

27617/D

A XXXI. Mor

JO. BAPTISTÆ
MORGAGNI

P. P. P. P.

OPERA OMNIA.

JO. BAPTISTE

MORGAGNI

P. P. P.

OPERA OMNIA.

J O. B A P T I S T Æ
M O R G A G N I

NOBILIS FOROLIVIENSIS

IN CELEBRIMO

PATAVINO GYMNASIO

THEORICAM PRIMUM MEDICINAM, DEINDE ANATOMEN
E PRIMARIA SEDE ANNOS JAM TRES ET
QUINQUAGINTA DOCENTIS

OPERA OMNIA

IN QUINQUE TOMOS DIVISA.

QUORUM OPERUM

QUÆ ANTEA, ET UBI, ET QUÆ NUNC SINT EDITA,
PRÆFATIO OSTENDET.

TOMUS PRIMUS

CONTINENS

ADVERSARIA ANATOMICA OMNIA.



ANNO MDCCLXV.

EX TYPOGRAPHIA REMONDINIANA.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

Handwritten signature or stamp at the bottom of the page.



MORRIS

WELLOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

WELLOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

WELLOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

WELLOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

WELLOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

WELLOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

WELLOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

WELLOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

WELLOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

WELLOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

WELLOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

WELLOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

WELLOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

WELLOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

CLEMENTI XIII. PONTIFICI MAXIMO

Joannes Baptista Morgagnus.



INTER plurima, eaque magna, pro
quibus Largitori bonorum om-
nium **DEO** gratias ago, benefi-
cia, illud certe est, **PATER SANCTISSIME**, quod
per Beatissimos Decessores Tuos, inprimisque
CLEMENTEM XI. & BENEDICTUM XIV. imperti-

vit. Eorum enim non modo uterque in me ornando liberalissimus fuit, sed alter ut ad inserviendum SERENISSIMÆ huic REIPUBLICÆ venirem, alter ut perstarem, benigne annuit, superiorum Pontificum Concessa amplificando, exemplumque in me renovando Privilegii illius, quo LEO X. Pontifex Maximus unum olim ex Majoribus meis Augustinum, missis ad eum Brevibus, quas vocant, Litteris, honestaverat, ut quandocunque Forolivii esse non posset, locum tamen a Civitate datum, haud secus ac si adesset, in ea retineret. Id vero mihi gratissimum fuit, non quod a Patria, quæ vita ipsa carior est, libenter abessem, aut quod eximia, atque adeo regia in me VENETA Munificentia duceret; sed quod meis hic insenescens studiis, in tanti Gymnasii luce, & toties SENATUS Sapientissimi perhonorifico de me judicio excitatus, is aliquando evadere fortasse possem unde aliquid honoris in Patriam redundare videretur. Quod meum consilium, datis ad eam unis, & alteris, quæ typis commissæ, vulgatæque sunt, Litteris a me expositum, nuper ipsa quoque adeo probavit, ut, quasi is jam evasissem, viventi adhuc ea decreverit, quæ ne post mortem quidem, suspicari unquam potuissem, esse decreturam. Sed longe majus mei consilii præmium ab eo usque tempore hic ceperam quo TU, PATER SANCTE, Patavinis Sacris præfuisti. Neque enim, nisi hic per-

stitissem, is usquam aditus patuisset venerationi erga TE meæ, quem Tua ipsa innata Benignitas ultro aperuit, modo studiosos, quos docerem, Juvenes, modo exteros Proceres, quos consiliis medicis juvarem, commendando, interdum quoque pro TIBI carissimis, imo pro TE ipso (quæ utinam nunquam amplius redeat occasio) eadem requirendo. Et admiratus quidem fueram semper cæteras excellentes Virtutes Tuas; tunc vero illam quoque suspexi, cum acerbum artus dolorem patienti adeo animo ferres, ut de illo nulla, sed de impedimento omnes essent querelæ Tuæ, quod sic iis quæ jugiter agere consueveras, per dies aliquot afferebatur. Consueveras autem quæcunque sive ad DEI Immortalis cultum, sive ad concrediti gregis emolumentum attinerent, & solícite curare, & præstare diligentissime. Ostendunt Tempia, quæ solemni ritu consecrasti, quæ donariis magnificis exornasti, quæ dignitate, & honoribus amplificasti. Egentes autem, quos & perquirebas, & invisebas, & sublevabas, Charitatem, & Liberalitatem in se adhuc prædicant Tuam. Quin Civitas hæc universa quantopere ipsam diligeres, oblivisci nunquam poterit. Sane id perspexit, non solum cum celeberrima Sacra Æde nocturno, rapidoque incendio correpta, aut cum ipsa vehementissimo illo turbine perterrefacta, sollicitudinem omnes vidimus, & fervidas pro nobis preces audivi-

mus Tuas; verum etiam cum identidem aut pueris Divina Myſteria explicabas, aut Cæleſti Pane Tuis ipſe manibus nos cunctos paſcebas, aut de loco ſuperiore verba faciens, docebas, obteſtabaris, permovebas. Et ad permovendum quidem nihil in Oratore eſſe efficacius poteſt, quam ſi illum eadem feciſſe, & facere videamus, ad quæ hortatur; ſed magna ſimul vis eſt eloquentiæ & ſacræ, & paternæ. Quidquid præcipiebas, ut erat a DEO, ſic per ſe erat *omni gladio ancipiti penetrantius*: iis autem verbis præcipiebas, quæ Parentis eſſent amantiſſimi, non errantem filium, ſed (quod Antifiitem decet, non minus charitate, & prudentia, quam zelo præditum) errorem unice inſectantis. b. Sacra autem iſta gravi ſimul & flexanima, ſimul leni mitique Eloquentia cum ſine doctrinæ, & litterarum ſubſidio homines ſatis inſtructi eſſe non poſſint; hinc Tuus ille ſingularis in Scientias, & optimas Artes amor, favorque exiſtebant: quos non Seminarium modo hoc Patavinum, peculiare ſemper illarum domicilium; ſed & Univerſitas hæc noſtra ſenſit, cujus in Hiſtoriis cum tot exiſtent non vulgari laude digniſſima, tum nihil eſſe glorioſius poteſt, quam TE, BEATISSIME PATER, ejus Archicancellarium fuiſſe, idque eo magis, quod TE necdum eſſe ejus oblitum, perrarum noſtris in Regionibus Donum, non ita pridem a Tua Beneficentia ad eam miſſum, oſtendit. Quid? quod in

mediocritate, vel potius in tenuitate hac mea quidpiam fortasse esse, existimans, quo Rei Anatomicæ, Medicæque dediti homines juvari possent, eo sæpius in colloquiis Te demittebas, ut de meis senilibus Scriptis sciscitareris, & quantum progredierentur, quando exitura essent, ex me quærereres. Quæ res una mihi animos addidisset, ut id facere antea auderem quod nunc facio, nisi Te Tua Eximia Merita, bonis omnibus gaudentibus in eum Locum evexissent, ut qui Patronus meus eras, meus jam Princeps, & Dominus esses, gemina Potestate verendus. Equidem & ego lætabar, ut qui maxime, Dominum mihi ex ea potissimum REPUBLICA esse datum, cujus in me imperium ultro appetiissem, & erga inservientem expertus essem benignissimum. Attamen hinc Majestatis Tuæ Altitudinem, hinc humilitatem spectans meam, nunquam mihi tantum sumpsissem, nisi Patronus alter, egregie vel antea de me meritus, Cardinalis Eminentissimus Carolus REZZONICUS, cujus omnes laudes complecti melius nequeo, quam si Te Patruo dignissimum dicam, Tuis me verbis certiolem nuper fecisset, perstare in Te, PATER BEATISSIME, (quæ Tua nunquam satis prædicanda Benignitas est) antiquam illam Tuam de me opinionem, eandemque benevolentiam. Qua una confisus, non amplius veritus sum, ne forte audacior viderer, si quanta maxima possem animi demissione non seni-

lia solum, sed universa, qualia ea cunque sint, mea Scripta Majestati Tuæ per epistolam hanc offerrem, quæ ut prolixior sit, multo plura tamen de Tuis Virtutibus, & de iis quæ TIBI, & Decessoribus Tuis debeo, omisit, quam attigit. TU, PATER SANCTE, pro Tui Animi magnitudine veniam dabis, & si bene TE novi, libenter dabis, quod duo hæc denique precari ausim, alterum, ut a Supremo Domino, alterum, ut a Summo Sacrorum Præsidente. Alterum est, ut qua me Benignitate, eadem semper TIBI placeat meos quoque respicere, quo nomine non filios dumtaxat intelligo, sed & Cives, TIBI devotissimos, meique amantissimos, Forolivieneses. Alterum, ut quod mihi, cum hic Episcopus olim eras, ad TE adeunti, semperque, ut memineris, id petenti, idem nunc quoque ad Tuos Sanctissimos Pedes provoluto Episcoporum Episcopus largiaris, nempe ut Dextera in Crucis modum ducta, ab Eo cujus in terris locum tenes, bene mihi precari velis. Sic idem Præpotens DEUS, meis, atque adeo omnium votis annuens, TIBI, PATER SANCTISSIME, feliciora tempora, & quam diutissimam incolumitatem retribuat.

Patavii Pridie Kal. Novembres MDCCCLXIV.



BENEVOLIS LECTORIBUS

ANTONIUS LARBER

CELSISSIMI AC REVERENDISSIMI

PRINCIPIS & EPISCOPI TRIDENTI

MEDICUS CONSILIARIUS,

ET BASSANENSIS CIVITATIS

ARCHIATER.



I quorum scripta sunt, quæ publicam mereantur prodire in lucem, & quæ Scientiarum Artiumve nobiliorum studiosos non modo oblectare, sed summorum etiam virorum existimationem assequi possint, ea certe sunt illorum, qui postquam diu in excolendis eximiis iisdemque maxime utilibus disciplinis magna cum laude ac felicitate sunt versati, in id devenere consilii, ut, colligendo in unum meliores animadversiones quas multorum annorum serie in proprium usum conscripserant, Opus tandem conficiant, quo hæc studia vel magis provehant peculiaribus illustrationibus, vel novis locupletent inventis. Hujusmodi homines si forte, de majori famæ nominisque celebritate parum solliciti, per se adduci nequeant, ut quæ privatim lucubra- runt in lucem proferant; hi certe omni ope sunt excitandi obsecrandique, ut communi studiosorum utilitati velint aliquando prospicere, suæque scripta typis mandando, tum bono publico, tum suæ gloriæ consulere non recusent.

Hæc

Hæc nobiscum animo reputantes, Joannes amantissimus Parens meus & ego, mirari subinde soliti eramus, Virum celeberrimum Jo. Baptistam Morgagnum, cujus quamvis temporibus longo intervallo diversis uterque in Gymnasio Patavino fuimus Auditores, post edita olim *Adversaria*, *Epistolas Anatomicas*, & perpauca Opuscula, nihil exinde e penu ingenii sui depromptum voluisse typis committere: quum nobis certo constaret infinito pene numero Observationum tam Medicarum quam Anatomicarum suos privatos Codices ipsum augere quotidie consuevisse. Quum vero hi sermones inter nos incidissent, quo tempore quotannis studiorum meorum causa Patavium me conferre adhuc solebam, ubi pro summa humanitate erga me sua Viri hujusce præclarissimi familiaritate & consuetudine quotidie utebar; contigit mihi eum quadam die invisenti, dum varias ejus chartas nescio quid reperiendi causa, ipso annuente, versarem, forte fortuna oculos injicere in Codicem ipsius manu exaratum, nondum tamen absolutum, cui præfixus erat titulus: *De Sedibus & Causis Morborum per Anatomen indagatis*. Titulo ipso permotus cursim pervolvi aliquot ejus Capita, quæ mihi ante oculos obvenerant, ex quorum quantumvis celeri lectione haud difficile fuit pretium Operis deprehendere, quippe quia per hunc Librum novam magnamque lucem scientiæ tam Medicæ quam Anatomicæ videbam affundi. Certiore a me confestim facto Parente meo de hoc Morgagni Codice inter cumulum chartarum ejus reperto, ille per epistolas, quarum intercedebat inter eos frequentissimum commercium, ego, qui Patavii commorabar, voce ac precibus doctissimum Auctorem hortari, rogare, instanter urgere, ut tam præclarum tamque singulare Opus & perficeret quantocitius, & publici juris faceret. Ægre hoc quidem a modestissimo Viro innumeris occupationibus iisque pluribus quam ætas ferat distento, sed tamen ob peculiarem amorem ac benevolentiam qua semper usque ab adolescentia utriusque nostrum nos est prosequutus, non multo postea impetravimus.

Verum quia legentibus hoc Opus *de Sedibus* non ita raro vidimus occurrere citatas quasdam ejusdem Auctoris Observationes propositas aut in *Adversariis*, aut in *Epistolis Anatomicis*, aut etiam fusas sparsimque disseminatas tum in cæteris ejus, tum in aliorum Scriptorum Libris, quarum constanti more suo nullius repetit descriptionem, sed loca tantum indicat ubi singulæ sint quærendæ; hinc Virum clarissimum iteratis precibus eo adduximus, ne saltem prohiberet, quominus reliqua ejus Scripta recuderentur omnia unum in Corpus collecta, quo facilius in Voluminibus annexis Operi *de Sedibus*, ejus observationes in hoc ab se memoratas, Lectores, si qui vellent, possent & consulere, & fusius expositas invenire. Sed hæc nobis exequi jam cogitantibus (quod est miserum rerum humanarum fatum) amantissimus Parens meus immatura morte decessit, meque meaque omnia luctu ac mœrore complevit. Ut naturæ justisque meritissimi de me Parentis satisfeci, illius hæres hac etiam in re non solum susceptum a nobis consilium sequutus sum, verum etiam quoad fieri per me potuit, nihil eorum prætermisi, quæ ad persuadendum valerent Sapientissimo Viro, ut mihi per eum liceret alia simul evulgare necdum edita ipsius Scripta, quæ mihi videbantur litterario Orbi futura non minus utilia, aut certis de causis non minus grata, quemadmodum in enumeratione Operum abs me petitorum mox apparebit. Quod tanto enixius rogavi efflagitavique, quia firmum ejus propositum mihi jam innotuerat, ut quidquid ab ipso con-

scri-

scriptum post mortem ab hæredibus inveniretur, nullius Scripti ratione habitum vellet igne comburi. Inter cætera quæ flammis eripi digna videbantur, libenter si fas fuisset in publicum protulissem.

Consilia Medica prope innumera, sed præsertim complura pro Ægris aut Dignitate, aut Nobilitate, aut Scientia insignibus quæsitâ; aut Responsa nomine utriusque Collegii Medici Patavini ab ipso conscripta.

Adnotationes multas, quæ novæ Idæ suarum Institutionum Medicarum inservire debebant, & quæ prospectum suæ Methodi docendi hanc scientiam fufius exhibebant.

Animadversiones multo plures ad Historiam Anatomes, Scriptorumque Anatomicorum pertinentes, sed præcipue ad explicationem Tabularum Eustachianarum spectantes.

Quamplurimas vero ejusdem generis Animadversiones ipsi obortas in legendis tum vetustioribus tum recentioribus Anatomes & Physiologiæ Scriptoribus. Perpetuus enim celeberrimi Auctoris nostri mos fuit, ut quod novum ipsi videretur, dignumque examine id accurate annotaret, adderetque postea quid deprehenderet, nec silentio præteriret unquam quod detegeret a vero recedere, & oriri vel ab observationibus non tam sæpe quam par erat repetitis, & minori quam oportebat diligentia institutis, vel ab eo quod Veterum Auctorum verba non probe fuerint ab iis Scriptoribus intellectâ. Quarum annotationum utriusque generis exempla non pauca facile licebit Lectori cuique non indocto agnoscere in memorato Opere de *Sedibus*; simulque quum offenderit loca quædam recentiorum Scriptorum qui ab eo nonnunquam videantur dissentire, non parvam eruditionis scientiæque segetem sibi comparabit, si attente meditabitur serioque exquiret, unde Auctoris nostri ab iis dissensio proficiscatur.

Præter ea quæ huc usque retuli, inter ejus quoque Schedas offendi infinitum eruditarum Adnotationum numerum, quas Vir doctissimus scriptavit, ut occurrebant, subsecivis quibusdam horis quibus animum a gravioribus studiis relaxare cupiebat, legendo nunc Poetas illustres non Italos minus quam Latinos, nunc Ciceronem, nunc Livium, nunc alios Latinos Auctores, & præcipue Julium Cæsarem. Quæ quidem Adnotationes quantiponderis ac momenti sint, ex Epistolis ab nostro Auctore editis in Scriptores Rei Rusticæ, itemque in Celsum, & Samonicum satis intelligi potest.

Sed quoniam ea quæ hætenus memoravimus omnia brevitatis gratia a Clarissimo Morgagno ea ratione sunt exarata, ut inutilis futurus esset quivis labor ad ea intelligenda susceptus; nec Consilia sua Medica a quoquam legi Auctor finit, veritus quippe ne ab annexis adjunctisque ægrorum nominibus colligi vel conjici queat aliquid, quod latere quemque debeat; & Responsa Collegiorum nomine conscripta, Collegiorum ipsorum, non sua esse dicit; hisce de causis ego ex Schedis ejus omnibus, quas fors dedit inspicere, vix reperire potui intelligibili modo scriptas paucas illas, quas ut possem typis committere, assiduis & nunquam intermissis obsecrationibus meis fere coactus tandem aliquando permisit.

Verum dum præ manibus haberem non modo illas chartas quas pervolvendas mihi concesserat, ut ex Epistola ad me missa, & in Parte I. Opusculorum jam edita apparet, sed alias etiam omnes, quarum modo mentio facta fuit,

fuit, Consiliis Responsisque exceptis; inter illas forte reperi complures Epistolās a Viris tum in aliis Disciplinis, tum in Anatome præstantissimis ad ipsum datas, quas ego per quam lubenter evulgassem, si ab illo facultas facta fuisset. Sed quum, curiositatis mihi excusationem prætexens, eas lente percurrerem, vix pauca ex illis verba, quasi aliud agerem, transcribere licuit, id quod ob ea quæ infra dicam, fecisse me, gaudeo.

Erat in illis Epistolis quam Joannes Albertus Körff Imperialis Majestatis Russæ Camerarius Ordinarius dedit Petropoli pridie Kal. Octobris 1735. quum illius cujus Præses erat Scientiarum Academia Diploma mitteret, in qua Epistola Morgagnum appellat *Virum Celeberrimum*, atque in *Anatomes scientia longe omnium principem*.

Erat & quam summus Mathematicus Joannes Bernoulli Basileæ dedit viii. Idus Februar. 1725. hoc interiore titulo: *Viro Incomparabili Jo: Baptista Morgagno Anatomicorum Principi*: Qua in Epistola paullo inferius id scriptum legi: *Quo enim alio Duce atque Auspice uti potuisset Daniel Filius meus Patavium missus, ut Te in Re Anatomica docentem audiret, quam Te, Vir Præstantissime, qui unanimi consensu omnibus qui in toto Orbe florent hoc tempore Anatomicis longissime antecellis?*

Erat & data ab summo Anatomico Friderico Ruyschio Amstelodami postridie Kalend. Octobris 1721. quum suorum Adversariorum Decadem I. & II. Morgagno mitteret, præfixo hoc interiore titulo: *Clarissimo Excellentissimoque Viro D. D. Morgagno Anatomicorum Principi*.

Erant & aliorum aliæ his similes, nominatim duæ a Præclaro Anatomes Professore Joanne Saltzmanno datæ Argentorati, altera ipsis Kal. Maji 1720. altera pridie Kal. Decembr. 1722. quarum interior titulus idem erat, ac in illa Ruyschii.

Hæc quam simillima præconiis jamdiu editis ab Heistero, Lancisio, aliisque omnium fere gentium celeberrimis Viris, tum præterea quod Morgagnus primus omnium, quantum scio, qui nunc vivunt, nempe anno 1706. Anatomica typis mandare cœpisset, eaque toties, & in litteratissimis quidem Civitatibus, cum apud nos, tum longe etiam ab Italia recusa, quæsitæ, laudatæ; Anatomem autem e prima sede tanti Gymnasii ab anno 1716. usque ad hoc tempus docuerit; hæc, inquam, me utique permoverunt, ut circum ejus Imaginem in fronte Magni Operis de *Sedibus & cæt.* positam, quum nihil ipse circum scribendum misisset, nisi quod de die natali suo subscribi volebat, notum illud de Sallustio Martialis (a) distichon, parce detortum sculpendum ipso inscio curaverim

Hic est ut perhibent doctorum corda virorum

Primus in humani corporis Historia.

Propter quod mihi subiratus esse nunc desinet, nisi & Forolivienfibus suis quos non minus amat, quam ab ipsis amatur, irasci velit. Illi enim meum sequuti exemplum, circum marmoream ejus Effigiem, quam nuper in majori Publici eorum Palatii Aula magnifice ornatam posuerunt, idem distichon sculpendum curarunt. Cujus pulcherrimi facti quum ad me fama perve-

(a) Epigramm. libr. xiv. 191.

pervenit; operam confestim dedi, ut ejus exemplum Operis accurate descriptum ad me mitteretur, ipsumque ærea tabula fideliter repræsentari volui. Eam Tabulam post hanc Præfationem videbitis.

Jam enim ad Operum omnium seriem quæ nunc a nobis exhibentur descendamus oportet; in qua recensenda ordinem servabimus in quem Auctor maluit esse disposita.

Adversaria Anatomica omnia imprimis exhibemus, quorum *Prima* edita sunt primum Bononiæ 1706. typis Pisarri in 4. magno, deinde Lugduni Batavorum 1714. apud Wishoff in 8, & Patavii 1719. apud Cominum in 4, & Lugduni Batavorum 1723. apud Langerak in 4, & rursus apud eundem 1741. in 4. *Altera* & *Tertia* excusa fuere Patavii apud Cominum 1717. in 4, & Lugduni Batavorum apud Langerak 1723, & rursus 1741. in 4. *Quarta* denique, *Quinta*, & *Sexta* impressa fuere Patavii 1719. apud Cominum in 4, & Lugduni Batavorum 1723. apud Langerak, & rursus 1741. in 4. Ex his omnibus selegimus Editionem Comini inscriptam *Adversaria omnia*, quippe sub oculis Auctoris habitam, & ab ipso cæteris semper præpositam. Tabulis Archetypis ab Auctore ad nos missis usi sumus; & data quoque ab ipso est opera ut Index non paginis, sed articulis & animadversionibus responderet.

Epistolæ Anatomicae viginti subsequuntur, quarum duæ priores prodierunt 1718. Lugduni Batavorum apud Jo. a Kerkhem in 4, & nunc primum in Italia per nos eduntur, ab innumeris operarum erroribus, jam olim ab Auctore notatis, diligenter expurgatæ. Quæ succedunt reliquæ *Epistolæ* duodeviginti editæ primum fuerant cum Valsalvæ Operibus Venetiis 1740. typis Pitteri in 4, duos in Tomos divisæ; & deinde 1741. apud eundem in 4. minori, unumque in Tomum redactæ. Nos sequuti sumus primam Pitteri Editionem, aut quæ sub oculis Auctoris, eam unice probantis, perfecta est.

De Sedibus & Causis Morborum per Anatomem indagatis Libri Quinque succedunt, multiplici accuratissimo utilissimoque Indice instructi, duosque in Tomos in fol. divisi. Hi ann. 1761. ex Typographia Remondiniana primum prodierunt, ubi ut ederentur quo majori posset diligentia, Auctor curam impressionis tum horum, tum reliquorum Operum nominatim mihi commisit, quam utinam præstare animo ob gravissimum amissi Parentis casum non perturbato licuisset. Anno 1762. hi quinque Libri recusati fuerunt Neapoli sumptibus Dominici Terres in 4. quatuorque in Tomos divisi, & nunc iterum in fol. ex Remondiniana Typographia exierunt; quod toties tam brevi spatio ulli Operi præsertim ejuscemodi molis accidere, perrarum est.

Miscellanea denique *Opuscula* seriem claudunt tres in Partes divisa. Quorum singulorum quum brevis Indiculus singulis sit Partibus præfixus, reliquum hic nobis est, ut quæ nunc primum prodeant, quæ vero alibi, quando, ubi, qua forma, & apud quos typis fuerint commissa indicemus.

PRIMA PARTE continentur quæ ad Rem Medicam & Anatomicam spectant, eaque sunt

La Nova Institutionum Medicarum Idea Patavii edita apud Coronam 1712. in 4. magno; & Lugduni Batavorum apud Langerak in 4. 1740, & cum *Adversariis* conjuncta 1741.

De via atque ordine in tradenda publice Medicina atque Anatome Epistola ad me missa ; quam ut Auctor ederet non æque facile, ac ut scriberet, impetravi. Difficilius tamen fuit ut concederet Proœmia quæ continuo sequuntur, a nobis inter ejus Schedarum acervum reperta, quæ veniunt hoc titulo :

Proœmia quædam Anatomicarum Prælectionum.

De Anatomicis Eustachii Tabulis Epistola, cum his ab Lancisio edita Romæ 1714. apud Gonzagam, & Genevæ 1717. cum Theatro Anatomico Mangeti apud Cramer & Perachon ; & rursus Romæ 1728. sumptibus Pagliarinarum semper in fol.

De Glandulis Epistola, a Michelotto vulgata in suo de Separatione Fluidorum Libro Venetiis 1721. apud Pinellos in 4.

De Lacrymalibus Ductibus, eorumque obstructione Epistola edita ab Anelio in Libro inscripto : *Suite de la nouvelle methode de guerir les Fistules &c.* Taurini 1714. apud Maireffe in 4.

De Lumbricis Epistola, a Vallisnerio vulgata in suo Libro, cui titulus : *Considerazioni intorno alla generazione de' Vermi* Patavii 1711. typis Seminarii in 4 ; & recusa inter illius Opera Venetiis 1733. apud Coletum in fol.

De Acu intra vesicam intrusa, & de Excrescentia Membranae Adiposæ Epistola, quæ habetur in Centuria V. Ephemeridum Cæsareæ N. C. Academiæ, Noribergæ 1717 typis Heinii.

De Calculis Felleis Epistola, quam videre etiam est in II. Volumine Actorum ejusdem Academiæ. Ibid. 1730. typis Adelbulneri.

De Venæ Cavæ Varicibus Epistola, edita ab Antonio Cælest. Cocchio cum suis Epistolis Physico-Medicis Romæ 1725. apud Antonium de Rubeis in 4, & Venetiis 1762. apud Remondini in novissima Sydenhamii Editione in fol.

De Vesicæ Calculis a Fratre Jacobo Beaulieu Patavii exsectis, & de Casu Cornelie Bandiæ Epistola, quæ an edita adhuc alibi sit, ignoramus.

In locum Vitruvii Medicum Epistola, quæ extat in Exercitationibus Vitruvianis secundis Poleni 1739. Patavii typis Seminarii in fol.

De iis quæ a Valsalva in Bononiensi Academia Instituti Scientiarum recitata fuerant Epistola, quæ habetur in Tomo I. Commentariorum de eodem illo Instituto Bononiæ 1731. in 4.

Experimenta circa Aquam Calcis vivæ, quæ sunt in eodem Tomo I. illorum Commentariorum.

Responsum Medico-legale circa Obstetricum Judicium de mulieris Virginitate, editum Romæ 1739. typis Rever. Camer. Apostol. in 4.

Responsum Medico-legale alterum super seminis emittendi impotentia, quod nunc primum typis editur, ut & sequens

Responsum Medico-legale tertium. An post septem a conceptione menses infans nasci possit vitalis & perfectus?

In A. Corn. Celsum, & Q. Serenum Samonicum Epistolæ decem, quarum primæ quatuor Patavii exierant 1721. apud Cominum in 8, & Hagæ Comitum 1724. apud Alberts in 4, & rursus apud Cominum cum Celso 1722 : omnes autem tum solæ, tum simul cum Celso apud eundem Cominum 1750. in 4.

SECUNDA PARTE continentur quæ ad Clarorum Medicorum Historiam, ad Philologiam, & Rem Rusticam spectant, eaque sunt.

De Prospero Alpino Epistolæ duæ, quæ nunc primum typis mandantur.

De Philologo Ravennate, & de Angelo Bolognino Epistola, quæ editur hic, ut ad ambos attinet; nam ut ad singulos, edita fuerat ab Astruc in Tomo II. editionis secundæ suorum de Morbis Venereis Librorum Parisiis 1740. in 4.

De Vita & Scriptis Dominici Gulielmini Commentariolum, quod extat cum Centuria IV. Ephemeridum Cæsareæ N. C. Academiæ Noribergæ 1715. typis Adelbulneri, & Genevæ apud Cramer & Perachon tum 1719. cum Operibus Gulielmini in 4, tum 1731. in Bibliotheca Scriptorum Medicorum Mangeti in fol.

De Vita & Scriptis Antonii Mariæ Valsalvæ Commentariolum, cum hujus Operibus Venetiis editum 1740, & 1741. in 4. apud Pitterum.

De genere mortis Cleopatæ Epistolæ duæ, editæ ab Lancisio in Appendice ad Mercati Metallothecam Vaticanam Romæ 1719. typis Salvioni in fol.

De ordinario Frontini Consulatu Epistolæ duæ, quarum prima vulgata est a Poleno cum Frontino de Aquæductibus 1722. Patavii typis Seminarii in 4, altera nunquam antea prodiit.

De quadam Librorum M. Varronis particula, ut legitur in veteri Codice Epistola, quæ extat in Tomo IV. della Raccolta d'Opuscoli scientifici & Filologici. Venetiis 1730. appresso Cristoforo Zane in 12.

In Vitruvii locum, ad tempus quo is scripsit, attinentem, & in alterum Veteris Auctoris Compendii Architecturæ Epistola, nunc primum edita, concedente Auctore, qui vix adduci potuit precibus ut idem permitteret de Schedis quæ proxime sequuntur.

Laudationes habitæ olim a Morgagno quum Gymnasiarchas, aliosve Doctores insignibus ornaret.

Denique *In Scriptores Rei Rusticæ Epistolæ quatuor*, editæ Lipsiæ cum iisdem Scriptoribus Tom. II. 1735. sumptibus Fritschii in 4.

PARS TERTIA nihil continet quod antea fuerit editum. Sunt enim quatuordecim Epistolæ Historico-Criticæ, quas Auctor Æmilianas vocavit, propterea quia plerasque in Æmia scripsit, omnesque ad Antiquitates & Geographiam attinent partis non modicæ Provinciæ illius. Singulis autem iis Epistolis quid contineatur, Summariâ universis præfixa satis ostendunt.

Sed antequam præfandi finem faciam, non longe abs re erit, si Lectores præmoneam breviter, simulque orem ne valde succenseant aut mirentur, si quos forte errores in hac quam maxime fieri potuit accuratissima emendatissimaque Editione offenderint. Præterquamquod enim nemo est adeo Lynceus, ut nihil omnino oculorum ejus effugiat aciem, si quæ clanculum irreperint errata, non una tantum prætendi potest eorum excusatio. Nam & procul ab Auctore impressum Opus fuit; & fato nescio quo Opusculis certe malo evenit, ut pagina quædam amissa fuerit, in qua nonnulla Æmilianarum loca restituebantur; quod tamen mirum esse cuicumque desinet, cum sciverit non nulla etiam *Errata* ab Auctore deprehensa, & ad Remondinianum Typographum per Epistolas distincte missa, ex parte periisse. Utrique incommodo, ut quoad fieri potest subveniamus, separatim novam paginam in calce Opusculorum addemus, ea quæ amissa sunt indicantem.

Restat nunc ut Viro de Litteraria ac imprimis Anatomica & Medica Republica egregie merito diuturnum ævum a Superis omnes bonarum Artium studiorumque cultores enixe precentur. Modo enim vita suppeditet quædam

dam nova, quæ in promptu habet, Anatomica Inventa, novasque Observationes & Animadversiones a se perscribi posse sperat, & alia insuper, quæ tanquam Pars Quarta Opusculorum poterunt haberi. Cæterum si, postquam fato functus erit, (quod Dii per plures adhuc annos avertant) prodibit quidquam suo inscriptum nomine, jam nunc tanquam adulterinum foetum a se rejici per me omnes moneri vult.

Denique promissam a me supra, Monimenti imaginem quod grata Sapiensque Patria tanto Viro statuit, inspicientes, gaudebitis, esse adhuc Civitates, quæ, ut de sua regione agebat Cicero in Oratione pro Planicio, *se suorum honore ornari, augerique dignitate, arbitrantur*. Nam si pleræque imitarentur hujusmodi exempla, dici non potest, quot adolescentum ingenia ad Litterarum Scientiarumque studia multo enixius, quam solent, excolenda incitarentur. Valete.

BASSANI Pridie Kal. Novembres ann. 1764.





IO. BAPT. MORGAGNO NOB. FOROL
PATRIA
INVENTIS LIBRISQ. EIVS PROBATISSIMIS
VBICVNQ. GENTIVM ILLVSTRATA
DECREVIT A.D. MDCCLXIII
PONENDAM IN CELEBERRIMO HOC LOCO
MARMOREAM EFFIGIEM
ADHVC VIVENTIS

JO. BAPTISTÆ
MORGAGNI

IN PATAVINO GYMNASIO

PRIMARI ANATOMES PROFESSORIS

ADVERSARIA

ANATOMICA OMNIA

Archetypis æreis Tabulis Cominianis ab Auctore ipso communicatis, &
universali accuratissimo Indice orhata,

OPUS NUNC VERE ABSOLUTUM,

INVENTIS, ET INNUMERIS OBSERVATIONIBUS,
AC MONITIS REFERTUM,

*Quibus universa humani corporis Anatome, & subinde etiam quæ ab hac pendent,
Res Medica, & Chirurgica admodum illustrantur.*

Α' μάκαρ ὅσις ἔην κῆνον χρόνον ὄδρις αἰδῶν
Μυσάων θεράπων, ὅτ' ἀκίρατος ἦν ἔτι λημῶν.
Νῦν δ' ὅτε πάντα δέδασαι, ἔχουσι δὲ πῶρα τέχνηαι,
Ἦσαντο ὅτε δρόμον καταληπόμεθ', ἔδεται ἔσαν
Πάντη παπταίνοντα νεοζυγὲς ἄρμα πελάσαι.

Felix Musarum qui sacra colebat in illo
Tempore cum intonso surgebant gramina campo;
Omnia nunc dispersa: suis stant finibus Artes:
Postremi in stadio superamur; nec licet ulli
Quocumque aspiciat, modo junctum impellere currum?

Charilus apud Muretum in Var. Lection. lib. 12. c. 14. Gr.



IN NOVAM HANC ADVERSARIORUM EDITIONEM
 TYPOGRAPHI
 AD LECTOREM
 PRÆMONITIO.



UM celeberrimi JOANNIS BAPTISTÆ MORGAGNI Anatomicorum nostri temporis facile principis Opera cum edita, tum inedita omnia meis typis in lucem proferre constituerim, atque ita absolutissimam eorum collectionem conficere, cl. Auctore ipso non solum probante, sed omnia quæ ad id necessaria sunt, perhumaniter subministrante, ab Adversariis Anatomicis initium ducere operæ pretium esse existimavi. Quanto in pretio opus hoc vere aureum apud Rei Medicæ, atque Anatomicæ Professores habeatur, nemo est qui ignoret; nullus enim fere est recens Anatomicus, qui illud magnopere non admiretur, & exquisitissimis laudibus non extollat. Duabus autem potissimum ex causis ad novam hanc Adversariorum editionem suscipiendam aggressus sum. Prior est, quod jamdiu ceterarum editionum exemplaria ad unum omnia distracta sunt, & communibus Litterariæ Reipublicæ votis undique expeti jam constat. Altera fuit præstantissimi Auctoris humanitas erga me sane singularis, qui non solum Adversaria sua omnia iterum recensuit, & quotquot in Cominiana editione, qua ego ad hanc meam recudendam usus sum, irreperant typographica menda, summa diligentia emendavit; sed etiam; quod præcipuum est; Tabulas æneas archetypas omnes, eas nempe, quas ip-

se primum delineandas, incidendasque curaverat, mihi communicavit. Quanta vero cum fide, & diligentia hujusmodi Tabulæ ex vero primum ab exercitatissimo Pictore delineatæ, atque ab eximio postea Scalptore incisæ fuerint, ex ea, quæ sequitur, cl. Joannis Baptistæ Vulpii ad Lectorem admonitione perspicui potest. Ad correctionem quod spectat, ego quidem etiam atque etiam curavi, ut quantum fieri potuit, egregio Operi diligentia mea responderet. Quamobrem quod Vulpius de Cominiana editione sua præfatus confidebat, ego etiam jure meritoque confidere possum, quod si forte hæc summi Anatomici egregia scripta aliis typis recusa denuo prodierint, neque tam exactam correctionem, neque (quod caput est, atque in Anatomicis rebus summi momenti) perfectam adeo Figurarum delineationem præ se ferent. Vale.





LECTORI BENEVOLO JOANNES BAPTISTA VULPIUS

PHILOS. ET MEDIC. DOCTOR,

Et in Gymnasii Patavini Theatro Anatomico
Publicus Incisor

S. P. D.



Um libros, qui ex Typographia Cominiana, nobis impensam facientibus, toto hoc biennio prodierunt, maximam partem ad studia humaniorum literarum pertinentes, non solum non improbari, sed contra & per Italiam, & apud ceteras excultas nationes, eruditorum atque elegantium hominum gratia quodammodo florere videremus; in spem optimam adducti sumus, gratissimum pariter iis omnibus fore qui rerum cognitione delectantur, si Anatomicum hoc Opus, a Celeberrimo Doctissimoque Viro profectum, iisdem typis excudi curaremus, nulli neque sumtui, neque labori parcentes, ut Auctoris & Operis dignitati industria nostra, saltem aliqua ex parte, responderet. Is est porro quem significamus, JOANNES BAPTISTA MORGAGNUS, in hoc nobilissimo Patavino Archigymnasio Anatomies Professor Primarius, & Præses, nec non Inclytæ Nationis Germanicæ DD. Artistarum Protector: de cujus laudibus si plura dicere instituam, laborem frustra suscepisse videar, cum eas nemo doctorum virorum ignoret; nisi forte in tanta ingeniorum varietate unus aut alter excipi debent, qui vel de novis inventis minime solliciti, in sola veterum doctrina libenter acquiescunt, aut malevolentia felle suffusi, ea quibus ipsi sunt impares, ut ait Hippocrates in Epistola ad Dionysium, tamquam exigua & supervacanea traducunt. At nemo profecto est hoc tempore, ex illis etiam qui singularem quendam antiquitatis amorem, & verbis

verbis & scriptis præ se ferunt, qui majore cura quam Auctor noster, veterum volumina scrutatus fuerit, eorumque existimationis & gloriæ (ubicumque per veritatem ei licuit) acriorem se vindicem defensoremque præbuerit. Hujus rei tot testes locupletissimos proferre possum, quot hætenus ab eodem Scriptore edita sunt fecundissimi ingenii Monumenta. Ceterum nec ipsi, nec ejus similibus viris vitio vertendum est, quod novis quotidie observationibus Rem Medicam, atque Anatomicam augere pergant; cum contra iis vel ob hoc ipsum quod in ea re majorum exemplum sequuntur, laus immortalis debeatur. Et sane quicumque recentium Anatomicorum libris perlegendis tempus insumunt, ii facile perspicere possunt, quo in pretio tanti Viri scripta sint apud gravissimos, experientissimosque ejus disciplinæ Professores, a quibus passim eorum quæ ipse vel solerter invenit, vel doctè restituit, vel apte ac sapienter correxit, mentio perbonorifica fieri solet. Nemo profecto Anatomicarum rerum cupidus invenitur, qui postquam ejus Adversaria Prima, sane aurea, & cedro digna, attentius evolaverit, ea se magno cum fructu, parique cum voluptate evoluisse non fateatur. Nemo veræ Medicinæ, ceterarumque disciplinarum quæ ad eam percipiendam necessariae sunt studiosus in hoc Gymnasium adventat, qui a publicis, privatisque hujus egregii, atque omnium scientiarum peritia instructissimi Magistri assiduè exercitationibus, pulcherrima, perutilia, solidissima, uberrima universæ Rei Medicæ dogmata non accipiat. Nemo tandem qui summam modestiam in proponendis, humanitatem in communicandis novis, & præclaris observationibus in hoc omni virtute ornatissimo, & jam extra invidiam posito Viro non admiretur. Quæ cum ita sint; cur hæc ejus Adversaria quæ in Clarissimi Mangeti Theatrum Anatomicum conscripta sunt (Secunda præsertim ac Tertia) a ceteris hujus Auctoris Operibus severitate quadam discrepare videantur, quæret aliquis fortasse. Sed cum primum ea quæ ad eundem Mangetum scripsit, Præfationis loco Adversariis Secundis præposita, & quatuor præterea Epistolas a nobis Adversariis Quartis præfixas perlegerit, non dubito quin, si æquus esse voluerit, illam eandem scribendi rationem jure ac merito sit probaturus. Hæc autem Adversaria quinque ab Auctore incredibili quidem celeritate, & inter adversæ valetudinis fere assiduas molestias, at qua tamen solet sedulitate, fide, solertia, atque eruditione exarata, & jam diu absoluta, singulari autem diligentia nostra, nec mediocri sumtu typis excusa, nunc omnia tandem in lucem prodeunt. Hæc dubio procul iis qui Theatro illo Anatomico uti volunt, valde profutura esse speramus, quod illos veluti manu ducent ad confertissimos, gravissimosque errores, quibus (quæcumque tandem rei causa fuerit) opus id scatet, cognoscendos atque evitandos; ita ut sine his Adversariis inutile, immo perniciosum (tironibus in primis) fuisset; & præterea quod illos pluribus in locis admonent ut ad alium potius Auctorem confugiant quam ad illum cujus lucubrationes Theatro insertæ sunt. Sed & ipsos Auctores Theatri (Verheyenium præsertim) vel seorsim legentibus, eodem adjumento erunt. Potissimum vero omnibus qui raras novasque observationes, ad Anatomem quidem præcipue, sed tamen subinde etiam ad Chirurgiam, Praximque Medicam pertinentes, quibus innumeris hæc Volumina ornantur, consideraverint, ut valde jucunda, sic maximæ utilitati fore confido. Invenient enim, de omni Humanæ Corporis partibus Auctorem hunc Præstantissimum, magno cum Rei Anatomicæ emolumento differuisse, nullam intactam reliquisse, sive multarum augendo vel corrigendo historiam, sive quarundam novos usus proponendo, aut ab aliis propositos illustrando; quod, si universalem Rerum Indicem qui statim sequitur percurrere non gravaberis, nullo negotio ita esse deprehendes. Et ne multorum quæ proponuntur desiderarentur Figure, ut has Auctor adderet, suadendo pluries, sæpiusque

pliusque ipsum pro summa qua me prosequitur benevolentia, rogando, perfecì; quinque idcirco nunquam antea editæ Figurarum Tabulæ appositæ sunt, quæ quantâ cum fide diligentiaque fuerint ex vero delineatæ, non satis dicere possum. Assidue enim exercitissimus Auctor Joanni Baptistæ Cromer Pictori peritissimo delineanti non solum aderat, sed circino sæpe magnitudines partium ipse recognoscebat, minimæque etiam lineolæ vel puncta addebantur cum opus erat, vel tollebantur; neque his contentus, si Figura aliquando veritati haud satis respondere viderentur, totas atque integras delebat. Tandem pictas novis cum partibus non semel & ipse per se conferebat, & ut solet (more scilicet magnorum virorum in veri perquisitione) suis sæpe oculis diffidere, a me insuper, quem sibi per hos quatuor annos ad publicas sectiones administrum instruxit, & habuit, iterum conferri volebat. Fuit ideo incredibilis cada-verum numerus, quæ in propositis hoc in Opere Observationibus repetendis, ab Auctore nostro Celeberrimo atque diligentissimo fuerunt dissecta; parque numerus illorum quæ eodem iubente ac monstrante ipse dissecai; non solum ob id, ut quod perpetuum, quod frequens, quod rarum esset, magis magisque percipere posset, sed etiam ut Celeberrimis Amicis (quos in hoc Opere honoris causa nominat) cunctisque auditoribus suis proposita, & quæ in universo hoc Volumine Lectoribus proponenda erant, ab oculatis testibus non semel cognoscerentur: quæ quidem omnia quocumque tempore, ut veritatem tuear, ostendere paratus sum. Uberrimas tandem Figurarum Explicationes non prætermisit, quas priusquam Opus attingas, ut perlegas tibi sum auctor; multa enim quæ hoc Volumine continentur, harum ope clariora fiunt. Quoniam vero Primorum Adversariorum Editio Prima Bononiensis non amplius apud bibliopolas reperitur, raroque secunda Lugduno-Batava in Italiam apportari solet; idcirco ipso recensente Auctore, elegantior, & quod ad typographiam spectat, accuratior Editio tertia Adversariis quinque novis præponitur, cujus in margine indicia quam plurima eorum locorum quæ in ceteris Adversariis reperiuntur, Auctor adjecit; in quibus nempe locis non pauca ad stabiliendas muniendasque primorum Adversariorum Observationes, Figuras, harumque Explicationes docte diligenterque scripta leguntur; quod pariter, Lector Amice, ipsum generalem Indicem cursimvolvendo cognosces. Quatuor vero Tabulæ quæ ad Prima Adversaria pertinent, sunt eadem quibus Auctor in Prima Bononiensi Editione usus est, quæ quoniam ab egregio Scalptore Francisco M. Francia olim incisæ fuerant, ut ab ipso ceteræ quoque (Auctore particulatim edocente, multaque per literas iterum atque iterum admonente) inciderentur operam dedimus. Tandem Quintis Adversariis duas Celeberrimi & Summi Viri JOANNIS MARIE LANCISII, Intimi Cubicularii, & Archiatri Pontificii, ad se scriptas & nunquam antea editas Anatomico-Medicas Dissertationes, unam de Vena Azyga, alteram de Gangliis Nervorum, non magis ob affinitatem materiæ, quam ob raritatem utilitatemque observationum Auctor adjunxit; in iis enim plurima nova, Rem Anatomicam Praximque Medicam æque illustrantia proponuntur. Nec non duas elegantissimas utilissimasque Figurarum Tabulas Dissertationibus respondentes, ab eodem Amplissimo Lancisio delineationis ope communicatas iisdem Adversariis Quintis apponi jussit; quæ quidem pariter Tabulæ ab eodem Scalptore Francia incisæ sunt. Excipe igitur benigno gratoque animo, humane Lector, Summi Anatomici egregia, ac perutilia scripta, in quibus perficiendis, & ad suum autographum exigendis, ut Auctor studio, labori, & nos in divulgandis curæ, diligentie, magnis sumtibus non peperimus, ita non injuria confidimus, si forte (quod Primis Adversariis contigit) aliis typis recusa denuo prodierint, neque talem correctionem, neque

neque perfectam adeo *Figurarum* delineationem præ se laturo esse. Fruere interim his laboribus atque studiis, & si faves, rursus ab eodem Auctore, & a nobis etiam fortasse, aliquid anatomicum, in usum *Medicinæ* & *Chirurgiæ* studiosorum expecta. Vale.



M U N I C I P A L I RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del *P. F. Francesco Antonio Mantoa* Inquisitor Generale del Santo Ufficio di *Padova* nel Libro intitolato *Joannis Baptistæ Morgagni P. P. P. P. Op. &c.* non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a *Giambattista Remondini* Stampator di *Venezia*, che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 7. Agosto 1762.

- (Sebastian Zustinian Rif.
- (Alvise Mocenigo 4°. Cav. Proc. Rif.
- (Polo Renier Rif.

Registrato in Libro a Carte 143. al Num. 700.

Giacomo Zuccato Segretario.

RERUM, ET NOMINUM MAGIS IN TOTO HOC OPERE NOTABILIMUM INDEX.

Numeri Romani Adversaria; barbari autem articulos, & Animadversiones denotant.

A



Abdominis Ligamenta Suspensoria nota fuerunt Veteribus. III. 1.
Eadem quid vere sint. Ibid.
Abdominis Musculi. II. 10.
Acceleratores Musculi descripti. IV. 20.
Quando, & quomodo agant. III. 40.
Accretionis simplicior hypothefis unde eruenda. II. 32.
Aetorum Lips. Scriptores laudati. I. 18. III. 3. 17. IV. 22. 29. 47. V. 37. VI. 7. 38. 45. 62. 67.
Adiposa Vasa. De his quid sentiendum. III. 2.
Adiposæ Membranae structura, & officium glandulare. II. 9.
Tumores, sive Excrescentiæ. Ibid.
Æthiopum nigredinis sedes etiam in cuticula, & cute. II. 4.
Anatomes Elementa quænam, & quot sint. II. 1.
Tradendæ methodus. Ibid.
Comparatæ utilitas ad medendum. II. 17.
Minutæ, ut vocant, utilitas ad idem. Ibid. & VI. 69.
Anellius Chirurg. Gall. laudatus. IV. 47. VI. 36. 37. 39. 42. 48. 62. 63. 64. 65.
Aneurysmata duplicis generis. II. 39.
Quomodo fiant, & cur frequentissime ad curvaturam Aortæ. II. 41.
In iisdem quare, & quomodo dispositi polypi sæpe inveniuntur. Ibid.
Eorum unum hians inventum, sed tamen ab affixo pulmone occlusum. II. 39.
Alterum brachiales nervos immediate comprimens, sed tamen sine ulla brachii noxa. VI. 24.
Anglefius Med. & Consil. Taurin. laudatus. VI. 64.
Ani Cellulæ quædam, & Canaliculi. III. 6.
Levatores Musculi quales, & quot ex locis oriuntur. III. 44.
Sphincter quidam magnus, communis etiam Vaginae. Ibid. & 45.
Valvulae quædam, & Columnæ, earumque usus. III. 6.
Ad anum plurium animalium Folliculi. IV. 29.
Aortæ Arteriæ humanæ quinam olim unum modo truncum proposuerint. I. 16.
Apoplexiæ desperatæ curatio a Zacuto habita, per anatomem explicatur. VI. 83.
Appendicula Intestinor. Vermiformis in homine nunquam deest. III. 14.
Ejus orificium ubi sit. Ibid.
Ad ipsum desinunt omnia Coli Ligamenta, & cur. Ibid.
Ejusd. Appendiculæ positio quænam. Ibid.
Ejusd. usus generatim inquiritur. Ibid.
Arteriæ fibræ carneæ sunt annulares; non spirales. II. 38.
Fibræ longitudinales internæ tunicæ non sunt satis manifestæ. Ibid.
Structura a Recentiorib. tradita, in bove tota satis apparet; non in homine. Ibid.
Truncus quidam insignis per femur, non sub, sed super sociam venam descendens a Chirurgis attendendus. II. 45.
Arteriæ in mortuis, cur sanguine (non tamen semper) vacuæ. II. 42.
Hic illic officiatæ ostendere solent erosione signa. II. 41.
Arteriæ singulæ. Vid. suis locis.
Articulorum Hydrops Hildani quomodo explicandus. II. 26.
Vulnera nec nimis sero, nec nimis cito occludenda, & cur. Ibid.

Arytænoidæarum Glandularum descriptio, & usus. I. 2.
Arytænoidæi Musculi in brutis gemini, quomodo in homine se habeant. I. 28.
Arytænoidum Cartilaginum articulatio cum Cricoidæ, ejusq. usus. I. 15. 29.
Cavitates, & harum usus. I. 2.
Cellulæ, & medulla sine officatione. I. 23.
Structura in bobus, & ovibus. I. 3.
Asphyxia. Quænam de hac investiganda. II. 42.
De ipsa nova quædam sententia refutata. Ib. & seq.
Auriculæ Sebaceis Glandulis pili innascuntur. IV. 31.
Auriculæ Cordis. Vid. Cordis.
Azyga Vena, hoc est Sine Pari. De hac Vid. post IV. Advers.

B

Bartholinus Casp. Th. F. laudatus. I. 31. V. 1. 11. 14. 38. 39.
Basioglossi Musculi. II. 13.
Bauhini Valvula adversus negantes vendicatur. III. 8. & seqq.
Quid vere & qualis sit. III. 11. & seq. & explic. Fig. 3.
Quomodo suo munere fungatur. III. 12.
Ejusdem Valvulae duo Frena, & horum Usus. III. 13.
De Figuris ejusd. Valvulae judicium. III. 56.
Beccarius Prof. Bonon. laudatus. III. 28.
Bergerus Jo. Goth. Archiat. Pol. laudatus. I. 16. 33.
Bernoullius Io. Prof. Basil. laudatus. II. 7.
Nicolaus Prof. Patav. laudatus. Ibid.
Bibliothecæ Anatomicæ edit. 2. Tabulæ quædam inversæ. II. 37. 48.
Tabularum quædam Explicationes erroneæ. VI. 29. 85. 100.
Bidloi lapsus. II. 6. 28. 29. 30. 32. 35. IV. 20. 21. 22. 49. V. 2. 19. 50. VI. 16. 35. 76. 77.
Bilis quidam usus impugnati. III. 24.
Viæ in Vipera. III. 25.
Boerhaavius Prof. Lugdunobat. laudatus. III. 2. 19. 40. IV. 13. V. 25. VI. 57. 62. 79. 89. 91.
Bohnus Prof. Lips. laudatus. I. 33. III. 19. 25. V. 1. VI. 59. 60.
Bovis Partes quædam observatæ. II. 16. III. 3. Vid. etiam Arteria. Arytænoid. Cavæ. Clitorid. Cord. Cricoid. Fœtus. Hyothyroides. Lacrymal. Laryng. Lymphæ. Penis. Sternothyroid. Subpalpebrales. Thyroidæa. Tonsillæ. Tracheæ. Uteri.
Briggii lapsus. VI. 68. 72. 76.
Bronchiales Glandulæ ante Verheyenium notæ. V. 41.
An sint ex Conglobatis, & lympham secernant. V. 34.
Bronchialis Arteria Veteribus non ignota. I. 24. V. 32.
Brownii lapsus. II. 9. & seqq. 17. 21.
Tabulæ undenam fuerint descriptæ. II. 12. 21.
Brunnerus Archiat. Palat. laudatus. III. 8. 19. 24. VI. 4. 19. 25. 26.
Bubonum venereorum in viris generationis explicatio Cowperi laudatur. IV. 22.
Eadem ad mulieres transfertur. IV. 27.
Bucretii lapsus. I. 16. II. 15. 18. 20.
Burgos Alexander Prof. Patav. laudatus. IV. 12.

C

Cæci Intestini veri magnitudo incerta est. III. 14.
Situs perrarus observatus. III. Ibid.
Cæcum Intest. perperam dictum. Vid. Appendicula. Calcu-

Et Nominum.

IX

Calculi Cystis. Vid. Cystis. IV. 29.
 Galdeus laudatus. IV. 47.
 Calvus P. B. Chirurg. Taurin. laudatus. IV. 29.
 Canis Folliculi ad anum. III. 3. 17. IV. 14. Vid.
 etiam Chyli Cisterna. Cord. Cricoid. Epiglott. Fœ-
 tus. Laryng. Lymphæ. Subpalpebral. Tubæ Fallopp.
 Capitis Recti Ant. Min. Musculi. II. 19.
 Recti Laterales. Ibid.
 Carotidum Arteriarum in cranii trajectu curvaturæ. VI. 5.
 Qualis cum Cervicali communicatio. Ibid.
 Cartilaginum cavæ insensibiles, & sensibiles, harumque
 oleum medullare. II. 34. I. 23.
 Cartilagine Tibiæ Semilunares, & harum usus. II. 31.
 & Explic. Fig. 5.
 Inter Maxillam Infer. & os tempor. peculiare,
 earumque usus. II. 28. 31. & Explic. Fig. 5.
 Caruncula. Vid. Lacrymalis. Myrtiform. Seminal.
 Casserii lapsus. I. 16. 21. 26.
 Castelli in Lexico lapsus. VI. 44.
 Cataracta, ut vulgo describitur, an, & quomodo gigni
 interdum possit. VI. 74.
 Hujus vulgaris diagnosi quomodo interdum ve-
 rax esse possit. VI. 75.
 Ad celebres adversus eandem diagnosim Demon-
 strationes, quædam animadvertenda. Ibid.
 In Cataractæ Chirurgia Crystallinum necessario
 perforari, novit olim etiam F. ab Aquapend. VI.
 74.
 De Cataracta Veterum Spuria. VI. 75.
 Cavæ Venæ nusquam in unum truncum proprie conve-
 niunt. V. 15.
 Insigni musculo in bove (non ita in homine)
 prope auriculam cinguntur. Ibid.
 Cerebelli elegans structura, & superficiæ ingens ampli-
 tudo. VI. 11.
 Cerebrum ex fibris etiam constare (quamvis non omnes ejus
 quæ creduntur, sint veræ fibræ) confirmatur. VI. 12.
 Intra Cerebrum vasa ipsa sanguifera alte propa-
 gari, confirmatur. VI. 15.
 Lacunar tertii ventriculi interdum duplex, inter-
 dum nullum. VI. 10.
 Sub hoc lamina cinerea observata. Ibid.
 Septum lucidum aliquanto antius quam Fornix
 procurrit. Ibid.
 Ventriculorum anteriorum latera a quib. partibus
 fiant. Ibid.
 Cerebri sectio ad quosdam vitandos errores quo-
 modo instituenda. Ibid.
 Circa Cerebrum contingens feri depositio in aliis
 levius, in aliis gravius nocet, & cur. VI. 84.
 Sine Cerebro editæ Infantis observatio. II. 35.
 Cerebrum. Vid. etiam Meningis. Medullæ. Nervorum.
 Pinealis. Pituitariæ. Sinus. Plexus Choroid.
 Choroides tunica. Vid. Oculi.
 Plexus. Vid. Plexus.
 Chyli Cisterna. De hac quædam in cane observata.
 II. 48.
 Chylifera Vasa statim infra Pylorum observata. III. 37.
 Ex Crassis etiam Intestinis oriri, non est negan-
 dum. Ibid.
 Ex tota intestini superficiæ emergentia in homi-
 ne observata. II. 50.
 Sunt eadem ac Lymphatica Mesenterii. III. 17.
 Cicogninus Jacobus Med. & Consil. Taurin. laudatus.
 VI. 83.
 Circulatio quot præter sanguinem humoribus videatur
 concessa. II. 6.
 Sanguinis non a solis arteriis effici potest. II. 42.
 Clericus Daniel Med. Genev. laudatus. III. 3.
 Joannes laudatus. IV. 37.
 Clitoridis, & Pudendi Muliebris Ligamentum Suspen-
 sorium. I. 18.
 Quomodo nonnullæ deceptæ sint, putantes, se-
 men sibi e Clitoride effluere. I. 31.
 Clitoridis in vaccis mirifica intorsio. I. 30.
 Ejus in iisdem, ovibus, canibus &c. positus cui-
 dam ipsius Usui adversatur. IV. 23.
 Clysmata cur sæpe nequeant ob copiam flatuum immit-
 ti. III. 13.
 Coccygis Musculus Levator. III. 45.
 Morgagni Adversaria

Coli intestini varia in variis dispositio in Praxi Medi-
 ca, & Chirurgica non ignoranda. II. 2.
 Flexus extremi variant. III. 6.
 Flexus in sinistro hypochondrio non sufficit ad
 explicandum dolorem Lienis vulgo adscriptum. Ibid.
 Ligamenta quid vere sint. III. 14.
 Hæc non sunt duo, sed tria. III. Ibid. & Ex-
 plic. Fig. 3.
 Unde oriantur, & quo desinant, & cur. III. Ibid.
 Collum in Divisione Corpor. Hum. non omittendum.
 II. 2.
 Ejus Longi Musculi. II. 14.
 de Comitibus Antonius Patric. Venet. laudatus. IV. 5.
 Coracohyoides Musculi non oriuntur a Processu Cora-
 coide. I. 27.
 Cordis Auriculæ. V. 15.
 Fibræ rectæ extimæ, sunt quidem in bobus, &
 ovibus, sed non in homine. V. 14.
 Nervorum ligatorum Experimentum. V. 18.
 Ostiis omnibus esse validum tendinem circumje-
 ctum, non confirmatur. V. 14.
 Structura in Marina Testudine. V. 17.
 Valvularum Semilunarium, & Sigmoidum curvi-
 lineus in limbo angulus non perpetuus. V. 20.
 Corpuscula quædam, & Fibræ etiam ut in Bove,
 & Cane, eorumque omnium Usus. I. 19. V. 20. usq.
 ad 26.
 Cordis rupturæ observatio. VI. 84.
 Substantiæ ipsius, & Valvularum officationes in-
 signes. V. 14.
 Coronariarum Cordis Arteriarum, sive orificiorum ipsa-
 rum sedes. V. 25. 26.
 Utrum hæ eodem quo aliæ arteriæ tempore, an
 alio sanguinem admittant. Ibid.
 Venæ Valvula. V. 22.
 Costarum tantum undecim observatio. II. 32.
 Aliarum alia curvatura, & positus. Ibid.
 Levatores Musculi, qui Casserio olim noti fue-
 runt. II. 15.
 Cowperi lapsus. II. 13. 15. 18. 20. 47.
 Cranii Basis ad foramen ejus maximum videtur amplior,
 quam revera est, & cur. VI. 32.
 In ipsa Fissuræ, seu Foraminis cujusdam insculpti
 varietates. VI. 31.
 Foramina pro Nervis Opticis tota sunt intra os
 sphenoides. Ibid.
 Cranio anili ex recenti ossea substantia additæ intrinse-
 cus prominentiæ sine noxa. VI. 84.
 Cricoarytænoidæi Postici Musculi. I. 28.
 Cricoidis Capitula per quæ cum Arytenoidib. articula-
 tur. I. 15. 23.
 In hoc articulo mucilaginosæ glandula (etiam in
 bobus, canib. ovib.) reperta. I. 15.
 Cellulæ, & Foraminula. I. 23. V. 42.
 Cubiti Extensores Musculi. II. 16.
 Tendinæ Expansiones, Cubiti, & Cruris, &c.
 musculos universos complectentes, Veteribus notæ.
 II. 9. 15.
 Curtius Barthol. Med. Mediolan. laudatus. VI. 64.
 Cuticulæ natura, & generatio explicata. II. 3.
 Cutis multis in locis ubi perforari dicitur, intro potius
 inflecti ex observationibus videtur. II. 5.
 Glandulæ Sebaceæ. Vid. Sebaceæ.
 Cutaneorum Affectuum generatio, & curatio per
 notitiam existentiae, & usum dictarum Glandular.
 illustrari possunt. IV. 32.
 Cyst-hepatici Ductus. III. 27.
 Cystis felleæ Rete internum quomodo constructum. III. 30.
 Quædam quasi Hernia. III. 36.
 Calculi interdum dejecti quib. notis dignoscendi.
 III. 28.
 Eos aquæ innatare, etiam Veteres tradiderunt.
 Ibid.
 Duo eorum genera, & circa utrumque observa-
 tiones. Ibid.
 D
 Entes. De his in fœtu quænam observanda. II. 32.
 a Deventer Med. Belg. laudatus. III. 15. IV. 25.
 26. 27.
 Diaphragma ab Aorta proprie non pertundi, olim mo-
 nuerat Vesalius. V. 12.
 Vere

Vere autem pertunditur ab Intercoſtalib. Nervis;
& ſuper hac re animadverſio. Ibid.
Diaphragmatis continuationem cum Tranſverſo Abdom.
Muſculo olim docuerat Veſalius. V. 11.
De hac tamen re Vid. Ibid.
Poſitum bene ſciendi, etiam in Praxi, neceſſitas.
V. 12.
Figuras quinam etiam Veterum vero propiores de-
derint. V. 11.
In ipſo Foramen pro oſophago recte olim collo-
caverat Veſlingius. Ibid.
Diarii Eruditorum Italiæ Auctores laudati. IV. 8. 37.
Diemerbroeckii lapſus. I. 23.
Digaſtricor. Maxillæ Muſculor. extenuationis in medio
cauſas quinam indicaverint. II. 12.
Digestio. Vid. Ventriculus.
Digitorum Pedis Extenſores Muſculi. II. 20.
Horum præ ceteris, etiam in Manu, varietas.
II. 16.
Dorſi Latiffimi Muſculi. II. 11.
Longiſſimi. II. 15.
Drelincurti lapſus. IV. 44. & ſeqq.
Duodeni Inteftini Glandulæ. III. 17.

E

E Chini Partes quædam obſervatæ. Vid. Tub. Fallop.
Epididymidis, & Teſtium canaliculos jam olim
Riolanus diſſolvit. I. 19.
Epiglottidis multi Iconiſmi ſunt fallaces. I. 23.
Foveæ, & hiatus. I. 3. V. 47.
Glandula (Berengario non ignota) una eſt, &
quomodo. Ibid.
Quomodo in Cane. I. 3.
Epiglottidis Ligamenta Lateralia, etiam ut in Cane. I. 4.
Ligamentum Medium. I. 17. VI. 92.
Muſculi Depreſſores nulli ſunt. I. 28.
Muſculi Levatores non ſunt in homine. Ibid.
Pediculus Riolano notus fuit. V. 36.
Epiglottis quomodo ſit multo flexilior cæteris cartila-
ginib. laryngis. V. 47.
Equæ Partes obſervatæ. V. Tub. Fallopp.

F

F Abriçii ab Aquapend. chirurgica obſervatio explica-
ta. II. 24.
Defenſio. IV. 44.
Lapſus. I. 16. 22. 26. 28.
Faciei Muſculorum varietas; ex qua etiam ipſa facierum
varietas deducenda. II. 12.
De Muſculo quodam Faciei ab Euſtachio deli-
neato quid obſervatum ſit. Ibid.
Fantonus Jo. Prof. & Conſil. Taurin. laudatus. II. 49.
50. III. 3. 4. 9. 14. 23. 31. 33. 37. 40. IV. 1. 7. 8.
12. 13. 20. 26. 29. 32. 34. 46. V. 3. 21. 25. 32. 37.
38. 40. 41. 49. VI. 64.
Femoris cum Iſchio articulus, & ligamenta. II. 30.
Arteria ejus quædam notanda. Vid. Arteria.
Fluoris Albi fontes, & origo. IV. 27.
Fœtus Canaliculus Venofus, huiusque ſuppoſita Valvu-
la. I. 21.
Fontanella, ut vocant, cur potius ſit in antica
cranii parte, quam in poſtica. II. 32.
Foraminis Ovalis apertura in adultis obſervata.
I. 20. V. 16.
Huius Valvulæ fibræ: & chordulæ in vitulis obſer-
vatæ ex quib. vulgatus Valvulæ uſus vindicatur.
I. 19. 20.
Eundem uſum mutare non cogit anatome cordis
marinæ Teſtudinis. V. 17.
Eadem Valvula quomodo ſe habeat in adultis.
IV. Vid. Hxplic. Fig. 4. V. 16.
Fœtus Pinguedinis ſubſtantia diſſulſa, & minus mollis,
minuſq. oleoſa eſt. IV. 50.
Pulmonaris Arteriæ, & Magnæ diametri, & craſ-
ſities in vitulis, & canibus. I. 20.
Renes Succentur. Umbilicalia Vaſa, & Urach.
Vid. ſuis locis.
Fœtum per abortum ejectionum ætas non ſine multipli-
ci difficultate æſtimari poteſt. II. 32.

Quinam eorum ſeligendi ad perficiendam Oſteoge-
niæ hiftoriam. Ibid.
Fontenellius Acad. Pariſ. laudatus. IV. 47.
Frontales Muſculi quamnam habeant fibrarum directionem
a Chirurgis attendendam. II. 9.
Eorum pars eſt Corrugator. II. 12.
Frontis ea corrugatio quæ Corrugatori tribuitur, a qui-
buſnam muſculis fiat. Ibid.

G

G Agliardus Med. Rom. laudatus. II. 25. VI. 89.
Galli, & Gallinæ Foramen quoddam cæcum in Cloaca
cui Parti in aliis animantibus reſpondeat. IV. 53. 54.
Aliæ Galli Partes obſervatæ. II. 29.
Vid. etiam Seminales Capſulæ. Teſtes.
Geniohyoides Interni Muſculi. II. 13.
Glandulæ ſingulæ. Vid. ſuis locis.
Plures cur a Veteribus probe agnitæ non fuerint.
I. 12.
De earum Catalogo Nuckiano quid ſentietidum.
II. 49.
Ad earum ſtructuram manifeftrandam Cogitatum.
III. 33.
Earum ſtructuræ Malpighianæ ſimplex, obvia, &
conſpicua idea. IV. 29.
De eadem liſ quæ inter Malpighii Aſſecclas, &
Ruyschium intercedit, non eſt de nomine. II. 49.
Conglobatæ cur, inter lymphæductus inferiores,
ſint in homine plures, quam in brutis. II. 47.
Glaucomatis origo veriſimilis. VI. 71.
Gliffonii lapſus. III. 1. 4. 6.
Goelickius Prof. Francof. laudatus. IV. 34. 38. 40.
Gonorrhœæ virulentæ ſedem primam in Majoribus Ure-
thræ Canaliculis eſſe ponendam, oſtenditur. IV. 9.
Graafii lapſus. I. 9. 30. III. 49. IV. 1. 2. 5. 6. 22. 25.
26. 27. 29. 42. 44.
Gratianus Jo. Prof. Primar. Patav. laudatus. IV. 12. V.
37. 47. VI. 95.

H

H Avers Cloptonis lapſus. II. 22. & ſeqq.
Heiſterus Prof. Altorf. laudatus in Præfat. & II. 1.
24. 30. 46. III. 16. 17. 30. & Explic. Figurar. IV.
24. 27. 34. 43. V. 1. 2. 4. 5. 10. 32. 35. 40. 41. 43.
VI. 11. 13. 33. 36. 40. 48. 63. 67. 78. 95. 100.
Hemiplexiæ cauſam in oppoſita Cerebri parte eſſe, ob-
ſervationibus confirmatur. VI. 84.
Etiam prægreſſæ, diagnoſis. Ibid.
Henningerus Prof. Argentor. laudatus. III. 17.
Hepaticæ Arteriæ rami quo pertingant. III. 20.
Hiſtoriæ (libri ſic inſcripti) examen. III. 20. &
ſeq. uſque ad 31.
Hepati-cyſtici Duçtus. III. 27.
Hernia peculiaris, deſcripta a Littrio, fieri poteſt etiam
ab Ileii Diverticulis. III. 5.
Hernia, ad illam Littrii reducenda, quæ ſigna
habuerit. Ibid.
Highmori lapſus. III. 9. IV. 27.
Hirius Junior Acad. Pariſ. laudatus. II. 25.
Hymen quid, & qualis ſit. I. 29. IV. 23.
Hyoidis offis nexuum varietates, & utilitates. I. 28.
II. 29.
Hyothyroides Muſculi ut in homine, & ut in bobus,
& ovibus. I. 6.

I

I Lei Inteftini diameter, directio, & fibræ in ejus ſine
ut ſe habeant. III. 11.
Diverticula quid ſint, & a quibus antea obſerva-
ta. III. 5.
Hæc non inveniuntur fere ſemper. Ibid.
Interſpinales Muſculi videntur noti fuiſſe Caſſerio. II. 15.
Inteftina ſingula Vide ſuis locis.
Inteftinorum Fibræ non ſunt ſpirales. III. 5.
Glandulæ. III. 7. 8.
Valvula Bauhini dicta. Vid. Bauhini.
Valvulæ Conniventes. III. 7.
Val-

Valvula spiralis in piscibus de Canum genere.
III. 5.
Intestinorum Crafforum Pingues Appendiculæ quem usum
habeant. III. 6.
In Tenuibus etiam, sunt Glandulæ Solitariae. III. 7.
Intestinorum situs perturbatus in quibus credendus. II. 2.
Intracostales Musculi noti fuerunt Eustachio. II. 15.

K

K Erckringii lapsus. II. 32.

L

L Abrorum Glandulæ Sebaceæ. I. 12.
Ligamenta, horumque usus. I. 5. VI. 98.
Musculi. II. 12.
Lacrymalia Puncta non in tarsis sunt, sed ad horum fi-
nes. I. 22.
Cur in parva prominentia insculpta. I. Ibid.
Continuatis tubulis (etiam in bobus atq. ovi-
bus) sunt angustiora, & cur. VI. 37. 58. 59.
A Puncto superiori in nares usque, Ipecilla im-
mitti posse, confirmatur. VI. 63.
Lacrymalis Caruncula neque est cum lacrymali pecudum
glandula confundenda, neque est glandula. I. 22. VI.
33. 46. & Explic. Fig. 1. & 2. Tab. 2.
De ejus substantiæ genere. VI. 45.
Caruncula ipsius usus. I. 22.
Ejus glandulæ sebaceæ, & pili tum in homine,
tum in brutis, horumque usus. I. 12. 22. VI. 47. 57.
Lacrymalis Ductus Majoris figura, diametri, positus. VI.
29. 39. 42. 43.
Finis non est horizontalis, neque pelviformis,
imo est proximo Ductu angustior. VI. 41.
Non habet valvulam, præsertim ingressum prohi-
bentem. VI. 50.
De injectionibus per eundem Finem, olim notis
etiam Vegetio. VI. 66.
Lacrymalis Sacci fines. VI. 39.
De hujus supposito Rostro. VI. 48.
de Lacrymalium Fistularum sede, origine, & denomina-
tione quid Carcanus ante Recentiores olim censuerit.
VI. 64.
Lacrymalium viarum ab oculis ad nares existentia qui-
busnam Veterum nota. I. 22. VI. 65.
Earum substantia, color, &c. I. 22. VI. 48.
Ad earum Affectiones curandas Monitum. I. 22.
Lacrymalium Ductuum Novorum, idest Dissertationis sic
inscriptæ examen. VI. 36. usq. ad 67. & 88. 90.
Lactæ Venæ. Vid. Chylifera.
Lactiferi Ductus. Vid. Mammarum.
Lactis in Virginibus, & Viro observationes. V. 1.
Lancisus Archiæ. Pontif. laudatus. II. 12. 19. III. 21.
22. 24. 29. 45. V. 46. 50. & seq. VI. 84.
Laryngis Cartilagine quænam in senescentibus ossæ,
cellulosæ, & medulla refertæ inventantur. I. 23.
Glandulæ parvæ. Ibid.
Glottis, ut in bobus etiam, atque ovibus. I. 16.
Laryngis Musculi. I. 6. 27. 28.
Ventriculi, etiam ut in cane. I. 16.
Horum, & ipsorum Appendicum varietates. V. 46.
De horum usu. I. 16. V. 44. & seq.
Larynx elevatur etiam a pluribus Pharyngis musculis.
II. 18.
Lavagnolus Prof. Patav. laudatus. IV. 12.
Laurentii lapsus. I. 16.
Legius Andreas Senat. Venet. ac Præf. Patav. lauda-
tus. VI. 55.
Lien defuit a primordiis in cane sine ulla noxa. III. 19.
Defueritne vere in Ortelio, dubitandum. Ibid.
Lienis multiplicis, aut perexigui observationes. Ibid.
Exsectio in canibus sine motus læsione; unde
Splenis Usus ab Havers propositus rejicitur. II. 24.
Pariter sine fecunditatis læsione, sed cum læsione bi-
lis; unde Splenis Usus Malpighianus confirmatur. III. 19.
Ligamenta singula. Vid. suis locis.
Linguae foramen in dimidia fere parte hominum. I. 8.
VI. 93.
Hoc a Chirurgis est attendendum. I. 8.
De Canali ei Foramini nonnunquam continuato,
ipsiusque Ufu. Ibid. VI. 93. & seq.
Morgagni Adversaria

Linguae Glandulæ, & harum structura. VI. 95.
Musculi. Vid. suis locis.
Papillæ postremæ sæpe geminæ, aliquando etiam
ternæ sunt. VI. 96.
Listeri lapsus. II. 33. IV. 5.
Littirii Glandula. Vid. Urethra.
Littirius Acad. Paris. laudatus. I. 26. 32. 33. II. 35. III.
5. 19. 20. 33. IV. 4. 7. 13. 14. 15. 20. 26. 42. V.
16. VI. 8. 18. 19. 25. 26. 74.
Loweri lapsus. V. 14. & seq. 18. & seq.
Lumbares Glandulæ sæpe tribus plures, interdum quo-
que multo plures. III. 17.
Lumbricalium Musculorum Pedis origo Veteribus etiam
nota. II. 20.
Lymphæ ductus in lienis vitulini superficie, aere in ve-
nam moderate immisso, conspicui. II. 47.
In pulmonis canini superficie varias notabiles ha-
bent inosculationes. Ibid.
Mesenterii. Vid. Chylifera.
Uteri Muliebris, observati. IV. 43.
Lymphæ motum juvari ab interjectis inter ejus ductus
glandulis, confirmatur. II. 47.

M

M Agati admiranda quædam inedita curatio indica-
tur. VI. 90.
Malpighii sententia de Æthiopum nigredinis causa quo-
modo fortasse accipienda. II. 4.
de Glandulis. Vid. Glandulæ.
Mamillæ cur Viris datæ, quæritur. V. 1.
Organa lac fecernentia continent. Ibid.
In recens natis a non expresso seroso lacte indura-
tæ, & quomodo curatæ. Ibid.
Mammarum Areolæ Tubercula perraro pilis instructa,
ut pinxit Bidlous, aut in coronæ modum disposita
sunt, ut Verheyenius delineavit. V. 2. 6.
Non sunt ipsa ex pinguedine, sed maxima ex
parte ex ductu lactifero in singulis hiantes; & lac ef-
fundente, & cur. I. 12. V. 70. & seq.
Constant tamen etiam ex glandulis sebaceis, &
cur. I. 12. V. 6. 9. 10.
Mammarum Glandulæ non sunt plurimæ, minutæ, &
sejunctæ, ut passim delineant, sed una, ut Riolanus,
& Whartonus docuerant: hæcque describitur. II. 50. V. 4.
Pinguedo non intra hanc Glandulam, sed supra,
& infra posita est, & cur. V. 5. & Explic. Fig. 3.
Adv. 4.
Mammarum Papillæ cur exquisito sint sensu. V. 3.
Papillarum Glandulæ Sebaceæ. V. 10.
Manfredii Fratres laudati. III. 28. 32.
Maxillæ Inferioris Cartilagine. Vid. Cartilagine.
Musculi. Vid. Digastrici.
Maxillæ Superioris mobilitas in quodam Pisce observa-
ta. VI. 71.
Maxillarium Glandularum Ductus quibusnam Veterum
noti. I. 26.
Mayow Joannis lapsus. II. 7.
Medullæ Oblongatæ duo quidam Tractus medullares con-
firmantur, & quomodo observandi sint, indicatur.
VI. 12.
Pars postrema quæ intra cranium videtur, extra
ipsum est, & quomodo. VI. 32.
Medullæ Spinalis substantiam ab aere dissolvi, confir-
matur. VI. 19.
Ejusdem corpus infra secundam lumborum verte-
bram non producit. II. 36.
Ea pars quæ Cauda Equina dicitur, descripta. Ibid.
Cavæ, & Fissurarum observationes. VI. 14.
Involucrum primum. VI. 13.
Plerique Vasorum rami elegantius delineantur ab
Auctoribus, quam observentur. II. 36.
Membrana. Vid. Adiposa. Panniculus. Musculorum.
Oculorum.
Meningis Duræ Processus Falcatus est veluti suspensorium
Cerebri Ligamentum. VI. 22.
Ejusd. Processus initii in nonnullis amplitudo. VI. 31.
Processus Posterior. VI. 2.
Sinus. Vid. Sinus.
Menstruorum scaturigines non in vagina, sed in fundo
uteri observatæ. I. 33. IV. 27.
Mer-

- Mercurialis lapsus. I. 14.
 Meryus Acad. Paris. laudatus. I. 20. III. 19. IV. 26.
 42. V. 16. VI. 69. 72.
 Mesenterii Pinguedinis usus inserviendi Hepatis secretioni proponitur. III. 2.
 Michelottus Med. Venet. laudatus. V. 30.
 Mistichellii lapsus. VI. 12. 15.
 Mucilaginosæ Glandulæ conglomeratæ non fuerunt Veteribus omnino ignotæ. II. 23.
 De iisdem tum disgregatis, tum conglomeratis quædam. II. Ibid. & seq.
 Earum descriptioni, traditæ ab Havers, addenda. I. 15. II. 23. 29.
 De iis quæ sunt in specu Vertebrarum, II. 29.
 Mucrores de quibus Hippocrates in Aph. quomodo explicandi. II. 24.
 Mucosæ Glandulæ. Vid. Urethræ. Uteri.
 Munnickius Prof. Ultraject. laudatus. I. 29. IV. 42. V. 16.
 Musculi singuli. Vid. suis locis.
 Musculorum Membrana communis an, & quid sit. II. 6.
 Motus a transversis eorum fibrillis non pendet. II. 7.
 Ad eundem motum pertinens Stenonis Experimentum consideratur. II. 8.
 Musculorum singulorum descriptiones, & delineationes quinam meliores adhuc dederint. II. 21.
 Myloglossi Musculi. II. 13.
 Mylohyoides Musculi. II. Ibid.
 Myrtiformes Carunculæ quid sint. I. 29. IV. 24.
 Sunt duplicis generis, & originis. IV. Ibid.

N

- Nabothus Prof. Lips. laudatus. IV. 39. 40.
 Nasi Glandulæ Sebaceæ. I. 12.
 Alarum Constrictor vulgaris, Musculus videtur fictitius. II. 12.
 Earundem quinam veri Constrictores. Ibid.
 Prope easdem quidam in variis variis Musculus observatus. Ibid.
 Nasi interni dimensiones quædam. VI. 52.
 Basis quomodo disposita. VI. 51.
 Membrana Nasi Glandulæ, & Papillæ non ita sunt conspicuæ, ut plures existimant. VI. 88.
 Quædam ejus Corpora Glandulosa. VI. Ibid.
 Os Turbinatum superius non ita antè incipit, ut inferius. VI. 53.
 Sensorium an potius a 5. quam 1. Nervorum Pari efficiatur. VI. 89.
 Septi major quædam crassitudo interdum; curvatura autem in alterutrum latus sæpe observata. VI. Vid. Explic. Fig. ult.
 Nasi totius interni, adjunctarumque, ac communicantium Partium structura, & positus qua ratione per Figuras penitus ostendi queant. Ibid.
 Nervorum Involucrum tertium, sive intermedium ubinam manifestissimum. II. 33.
 Structura a Cowpero observata quomodo explicabilis. II. 34.
 Origo multorum est incerta. II. 37.
 Trunci quoque majores variant. Ibid.
 Per Nervorum certas connexiones vulgo explicata, non omnia firmo innituntur fundamento, & cur. Ibid.
 Nervorum Munia ab immediate proximarum Arteriarum pulsationibus non turbantur. VI. 24.
 Plexus Cardiaci superioris sedes variat. II. 37.
 Plexus quoque majores variant. Ibid.
 Plexuum Gangliiformium sive Gangliorum color, & ex eo deductæ de horum natura, & usibus conjecturæ. II. 34.
 Nervorum 1. Par. VI. 22.
 Pro 2. Pari Foramina tota sunt intra os sphenoides. VI. 31.
 De Paris 3. origine. VI. 26.
 De Paris 3. & 4. Vagina, qua tantum interjecta Carotidibus insunt. VI. 20. 22.
 De Paris 5. fibris, Plexu, & figura in prima ramificatione. VI. 21.
 De Paris 6. origine, & intra Sinuum alveum progressu, & immediato Carotidum contactu. VI. 22. 23.

- Paris 7. origo etiam ex quarto ventriculo, nota videtur fuisse Piccolhomino. VI. 27.
 Hujus Paris Surculi quidam intra cranium redeuntes descripti. Ibid.
 De Paris 8. origine, septoque ejus fibris interjecto. VI. 12.
 Hujus trunci infimi variant. II. 37.
 Horum transitus per carneam Diaphragmatis partem dignus meditatione. V. 12.
 De Paris 9. origine, & duplici in Dura Meninge foramine. VI. 32.
 An Par 9. potius motui, quam sensui linguæ inserviat. VI. 91.
 Par 10. oritur non ex Oblongata, sed ex Spinali Medulla; & tamen differt a Spinalibus. VI. 32.
 Nervorum Accessoriorum ad Vagum initium, ut vocant, cur aliud aliis Auctoribus. II. 36.
 Ciliarium Observatores. VI. 82.
 De Intercoastalium origine. II. 36. VI. 24.
 Horum continuatio, & genus quibusdam non ita certa videntur. II. 37.
 Eorundem Trunci, & Plexus variant. Ibid.
 Transitus ipsorum per carneam Diaphragmatis partem dignus meditatione. V. 12.
 De Phrenicorum origine. Ibid.
 Novesius Chirurg. Gall. laudatus. I. 26. 32. IV. 39. 40. V. 18.
 Nuckii lapsus. II. 48. 49. V. 4.
 Nymphæ interdum nullæ, interdum una, interdum quatuor observatæ. IV. 23.
 Earum Glandulæ Sebaceæ, & harum usus, I. 11. IV. 32. 34.

O

- Obturatores Interni Musculi. II. 18.
 Occipitalis Vena truncum semper habet profundum, & interdum in minores plures divisum. VI. 83.
 Hinc scarificationes ad ejus sanguinem educendum profundæ & crebræ esse debent. Ibid.
 Harum utilitas. Ibid.
 Occipitis ossis inæqualis crassities, & duo quidam processus. II. 27.
 Oculis obversantium quorundam punctorum, aliorumque ejusmodi, varias esse causas, & quomodo hæ in Praxi distingui, dignoscique debeant. VI. 75.
 Circa lucis quæ presso oculo apparet, sedem, & naturam experimenta. VI. 73.
 An aliqua ex ejusd. observatione existeret in rem medicam utilitas possit. VI. 74.
 Oculorum tunicam Choroidem ex fibris probabiliter motricibus constare, & quis esse possit harum usus. VI. 70.
 Ciliare Ligamentum, seu potius Processus ex veris fibris, iisque motricibus constare, confirmatur. Ibid.
 Ciliares Nervi. Vid. Nervi.
 Crystallini intimus nucleus durior, reliquum quo exterius, eo mollius est, & cur. VI. 71.
 Intra Crystallinum quidam humor aqueus observatus, hujusque utilitas, & si ipsius secretio impediatur, noxa. Ibid.
 Crystallini figuræ, in visione, mutatio a quibus causis repetenda. Ibid.
 Crystalloides tunica etiam in homine confirmatur. VI. 68.
 Hæc videtur esse tendinea expansio Ciliarium Processuum. VI. 70.
 Oculorum Glandula Innominata: cujus ductus non satis adhuc in homine ostensi sunt. I. 22. VI. 33. & seq.
 Per ipsam traducti ad palpebras nervuli quos usus habere videantur. VI. 34.
 Glandula, & Caruncula Lacrymales. Vid. Lacrymalis.
 Membrana interni anguli Semilunaris: & an sit sedes Unguis, & Panni. I. 22. VI. 44.
 Musculos Obliquos contraria Rectis directione se insertum ire, jam olim noverat Eustachius. VI. 78.
 Hujus rei usus. VI. Ibid.
 Trochlea Obliqui Super. quomodo, & cur sit constructa. VI. 77.
 De vagina quadam tendinis ejusd. Musculi. Ibid.
 De Musculis Rectis ad Palpebras quodammodo, & cur

- cur productis. Ibid.
- Palpebræ. Vid. Palpebræ.
- Pupillæ motus constrictionis, & dilatationis Antiquis notus. I. 26.
- Ejus motus causas tum naturales, tum morbosas non esse adhuc exploratas. VI. 69.
- Qua propterea cautione interim Medici in harum curationibus uti possint. Ibid.
- Vitrei humoris quæ substantia sit, & structura, per conjecturas tantum novimus. VI. 72.
- Has conjecturas primus Riolanus indicavit. Ibid.
- Œsophagi carnea tunica. II. 14.
- Hujus fibræ in homine non sunt spirales. III. 3.
- Glandulæ interiores in variis brutorum speciebus observatæ. Ibid.
- Glandulas exteriores verisimile (non certum) est, in Œsophagum influere, & cur. Ibid.
- Omenti Usus inserviendi Hepatis secretioni. III. 2.
- Ossa singula. Vid. suis locis.
- De natura, & usu plerorumque foraminulorum, in ossum laminis ab Havers observatorum, dubitatio. II. 25.
- Ossæ substantiæ in senili corpore recens incrementum observatum. VI. 84.
- Osteogeniæ historiæ perficiendæ quinam Fœtus aptiores. II. 32.
- In edita a Kerckringio quænam desiderentur. II. Ibid.
- Ovaria Viperarum, aliarumque Serpentum sunt clausa, & tamen non parva ova opportune emittunt. IV. 28.
- De iisdem quædam alia. Ibid.
- Ovariorum muliebrium Vesiculæ quid sint, & quos usus præstent, conjicitur. Ibid.
- Superficies in junioribus Virgunculis levigata solet inveniri. IV. 41.
- Luteorum Corporum structura Malpighiana subviva. IV. 45.
- Cellulæ quædam frequentes: & alia rariora, & morbosa. I. 30.
- Ovium Partes observatæ. Vid. Arytæmoid. Cord. Cri-coid. Hyothyroid. Lacrymal. Laryng. Prostat. Sterno-thyroid. Subpalpebrales. Thyroidæa. IV. 45.
- Ovorum fœcundatio. De hac quædam. IV. 45.
- P
- P**acchionus Med. Rom. laudatus. I. 25. II. 9. V. 14. 46. VI. 3. 20.
- Palati Glandulæ Falloppio notæ fuerunt. I. 22.
- Ad Palatum Transitus ex Naribus. Vid. Steno-nis.
- Palfynius Chirurg. Gandav. laudatus. II. 32. VI. 55.
- Palmaris Musculus non est perpetuus. II. 16.
- Palpebrarum Glandulæ Sebaceæ, & harum usus. I. 12. VI. 79.
- Alia. Vid. Subpalpebrales.
- Musculi Orbiculares supercilia etiam possunt deprimere, & adducere. II. 12.
- Pancreaticus Succus non est acidus. III. 19.
- Panniculus Carnosus an, & quid sit. II. 6.
- Paralysis quæ convulsivos Affectus, & præsertim Coli-cos consequitur, explicatio. VI. 84.
- Parotidis Glandulæ Appendix sæpe observata. VI. 99.
- Ejus Ductus cur longior, & laxior. Ibid.
- Hujus finis, & sedes a Chirurgis attendenda. Ibid.
- Partus tempore an ossa Pelvis diducantur. III. 15.
- Pauli Jo. Guil. Prof. Lips. laudatus. IV. 7.
- Penis Glandem esse productionem corporis urethræ spon-giosi, quomodo observandum. IV. 5.
- Glandis Coronæ, & præputii Tubercula. I. 11. IV. 12.
- Septum, quod vocant, non est pars a Penis Cor-poribus distinguenda. IV. 5.
- His inflatis, illud urethræ distendi non solere, confirmatur. IV. 5.
- Illorum substantia per injectiones in hoc institu-tas, tantum inficitur. Ibid.
- Penis Ligamentum Suspensorium. I. 18.
- Hoc quibusnam Veterum notum. Ibid.
- Musculi Transversi, qui non semper adsunt, a quibusnam Antiquorum cogniti. IV. 21.
- Musculus Triangularis, ejusque usus. IV. 20.
- Hic quibusnam olim notus. Ibid.
- Musculi duo longissimi in Tauro. I. 30.
- Penis in Viperis, & Testudinibus quomodo se habeat. IV. 4.
- Peritonæi Processus a quibus descripti melius fuerint. III. 1.
- Cur in viro sint clausi, pervulgata quædam cau-sa rejicitur. IV. 2.
- Peronæi Musculi. II. 20.
- Pharynx. De ea quædam. II. 18. III. 3.
- De ejus Musculis. I. 8. II. 14. 18.
- Pinæi lapsus. I. 13. 16.
- Pinealis Glandulæ observationes, conjecturas de ejus na-tura glandulosa simili cæteris Plexus Choroidis (quod olim Bauhinus indicavit) confirmantes. VI. 9.
- In ea sæpe dura corpuscula reperiuntur. Ibid.
- Pilorum radices in Membrana Adiposa implantari, ubi-nam facilius ostendatur. II. 5.
- Pinguedinis circulatio est verisimilis. II. 6.
- Ejus in fœtu constitutio. Vid. Fœtus.
- Pisaurus Joannes Eq., Senat. Venet. & Præf. Patav. lau-datus. VI. 55.
- Piscium Partes observatæ. Vide Intestinatorum. Maxillæ.
- Pitcarnius Prof. prid. Lugdunobat. laudatus. III. 18. 24. VI. 75.
- Pituitariæ Glandulæ substantiam esse duplicem, confir-matur. VI. 25. 26.
- Ejus Appendicis, hujusque sedis descriptio. Ibid.
- Ejus humorem per involucrum ipsius non expri-mi, confirmatur. Ibid.
- Pituitarii Sinus. Vid. Sinus.
- Plantares Musculi. II. 19.
- Plexus Choroidis Glandulæ confirmantur. VI. 7.
- Harum dilatationes, quas alii vocant hydatides, maximæ, & præcipue in Plexus postrema parte sæpius observantur. Ibid.
- Plexus Nervorum. Vid. Nervorum.
- Plinii locus de specillo per oculum tracto quomodo ac-cipiendus. VI. 64.
- Pollicis Pedis Adductor Musculus. II. 20.
- Polenus Prof. Patav. laudatus. IV. 12. 38. V. 6. 37. 47. VI. 92. 95.
- Polypi quales, & cur in Aortæ dilatationib. sæpe ob-serventur. II. 41.
- Polyporum Cordis, vasa a quibusdam descripta, in du-bium revocantur. V. 27.
- De eorum generatione sententia Malpighii defen-ditur. V. 28.
- Pontedera, nunc Prof. Patav., laudatus. III. 37. VI. 55.
- Poupartii lapsus. III. 1.
- Prostatæ viriles sunt una glandula. I. 26.
- Earum Propago. IV. 14.
- Humor quomodo interdum mutetur. IV. 19.
- Prostatarum muliebrium lacunas, earumque humorem pro-semine non prolifico etiam Veteres agnovere. I. 31.
- Hæ quales in Ovis. Ibid.
- Alia muliebres, dictæ Casp. Bartholini, descri-ptæ. Ibid.
- Pseudosphincter. Vid. Vesica.
- Psoæ Musculi, Magnus, & Parvus. II. 17.
- Pterygopalatini Musculi desinunt in os palati; ideoque ad Uvulam non pertinent. II. 14.
- Pudendi muliebris Lacunæ multiplices, harumque glandulæ. I. 31. IV. 35.
- Pulmonem non implere vel in inspiratione totam thora-cis caveam, experimento ostenditur. V. 33.
- Pulmonis Vasa sanguifera quem respectu ad bron-chia situm habeant. V. 30.
- Ejusdem interstitia communicare quidem inter se, non vero cum aspera arteria, experimentis comproba-tur. V. 33.
- De Viperarum Pulmone. V. 29.
- Pupilla. Vid. Ocul.
- Pylorus. Vid. Ventricul.
- R
- R**anarum quædam partes observatæ. Vid. Respiration.
- Ravius Prof. Lugdunobat. laudatus. I. 18. II. 50. IV. 1.
- Rece-

- Receptacula ad Sellam Equinam nota Veteribus. VI. 6.
 De eorum Postico. VI. 18.
 De Septo quodam in Lateralibus. VI. 23.
 Intra hæc quomodo Nervi respectu ad Arterias
 disponantur. Ibid.
 Hæc quatenus inter se communicent. VI. 26.
 Rectum Intestinum haud raro a suo recto situ facile di-
 moveretur. III. 13.
 Ejus Diverticulum. III. 5.
 Valvulæ quædam. III. 6. Vide etiam Ani.
 Redii lapsus. IV. 29.
 Renes an femini præparando inserviant, quomodo in-
 quirendum. III. 33.
 Renum alterius defectus. III. 32.
 Cellulæ quædam morbosæ pluries in ipsis obser-
 vatæ. III. 33.
 Structura Malpighiana defensiva. Ibid.
 Superficie structure, & vasa. III. 34.
 Pelvis magnitudo, & varietas. III. 32.
 Ejusdem Pelvis, & Ureteris vasa. III. 34.
 Renes Succenturiati in fœtu unum corpus cum Renibus
 videntur conficere primo aspectu. IV. 50.
 De eorundem Ufu. III. 31.
 de Respiratione Ranarum, & Testudinis, & organis illi
 inservientibus. V. 29.
 Rete Mirabile ex parte constare ex lacertosis fibris, con-
 firmatur. VI. 30.
 Non æque in cunctis hominibus patet. Ibid.
 Ridleyi defensio quædam. VI. 19.
 Lapsus. VI. 5. 6. 10. 12.
 Riolani lapsus. I. 27. IV. 27.
 Rolincii lapsus. I. 19.
 Ruyschius Prof. Amstel. laudatus. I. 21. 24. II. 49. III.
 5. 19. 20. 25. 30. 34. & Explic. Fig. 3. IV. 1. 2. 5.
 22. 27. 37. 38. 45. 47. V. 3. 13. 32. 38. & seqq. VI.
 5. 7. 12. 34. 68. 69. 80. 88. 90. 98.

S

- S**acrolumbi Musculi. II. 15.
 Saliva cur naturaliter subviscida? III. 24.
 Santorinus Protomed. Venet. laudatus. II. 38. III. 14.
 32. IV. 5. 13. 15. 19. 27. 34. 38. VI. 14. 84.
 Scaleni Musculi. II. 14.
 Scapulæ Sinus Semicircularis notus Veteribus. I. 27.
 Scapulæ Levator Musculus. II. 14.
 Sceletis conficiendis quorum ossa aptiora, & cur. III. 50.
 Schröckius Acad. N. C. Præf. laudatus. Præf. ad Advers. 2.
 Scroti Septum quinam Veterum descripserint. I. 18.
 Sebaceæ Glandulæ. I. 11. & seqq.
 Qualem fecernant materiam. IV. 13. 32. 33.
 Sebaceæ Cutis Glandulæ confirmantur. IV. 31. & seqq.
 Quænam habeant peculiaria. IV. 31. 34.
 Quinam tum singularum, tum universarum sint
 Ufus. IV. 32.
 Per has explicari possunt oleaginosi sudores, &c.
 Ibid.
 Sebaceæ cæteræ Glandulæ. Vid. suis locis.
 Secretio animalis. De ea quædam sententia rejicitur.
 III. 23.
 Sellæ equinæ, posterioris parietis facies anterior concava
 est, & cur. VI. 26.
 Receptacula. Vid. Receptacula.
 Semen Deferentia Vasa intus non spongiosa esse, sed
 unam cavitatem habere, confirmatur. IV. 22.
 Muliebri illud non prolificum. Vid. prostat.
 Seminales Capsulæ in gallo etiam observatæ. IV. 29.
 Seminalis Carunculæ Foramen tertium, & Sinus pecu-
 liaris observata, & descripta. IV. 3.
 Seminalium Vermiculorum existentiam dubitationes quæ-
 dam non valide impugnant. IV. 5.
 Serrati Musculi. II. 15.
 Sefamoidea Officula sunt multo pauciora, quam vulgo
 credatur. II. 30.
 In poplite non semper inveniuntur. Ibid.
 De iisdem alia. Ibid.
 Similariū Particularum plures gradus, & duæ Classes.
 II. 1.
 Sinus Duræ Matris Laterales nonnunquam per transver-
 sum canalem communicant inter se. VI. 1.
 Lateralis Sinister sæpissime incipit a Dextero, non

- autem a Longitudinali. Ibid.
 Ejus initium, & Torcular carneotendinea sub-
 stantia a tergo firmantur. Ibid.
 Lateralium, in fine, acclivitatis Ufus. VI. 6.
 Diverticulum in quod singuli Laterales definunt,
 Falloppius descripserat. VI. 29.
 Sinus Longitudinalis sæpissime non dividitur bifariam in
 Laterales, sed in alterum totus definit, eumque dexte-
 rum: sinistro, aliquando saltem, latiore. VI. 1.
 Posteriores observati, & descripti. VI. 2.
 Quartus quomodo, & quo definat. VI. 1.
 De quibusdam aliis Sinibus. VI. 3.
 Sinus non ita crebra, & insignia semper habent transver-
 sa ligamenta. Ibid. 2.
 In Sinibus Duplicationes nonnunquam observatæ.
 VI. 6.
 Sinus Duræ Matris in Basi Cranii duo quidam magni
 ab Ortobio indicati, videntur fuisse ipsa Receptacula
 Sellæ Equinæ. Ibid.
 De Sinu Circulari. VI. 19.
 Intra Sinus Breviares progrediuntur Trunci Ner-
 vorum 6. Paris. VI. 21.
 Longiorum Sinuum principium est supra, non in-
 fra Truncum Paris 5. Nervorum. Ibid.
 De Longiorum fine. VI. 28.
 Sinus Pituitarii non per canales, sed per foramina cum
 Naso communicant. VI. 89.
 Hæc foramina ita sunt disposita, ut in quocunque
 capitis situ ex aliquo semper eorum humor opportune
 effluat. Ibid.
 Sinuum horum varietates. I. 28. VI. 89.
 Eorundem in Fœtibus, & Pueris observatio ne-
 cessaria est ad illorum usus determinandos. II. 32.
 Vermium intra ipsos in homine nidulantium cu-
 ratio admiranda indicatur. VI. 90.
 Sphincter. Vid. Ani Vaginæ Vesicæ.
 Soporosa quædam Affectio quomodo curata. VI. 83.
 Specilli quotuplex acceptio. VI. 64.
 Spigelii lapsus. II. 20.
 Spirituum animalium existentiam quædam impugnantia
 quomodo explicanda. II. 33. & seqq.
 Ejusmodi alia adhuc explicanda. II. 35. VI. 23.
 24.
 Eorundem Spirituum motus contrarii in iisdem
 nervis exemplo explicantur. II. 8.
 Splenii Musculi. II. 16.
 Stahlius Archiat. Pruss. Primar. laudatus. VI. 64.
 Stancarius Jo. Ant. Prof. Bonon. laudatus. II. 8. IV.
 19. 34. & in Epist. præfixa IV.
 Stenonis Experimentum. Vid. Muscul.
 Transitus a Naribus ad Palatum non est ita bre-
 vis. VI. 90.
 De eodem Transitu alia. VI. Ibid. & 51.
 Sternohyoidum Musculorum origo non tantum a Sterno.
 II. 13.
 Tendinæ inscriptiones. Ibid. & I. 7.
 Sternothyroidum Musculorum origo non tantum a Ster-
 no: & inter ascendendum contractio. II. 13.
 Inscriptiones tendinæ. I. 7.
 Finis ut in homine, & ut in bobus, & ovibus.
 I. 6.
 Sublingualium Glandularum Ductus ubi, & quomodo
 persæpe observati. VI. 100.
 Subpalpebrales Glandulæ quales in bobus, ovibus, ca-
 nibus, in homine ostendi non possunt. I. 12.
 Suis Partes quædam observatæ. Vid. Ventricul.
 Suffusio. Vid. Cataracta.

T

- T**erranei lapsus. IV. 6. & seqq. 14. & seqq. 24. 44.
 45.
 Testes muliebres. Vid. Ovaria.
 Testes viriles intus ad vesicæ latera observati. IV. 1.
 Tertii Testis observationes multorum sunt incer-
 tæ, & cur. Ibid.
 Testibus exsectis quæ animalia genuisse dicuntur,
 de his quid attendendum. IV. 3.
 Testes in gallis Epididymide non carent. IV. 29.
 Testium veram structuram quinam Veterum indicaverint.
 I. 19.

Eadem

Eadem etiam in Testudine apparet. IV. 2.
 In tubulorum Testium longitudinis metiendæ ratione a Bellino proposita quid desideretur. Ibid.
 Eisdem tubulos ex medio quoque teste egredi, ex observatione suspicio. Ibid.
 Testium Albugineæ Tunicæ divisio in duas. IV. 1.
 Erythroides confirmatur. Ibid.
 De Humore intra Vaginalem secreto. Ibid.
 Testudinum duæ in Cloaca vesicæ quo facile pertineant. IV. 29.
 Aliæ Partes observatæ. III. 3. Vid. etiam Cord. Penis Testes. Respiration.
 Theopollus Laurentius Eq., D. Marci Procur. & Triumvir. Litter. laudatus. IV. 12.
 Thoracicus Ductus cur influat in ramum venæ Cavæ superioris. Post Adv. V.
 Thymi quidam Usus rejectus. V. 13.
 De ejus extensione, succo, lobis, & lobulis quædam. Ibid.
 Thyroidæa Glandula una est. I. 26.
 Duarum rarissima observatio. V. 35.
 Thyroidæa Glandulæ structura &c. in homine, bobus, ovibus descripta. I. 26.
 Appendix. Ibid. & VI. 92.
 Ductus cur adhuc ignoti, conjicitur. V. 45.
 Succus: & sedes: & ex his de Usu conjectura. I. 26.
 Tumor frequens, & quid in eo reperiatur. Ibid.
 Thyroidis Cartilaginis prominentiæ duæ, & harum usus. I. 6.
 Fissura nota fuit Riolano. V. 36.
 Tibiæ Cartilagine Semilunares. Vid. Cartilagine.
 Tonsillæ non sunt, ut plerique Recentiorum censuerant, una glandula. I. 26.
 Earum in bove divisio in lobos. Ibid.
 Tracheæ Arteriæ, Cartilagine cur semiannulares. V. 31.
 Ubi esse definant semiannulares. I. 24.
 Quomodo se habeant in bobus, & cur. Ibid.
 Intra pulmones quales sint, jam docuerat etiam Bauhinus. Ibid.
 In Sene ossæ observatæ. Ibid.
 Tracheæ Arteriæ, Glandulæ quædam, & Lacerti Laurentio olim nota. I. 25.
 Glandulæ, & præsertim quæ ad Interstitium sunt, crebræ, majusculæ, harumque excretoria oscula. Ibid.
 V. 37. & seqq.
 Lacerti diversi generis. I. 25.
 Transversalis Pedis Musculus. II. 20.
 Tubæ Falloppianæ sæpius quidem videntur clausæ, sed non sunt. I. 30.
 Earum frequentior positus, & qua cautione observandus. Ibid. IV. 41.
 Earundem in cane, & echino peculiaris circum ovaria dispositio consideranda. IV. 30.
 In ipsis in equa non gravida nullæ valvulæ. Ibid.

V

Vaginæ muliebris Columnæ, a quibus illius initium in Virginibus angustius redditur, in his descriptæ. IV. 23.
 De ejusdem Glandulis. IV. 24.
 Papillæ, & harum usus. I. 13. IV. 24.
 Prominentia intra ipsam glandosi urethræ corporis, & illius usus. I. 13.
 De ejusdem Rugis. Ibid. & IV. 24.
 Sphincter quid sit. III. 44.
 Vallisnerius Prof. Primar. Patav. laudatus. II. 24. 35. 38. III. 5. 18. 19. 28. IV. 8. 12. 38. 40. V. 37. VI. 90. 95.
 Valsalva Prof. Bonon. laudatus. I. 8. 12. 16. 27. 29. II. 14. 24. 28. 33. III. 14. 19. 32. IV. 13. 25. 31. & seqq. VI. 3. 6. 29. 76. 79. 83. & seqq. 90.
 Valvula Bauhini dicta. Vid. Bauhini.
 Valvulæ Cordis Vid. Cordis.
 Valvularum structura generatim indicata. I. 29.
 Varolii lapsus. I. 14.
 Vasa. Vid. Adiposa. Chylifera. Lymphæduct. &c.
 A vasorum majorum conditionibus non licet inferre conditiones minorum, & insensibilium. III. 21.
 Venæ sigillatim. Vid. suis locis.

Venerea Lues. Vid. Bubon. Gonorrh. Uteri Cervic.
 Ventriculi structura. De hac multa Falloppius docuit quæ Willisius postea tradidit. III. 4.
 Glandulæ etiam in hominibus observatæ. Ibid.
 Pylori structura etiam ut in Sue. Ibid.
 Villi in eod. animali satis ostenduntur. III. 9.
 Ventriculum ingesta, non succo dissolvente, sed motu potius exterente conficere, quibus disputari argumentis possit. III. 18. 24.
 Vercellonus Med. Pedemont. laudatus. III. 18. V. 40.
 Verheyenii lapsus. II. 3. 5. 7. & seqq. 19. 20. 27. & seqq. 32. 35. 38. 45. & seqq. III. 1. & seqq. 16. 17. 32. 34. 35. 49. IV. 2. 3. 5. 11. 20. & seqq. 27. 28. 34. 43. 50. V. 2. & seqq. 12. & seqq. 18. 23. 30. 31. 34. & seqq. 41. 43. & seqq. 50. VI. 1. 5. 13. 14. 33. & seqq. 52. 68. 85. 89. 90. 97. & seqq.
 Verneyus Jos. Acad. Paris. laudatus. IV. 29. VI. 85. 87.
 Vertebrarum Corporibus interjectorum Ligamentorum structura, & varia pro varia ætate crassities. III. 90.
 Vesalii lapsus. I. 19. 24. 26. 28. IV. 23.
 Vesicæ urinariæ duo Carnea Corpora, etiam in brutis. I. 9. III. 42.
 Musculi quidam, Levatorum, & Depressorum nomine nuper propositi, rejiciuntur. III. 43. 45. & seqq.
 Sphincter verus, & falsi. III. 37. 40. 44.
 Tunica. III. 36.
 Alia de Vesica. III. 41. & seqq.
 Vesicæ Urinar. novus quidam Mechanismus examinatus. III. 36. & seqq. usq. ad fin.
 De Acubus intra Vesicam repertis. III. 36.
 Ejusdem quædam quasi Herniæ. Ibid.
 Peculiares ad vesicam Viæ pro urina potus non admittendæ, & cur. Ibid.
 Vesicula fellis. Vid. Cystis.
 Veslingii lapsus. I. 21. II. 13. 29. V. 29.
 Vieussenius Acad. Paris. laudatus. II. 8. 36. 37. 43. III. 20. 47. V. 11. 14. 18. 26. VI. 5. 6. 9. 10. 12. 13. 15. 16. 18. 21. 22. 25. & seqq. 32. 59. 76. 82. 89. 91.
 Viperæ Cloaca descripta, & peculiaris positus osculorum uterinorum, atque intestini. IV. 39.
 Aliæ Viperæ Partes observatæ. III. 6. 25. Vid. etiam Penis. Pulmon. Ovaria.
 Viscerum quorundam imi ventris sedes in variis varia, in Anatomia, & Praxi Medica, & Chirurg. attendenda. II. 2.
 Umbilicalium Arteriarum origo unde sit, & quomodo in hac observanda errari facile possit. IV. 49.
 De Vena Umbilicali frequentissimus quidam error indicatur. I. 21.
 Ungues. De his nonnulla. II. 5.
 Volvulo correptorum rarissimi verum sterces evomunt. III. 9.
 De Volvulo alia. Ibid. & seqq.
 Vomitu rejecta cur non incurrant in Epiglottidem, & sic incidant in asperam arteriam. V. 35.
 Urachus. De hoc quædam. I. 21.
 Ureterum diametrum naturaliter esse inæqualem, facile ostenditur. II. 47.
 Ejus rei causa a Cowpero excogitata rejicitur. Ibid.
 Ureterum figura, & angustia in fine, hujusque usus. III. 48.
 Glandulæ confirmatæ. III. 35.
 Parietes cur crassiusculi. Ibid.
 Dilatio ingens. III. 48.
 Urethræ Muliebris Foramina, & Canaliculi ipsam intrinsecus obliantes. I. 10. IV. 24.
 Alia de eadem Urethra. Ibid. & III. 44.
 Urethræ Virilis tota positio descripta. III. 41.
 Hujus positionis observandæ modus, atque utilitas. III. 46.
 Caruncula. Vid. Seminalis.
 Corpus spongiosum cur non undiq. æquale I. 10.
 Vid. etiam Penis.
 Ejusdem Corporis Bulbus nunc dictus, quomodo antea vocatus. IV. 21.
 ejusdem Bulbi usus. IV. 20.
 Foramina, & Canaliculi, eorumque humor, & usus. I. 1. IV. 16. & seqq.
 Sunt duplicis generis. IV. 13. 8. 9. 19.
 Majores Canaliculi sunt prima sedes Gonorrhææ viru-

- virulentæ IV. 9.
 Alii Canaliculi observati in Majores influentes .
 IV. 17.
 De horum omnium origine Ibid.
 Glandula Littrii differt a Prostata IV. 14.
 Ejusdem Glandulæ Ductus . IV. 7. 14.
 Mucosæ Cowperi Glandulæ non semper ostendi
 queant IV. 15.
 Hæ in brutis inventæ antea fuerant a Malpighio .
 Ibid.
 Linea Urethræ alba IV. 18.
 Urethræ ejusd. Musculi . Vid. Acceleratores . Penis Trian-
 gular. & Transversi
 Dolor contumax facile curatus IV. 9.
 Uteri in latus inclinati : & per sulcum bifariam divisi
 observationes IV. 25.
 Uteri Structura musculosa in Puerpera planissime obser-
 vata IV. 26.
 In eadem nulla interna Uteri membrana Ibid.
 Sinus sanguiferi quibusnam Veterum noti Ibid.
 Hi, eorumque orificia in Uteri cavitate aperta in
 eadem Puerpera quam ampla fuerint Ibid.
 Uteri Cavitatis vera figura qualis sit IV. 42.
 Eadem Cavitas quomodo humida servetur . IV. 27.
 Cervicis Valvulæ I. 14. IV. 37.
 Hæ in quibus potissimum quærendæ IV. 38.
 Analoga in Vaccis structura descripta I. 14.
 Vesiculæ Cervicis descriptæ I. 32. IV. 39.
 De his quædam alia addita IV. 39. 40.
 Sunt Glandulæ Mucosæ IV. 40.
 De hoc Mucos I. 23.
 Num in Lue venerea sæpe vitientur IV. 41.
 Osculum cervicis aliquando Penis subit : IV. 25.
 Uteri Ligamenta Lata, & Alæ Vespertilionum distin-
 guenda IV. 27.
 Rotunda, magna ex parte ex vasis, quorum non
 nulla ad Cruralia pertinent, compingi, confirmatur .
 Ibid.
 De iisdem alia III. 49.
 Uteri Lymphæductus etiam in Muliere observati . IV.
 43.
 De Uteri prolapsu quædam IV. 27.
 Vulpus Jo. Bapt. Incis. Publ. laudatus . III. 37. IV.
 14. VI. 55.
 Uvulæ Musculi I. 8. II. 14.

W

W Hartoniani Ductus . Vid. Maxillarium .
 Willisii lapsus . II. 37. 45. III. 4. V. 18. 30. &
 seqq. 36. 50. VI. 5.

Z

Z Acuti Lusitani admiranda quædam curatio, per ana-
 tomen explicatur VI. 83.
 Zambeccarius Prof. Pisan. laudatus . II. 24. III. 14. 33.
 Zanottus Franc. M. Prof. Bonon. laudatus in Epist.
 præfixa Advers. IV.
 Zandrinus Med. Venet. laudatus II. 38.
 Zygomatici Musculi . II. 12.

I N D I C I S F I N I S .



D. JOANNI BAPTISTÆ MORGAGNIO

In Patav. Lyceo Anatom. Professori Primario, & Præsidi Meritissimo

JOANNES MARIA LANCISIUS S. P. D.

Cum primum inter Te, Virum Celeberrimum, & Clarissimos Mangetum, ac Blanchum Anatomica diffidia emeruisse comperi, non mediocre dolorem suscepi; tum quia natura, & ingenio ab hujusmodi concertationibus abhorreo, tum maxime quod apud Amicos uberem eruditionum, laborum, studiorumque fructum cum animorum acerbitate prodire, moleste fero. Itaque satis explicare verbis non possum, quanta me lætitia affecerit doctissimi Blanchi epistola nuper accepta, qua eos mihi sensus candide aperit, quibus existimationi, gloriæque tuæ præclare consultum video, simul etiam discordiarum finem brevi futurum, confido. Nec vereor, ut qui me singulari quodam amore, ac benevolentia semper prosequutus es, spem quoque meam ratam, firmamque efficias, restituta videlicet per me pristina vestra amicitia, quæ non solum in uberiores Rei Anatomicae utilitatem, sed etiam ad peculiarem animi mei voluptatem redundabit. Ut vero certissimis documentis obsequentem Blanchi nostri voluntatem perspicias, Autographum ejus epistolæ ad Te mitto, pro certo habens, Te consueta benignitate, justas licet, severioris Apologiæ causas magnanimo silentio prætermittitur: cujus quidem rei anxie nimis, sollicitæque testimonium abs Te præstolor. Vale, & si me amas, Blanchum, ut olim consueveras, redama; mihi que eas litteras scribe, quas ad eundem quamprimum mittendas curem, pacemque a Te impetratam renunciem.

Romæ XII. Kal. Novemb. MDCCLXVIII.

Illustrissimo, ac Sapientissimo Præsuli

D. JOH. Mariæ LANCISIO

Archiatro Pontificio, & a Secretiori Cubiculo

JOANNES BAPTISTA BIANCHI S. P. D.

Dum novam operum meorum Anatomico-Præcticorum, quæ nuper auxi, & illustravi, editionem Genevensibus typis appararem, ad manus meas pervenire Adversaria II. & III. Cl. Morgagni. Visum mihi statim est, illam editionem tandiu a me differendam esse, donec responsiones meas ad hæc Adversaria perficere, & meis operibus addere possem. Sed eas scribere aggrediens, quemadmodum cognosco, non carere me rationibus, experimentis, & certis observationibus, quibus mea confirmare possim, ita de styli ratione seligenda in iisdem responsionibus admodum hæsito. Severitas quidem, qua ille in scribendo erga me est usus, ut eodem modo respondeam, persuadet: Spes autem, fore, ut ille meis officiis, per te, Vir Illustrissime, allatis sibi satisfactum esse interea censeat, atque ideo deinceps sibi aliter scribendum judicet, me quoque, ut aliter scribam, hortatur. Equidem fateor, justam illi esse causam, ob quam de me queratur; quandoquidem ego in meis animadversionibus quibusdam eram usus loquendi formulis, neque ipsi debitis, neque sane a me bene animadversis, multoque minus lædendi animo adhibitis; a qua re semper maxime abhorruim; Quippe qui doctos omnes Viros, ipsumque præsertim Morgagnium, etiam ob nostram amicitiam, magni facio. Volueram ego, ex quo primum ejus I. Adversaria in hanc Urbem allata sunt, ejus observationes exercitationis causa cum oblati mihi cadaveribus conferre: & sic quæ aliter, quam ipse descriperat, videbam, hæc in meum dumtaxat usum adnotabam. Eas animadversiones cum ita scripsissem, nunquam deinde amplius inspexi. Pluribus exinde annis elapsis contigit, ut D. Genevensis, ad sui Theatri Anatomici editionem, postquam illas meas, quæ in eodem habentur, Dissertationes acceperat, etiam atque etiam aliquid aliud a me peterent. Recordatus sum illarum Animadversionum; easque statim, ne relectas quidem, ob graves, quibus tunc impediabar, tum practicas, tum domesticas occupationes, ad ipsos mihi, admonens, ut cum mihi tunc otii satis non esset, ipsi prius ab aliquo Viro prudenti emendandas curarent, si quidem Cl. Mangeto ob graviores curas id minime liceret. Cum vero postea Theatrum Anatomicum editum est, fateor, me illud ægerrime tulisse, quod meas Animadversiones non

Adversaria Anat. IV. ad pag. 109.

modo singulis Cl. Morgagni figuris quasi in certaminis cuiusdam modum appositæ vidi, verum etiam cognovi prædictas formulas continere, quæ certe mihi nunquam excidissent, si ego illas edidissem.

Ille postea Adversaria prædicta edidit, in quibus quemadmodum mecum agat, tute satis vides. Concedo, a me, quamvis, ut iterum fateor, id nolente, primum ipsum provocatum fuisse illis, quas dixi, formulis, iisque præsertim, quæ in pluribus locis ejus animadversionis occurrunt, quam in III. ejus Tabulam scripsi. Attamen nonne tibi, Vir Illustrissime, videtur, abunde sibi ipse de me in suis Adversariis satisfecisse, in quibus tam dure mecum agit, & potissimum in Præfatione, in qua nescio quomodo in me torqueat illud tibi notum Taciti dictum. Cum igitur alienum semper a literarum, & veritatis cultoribus habuerim, opinione dissentientes se invicem carpere; tametsi mihi in promptu essent, quæ ad edita jam ipsius Adversaria consonanter responderem; tamen, ne ipse ego nova simultatum semina jacerem, quibus a Cl. Morgagnio in suis IV. V. & VI. Adversariis uberiores offensionum segetem, sapientibus Viris improbantibus, colligerem, hanc scribendi methodum averfatus, nihil ad rem accommodatius me facturum putavi, quam si ad te, Vir Præstantissime, confugerem, in quo tota consentiente Europa, præcipuum veneror rei totius Medicæ, atque omnium virtutum lumen. Si Cl. Daniel Clericus, dum laudatissimam suam Medicinæ Historiam Egregio Bourdeloto nuncuparet, scripsit, quo jure apud veteres Litteratos homines in usu erat, sua Diis opera dicare, a quibus protegerentur, eodem, imo multo veriori, se credere idem erga insignes Monarcharum Archiatros esse faciendum, qui videlicet, ceu totidem Numina, non fabulosæ præsumunt Medicinæ; cur ego quoque ad te confugere dubitabo, qui primi universi orbis Monarchæ Archiater es dignissimus, non quidem ut aliquod ex meis operibus protegas, quod nunc celeberrimo Tuo Nomine insignire non audeo, sed ut meam cognoscere causam non graveris, in qua te, quod ad me attinet, plenissima auctoritate arbitrum constituo. Quamobrem eandem tibi exposui non sine illis animi sensibus, quibus Cl. Morgagnio satisfieri possit, si tu ipse, Vir Illustrissime, eos velis eidem afferre. Nam, si tibi videbitur, plane non recuso, quin totam hanc Epistolam eidem communices, & si referre existimes, typis etiam vulgandam permittas. Ut verbo me expediam, non aliud mihi consilium est, quam ut quæ ego observavi, pro veris, ut semper faciam, tueri non acri, & pugnaci, sed miti, & pacifico, quem unice probo, stylo possim. Quamobrem ex ea, qua nunc ad te scribo ratione, & ex heroica magni tui animi integritate viam, modumque inveniri posse spero, unde id consequar quod cupio, & quod mihi esse, meo salvo honore, cupiendum existimo. Hoc si fiat, neque erit cur me pœniteat ejus scribendi rationis, qua scribere constitui, & Docti omnes id tibi acceptum referent, quod dissidentium animos, si non opiniones, tua prudentia, & auctoritate conciliaveris: me autem eo magis in posterum obstrictum habebis. Vale.

Taurini id. Octobris 1718.

Illustrissimo, & Reverendissimo Præsuli

D. D. JOANNI M. LANCISIO

Intimo Cubiculario, & Archiatro Pontificio

JOANNES BAPTISTA MORGAGNUS S. P. D.

Quam vellem, ut quando Cl. Blancus isto animo est quem Tuæ, Vir Illustrissime, ejusque etiam magna ex parte Litteræ testantur, æqui, verique studioso; quam, inquam, vellem, ut vel, pro ea quam ipse quæsierat, amicitia, illa mecum primum communicasset quæ ipsi aliquanto aliter ego perspexeram, in quibusdam cadaveribus esse videbantur, vel postquam illa typis, & ea quidem ratione quæ nostrum certe neutrum deceret, aliorum culpa vidit esse vulgata, istam ipsam quam nunc tandem misit, continuo ad Te, Vir Amplissime, confessionem misisset; profecto non modo

modo isto Taciti dicto (quod denique non meo, sed Amicorum iudicio in mea Præfatione positum esse, intelligitur) usus non essem, sed quod pariter de eorundem Amicorum, aliorumque Sapientum Hominum consilio prope invitus, coactusque feci, ut Adversaria cum edita, tum edenda severe scriberem, atque ita & mihi satisfacerem, & ipsum admonerem, in eo me aliter; & facile quidem, libenterque; gessissem.

Sed quoniam id quod factum est, infectum fieri non potest; de eo quod faciendum supererat, sic habeto. Quæ mox emissurus sum, Adversaria ut ejus in nostras Tabulas Animadversionibus sigillatim respondent, ita majori, sed iusta tamen, severitate conscripta erant. Nam priusquam ejus primam Animadversionem expenderem; ut in Præfatione me facturum indicaveram, quid illum, me quid deceret, inquirebam, binis dumtaxat rebus, sed iis certissimis apertissimisque spectatis, iisdemque inter cæteras quæ spectari potuissent, tum maxime gravibus, tum ad propositum maxime pertinentibus, hinc ejus videlicet provocatione, & provocationis ipsius genere, inde vero conceditis mihi, non satis merito, fateor, sed tamen a tanto Principe, & in hac tanta Academia conceditis, & a me post Medici Partes gestis Summis Anatome Muniis, cum ipse ne Publice quidem Medicinam, aut Anatomen profiteatur. Quibus ex rebus quæ ego usque adeo provocatus reposuissem, ac reponere adhuc pergerem, ea non Dicta, non Offensiones, sed Responsa, sed Defensiones esse, tum Priscis, tum Recentioribus Sapientibus Viris probantibus, demonstrabam. Mox quæ hinc illinc, in nonnullis præsertim Animadversionibus, certæ quædam loquendi formulæ in me torquebantur, ut ad ea loca ventum erat, ita rursus singulas repellebam, qua severitate hic non dicam; qua autem vi, & quo jure, ex eo uno, quod proferam, exemplo, tute facile, Vir Gravissime, existimabis.

Nam certo cuidam ejus Animadversionis quæ in meam III. Tabulam est, loco (non quod eorum qui me probe nossent, quenquam esse putarem, qui me aliquid affirmante, aliorum testimonium requireret; sed ut ignotissimus quisque intelligeret, nihil in meis Tabulis esse propositum quod ipse, atque adeo Pictor quoque reapse non vidissemus) Angeli Michaelis Cavazzoni, quo uno Pictore in illis iisdem Tabulis conficiendis sum usus, hominis, ut summa in pingendo peritia, ac diligentia, sic antiqua illa atque optima fide spectati, luculentissimum, quod asservo, testimonium opponebam, cui scribendo affuerunt Viri pari fide ornatissimi Jo. Antonius Stancarius Rei Medicæ, atque Anatomice Professor apud Bononienses, in primis clarus, & Franciscus M. Zanottus, qui apud eosdem Philosophiam proficetur, non hujus modo, sed pulcherrimi cujusque studii laude vel supra ætatem florentissimus, in quo testimonio diserte negat Cavazzonus, se quidquam mihi pinxisse quod ex vero qua summa potuit diligentia, exactissime non describeret.

Cum ergo mihi satis quidem in jam editis Adversariis fecissem, sed in eo nunc essem, ut quod in illis generatim, in his proximis sigillatim efficerem; ecce Tuæ, & Cl. Bianchi Litteræ, in quibus istas ipsas loquendi formulas, easque præsertim, quæ in pluribus locis ejus animadversionis occurrunt, quam in III. meam Tabulam scripsit, - neque mihi debitas, neque sane a se bene animadversas; multoque minus laudendi animo adhibitas esse; ideoque quod editæ fuerint, se ægerime tulisse, confitetur. Hanc confessionem, quam sua ipse sponte & voluntate insuper addit, ac typis etiam vulgandam permittit, & quam Tu, Præsul Illustrissime, tam benigne, ac liberaliter ad me defers, vel ut ipsi gratum faciam, vel ut naturæ ingenioque meo indulgeam, vel ut Tibi, quod caput est, Amplissime, & de me egregie merite Vir, obsequar, prompte, ac libenter accipio. Atque ut intelligas, quam cupiam, istarum formularum induci, obli-vionem, qualis fuit rerum ante Euclidem ducem gestarum, & quanti istam confessionem faciam; ea omnia quæ supra memoravi, loca ad istas formulas spectantia, quasi ex nunquam scriptæ essent, ex edendis Adversariis delebo; & pro illis omnibus locis unam ipsam cum hac Epistola eorundem Adversariorum initio præfigam.

Utinam vero æque mihi facile esset colorem etiam quasi quendam auferre per cuncta illa pariter Adversaria diffusum meæ illius prioris severitatis. Sed certa, & extantia loca, asperiora quædam responsa, & siquid etiam jocosius sorte

scriptum est, hæc quidem demere omnia possum; cum autem quem dixi, colorem unum & perpetuum per universam scriptionem eodem velut tenore pertinentem qui possim? Ex eo tamen ipso quantum lex jam diu suscepti, & plures ante menses; quod Tu quidem optime nosti; absoluti Operis, tum observationum ipsarum pondus; & veri inprimis studium atque amor finent, tantum subducere, ac detrahere conabor. Quod si vel propter rei incredibilem, nec nisi iis qui periculum fecerint, satis cognitam difficultatem, vel propter summam Typographi, qui jamdudum promissa scripta jure suo repetit, ac flagitat, festinationem, quidquid ex animo cupio, satis efficere non potuero; erit Tuæ æquitatis, Vir Sapientissime, eorum quæ nunc consulto edico, ac præmoneo, & Te ipsum meminisse, & cæteros mature facere certiores; ne quis forte postea usque adeo in me iniquus existeret ut Tullianum illud jactaret: „reditus illustris in „gratiam, in quo ne per imprudentiam quidem errari potest; „est; „nostri reliqua.

Velim itaque, ut magis quo tempore scripserim, quam quo scripta ediderim, attendas. Id si feceris, ut meus Tibi jam diu perspectus est animus candore, & fide nemini omnium secundus, ita sine ulla hæsitazione affirmabis, quæcunque erunt reliqua prioris nostræ severitatis vestigia in eum nempe cadere, qui eas de quibus sæpius dictum est, formulas nobis esse debitas, sentiret; non igitur in Cl. Biancum, qui easdem formulas nobis esse indebitas, fassus est. Hoc si, Vir Summe, affirmaveris, & si illud præterea addideris, quo in numero ipse, & quo in loco apud animum Tuum est, in eodem apud meum & nunc esse, & omni tempore futurum; me semper libentissime confirmantem, atque adstipulantem habebis. Vale.

D. Patavii V. Kal. Novembres MDCCXVIII.

Viro Eruditissimo Doctissimoque

D. JO. BAPTISTÆ BLANCHIO

Med. & Anat. Professori Taurinensi

JO. MARIA LANCISIUS S. P. D.

V Eherentius nunquam Tibi gratulatus sum, aut in posterum me posse arbitror, Vir doctissime, quam hodierno die, quem sane lætissimum mihi quoque illuxisse sentio. Nam, cum superiori mense litteras abs Te accepissem benevolentia in me tuæ, simul etiam prudentis, candidæque erga Præclarissimum Morgagnium excusationis plenas, easque ad illum una cum non obscura voluntatis, amorisque mei significatione misissem, ab eodem, data ad me epistola, humanissime probatas video, priscamque proinde amicitiam inter Vos rursus conglutinatam, ac firmissime duraturam intelligo. Nemo enim, amicissime Bianchi, Te perpetuam cum optimo Viro pacem voluisse crederet, si acta cæteroquin improbanda defenderes. Ad me autem quod spectat, cum nihil ægrius ferre soleam, quam eruditorum hominum, amicorum præsertim dissensiones, quibus plerunque non leve in eisdem detrimentum, semper vero aliqua in literariam Rempublicam jactura redundat; omnia quidem libentissime feci, quæ ad mutuam vestram concordiam, publicamque existimationem pertinere cognovi. Id enim vero ab eo animo, qualem meum esse amici dicunt, non privata solum quies exigere, sed multo magis similium vobiscum studiorum tranquillitas, quæ ad communem utilitatem conspirat, impensus postulare videbatur. Cæterum, Vir Clarissime, auguror, & futurum confido, ut, depulsis omnibus animorum diffidiis, diuturna Vobis, prospera, & felix vita contingat: unde mutuis officiis, sedulaque, & amica tum inquirendi, tum lucubrandi contentione ad veram laudem, propitio Deo bonorum omnium largitore, feliciter semper contendatis. Interim Autographum Clarissimi Morgagni ad Te mitto, ut certissimum habeas reconciliatæ illius voluntatis testimonium. Vale.

Romæ Postridie Kal. Novembris MDCCXVIII.

JO. BAPTISTÆ
MORGAGNI
ADVERSARIA
ANATOMICA PRIMA,

BONONIÆ OLIM IN PHILOSOPHICÆ ACADEMIÆ

QUAM NUNC

INSTITUTI SCIENTIARUM VOCANT,

publico solemnique conventu recitata,

IN PATAVINA VERO EDITIONE

Ab ipso Auctore recensita, & NOTULIS in margine plurimis adaucta quibus
cæterorum ADVERSARIORUM loca indicantur ad horum
confirmationem, aut illustrationem pertinentia.



VENETIIS,

MDCCLXII.

~~~~~

EX TYPOGRAPHIA REMONDINIANA.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.



TO BAPTISTE  
MORGAGNI  
A DIVERSARIA  
ANATOMICA PRIMA.

DOMINICUS CILIMINUS THEOPHILUS ACADEMICUS

IN ANATOMIA

INSTITUTUM SCIENTIARUM VOCALAT.

IN PATAVINA VERO EDITIONE

IN PATAVINA VERO EDITIONE  
IN PATAVINA VERO EDITIONE  
IN PATAVINA VERO EDITIONE



IN PATAVINA VERO EDITIONE

IN PATAVINA VERO EDITIONE

IN PATAVINA VERO EDITIONE  
IN PATAVINA VERO EDITIONE

IN PATAVINA VERO EDITIONE



## EUSTACHIO MANFREDIO

Philosophicæ quæ Bononiæ est, Academiæ Præsidi,

CÆTERISQUE EX EADEM ACADEMIA

SODALIBUS ORNATISSIMIS

Joannes Baptista Morgagnus S. P. D.



Oactus assiduis tuis jussibus atque adhortationibus, Doctissime Eustachi, cum neque occupationes meæ, neque temporis præscripti angustia majus suscipiendi opus & elaborandi ullam darent facultatem, rem nuper animosissimam feci. Leves quasdam, incomptas, longeque inter se disjunctas anatomicas observationes, quæ aliquanto melius plura adhuc lustra, & omne fortasse tempus meis in pluteis latuissent, ex adversariis ipsis informibus in solemni, & publico Academiæ nostræ conventu recitavi. Quod postquam facere ausus sum, satis causæ amplius non est visum quare Amicis aliquot earundem forte editionem postulantibus, diutius id negare pertenderem. Etsi enim quantum ea res ab ætate, studio, meisque viribus, atque ab ipsa item adversariorum ratione & videatur, & sit aliena, tam ipse intelligo, quam qui maxime; non tamen existimo, me plus ausurum, omnium judicio meas observationes subjicientem, quam ea die cum vestræ Academiæ, imo Civitatis vestræ gravissimis auribus easdem committere non dubitavi. Additque vim animi ad hoc audendum & alacritatem quandam incredibilem etiam illa cogitatio, quod per editionis istius ausum facultas mihi præbeatur longe optatissima agendi Vobis publice gratias pro tot ingentibus Beneficiis quibus me singuli affecistis, & ornastis universi. Namque in vestro isto Cœtu florentissimo ii prope omnes connumerantur perhumani, & Eximii Viri quorum me præceptis in Botanica, in Re Anatomica, in Mechanica, in universa Re Medica optimis spectatissimisque usum esse, memoria teneo impermutabili. Sunt item in vestro numero Amici omnes mei, & Socius quisque suavissimus: suntque inprimis Fautores multi, & Tu quoque in his, Ornatissime Eustachi, Tuque præterea, & Stancarii Fratres hospites mei, singulari homines virtute, & humanitate. Per quorum, aliorumque omnium laudes singulatim ire cum hujus brevitatis epistolæ vetet, non semper tamen quærenti præsertim & exoptanti ejus rei faciendæ deërit locus. Porro quæ, & quanta extiterunt universæ in me Academiæ Beneficia! quod principio adolescentulum benigne admisit, quod deinde instruxerit, & prope educaverit, quod Physicomedicam, atque Anatomicam provinciam commiserit, quod novissime ejus Institutum me nomine tenus instaurantem vere ipsa consilio, labore, & auctoritate propria adjuverit, quod denique iis me nec opinantem Honoribus exornaverit qui utinam ejusmodi essent, ut pro ipsis publice, & nominatim sine magnæ ostentationis specie dignas persolvere gratias possem. His tot maximis erga me Beneficiis pro quibus & Omnibus, & Universis gratias ago quas possum cumulatissimas, illud etiam, Sodales, & Tu inprimis, Cl. Vir Præses, adjicite, uti observationes hæc meæ, quæ vestro jussu, & in vestra Academia sunt recitatæ, vestro Nomini inscriptæ prodeant. Quæ utinam meditationibus vestris adjutæ aliquam valerent Philosophiæ nostræ particulam illustrare. Sunt enim (quod postremis hisce temporibus necesse propemodum est accidere) meæ observationes per se parvæ, tum mihi adeo esse videntur, ut his quas publice recitavi, non cogitata quidem plura; hæc namque ferme hujus loci visa non sunt; sed multas alias observatiunculas ex iisdem adversariis interseruerim, si forte quæ singulæ parum habent ponderis, conjunctæ ac conglobatæ majoris aliquid momenti acquirèrent. Quod tamen non mediocriter me recreat atque confirmat, quantum leves & pusillæ sunt observationes hæc meæ, tantum veritati sunt consentaneæ, nisi me in cadaverum longa serie attente spectantem, & respectantem mei prorsus oculi deceperunt. Quod ne fieret, & Vestrum




pluribus plura ostendi, & quid singulis videretur, rogavi; nam haud tanti apud me inventionis amor est, ut veritatem non magis diligam, & quacunque datur ratione perquiram. Quocirca & a Vobis omnibus, Sodales, & per Vos a Cl. Viris quibuscum litterarum habetis commercia, in magni beneficii loco etiam atque etiam peto, ut si quid in plurimis, iisdemque aptis cadaveribus forte deprehendatur contra atque a me propositum sit, id ne me celare velitis. Etsi vero longe mihi potior cura est veritatis quam novitatis; & aliquid tamen operæ in eo sumpsi, ut ne quidpiam pro re nova haberem atque adeo traderem quod ab aliis antea proditum esset, tum paucos meos, tum multos Amicorum libros versando, quorum nonnullam partem in observationibus meis nomino, & quoscunque item in hac litteratissima Civitate mihi inspicere proclive fuit, qui de Re quidem Anatomica conscripti essent. Quoniam tamen neque meæ diligentiae, neque memoriae plurimum tribuo, & quosdam præterea libros invenire nusquam licuit, siue quod vetusti, & rari nimis sint, seu quod exteri sint, & recentes; neque enim, ut probe nostis, ob infesta milite itinera, peregrina scripta nisi sero ad nos importantur; siqua res propterea tanquam indicta, in observationibus his ponitur quam ante me ab aliis descriptam plane atque indubie comperiatis, ut privatim alias, ita nunc publice a Vobis peto, ut de illa me faciatis certiores. Sicut enim falsa, siqua sint, primus ipse ex Adversariis delebo, sic quæ forte aliena esse, monstrabitur, suis lubens Inventoribus referam. Meique hujus animi luculentum specimen credo me in his ipsis observationibus præbuisse. In his enim non pauca quæ nemine unquam indicante, meo labore ac Marte detexeram, postquam in Majorum exemplaribus comperi, suo quæque Auctori, a quo nihil certe in eorum inventionem adjutus fueram, cum sæpe alibi, tum in tota ferme Adversariorum secunda parte volens retuli atque restitui. Etsi enim aliquot fere singulis ipse adjeci, quæ fuerant ab inventoribus prætermissa, poteramque Nicolai Massæ auctoritate, atque exemplo eorum mihi nostris temporibus inventionem asserere quæ longum jam tempus forent aut nullatenus, aut non satis etiam memorata, attamen æquum magis, piusque esse credidi, integram atque indivisam inventionis laudem Majoribus nostris referre, mihi vero aut amplificatoris, aut restauratoris, aut minus aliud aliquod nomen satis superque esse existimare. Quæ cum ita sint, nemo, opinor, graviter feret, quod nonnullas alias res quæ vulgo a junioribus inventæ putantur, eas quoque alicubi priscis Inventoribus restituerim, horumque perspicua verba & fidei faciendæ causa, & quo Amicis ea forte a me requirentibus indulgerem, in calce pagellarum adscripserim. Illudque etiam, spero, a Clarissimis aliquot Anatomicis quos ut doctos esse video, ita ingenuos esse audio, non ita difficile condonabitur, quod nonnulla ab ipsis proposita in dubium aliquando vocem, aut pro rei natura minime approbem, cum ego cæteros ideo admonendos existimaverim, ne propter tantorum Hominum auctoritatem in errorem laberentur. Quo enim id animo fecerim, vel ex ea re intelligi potest, quod illis in locis eorum nomina Virorum siluerim, quæ alibi & semper protuli, & suis honoribus affeci. Quos utinam, Præses, & Vos, Sodales, docere singulos possitis qua ego sim mente, quoque instituto, quantumque per totos octo annos quibus in vestra Academia versatus sum, in aliorum laudes, & obsequia fuerim pronus, quantum contra a reprehensionibus, quantum a quibusque contentionibus alienus. Illud, Sodales, relinquitur ut duo per humanitatem vestram a Vobis petam. Siquem forte audietis (audire autem potestis plures) nonnulla in his meis observationibus pacate, & ut sapientem hominem decet, non sine jure & ratione improbantem; eas, quæso, apud hunc multis nominibus excusate, tum quod prima sunt quæ ediderim, tum quod adversaria sunt: sperare Vos, me paulo aliter esse scripturum, siquando olim, non adversaria, sed librum, non prima amplius, sed ulteriora in manus omnium sim daturus. Quod si aliquos vicissim audietis temere, & procaciter insectantes; ut imperitos, aut etiam animo male affectos persæpe facere videmus; hos vero homines; si ego meum omni tempore Academiae officium præstiti, si ejusdem commoda privatis habui necessitudinibus potiora, si Vos & singulos, & universos præcipuo semper honore sum prosecutus; hos, inquam, homines aut candidis & liberis vocibus, aut sola etiam, quæ tanta est, vestri Nominis auctoritate, & opinione absterrete. Bene agite, & læte philosophamini.

*Libr. In-  
troduct. Anat.  
cap. 3.*

















ADVERS. I. TAB. II.









ADVERS. I. TAB. III.









Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.





Fig. IV.







# JO. BAPTISTÆ MORGAGNI

## ADVERSARIA ANATOMICA

### P R I M A.



Quod ex meis Adversariis Anatomicis hodie in Academia lecturus sum, id omne divido in partes tres. In prima res aliquot ab nemine adhuc, quod sciam, traditas, in alia nonnullas res olim quidem litteris proditas, nunc autem fere obsoletas, in tertia circa res quasdam de quibus aliter ab aliis scriptum est, quid ego observaverim, qua summa potero perspicuitate, brevitate, fide proponam.

*Glandula Arytænoidæ.*

Tabul. 2. Figur. 1. Litter. e. e. Fig. 2. Lit. E. E. Fig. 3. Figur. 6. Lit. h.

*Vide infra num. 16.*

*Nonnulla de Glandula Epiglottidis.*

Tab. 2. Figur. 5.

*An. med. ventr.*

*De Laryng.*

2. Nondum mihi contigit quemquam Anatomicum videre, duas qui Glandulas descripserit, quas ego ab loco in quo reperi, appellare soleo *Arytænoidæas*. Singulæ enim ad singulas cartilagineas arytænoides positæ sunt, forma L litteræ fere conlimili. Crus earum alterum quod longius est, superiori arytænoidum processui ab anteriore parte incumbens, alte in quasdam cavitates se se insinuat quæ ab eadem parte, uti animadvertum mihi est, arytænoidibus insculpuntur. Alteri autem cruri quod thyroidem versus protenditur, superius de duobus ligamentis per quæ arytænoides & thyroides inter se connectuntur, intrinsecus attensum est, credo, ne glandula nimis aliquando humore distenta, intro protuberet, spiritumque intercipiat. Nam ea de causa quædam etiam veluti columella videtur extructa, interdum ex cartilagineis fragmentis, alias ex solidiuscula ejusdem glandulæ substantia, qua illud alterum longius crus intrinsecus pariter & secundum ejus longitudinem coercetur. Constant glandulæ arytænoidæ ex granosa substantia e livido albescente, de qua utilem obliniendo laryngi succum, maxime inter edendum, aut vociferandum, appressa epiglottis, vel contracti vicini muscoli exprimunt.

3. Harum glandularum eadem atque *Glandula Epiglottidis* substantia est. Cujus hic descriptionem proponam, non uti novæ (hanc enim & nostris vulgo Anatomicis, & Jacobo Berengario notam esse, video, quam iste carnem glandosam appellat) sed uti glandulæ non satis descriptæ. Hæc epiglottidis dorso incumbit, non modo inferius, veluti ab aliquo scriptum est, sed quamquam inferius crassior est, atque ibi a lateribus utrinque extat, ascendit tamen, & sub alba latens membrana, ad epiglottidem summam pertingit.

Epiglottidem crebris pertusam foraminulis delineavit Fabricius, & post hunc Casserius, qui & superiorem arytænoidem multis foraminibus perviam sculpsit in ovibus tantum, quamquam & in bobus ita habere, & in utrisque glandulosos ductus, imo glandulosam substantiam per ea foramina transmitti, compertum habeo. Cæterum per ista epiglottidis foramina canaliculos hujusce glandulæ quam describere institueram, traduci, docuit Steno, quem cæteri, quotquot ego vidi, secuti sunt. Ego vero sicuti istis Fabricii, Casserii, Stenonis observationibus nihil verius esse, confiteor, ita oportere, ajo, aliis ut additamentis perficiantur. Nam neque epiglottis foraminulis tantum pervia est, sed utraque facie profundis, & inæqualibus foveis quibus suam alte glandulam excipit, potissimum propius basim, excavata & veluti corrota est. Neque glandula suos modo canaliculos, sed & se ipsam non uno meatu a gibba epiglottidis parte transmittit in concavam, ibique rursus se se expandit, sic ut foveas, quibus epiglottidem etiam intrinsecus excavatam proposui, plane compleat & inæquet. Quod ergo aliqui ex Recentioribus tradiderunt, faciem epiglottidis concavam a singularibus minoribus glandulis obsideri, ii videlicet ab una eademque glandula decepti sunt. Adjicere hic possem, quid epiglottis, ejusque glandula in bubulo atque ovillo genere differant ab humanis quas modo ostendebam, præsertim vero uti in canibus bino tenui & foraminulis multis pervio epiglottidis pariete crassa glandula singulari posito includatur. Sed alia properantem me avocant.

4. Sunt igitur gemina *Epiglottidis Ligamenta* præter illud quod postea commemorabo. Crassa enim tunica qua radix linguæ, & cornua ossis hyoidis super contexta sunt, duplicata, assurgit in duo vincula, quæ proximis convexæ epiglottidis lateribus singula utrinque conjunguntur. Hæc licet in canibus propter peculiarem situm dilatatam servare epiglottidem videantur, in nostro tamen genere nihil dubito, quin illius alterius ligamenti usum juvent, de quo infra demonstrabitur.

5. Et si vero lateralia hæc epiglottidis ligamenta solent inquirerium oculis ultro occurrere, minus tamen miror, ab nullo adhuc, quod sciam, Anatomico descripta esse. Nam neque memini legisse, qui *Labrorum* evidentia adeo *Ligamenta* memoraverit. Porro utrumque labrum, & præsertim superius, subjectæ in mandibulis mediis gingivæ ceu quodam vinculo commissum est, nequando labra nimis extra suum locum avellantur. Ligamenta hæc etiam in his quæ dissecui, brutis, & sæpius crassa admodum, validaque, observavi.

6. Traditur ab Anatomicis prope omnibus, ab iis vero qui partium usus exponunt, non sine aliquo interdum consequente errore, præsumitur, *Hyothyroides*, & *Sternothyroides Musculos* se se in basi scutiformis cartilaginis implantare. Quod si cuti cum ovina, bovine anatome optime congruere, sic non admodum convenire cum humana dissectione, compertum habeo. Etenim sternothyroides postquam ejus quam dixi, cartilaginis basim attingunt,

*De Glandulis.*

*Vid. Adv. V. Animad. 47.*

*Ligamenta Epiglottidis Lateralia. T. 1. Lit. e.*

*Labrorum Ligamenta.*

*Vid. tamen Adv. VI. An. 98.*

*Sternothyroidum & Hyothyroidum termini. T. 1. Lit. g. r.*



De La-  
ryng. P. 1.  
c. 4. 8.

gerunt, interioribus lateribus paulatim ad exteriora inclinatis, summis apicibus ad parvam quandam prominentiam ascendunt, quæ ab uno fere Hieronymo Fabricio ab Aquapendente, neque tamen ita dilucide, indicata est. Ea non procul a supernis processibus ejus cartilaginis utrinque protuberat, eique thyropharyngæi musculi superioribus angulis illigantur. Sternothyroides igitur tametsi tota ea parte quam ad exteriorem inclinare, supra posui, a cartilaginis basi ad eas usque prominentias inferuntur, his tamen valentius alligantur, ut in hunc potissimum finem eæ videantur factæ, præsertim cum in pluribus animantibus quibus illi musculi ad thyroidis basim subsistunt, eadem desiderentur. Pariter hyothyroides etsi ex nonnulla parte in eadem basi inferuntur, fibris tamen multo pluribus ad totum hunc tractum terminantur, quem ad tractum sternothyroides finiri, proponebam. Non sum nescius, tot inter descriptiones horum musculorum esse pauculas quæ ad nostras ex parte accedant: has tamen ab illis satis discrepare, intelliget quicumque ambas simul contendere voluerit.

Sternothyroidum, & Sternohyoidum tendinæ Inscriptiones.

T. 2. F. 1.  
Lit. n. n.

Vid. tamen Adv.  
II. An. 13.

7. Quoniam de his musculis sermonem habeo, non alienum esse, existimo admonere, fuisse ab hominibus anatomicæ rei longe peritissimis nervosas quasdam inscriptiones, quales in rectis abdominis musculis, in utroque sternothyroide memoratas, quæ ad eorum firmitudinem, quod longi sint, non parum conducant. Has mihi nonnisi semel, atque iterum videre datum est. Sed in Musculis sternohyoidibus, qui illis aliis, ut est notum, longiores sunt, nunquam sane memini tendineas istiusmodi inscriptiones defuisse. Quæ quoniam adeo sunt perpetuæ, & a nemine, quod sciam, perspicue indicatæ sunt, has qui volet, sic observabit. A sterno duos tresve digitos transversos in posteriore sternohyoidum facie singulæ occurrent. Aliquando rectæ sunt, sæpius tortuosæ, & obliquæ. Musculorum corpus alte subeunt, raro tamen ad eorum anticam faciem pervadunt.

De quibusdam Uvulae, & Pharyngis Musculis.

Anat. c. 11. Differ.  
Anat. l. 3.  
Obs. An.

8. Locus hic esset proponendi quid circa alios musculos superiore anno observaverim, & nominatim circa Musculos Columellæ, quorum duos comperio in thyroidis lateralem utramque oram infixos, duos in triangularem expansionem deorsum productos, unum vero teretem ab horum tergo collocatum. Locus quoque esset demonstrandi quid porro exploratum habeam de sphinctere ejus pharyngis orificii quod est ad nares, quidque de musculis pterygopharyngæis quos nobilissimi Anatomici Patavini Marchettus, & Molinettus, alique præterea descripserunt; eademque occasione possem traditam olim a Falloppio Stylolpharyngæi Paris in osse hyoide, & superna thyroidis ora implantationem restituere. Sed quoniam hæc fere omnia, eorumque usus & alias cum vestrum pluribus, Academici, communicavi, & in Epistola data nuper ad Cl. Antonium M. Valsalvam, quem vos Sodalis, ego etiam Fautoris, Amici, & in re anatomica Præceptoris loco habeo, executus sum, non videntur amplius ex his Adversariis esse relegenda. Unum potius addam, quod dum in iis rebus perquirendis operam ponerem, jam olim ad linguæ radicem animadverti. Scilicet ad anticos limites ejus glandulosæ expansionis quæ postremam linguæ superficiem occupat, Foramen in medio hiat, quod cum primo vidi, pro sinuosi ulceris orificio perperam habui. Interdum hoc foramen est arctius, sæpe vero latum est. Papillis aliquando longiusculis, quales ibi solent occurrere, impeditum est, alias patulum & omnino vacuum spectatur. Et quamvis non raro immixtus foramini stylus parum alte adigi possit, pluries tamen memini, ad longum spatium oblique deorsum nullo negotio descendisse. Sic nuperrime per tractum bini transversi digiti ad basim usque ossis hyoidis eundem adagi; canalemque secundum ejus longitudinem penitus apertum mucosa scatentem saliva comperi, qualem &

Foramen ad Linguae radicem.

T. 1. Lit. l.

Vid. Adv.  
VI. Anim.  
93. 94. 95.

ex parvo orificio expressi, quod in medio canali a parte inferiore aperiebatur. Hunc canalem, seu potius sinum, cum extat, pro magnæ partis earum glandularum excretorio ductu agnosco. Sed neque ipsum, neque vero descriptum foramen semper invenire est. Hoc tamen si non in majore, certe in dimidia parte eorum quæ secui, cadaverum conspicuum fuit. Cujus descriptionis ea saltem utilitas est, ne quis aliquando imperitus Chirurgus, si in aliquo linguæ morbo eam rem aut intorti specilli ope, aut alia ratione animadvertat, id foramen pro ulcere habeat, & tractet, quod a Natura ipsa frequenter adeo positum est. Eodem consilio Falloppius proxima tonsillarum descripsit foramina: quæ, fateor, perpetua sunt, ubi nostrum frequenter deest. Sed hoc ipso nostrum multo fallere aptius est, quod perpetuum, & constans non est.

Obs. An.

9. Nunc juvat nonnullas ex his rebus proponere quas in dicatis urinæ, & semini instrumentis compertas habeo. Et primum ubi ureteres arctato orificio in vesica finiuntur, productis ulterius ex se fibris, unum utrinque crassiusculum, teres, & compactum corpus excitant, quod solet posterius intra vesicæ collum protuberare. Carnea hæc duo corpora aliquantum progressa, concurrunt, raro linea recta, nempe inter utrumque ureterem, raro etiam ad modum curvæ lineæ, verum oblique deorsum lata ad angulum inclinantur, quo ex angulo in maribus sæpius vidi nescio quam lineam deorsum promissam, illique urethræ prominentiæ, quam gallinaceum caput vocant, continuatam. Hac linea, sive iis corporibus digiti apice deorsum tractis, contrahi ureterum oscula, & coarctari videntur. Quas res postquam frequenter observavi, tum primo agnovi, quid essent duo teretia corpora, quæ in virili aperta vesica, at sine ulla explicatione, delineavit solertissimus Auctor Graafius in suo de Virorum Organis tractatu; etsi fateor, non posse me assequi per anatomen, quid sit illud tertium corpus quod ad priorum concursum descendere ad perpendiculum in Figura eadem facit, & præterea non intelligere, quamobrem in posteriore de Mulierum Organis tractatu in his quas pariter apertas delineat, muliebribus vesicis ea semper corpora prætermittat. Porro hæc duo quæ descripsimus, corpora non modo in mulieribus, sed neque in his fere omnibus, quæ quidem ego dissecui, brutis, sive nostri sexus, sive sequioris, Prudentissimus animantium Conditor prætermittit.

De quædam carne Vesicæ Corpora.

Vid. Adv.  
III. An.  
42.

10. Plures ante annos in superiore urethræ virilis pariete multa interius peculiaria Foramina, seu excretoria oscula animadverti, quæ in eadem recta linea secundum urethræ longitudinem disponuntur. In plurimis ostendere se se incipiunt ab extremo urinario meatu pollicem unum transversum, desinunt autem septem, vel octo transversos digitos ab eodem. Et sicuti raro decem, vel undecim plura sunt, sic raro tribus, vel quatuor pauciora inveniuntur. Hæc quamvis certam inter se distantiam magnopere non servant, tamen non sæpe fit, ut alterum ab altero totum digitum transversum absint, & novissima præsertim, ut quæ minus inter se distare solent, quam prima. Ut distantia, ita magnitudo incerta est, sic tamen ut quam sæpissime quæ prima sunt, eadem maxima quoque sint. Maxima autem nunquam tanta fuerunt, ut eorum orificium frumenti grano operire non potuissem, & raro minima observavi quibus setam indere non potuerim. Elliptica figura sunt, quamvis non raro triangularia fere conspexerim; at semper secundum urethræ longitudinem eorum figura protensa est. Pressione guttas emittunt liquoris subalbidi, crassiusculi, & lenti, quemque cum nuper in quodam viro cum eo contulisset qui ex mucosis Præstantiss. Cowperi glandulis in urethram pariter exprimitur, consimilem admodum observavi. Post primas guttulas si supra foramen quodvis apprehensum

Urethræ Foramina, & Canaliculi peculiare.

T. 4. F. 4.  
Lit. B. C. D.

Vid. Adv.  
IV. An. 8.  
9. 10. 11.  
16. 17. 18.  
19.



sum digitum deorsum ducas, id alias dabit; non ita prompte, si infra foramen, aut ad ejus latera appressum, ipsum foramen versus ducas. Pariter si specillum, aut setam per ea foramina sursum adigere volueris, minimo negotio adiges, non ita vero, si deorsum, aut ad latera impellere libuerit; quamvis & oppositum, & utrumque simul aliquando observavi. Sunt ergo ut plurimum hæc foramina secundum urethræ ductum & naturam disposita, credo, ne aliquid feminis, aut urinæ interciperent, si contra horum cursum conversa essent, tum quo liquor is facilius prodire, & per urethram diffundi queat; quamobrem neque in pariete urethræ inferiore, sed in supero hæc foramina statuta sunt. Continuati autem singulis foraminibus Canaliculi statim fere sub interna urethræ tunica protensi occurrunt, alii ad brevem, alii vero ad longiorem tractum, quisque pro sui foraminis amplitudine, & pro spatium (nam totum hoc fere occupant) inter illud, & foramen proximum interjecto; quin interdum continens ab uno in aliud foramen aditus est. Quorum canaliculorum cum maximos nonnunquam secundum eorum longitudinem aperuerim, eadem qua urethram, interius obductos membrana comperi, tum e foraminibus variæ magnitudinis eam membranam pertendentibus, guttulas descripti liquoris intra canaliculos expressi. Præter majora hæc, & peculiaria *Foramina*, longe plura, sed pleraque admodum minora, permeant urethram *Foraminula* ubique passim ad latera majorum foraminum, interdum quoque paulo infra hæc, supraque occurrentia: quæ retento intus liquore turgidula non raro specie subrotundorum albescentiumque corpusculorum imponunt. Is liquor admodum similis descripto est. Eum ego turgente spongioso urethræ corpore intra hanc opportune exprimi, opinor, ejusdemque corporis turgentia hunc etiam qui in majorum foraminum est canaliculis, extrudi, quanquam hoc magis tribuo tumentibus eodem tempore penis corporibus; nam illud urethræ quo magis circa superiorem hujus parietem, atque ideo circa majora foramina protenditur, ne vitiet teretem, cui inservit, colis figuram, eo magis attenuatur. Porro urethra uti superius a prostaticis, & Cowperi glandulis, sic inferius ab his omnibus Foraminibus oblitur, ne forte transitori feminis multum subsistat, atque depercat, nisi per lubricum transmittatur; tametsi adversus etiam acrimoniam urinæ, facile in vesica acrioris factæ, id fortasse præsidio est, quod continenter ab iisdem oculis destillat. Nam in fœminarum quoque urethra sæpe subrotunda corpuscula, qualia in urethra virili, sæpe mediocria etiam prope vesicam observavi foramina, circulari, elliptica, triangulari figura, setam sursum versus tantummodo admittentia, simillimumque cum virilis urethræ foraminibus liquorem proferentia. Quorum jam aliquot demonstravit Præcl. Bidlous; sed a glandoso urethræ corpore pariter ac paulo inferiora lacunarum oscula deduxit: qua de re ego amplius quærendum puto. Cæterum cui minora hæc urethræ foramina videre placuerit, is virilem urethram secundum ejus longitudinem apertam, super tabella sic extendat, ut nihil digitis exprimat, nihil abstergat, tum si foramina nimis forte parvula laterent, sole, vel præclara luce admissa, varie ad lumen tabellam inclinet: hac nempe ratione (quæ ad multas quoque res, quas in ulterioribus proponam, dilucide magis perspicendas conducet) tum ea foramina assequatur, tum alba quædam vascula limpidi humoris, lentique plena per virilis urethræ superficiem longe lateque discurrentia: Quæ tametsi non semel vidi, & alicubi in urethra hiare perspexi, quoniam tamen mihi de illorum ortu atque principio nondum constat, non videntur hic pro exploratis esse ponenda.

limum est; sed in homine non nisi in glandis corona posse glandulas ostendi, Solertissimus apud Parisienses Anatomicus observavit. De quibus quoniam alias secundum Cl. Viri descriptionem ad Academiam retulimus, nunc pauca tantum juxta posteriores nostras, easque multiplices observationes proponuntur. Et primum ut reticeam, eas glandulas, sive alba illa, & subrotunda quæ in corona occurrunt, corpuscula raro descriptum ordinem, & dispositionem servare, illud non respondet, in omnibus semper glandibus esse admodum manifesta. Glandes enim vidi in quibus conspici vix poterant, & in quibus nullo modo conspici poterant. Illud multo minus respondet, semper ipsa eodem circiter esse numero; Illudque etiam minus, quod nulla unquam in præputio se ostendant, cum aliquando in eodem statim infra coronam plura conspexerim, nonnunquam fere omnia in summo præputio, sæpe vero aliquot ad latera, aut ad finem freni, aut ipso super freno in eodem pariter præputio observaverim. Hoc potius animadverti, quod etsi ea corpora, magna profecto varietate, duobus modo, modo tribus, modo quatuor, aut quinque seriebus coronam ambiunt, atque alias in coronæ dorso, alias in lateribus creberrima & confertissima existunt, in eo tamen ut plurimum constant, ut cum appropinquare freno incipiunt, primum rara utrinque, & singularia, post nulla omnino ad certum aliquod intervallum conspiciantur. At hæc quidem omnia non magni momenti sunt; illud gravius, non potuisse unquam me ex eis corpusculis aliquid exprimere, aut certe albam crassamque materiam, quæ egrediens in fila formetur, sed neque foraminulum, aut foraminuli vestigium ullum in eo ubi descriptum est loco, visu attingere potuisse. Sed non propterea ad illorum sententiam continuo accedam qui ea corpuscula non glandulas, sed papillas potius esse, censuerunt: neque enim meas cum dexterrimi Anatomici observationibus comparari, nedum his anteponi, postulo: tantum quid ego observaverim, fideliter propono. Cæterum ut ut hæc sunt, certe ego plurimum semper observationi Cl. Viri debebo. Postquam enim certior factus sum, descriptas ab illo esse glandulas quæ scaturigines essent materiæ, quæ non sine certa utilitate intra virile præputium congesta invenitur, tum ex consimili materia conjecturam cœpi, similes glandulas in muliebri genitali esse detegendas. Qua conjectura adductus cum circum tentiginis coronam nequicquam primo perquisivissem, inveni postmodum in alis sive nymphis longe confertissimas, uti jampridem in commentariolo Academia tradito testatus sum, pluribusque postea accuratioribus etiam observationibus confirmavi. Sunt nempe in tota alarum utraque facie creberrimæ glandulæ, modo extremum earum limbum, supremamque partem excipias. Exterius item ab lateribus, necnon supra, infraque ipsas alas solent occurrere. Et parvulæ quidem sunt, sic tamen ut leniter tractis, extensisque alis, sæpe in singularum glandularum medio foraminulum conspici queat, ex eoque proflans concolor glandulis subalbum, & pertenuè filum: quod si a pluribus glandulis admoto digito absterges, proclive erit intelligere, has ex illarum esse genere quas sebaceas vocare placuit nostro quem supra laudavi, Academico. Quare & ego has soleo *Sebaceas Nympharum Glandulas* appellare.

12. Quoniam ad *Sebaceas Glandulas* perventum est, non alienum est, Sodales, de iisdem, quotquot mihi, & ubicunque cognitæ sunt, & quo differant hæc omnes glandulæ inter se, proponere. Malpighius vester de his glandulis meminit quæ in facie, quæque in ipsis labris occurrunt. Quarum de primis, quæ scilicet in genarum, mystacis, menti, nasique potissimum inferioris cute cernuntur, deque pluribus istarum oculis, innatoque ductui frequenter pilo, alias mihi videor ad Academiam retulisse, easdemque in majores, & minores divisisse. Quæ vero in

T. 4. F. 4.  
Lit. K.Vid. Adv.  
IV. Anat.  
12. 13.Sebaceæ  
Nympharum  
Glandulæ.T. 3. Lit.  
e. e.Vid. Adv.  
IV. Anim.  
34.De Aure  
hum. c. 2.

Op. Posth.

De Sebaceis  
Nasæ,  
& Labrorum  
Glandulis.Vid. Adv.  
IV. Anat. 24.An. hum.  
Corp. T.  
51. Fig. 3.De Glandulis  
Coronæ  
Penis nonnulla.

11. In tauri, atque etiam in canis præputio, & glande secretorios folliculos demonstrare facilior Morgagni *Adversaria Anat.* 1.



De Glandulis Subpalpebrarum Libus.

Glandula Palpebrarum Sebacea.

T. 4. F. 1.  
Lit. c. d.  
Theatr.  
Anat. 1. 3.  
T. 20. F. 5.

Anat.  
Animal.  
T. 1. F. 13.  
Anatom.  
quart. re-  
nov. 1. 3.  
T. 10. F. 5.

Vid. Adv.  
VI. An.  
45. 46. 47.

labris positæ sunt, eas nuper observando, haud multum ablimiles comperi his albis subrotundisque corpusculis quæ paulo ante in glandis corona extare, dicebam. Raræ admodum, & paucæ sunt, ex iisque aliquid materiæ sebaceæ nonnunquam expressione elicere visus sum. Idem Cl. Civis vester huic glandularum generi illas etiam quodammodo accensuit quæ in palpebris miliares sunt, quibusque hydatides istarum partium aliquando fieri, existimavit: quæ in re omnino videtur Galenum (\*) in animo habuisse. Nam Galenus easdem utique glandulas vidit, etsi, ut multas alias, non corpora glandulosa, sed adiposa esse, credidit: quæ res cum aliis deinceps Anatomicis ad eundem modum imposuerit, hinc, opinor, factum est, ut complurium glandularum vera agnitio, atque adeo inventio in hoc usque ævum dilata sit. Et hæc sane, quas dico, glandulæ interiori tunica palpebrarum intextæ in bobus, atque vervecibus nil aliud primum nisi adipis subflavi congestiones videntur: quæ paulo attentius inspectæ glandulosi plexus esse inveniuntur ex creberrimis, minutissimisque lenticularibus particulis in varias formas, magnitudinesque coagmentati. Hi potissimum in palpebra inferiore ad internum angulum insignes, & conspicui sunt. Glandulæ præterea ex eodem genere singulares, sed majores, in ovibus, atque item in canibus solent occurrere. Caterum ex hujusmodi glandulis serpsa materia, non sebacea exprimitur: nec mihi ipsas in palpebris humanis demonstrare proclive est, ut ut recentiores Anatomici non desint qui in his descripserint, atque etiam delineaverint. Illas contra glandulas facile in sebacearum genus admiscerim, quas in hominum pariter, atque in brutorum tarsis linearum albarum forma conspiciamus ad extremum tarsorum limbum in foraminula, sive in parva excretoria oscula desinentium. Quæ foramina etsi quosdam veteres Professores ex parte novisse, suspicor, lineas vero ipsas Bauhinum, utraque autem ante quadraginta annos descripsisse Meibomium, intelligo; non pigebit tamen, ex meis circa hæc glandulas observationibus hic pauca aliquot proponere. Epistolam namque Meibomii, quod, uti opinor, rarissima est, reperire nusquam potui: quæ fortasse causa est, quare in palpebrarum historia a plerisque Recentioribus hæc glandulæ prætermittantur, ab aliquo etiam earum oscula pro abducentibus ad nares vasculis proponantur: & præterea ista Meibomii Figura quæ cum Blasio quidem, & Bartholino circumfertur, in pluribus rebus tam a vero aliena est, quam quod alienissimum. Igitur glandulosæ hæc lineæ, quæ in superiore palpebra ut plurimum inclinata, nonnunquam etiam tortuosæ, & quo magis ejusdem palpebræ medio appropinquant, eo longiores sunt, in universum in superiore longiores, in palpebra autem inferiore esse solent latiores. Certum numerum minime, in eodem etiam homine, observant; attamen in palpebra inferiore supra triginta, aut infra viginti, in superiore autem infra triginta, aut supra quadraginta raro numerantur. Nil aliud vero sunt nisi aggeries minutissimarum glandularum, quarum exiles canaliculos in majorem ductum confluentes, qui lineæ cujusque medium tenet, sæpe in bobus, nonnunquam & in ipso homine videre visus sum: is ductus in foraminulum terminatur. Harum glandularum in ipsis palpebrarum angulis nullæ sunt præterquam quæ carunculæ lacrymalis dictæ superficiem insternunt. Hæc namque, uti ego alias indicavi, albicantibus quibusdam tuberculis inæqualis est in plures lobulos divisus, atque osculum excretorium in medio habentibus,

unde sebaceam materiam, non minus quam istam linearum, aliquando in fila formatam pluries memini expressisse. Ab iisdem tuberculorum osculis nonnulli prominent pili, qui, ut exigui tenuissimique sint, in nullis tamen quæ quidem ego secuerim, brutis a Natura prætermittuntur. Porro eas omnes palpebrarum glandulas fontes esse, existimo, illius materiæ quæ in ophthalmiis, & generatim in illo oculorum affectu qui Græcis *Αῦμα* appellatur, copiosior, & viscidior reddita, cilia præsertim in somno scædat, atque conglutinat, quæque absente etiam ophthalmia, ad oculorum majores angulos noctu præcipue colligitur, circaque ipsos exsiccat. Et de Palpebrarum glandulis hæcenus. Jampridem vero in mammarum virilis, muliebrisque sexus arcolis tubercula quædam animadverti totas nonnunquam areolas confertissimarum verrucarum modo occupantia, alias ad basim papillæ potissimum prominentia, sæpius vero hic illic per areolas disseminata. Haud raro duo, vel tria in unum junguntur: habentque singula excretoria oscula attente inspectantibus manifesta. Et licet ea tubercula aut perexigua, aut etiam nulla interdum mihi se ostenderint, ut in senibus præsertim tabidis, & macie confectis; id tamen raro admodum contingit. Hæc postea vidi tubercula in Bidloii Tabulis delineata, naturalibus quidem valde majora, ut quæ ope microscopii descripta sunt, neque ita præterea, ut auferri, mutarive aliquid non possit: quæ in re diligentiam magis desideres trium, vel quatuor Anatomicorum qui eandem in suos libros Figuram, sed proportionis nulla habita ratione, transfulerunt. Tradit autem Bidloius, aliquando ex iis tuberculis humorem limpidum emanare. Ego vero non hunc modo, sed haud raro ceu serosum lac, interdum quoque ceu veri, albißimique lactis guttas de tuberculis iisdem expressi ex cadaveribus etiam (quod magis admirere) virilibus. Addere etiam possum, me in duabus, vel tribus mulieribus lactiferos ductus vidisse, quales ad papillam pergebant, & hæc versus areolarum tubercula contententes; & præterea cum nutrix quædam, hortante me, sibi areolam admotis digitis vix pressisset, continuo albas velut lactei feri guttas de his tuberculis erupisse, tum absterfa areola, rursusque pressa, easdem rursus erupisse. Quibus observationibus factum est, ut eam interdum mihi suspicionem injecerim: juvenne tubercula hæc, suppleantve officium papillæ tunc præsertim cum introrsus hac, non infrequenti nempe vitio, subidente & quasi retracta, nihil quod infans labris exceptet, nihil quod sugat, præter areolam relinquitur. Nil tamen pro certo de re hac affirmare nunc ausim, ut qui neque ex una, aut altera sectione asseverare quidquam soleam, & vicissim sciam, nutrices duas, cum, me suadente, ea tubercula compresserint, nil tale exprimere potuisse. Ea potius tubercula pro sebaceis glandulis interim habenda existimarem; propterea quod sebaceam materiam ex eorum osculis prostantem frequentissime viderim, neque minus frequenter expresse- rim. Super has quas hucusque exposui, glandulas, alias de eodem genere per observationem extare didici, non modo in auriculis, in quibus a Cl. Sodale nostro Valsava descriptæ sunt, sed intra ipsas statim nares, in, cervice, in clunibus, lateque in mammis circum areolas, ad genua, ad scapulas, circa umbilicum, in scroto, in penis integumentis, in perinæo, circumque ipsum anum; ubi a Cl. etiam Bidloo observatæ esse videntur, qui tubercula glandulosa vocavit; in pube item, & mon-

Vid. Adv.  
VI. An. 79.

Glandula  
Areolarum  
Sebacea.

T. 4. F. 2.

Vid. Adv.  
V. An. 6.  
7. 8. 9. 10.

An. hum.  
corpor.  
T. 19. F. 3.

Cæteræ  
Glandulæ  
Sebaceæ.

De Aure  
hum. c. 11.

An. hum.  
corpor. in  
Expl. F. 5.  
T. 47.

(\*) De usu part. 1. 10. c. 7. ubi postquam docuit, palpebras a perioestio descendente, & rursus remeante bis succingi, hæc adjecit. *Spatium vero inter duas portiones perioestii corporis medium viscosa, atque unctuosas occupant cum membranis quibusdam a musculis extensis, quo loco etiam quas vocant edaridas gigni contingit, unctuositas his corporibus (quæ molliendarum sua pinguedine palpebrarum gratia a natura fuerunt comparata) supra modum naturalem aliquando auctis.*



monticulo Veneris, inprimis vero ( ut alias denique reticeam partes ) in muliebris pudendi labiis. In his namque omnibus locis & certa quædam observavi tubercula, & sebaceam fere ex omnibus expressi materiam. Quoniam tamen cunctis memoratarum partium tuberculis sive mediocres, sive perexigui, & visum ferme eludentes pili innascuntur; posset aliquis ista omnia turbercula quæ ego glandulas sebaceas voco, illaque etiam quæ in caruncula lacrymali descripsi, nil nisi pilorum conceptacula, & bulbos vocare: cum quo sane ( tametsi aliquot non desunt, quæ reponantur ) haud magnopere contendam. Unum tantummodo admonebo: e pinnarum nasi glandulis pilos, ut antea dictum est, prodire, & facile quidem non sine certa ob excernendæ materiæ rationem utilitate; non inde tamen effici quo minus illæ pro sebaceis glandulis habeantur. Ut ut est; non idem iudicium ferre oportet de his glandulis quæ in corona penis, quæ in nymphis, quæ in tarsis, quæque in labris descriptæ sunt. Ex his enim pronasci pilos nunquam vidi, ut neque ex iis quæ per areolas disseminantur. Nam quod Bidlous, quique ejus figuram descripserunt, hisce ultimis pilos appingunt, id nempe cum meis frequentissimis observationibus non consentit. Cæterum unusquisque per se poterit de glandularum istarum usus existimare, si nympharum, areolæ, glandis, labrorum, oculi, aliorumque quibus appositæ sunt, locorum naturam, utilitateve consideraverit.

13. Nunc ut eo unde digressus sum, redeam, duo adhuc, vel tria quæ in locis muliebribus observata habeo, protinus exponam. Atque illud primum minoris fortasse momenti videatur, vaginæ rugas contra atque ab Anatomicis traditum est, minime circulares esse, aut in orbem commeantes, sed utrinque ab lateribus vaginæ, nonnunquam etiam inter utrumque latus posterius certum quoddam spatium solere intermittere: quo loci quiddam quasi tendineum, firmumque interjectum est. Sunt porro eæ rugæ creberrimis prominentiis crenatæ aliis majoribus, aliis perexiguis, plerisque autem pyramidalibus; papillas diceret, quibus magis mulier venerem sentiat, præsertim quoniam interior vagina, ejusque adeo rugæ fere ex nerveo corpore, quodque in cute papillare vocaremus, contextæ sunt; nec vero eæ prominentiæ solent amplius in his mulieribus reperiri quibus crebra venus, creberve partus, diuturna ætas, longum profluvium, aliudve consimile vitium ejus partis sensum hebetaverit. Quod si aliquis etiam velit, & has prominentias, & mox indicandas cervicis valvulas in eum potissimum finem constructas, ut sit unde possint in partu muliebria loca dilatari, huic ego homini non sum magnopere adversaturus. Illud denique hic loci prætereundum non existimo: corpus istud glandosum quo muliebris urethra ambitur, quantum longum, latumque est, tantò spatium intra vaginam protuberare. Cujus hæc protuberantiæ utilitas est, ut eo tempore quo fibris carneis ab ano productis idem corpus deorsum trahitur, & viri genitale arctius comprimatur, & vicissim arctius ab hoc compressum, liquorem quo scatet, large, & opportune profundat.

14. Uteri cervicem rugosam atque asperam esse, apud Anatomicos plerosque omnes reperitur. Illud non videor legisse, has rugas, hancque asperitatem fieri a *Valvulis*, non sursum, sed deorsum versus spectantibus. Severinum quidem Pinnæum sic observasse, has rugas radices inferne sitas habere, aciem autem sursum tendentem, atque adeo ingressum facile, regressum difficile concedere, de Thoma Bartholino didiceram. Sed ex virgineis, aliisque potissimum integrioribus uteris, propria inspectione sic didici. Præter quosdam fibrarum fasciculos intra uteri cervicem secundum ejus longitudinem, aliquando in medio, alias a lateribus extantes, jamque Anatomicis satis notos, carneæ nonnunquam, & crassæ fibræ,

sæpius vero plures firmæ valvulæ ex duplicata cervicis interiore membrana productæ, in transversum, vel oblique inter illos fibrarum fasciculos protenduntur ea ratione uti loco superiori, unde nascuntur, limbo altero firme inhæreant, sed alterum qui solutus est, deorsum conversum habeant. Ob eamque causam efficitur, ut admoto ipsis appressoque specillo deorsum quidem minimo negotio aditum permittant, sursum vero aditum omnino ascendere prohibeant, contra atque a Severino traditum est. Quem structuræ modum atque rationem negligendam non existimo hoc magis, quod in pluribus præter mulierem animalibus eandem fere ab Natura servari, constat. In terrestri namque echino succingi uteri orificium annulo eadem ratione constructo, in Miscellaneis Inclytæ Academiæ Leopoldinæ conscriptum est. In ove autem, & vacca uteri cervicem haud absimili structura impeditam esse, cum alii antea indicaverunt, tum ego, quod haud inelegans, nec satis tamen cognita sit, quomodo saltem in vacca habeat, demonstrabo. Uteri cervix, sive is tubus qui a cornuum concursu ad vaginam usque protenditur, in crebras & confertas plicas recta secundum ejus longitudinem ductas assurgit. Hæ plicæ loco omnes eodem magis elevantur sic ut universæ annuli imaginem repræsentent: idque cum semel aliquando, bis nonnunquam, aliasque ter faciant, propterea uno alias annulo, alias pluribus impedita cervix reperitur. Solent tamen inferiores plicæ aut modice, aut nihil assurgere: hoc unum annulorum formæ perfectæ deest. Et quoniam annulo qui cornibus propior est, minus insequens arctus est, & deinceps cæteri quo exteriores, eo minus contracti sunt, fit ob eam rem, ut ita obicibus & quasi valvulis deorsum conversis, longe specillo proclivius sit uterum egredi, quam subire. Neque parvo impedimento est ipsius etiam osculi uteri constitutio. Cum enim eadem plicæ, in fine haud ineleganter laciniatæ, ad osculum construendum omnes producuntur, tum quæ superioribus proximæ sunt, & deinceps cæteræ quanto magis a superioribus remotæ sunt, tanto magis ex ordine elongantur: hinc fit uti osculum, non ad pudendum e regione convertatur, sed parietem vaginæ supernum spectet. Quæ res sicut excipiendo taurini membri meatui, qui scilicet in glandis apice inferiore aperitur, singulariter juvat, ita ad externas injurias defendendas non mediocriter conducit. Atque hic osculi uterini positus, si quid ego judico, errorem objecit Amicis, Virisque duobus longe præstantissimis Mercuriali meo, veltroque Civi Varolio, dum illam idcirco figuram in procreandis liberis magis naturalem censuisse videntur quæ a brutis præmonstratur, quod ad posteriora in muliere etiam, uterinum osculum conversum esset. Quæ res a muliebri quidem dissectione tam discrepat, quam quod maxime. Illud contra in mulieribus pariter, atque in vaccis ad obstruendum uteri aditum cum illis valvulis concurrat, quod muco quodam, seu lentore uterina cervix redundat: qua de re in ulterioribus amplius dicemus. Cæterum cur Natura sic uteri cervicem præseperit, an arcendi aeris, nocuique adeo frigoris causa, an vero etiam uti feminis crassiorem partem, quam subire uterum, de multorum sententia necesse non est, in hunc jaculari prohiberet, aliorum, vestrumque inprimis, Sodales Clarissimi, iudicium facio. A me quidem & istud, & quidam etiam nervorum plexus super tubarum uteri vincula quæ alis vespertilionum assimilantur, eleganter, ut non semel vidi, proserpentium, atque alia insuper quæ in muliebribus, cæterisque corporis partibus cognita compertaque habeo, quoniam nostra, quæ primo loco pollicitus eram, jam plura videor proposuisse, in aliud tempus rejiciuntur.

Dec. 1.  
Ann. 2.  
Obs. 58.

Pisan.  
Prælect.  
c. 13.  
Anat. 1.  
4. c. 4.



15. **J** Am verò illa ; quæ a gravissimis Anatomicis olim quidem proposita sunt , nunc autem fere obsoleta , omittuntur vulgo , ac delitefcunt , ex parte aliqua enarrabo , ut si minus ipse de meo proferre possum digna quæ hic recitentur , at certe nonnulla ex iis referam Viris qui digna oppido scripserunt quæ in antiquum notitiæ , communisque usus locum restituantur . Galenus igitur in cartilagine cricoide capitula ostendit , in arytænoidæ autem sinus ; per hæc vero utramque cartilaginem mobili admodum committi articulatione , demonstravit . Cujus rei utilitas tanta est , ut ea remota , potissimus laryngis usus amplius non constaret . Neque enim aut plerique istius musculi , quos proprios vocant , utiles essent , aut horum , atque arytænoidum actiones , & utilitates explicari satis possent , nisi ea capitula , ii sinus , ex cartilaginum juncturæ haberentur . Quæ cum ita essent , a Curtio ( *a* ) postea , Vesalio ( *b* ) , Stephano ( *c* ) , Valverde ( *d* ) , Fuchio ( *e* ) , itemque a Columbo ( *f* ) , a Fabricio ( *g* ) , atque a Casparo Bauhino ( *h* ) minime prætermiffa , sed ab omnibus descripta sunt , a multis etiam delineata : ut alios mittam Anatomicos , eos præcipue qui aut inferioris subfelli sunt , aut qui illam saltem juncturam commemorare contenti , neque cætera delinearunt , neque accurate descripserunt , quos inter demiror esse Casserium , ut qui tam diversis , tamque elaboratis Iconibus cæteras hujusmodi partes est persecutus . Sed qui a Caspari Bauhini temporibus in hanc usque diem Anatomici floruerunt , quos mihi quidem videre contigerit , ita de iis rebus multum silent , ut perpauca articulum ipsum nominent , vix unus , isque ante hos totos triginta annos , Antonius Molinettus exponat . ( \* ) Sic igitur habendum est . Cricoides cartilago fert in ipsa superna ora ab laterali postica parte oblongum utrinque capitulum eleganter candidum , & lævigatum . Lævis pariter sinus est in utriusque arytænoidis basi a parte externa , & posteriore . His finibus arytænoides iis quæ dicebam , capitulis insidunt , atque ita articulata circum perichondrio , laryngis tunica , musculisque etiam aliquot continentur . Sicque facilis arytænoidibus mobilitas est , five antrorsum , five retrorsum , five pariter ad utrumvis latus sint agendæ : quibus de moribus copiose inprimis ab Hieronymo Fabricio disputatum est . Neque vero Divini Opificis Providentia his tam crebro , tam diverse motis articulis illud negavit quod cæteris impertivit , ut a glandulis mucilaginosi lubricarentur : Quod cum ego a primo conjectura tantum fretus , existimassetem , dearticulando postmodum diligenter ab externo latere has juncturas , reperi ad ambas utriusque capituli extremitates , totumque insuper latus internum parvulam substantiæ cujusdam laciniam natura mollem , & subrubentem ; quam cum aliquando cum mucilaginosâ glandula , quam de vagina cujusdam tendinis ob hanc ipsam causam extraxeram , non sine microscopii auxilio comparassem , ejusdem generis , & structuræ judicavi . Certe ex ea lacinia satis pro articuli parvitate mucilaginis exprimitur , quæ & intra cavitatem juncturæ agnoscitur ab his præsertim qui in bove antea perquisiverint . Sunt enim in bove non solum juncturæ istæ ( quas præterea in canibus , ovibusque reperi , quasque in consimilibus extare brutis , vix est , cur dubitem ) sed cum glandulæ mucilaginosæ in his in quibus demonstravi , locis conspicuæ satis sunt , tum tanta inesse mucilaginis copia solet , quantam quis in iis esse juncturis , ita facile non putaverit .

16. Sed est aliud in larynge ab recentioribus Anatomicis vulgo omiffum , quod si non æque necessarium , est longe certe memorabilius , longèque dignius quod vestris , Sodales ingeniosissimi , meditationibus subjiciatur . Id quo facilius accipi possit , prius quid sit glottis , ex quibus , & quomodo fiat , paucis est verbis commemorandum . Glottis itaque , five potissimum vocis organum rima oblonga est a particulis effecta pluribus utrinque in laryngis cavitate protuberantibus : quæ cum posterius oblique ascendunt , antèrius horizontales sint , rima quoque a posteriore parte oblique ascendat , a priore sit horizontalis , necesse est . Obliqua autem rimæ pars ab arytænoidæ utraque efficitur , & ab longiore item glandularum arytænoidæarum utroque crure , sicque ea pars glottidis duplex est . Duplex horizontalis quoque est . Utrinque enim fit ex duplici albo ligamento , five ex duplici fibrillarum fasciculo , quibus arytænoides , atque thyroides inter se conjunguntur . Ex his ligamentis quod superius est , a media ferme arytænoidæ exortum , ad interiorem & fere mediam thyroidem producit , ibique infigitur . Inferius prope ab extremo arytænoidis inferiore processu enascitur ; hinc ad thyroidem protensum , in hac statim infra primum ligamentum implantatur . Duo hæc ligamenta ad horizontalem glottidem efficiendam protuberant , eoque magis , quoniam ligamentum inferius , quod quidem extantius est , inferiorem thyroarytænoidæ musculi partem , superius vero crus brevius glandulæ arytænoidææ exterius appositum , adjunctumque habet , uti supra demonstratum est . Nunc illam rem exequar cujus rei causa hæc a me glottidis descriptio suscepta est . Igitur inter hæc duo quæ proposui , ligamenta rima utrinque fere elliptica figura relinquitur , ea longitudine , ut modo pollicis , modo alius digiti apex pro varia laryngum magnitudine intrudi queat . Hæ rimæ orificia sunt Cavitationum ; si quid ego video ; longe notabilium : quarum inferiori parti inferior Paris thyroarytænoidæ pars subtenditur ; a tergo autem ad modicam altitudinem mediis atque etiam superioribus eorundem musculorum fibris insternuntur ; superius vero breviora glandularum arytænoidæarum crura aliqua ex parte posita habent ; nam qua parte epiglottidis basi appropinquant , illic majore modo , modo minore adjecta appendice Cavitates altiores sunt : quod facile immisso stylo observabitis . Eadem qua larynx interior tunica , interiores undique Cavitationum parietes obducti sunt ; quare multis foraminulis ea præsertim parte qua glandularum arytænoidæarum crura imminet , pertunduntur : ex iis foraminulis lubricantis , lentique humoris guttulæ prodeunt . Galenus has Cavitates princeps invenit , & *Ventriculos* appellavit : quod ego nomen tametsi in suis , in quibus hæc eum observasse , volunt , magis congruere , non ignoro , quoniam tamen imposita ab Antiquis vocabula non sine gravi , & singulari causa mutanda censeo , *Laryngis* addita distinctione , retinebo . De iisdem orificiorum nomine meminit Curtius ( *i* ) , sed Carolus Stephanus ( *k* ) etiam descripsit , ut mirum sit , homines hujus populares Pinæum ( *l* ) , atque Laurentium ( *m* ) , illum a Galeno tantum , hunc neque ab ipso Galeno descriptos postea tradidisse . Mirum quoque est , Fabricium ab Aquapendente , auditoremque hujus Casserium editis tanto studio de Larynge operibus , ventriculos , quos copiose e brutis proponunt , in homine non descripsisse , hunc vero neque eorum saltem orificia delineasse . Bauhinus ( *n* ) , & Riolanus ( *o* ) , paucique alii Veteres potius

*Laryngis  
Ventricu-  
li.*

T. 2. F. 1.  
Lit. g. F. 2.  
Lit. f. f.  
g. g. h. h.  
F. 3.  
Lit. a. a.  
F. 4.

num. 2.

De Ufu  
Part. 1. 7.  
c. 13.

Vid. Adv.  
V. An. 43.

( *a* ) In Mundin. Anat. Explic. ubi de anat. epiglot. ( *b* ) De hum. corp. fabr. l. 6. c. 38. ( *c* ) De dissect. part. corp. l. 2. c. 43. ( *d* ) Anat. corp. hum. l. 1. c. 39. ( *e* ) De hist. hum. corp. l. 1. c. 43. ( *f* ) De Re anat. l. 1. ( *g* ) De Laryng. Part. 1. c. 3. & seq. ( *h* ) Theatr. Anat. l. 5. c. 94. ( \* ) Dum hæc prælum jam jamque subitura essent , etiam in Idea Machinæ Humanæ Cl. Viri Joh. Mauricii Hoffmanni nunc primo ad nos importata factam harum rerum mentionem vidi Sect. 17. §. 5. & 6. quod meæ fidei esse duxi hic saltem Lectoribus indicare. ( *i* ) In Mundin. Anat. Explic. ubi de anat. epiglot. ( *k* ) De dissect. part. corp. l. 2. c. 42. &c. ( *l* ) apud Bauhin. in Theatr. Anat. l. 3. c. 94. ( *m* ) Hist. Anat. l. 9. c. 16. &c. ( *n* ) Theatr. Anat. l. 3. c. 94. & Institut. Anat. &c. ( *o* ) Anthropogr. l. 4. c. 11.

De Uf.  
Part. 1. 7.  
c. 11. &  
alib.  
*Arytæ-  
noidum  
cum Cri-  
coide Ar-  
ticulatione.*  
T. 2. F. 6.  
Lit. c. d.  
Vid.  
Adv. V.  
An. 49.

Diff.  
Anat. l. 3.  
c. 11.

De La-  
ryn. P. 3.  
c. 7. &c.



potius indicarunt, quam descripserunt: quod pariter factum est a perpaucis illis Anatomicis qui ab eorum ætate ad hoc tempus de ventriculis meminere. Quæ cum ita sint, cumque in Galeni, itemque in Stephani descriptionibus, quæ facile hominis non sunt, non pauca sane desiderantur; nemo postea admirari debet, si propositi a Galeno, a Bauhino, a Riolo, a Casserio (a), five potius a Stephano ventriculorum usus non arriperint, aut quod nihil de usibus eorundem apud posteriores Anatomicos reperiatur. Quibus de usibus vestrum, Sodales perspicacissimi, iudicium, & sententiam rogo, cum nihil ego de ipsis, ut de re perdifficili, mecum adhuc constituerim. Illud tamen aliquando in mentem venit. Faciantne aliquid ventriculi ad tonorum vocis diversitatem. Suspicionem hanc certa quædam observatio quam apud Fabricium meminisse legere, suscitabat. Docet enim Fabricius: quæ ranæ graviores vocem edunt, in his ranis prope aures ex utraque parte foramen esse tenui laxissimaque obductum membrana, quam quidem aer in iis gravibus vociferationibus impulsam extrorsum inflet, atque dilatat, sic ut opportuno ejusmodi cavitatum additamento ea vocum gravitas, vel potius, ut ingeniosissimus Dodartius loquitur, earum saltem gravis resonitus debeatur. Porro laryngis ventriculi sicuti facile coarctari, & comprimi queunt, ita invicem minimo negotio extendi possunt, & prolari; imo revera in acutis tonis arctantur, in gravibus expanduntur. Sunt enim ventriculi, ut ante demonstrabam, statim intra Paris thyroarytænoidei, atque adeo etiam intra thyroididis circumferentiam constituti, sic ut his contractis, aut relaxatis, illi quoque necessario comprimantur, vel ampliantur. Illud autem musculorum Paris sicuti in acutis tonis constringendæ glottidis gratia contrahitur, unaque ob eandem causam thyroides ab staphylopharyngæis, atque a thyropharyngæis, velut in Epistola ad Cl. Valsalvam posui, coarctatur, ita opposita de causa illud idem thyroarytænoideum Paris, eademque cartilago in tonis gravibus remittuntur. Atque hæc, Sodales, meæ suspicionis rationes erant. Cæterum si hanc, seu conjecturam aliam aliquam circa usum ventriculorum recte, ut soletis, & diligenter judicare velitis, ante illud facile requiretis: quibus porro in brutis, & qua ratione, quemque ad modum conformati hi ventriculi reperiuntur: quod quidem ego hoc in loco ex parte aliqua indicare constitui. In cane igitur ab anterioribus arytenoidis duobus processibus (sunt enim in cane arytenoides figura peculiari) duo ligamenta ad thyroidem utrinque producta orificium inter se relinquant singulari forma, quæque admodum ab delineatione Casserii diversa est. Inde incipit ventriculus, qui statim inferiore parte subsidit, & cavus est. Assurgit deinde per ventriculi cavitatem thyroarytænoideus musculus in quoddam septum; quod tamen hanc primam ventriculi partem omnino ab altera non diducit, quæ multo quidem spatiosior est. Quod enim inter id septum, atque thyroidem interjectum spatium est, hoc totum non modo tenet, sed altius quoque ascendit, & præterea retrorsum versus dilatatur. Et in cane quidem ventriculi ad hunc modum utrinque habent. In equo autem, itemque in sue ad quem modum constructi sint, describere occupavit Fabricius, de quo hæc, opinor, sat cognoscetis. In ovibus vero, atque in bobus neque ulla pars glottidis duplex est, neque ulli uspiam ventriculi, aut aliqua saltem ventriculorum simi-

litudo reperitur. Sicque idem Fabricius in eo labitur, quod dicendum statuat, terrestria omnia animalia laryngis ventriculos obtinere. Adeo Anatomicis proclive est in errorem rapi, cum ad universum quodpiam animantium genus extendunt quod in aliquot observarunt speciebus. Quam quidem præfidentem consuetudinem Dissectorum animis insedisse, semper humanæ historiæ studiosis, maximopere dolendum fuit. Inde enim Galenus, qui ut incomparabili studio, & ingenio fuerit, scire tamen omnia non potuit solus, tam multa in humani corporis descriptione peccavit, ut a Vesalio, aliisque industriis Anatomicis ostensum est. Indeque ipsum etiam Vesalium in larynge, in oculis, in locis muliebribus, in fœtus involucribus, inque aliis partibus deceptum miramur. Inde illa defluxit vulgata adeo, & celebris humanæ aortæ divisio in truncos ascendentem, & descendentem, ut paucis demptis Fabricii (b), Casserii (c), Bucerii (d), & Loweri (e) Figuris, Rolfinii (f) autem, & Molinetti (g) descriptionibus, Anatomicum prope viderim neminem qui humanæ loco, bubulam, aut ovillam, vel alterius fere bruti aortam non descripserit, aut delineaverit: quod quidem Anatomæ vitium a Bergero (h), Verheyenio (i), aliisque Cl. Viris tandem aliquando emendatum est. Neque porro his etiam temporibus defuere qui brutorum structuram in hominis descriptionem invexerint, ut qui cochlearem fibrarum œsophagi circumductionem in cane, in bove, inque aliis hujusmodi animantibus observatam, in nostri corporis anatomen intruserunt: quibus tamen a peritis Professoribus, & quidem merito, reprehensis, a quibusdam non oportebat admisceri Stenonem, ut qui in tractatu de Musculis suo (k), ubi istam gulæ structuram proposuit, non eam quidem in nobis, sed in quibusdam esse animantibus, auctor fuit. Atque utinam ii tantum errores in Anatomem irrepsissent eorum vitio qui Naturæ operum similitudini jure a summis Viris celebrata, a paucis tamen bene intellectæ, multo quam par erat, fidentius omni sæculo atque ætate innixi sunt. Sed errata ejusdem generis alia fortasse in ulterioribus attingentur.

17. Nunc ut eo me referam unde meæ Facultatis amor abduxerat, supra pollicitum esse meminisse præter lateralia quæ proposui, epiglottidis ligamenta, de alio etiam quod superesset, dicturum me fore. Ex illa igitur tunica qua linguæ radix instrata est, duplicata, atque alte ad epiglottidis dorsum affurgente *medium* inter duo proposita *Ligamentum* efficitur, quod illis quidem multo insignius, atque altius est, neque in bobus, ovibus, aliisque insuper præter hominem animantibus desideratur. Hujus munus est epiglottidem ciborum pondere, linguave in deglutitione elevata, & retrorsum acta depressam, eadem lingua ad anteriora relabente attollere, elatamque servare. Quod quidem ligamentum post Casserium (l), Bauhinum (m), & Joannem Riolanum (n) Anatomicorum quos ego legerim, proposuit nemo.

18. A Vesalio (o) litteris proditum est, membranis quibusdam vinculis cum ossis pectinis commissura virile genitale connexum esse: idemque ab ejus sectatoribus Fuchsio (p), atque Valverde (q), post etiam ab oculatissimo vestro Varolio (r) in libros anatomicos relatum est, tandemque est a Casserio (s), nisi multum ego fallor, delineatum. Ex eo tempore perpauci omnino rem hanc indicarunt: in his Lyserus (t) fuit, itemque

Ibid. P. 3. c. 2.

Medium Epiglottidis Ligamentum.

Tab. 1. Lit. d.

Vid. Adv. VI. An. 92.

Ligamentum Penis Suspensorium.

T. 4. F. 4. Lit. E. f. f. 5.

Vid. Adv. V. An. 44. 45. 46.

De Laryng. P. 3. c. 11.

Memoires de l'Acad. R. des Sc. 1708.

De Laryng. T. 9. F. 10.

De Laryng. P. 1. c. 2.

(a) De Laryng. l. 3. c. 2. Cæteros vide locis ante citatis. (b) De form. Fœtu Fig. 15. (c) De Larynge Tab. 15. F. 1. (d) Ad Spigel, de hum. corp. fabr. Tab. 1. lib. 9. F. 1. quanquam & hanc Figuram Bucerius acceptam Casserio referre poterat, cum eadem atque illa quæ modo citata est, esse videatur. (e) De Corde Tab. 1. F. 4. 5. 6. (f) Dissert. Anat. l. 6. c. 17. tamen post paulo ibidem sibi in eo non constare. (g) Diss. Anat. Path. l. 5. c. 5. (h) Vid. Act. Lips. A. 1698. M. Jun. (i) Corp. hum. Anatom. tr. 7. c. 1. & Animadvers. in Blancard. (k) De Musc. Observ. Specim. (l) De Laryng. in Explic. Fig. 5. Tab. 1. (m) Theatr. Anat. l. 3. c. 96. &c. (n) Anthropogr. l. 4. c. 11. (o) De hum. corp. fabrica l. 5. c. 14. (p) De Hist. hum. corp. l. 4. c. 2. (q) Anat. corp. hum. l. 3. c. 13. (r) Anat. l. 4. c. 4. (s) Vid. ad Spigel, de hum. corp. fabr. T. 9. l. 4. (t) Cult. anat. l. 1. c. 9.



que Dionisius ( a ), esseque præterea Cowperum, a quo ligamentum id penis suspensorium dicatur, ex Actis Eruditorum Lipsiensibus ( b ) accipio, quorum Cl. Scriptoribus cum tot alia, tum eorum indicium debemus quæ de Anglorum tanto Anatomico Italis hominibus subolueret. Igitur *Ligamentum Penis Suspensorium* ( placet enim uti Cel. Viri vocabulo, quod ligamenti hujus positum, usumque significet ) primum aliquando ab linea alba abdominis, multo sæpius a medio osse pubis nunc altiore loco, alias paulo inferius ortum, arctèque ei cartilagini qua os illud committitur, ab anteriore parte innexum, firmæ, valentisque membranæ modo, in subjectum penis dorsum protensum est. Huicque proportionem, & usu respondet ligamentum illud mulierum a Graafio ( c ) primo indicatum, quod consimili modo ab iisdem locis in clitoridis corpus productum, & præterea in vicinum labiorum angulum, partefque contiguas observavi. Sed descriptum penis ligamentum simul atque ejusdem attigit dorsum, minime, quod a primo opinatus eram, in illius septum infigitur, verum in firmam explicatur tunicam, penem prope omnem, atque insuper scrotum ipsum sub cute investientem. Ea namque a posteriore parte expansa super hos musculos etiam subit quos passim urethræ dilatatores vocabant, ab anteriore autem id quod penis carnosum panniculum appellant, efficit, seu mavis, eidem continuatur. Atque ita denique in scrotum delapsa, & *Σαπρόν*, & restitutum hisce temporibus scroti septum constituit. Namque ipse, de septo scroti memoria teneo, illud me apud Carolum Stephanum ( d ) descriptum vidisse, his ipsis quæ per illud discurrunt, venulis non omisis, itemque apud antiquiorem paulo Auctorem Nicolaum Maslam ( e ), imo & apud Gallum Anatomicum ( f ) cujus quadraginta ab hinc annis, vix amplius, liber prodit. Quæ ita in transitu indicare volui, cum quosdam legerim, atque interdum in colloquiis etiam audiverim, qui recentioribus Anatomicis ( quos ego tamen plurimi facio, magnaue semper, & multa habituros, confiteor ) illius septi inventionem tribuerent. Cæterum qui Anatomes historia oblectantur, plura opinor, hac de re, & fortasse etiam vetustiora Majorum testimonia comperient in Epistola quam Cl. Joh. Jacobus Ravius ( g ) de Inventoribus Septi Scroti conscripsit, siquando ea cum tot aliis quibus destituimur, libris in has regiones importabitur.

Corpuscula  
la quæ-  
dam, &  
Fibræ Val-  
vularum  
Aortæ, &  
Arteriæ  
Pulmona-  
ris.  
T. 4. F. 3.  
Lit. a. a. a.  
b. b. b.

19. Postremo & quædam restituere placet *Corpuscula* in Aortæ, & Pulmonaris Arteriæ Valvulis a vestro Arantio animadversa. Quæ corpuscula ut parva sint, minus tamen vereor, ut levialicui videantur, quod *observatione digna* a tanto Anatomico sint pronunciata, tum memini, in ea me Academia loqui, cui nihil in hac rerum universitate, nedum in absolutissimo humano corpore, tam exiguum est, tam contemptum, suis ut dignum meditationibus non arbitretur. Arantius igitur in elaborato Observationum Anatomicarum libello ( h ), in quo minimam testiculorum structuram ( quam tamen antiquioribus aliis etiam adscribi, non ignoro ) ab eodem visam comperio ( i ), sicut postea a Cabrollo ( k ) perstrictam, fusius vero a Riolo ( l ) expositam scio, tam-

etsi ab nemine; ut in consimilibus erat captus temporum eorum; probe intellecta, & cum illa, cum qua debebant, parastata connexa est: quæ nempe laus diligentissimo Graafio reservabatur; Itaque Arantius in eo libro ( tandem enim ad propositum me referam tamen ) in medio prope omnium valvularum limbo, quæ orificiis pulmonaris, magnæque arteriæ præficiuntur, appositum esse, tradit, cartilagineum corpusculum, quod grani panici imaginem repræsentet, & præterea totum eundem limbum, quasi ex duplicata membrana constaret, reliquo esse valvularum corpore solidiorem. Tum eorum omnium usum adscribit satis, ut in ejusmodi rebus, ingeniose excogitatum: hunc in illius libro videritis. Istas Præceptoris Arantii observationes, in suis de corporis humani fabrica libris ad verbum fere descripsit Bauhinus. At cæteri, quantum ego memini, Anatomici prætermiserunt, si modo Rolincium demas: quem tamen Arantii mentem, quod illius manium pace dixerim, assecutum esse, non existimo. Arantius namque non ea corpuscula proposuit ut ossa quædam, neque ut superventuræ ossificationis inchoamenta. Quorum ut corporum natura clarius elucescat, ego breviter ostendam, quid super Arantii observationibus adnotaverim. Principio igitur subrotunda ea corpuscula sæpius in aortæ, quam in pulmonaris arteriæ valvulis comperio. In ove quadam nusquam vidi: in canibus vero, quos nuper dissecai, interdum in aliquo pulmonaris arteriæ ostiolo, in omnibus vero aortæ conspexi; alias vix in magnæ arteriæ valvulis videre visus sum. Sed in bobus, sive ineditos adhuc fœtus inspexerim, seu grandes, & adultos boves, prope in omnibus utriusque arteriæ ostioliis semper inveni. Corpusculorum positum, & structuram in his animantibus sic observavi. Earum omnium valvularum medius limbus assurgit in angulum curvilineum; eaque pars valvulæ in se convoluta, nonnunquam corpusculum repræsentat, quod nusquam est. Sed istud cum est, sub eo angulo positum est, figura aliquando rotundum, alias oblongum. Nec vero ex cartilagine, aut ex osse, sed ex fibris carneis factum est. Fibræ enim carneæ transversæ per valvulas ab harum lateribus promittuntur: suntque istarum sæpe aliquot quæ ad eum limbi angulum sursum protensæ descriptum ibi corpusculum faciunt. Neque admodum absimilis in nobis est eorundem corpusculorum, & valvularum structura. Ea namque corpuscula aliquando intus carnea, alias vero quasi tendinea comperiuntur. Valvulæ autem cum tendinea omnes fibra in ipso limbo firmantur, tum inferius fibræ carneis ornantur pluribus, valvulæ quidem pulmonaris arteriæ in transversum ductis, ostiola vero arteriæ magnæ oblique ut plurimum etiam protensis: harum sæpius aliquot hinc, atque hinc evidenter ad corpuscula elongantur. Sunt igitur cordis valvulæ, ut Hippocrates, & post ipsum reliqui Anatomici appellant, *μνέρες*, seu membranæ, non tamen, quod Vesalius inquit, substantia sunt *prorsus membranæ*, cum propriis nempe lacertis carneis & ad firmitudinem, & facile etiam ad motum propellendo cruori utilem instruantur. Sed & ipsa valvula quæ venarum anastomosi in corde fœtus præficitur, semicircularibus

I. 2. c. 13.

Diff.  
Anat. l. 6.  
c. 19.Vid. Adv.  
V. An. 20.  
21. 22. 23.  
24. 25.περί καρ-  
δίας.De hum.  
corp. fab.  
l. 6. c. 13.

( a ) Nouvelle Anatom. Demon. 4. Sect. 1. ( b ) Supplem. II. Sect. 11. ( c ) De mulier. Organ. c. 3.  
( d ) De Diss. part. corp. l. 2. c. 19. Inter utrumque testem diaphragma quoddam est, & veluti septum, ac membranula quædam tenuis extensa, permixtis venulis intertexta: quæ quidem obstat, quo minus se invicem collidant.  
( e ) Lib. introduct. anat. c. 20. Habet bursa panniculum mediastinum, qui panniculus est ex oscei substantia, qui dividit testiculum dexterum a sinistro, & sic bursa habet duos sinus. ( f ) L' Anat. François par M. Gellé l. 7. c. 5. De son milieu ( du dartos ) s'avance une cloison membraneuse qui separe les testicules l'un d'avec l'autre, de peur qu'en s'entretenant ils ne soient froissés. ( g ) ex Act. Lips. A. 1700. M. Maji, & alibi. ( h ) cap. 33.  
( i ) cap. 36. Perfectum semen ab innumeris quasi plantæ cujusdam tenuissimis radicibus per testium carnem varie dispersis, tanquam a succosa tellure attrahitur, quæ quidem radices, quod minime animadversum est, capreolorum vitis in modum convolutæ, & crispæ conspiciuntur, tenuissimaque capillamenta candida, & crispæ referunt, &c. ( k ) Observat. var. obs. 3. Testes fibræ pilorum instar, multoque sero plenos vidimus. ( l ) Anthropogr. l. 2. c. 31. Cum sæpius testiculi putrefacti substantiam digitis distraherem, eam instar retis in fibras multiplices, admodum ductiles, semicubiti longitudine producebam. Iis autem fibræ revulsis lineam fibrosam inseparabilem a testis tunica ( idest ductum, seu corpus Highmorianam postea dictum ) atque circa adhasum epididymidis, & in extremis hujus corpusculi intra testis tunicam observabam; atque poros quinque, vel sex, &c. Adde quod paulo infra habet de epididymide. Quamvis contorta, & instar xylocampi rugis quibusdam complicata sit, tamen si apte, & perite secentur fibrulæ, videbis, istas revolutiones dissolvi, & in longitudinem abire, servata vasis continuitate, & integritate, quod ejaculanti simile prorsus existit.



bus fibris carneis evidenter ornata est, quantum ego, eadem valvula luci objecta, in vaccinis foetibus observavi. Et hæc quidem super his quas retuli, doctissimi Arantii observationibus.

20. **H**Actenus de illis dixi quæ nova, aut obsoleta visa sunt: relinquitur, ut super aliquot rebus de quibus aliter ab aliis traditum est, quid ego observaverim, proponam. Quod antequam facio, haud alienum puto monere: me non tantum mihi sumere, ut sperem magnorum hominum controversias posse componere, & pro arbitro dirimere, quasi nempe plus me, quam illos, de re anatomica sentire, existimarem. Ego vero quid mihi observatum sit, quidve mihi videatur, pro studio veri, & pro officio aperte, ac libere propono; iudicium aliorum facio. Celebris, sicubi alibi, & pervulgata apud nos ea controversia est, quæ inter Meryum, & Sauvryum, aliosque ex Inclyta Academia Scientiarum ingeniosissimos homines est agitata: Fluatne sanguis per eam anastomosim quam esse in foetuum cordibus, paulo ante commemorabam, de cava in pulmonarem venam, quæ opinio in vulgus edita est, an vero potius de pulmonari feratur in cavam. Qua de re cum in foetibus vaccinis, ut qui commodius ad manum erant, aliquando perquirerem, sic observabam. Inprimis, valvula eo in loco a parte venæ pulmonaris ita ampla, atque insignis extabat, ut non videam, quam ergo aliam sint valvulæ nomine appellaturi, qui hanc non appellent. Dum autem specillum huic admovebam, a parte quidem venæ cavæ, nullo negotio, & quasi ultro in pulmonarem id labebatur. Contra si ab hac vena in illam tentarem traducere, tum valvula moram injiciebat, tum ea prior libere, & facile elabendi facultas nondabatur. Illud accedebat, quod inter ejus etiam, quam dico, moræ, & impedimenti causas erat, chordulæ aliquot ad venæ pulmonaris anticam partem limbum valvulæ alligantes: quas etiam Præstantissimo Ridleyo cognitatas video, quasque ille in humanis, ego in foetibus caninis frustra postea perquisivimus. In his una erat præ cæteris longe crassior: similesque admodum omnes erant earum fibrarum quibus mitralium, & tricuspidum valvularum limbi columnis cordis innectuntur. Quibus fibris, si recte ego memini, nihil prohibet quin munere etiam officioque respondeant, ut nimirum in auricularum diastole contendantur, attractaque valvula cruorem admittant, in systole autem invicem remissæ, valvulaque laxata, sibi viam claudere cruorem finant, ne qua de auricula venerit, in hanc confestim relabatur. Ut ut est, certe has fibras a parte venæ pulmonaris non oportuit positas, si valvula non in hanc venam, sed in cavam concedere aditum debuisset. Quod tamen pertinet ad aortæ, arteriæque pulmonaris diametrum; qua de re acriter in Regia Academia disputatum est; mihi sane in aliquot vaccinis foetibus, itemque in caninis quatuor pulmonaris arteria evidenter aorta major comperta est. Attamen in aliquo vaccino foetu, atque in his quatuor caninis paulo erat major parietum arteriæ magnæ, quam pulmonaris crassitudo. Cæterum illam de qua ante diximus, anastomosim foramen ne *orale*, ut vulgo appellant, an potius cum Viris Diligentissimis Fabricio, atque Ridleyo *orbiculare*, & *rotundum* vocare oporteat, quemque ad modum in adulto homine illud idem apertum compererim, alias mihi videor in Academia proposuisse.

21. In *Venæ Umbilicalis* descriptione, & delineatione invenio alios ab aliis Anatomicis dissen-

tire. Nam legere est qui hanc venam prope jecur bifidam tradant, alio ramo in cavam, alio in venam portæ dimisso, item qui eandem venam umbilicalem intra capsulam venæ portæ exceptam hujus omnes ramificationes imitari, unaque diduci per hepar totum, contendant. Quos quidem, arbitror, confutare non est operæ. Sunt igitur pauci, & in his Glissonius (a), Ruyschius (b), Verheyenius (c) singulari homines diligentia, qui cum venam umbilicalem ingredientem in jecur, aut in venæ portæ sinum delineant, a sinistro ejusdem visceris, aut sinus parte intrantem proponunt. Contra cæteri subeuntem a dextris pingunt, five proprios exhibent, five alienos, Casserii (d) inprimis, & Veslingii (e) Iconismos recidunt. Est vero hæc res tanto dignior quæ disquiratur: Utrorum pictura verior sit, quanto majores hi Viri sunt qui utrinque dissentiant, quantoque crebrior ejus delineationis est usus. Nam præter foetuum complures imagines, five apertus adultorum venter, five hepar est, seu vena portæ delineanda, scilicet appareat ligamentum umbilicale, quaque ex parte se se innexum eat jecinori, necesse est. Ego vero ligamentum hoc nunquam non insertum comperi in jecoris partem sinisteriorem, neque ex his omnibus quos secui, foetibus omnino ullus inventus est cujus vena umbilicalis in venæ portæ sinum a sinistra parte non influeret. Quo sit porro, ut admodum mirer, ita explicatum esse ab Anatomico, cæteroquin hujusmodi in rebus exercitato, quare sanguis a vena umbilicali in eum sinum delatus facile is canaliculum venosum subire possit, cum delatus a trunco venæ portæ non possit, scilicet quod valvula ei præfixa canaliculo nihil obstat sanguini ex umbilicali vena erumpenti, propterea quod hic sanguis a dextris ingressus ad lavam versus progrediatur. Acceditque insuper, me sæpe in vaccarum foetibus hanc, quam iste Auctor appellat valvulam vidisse, sed qua ratione appellari sic possit, quemve ad modum adscriptos usus præstare queat, non vidisse. Dum hæc, & cætera de hoc genere in vaccinis foetibus indagarem, memini me pluries Urachum inspicientem animadvertisse, alterum hujus tubi extremum quod vesicam propius est, lacertis intus prominentibus multis ornari, cum reliqua ex parte ita allantoidis texturam simplicem imitetur, uti ejus tunicæ propago esse videatur. Ut enim illinc vesica in ipsum constringitur, sic in eum sensim allantoides istinc contrahitur: quemadmodum ab diligentissimo homine Fabricio præclaris Iconibus, & nominatim Figura XXIX. in suis de formato Foetu lucubrationibus demonstratum est. Quam quidem Figuram nollem ego a præcellente alio Anatomico in cognomine tractatu primo loco exhibitam esse, non modo quia accepta Auctori suo non refertur; id namque nimis hoc sæculo frequens est; sed quia cum recte a Fabricio instituta sit ad ovinum foetum cum ejus involucris exprimendum, veluti caruncularum forma significatur, iisdem tamen nihil mutatis carunculis, ad bubulum foetum representandum ab hoc alio Anatomico tracta est. Sed de foetibus in præsentia quidem satis.

22. Varia admodum, & inter se discrepantia de *Oculorum Glandulis*, & inprimis de *Caruncula lacrymali* dicta Anatomici prodiderunt. Sunt enim perpauci, & in his Fallopius (f), Dionisius (g), atque etiam, ut perhibent (h) Verneyus Anatomicus Præstantissimus, qui negant, eam carunculam in humanis quidem oculis pro glandula posse haberi; hi præterea in angulo interno oculi ejus substantiæ quæ glandulosa appellari possit, agnoscunt nihil. Contra autem Recentiores plerique omnes celeberrimum hujus memoriæ Professorum

De Oculorum Glandulis, de Carunculis, & Lacrymalibus Punctis, deque Ductibus continuatis. T. 4. F. 1. Lit. e. e. f. g. Vid. Adv. IV. An. 79. 80.

De Foramine Foetus, ut vocant, Ovali, ejusque Valvula, &c. Hist. de l'Acad. R. des Scien. An. 1699. Traité du Foet. par M. Sauvry. &c. Vid. Adv. V. An. 16. 17.

Vid. Aët. Lipf. A. 1705. M. Mart.

De form. Foet. P. 1. c. 10. P. 2. c. 8. Vid. Aët. Lipf. loc. c.

Nonnulla de Venæ Umbilicalis, &c.

(a) Anatom. Hepat. in Tabulis excarnato hepatis adscriptis. (b) in Figuris adjectis Dilucidationi Valvularum in Lymphaticis. (c) Anat. corp. hum. Tab. 8. F. 4. & alibi. (d) Ad Spigel. de hum. corp. fabr. Tab. 8. lib. 8. F. 1. &c. (e) Syntagm. Anat. Tab. c. 4. F. 6. (f) Observat. Anat. (g) Nouvelle Anatom. Dem. 8. (h) Anatomie Raisonnée P. 2. c. 7. &c.



storem secuti, similes in homine atque in brutis ad angulum utrumque oculorum glandulas statuant, tum ejus Viri conjecturam pro re comperita arripientes, eosdem in nobis quos in brutis, earum glandularum ductus proponunt. Atque eorum aliquis est, qui vel cartilaginem brutorum propriam ad humanam anguli interioris glandulam sine ulla dubitatione traducat. Parsetiam plura in nobis ab ea glandula deducunt vasa, quam quæ in brutis describuntur, inque illis vel ipsa puncta lacrymalia palpebrarum limbis insculpta connumerant. Extantque præterea aliæ super hisce rebus sententiæ quæ ut hic commemorentur, satis causæ esse, non puto. Hæc cum ita varia, & discordia sint, non pigebit hic ea perstringere, quæ observanti mihi in istis partibus se se obtulere.

Vid. Adv.  
VI. An.  
33. 34. 35.

num. 12.

Et primum est cur aliquid in dubium revocem circa glandulam externam, quam vocare solent innominatam. In bobus quidem tum ipsa recte passim describitur, tum eidem adscripti ductus minimo negotio obvii fiunt, hiantibus eorum oculis in quibusdam tuberculis quæ aut glandulæ singulares sunt, aut plexus etiam earum glandularum quas supra, esse sub palpebris, ostensum est. In nostro autem genere, in quo ea glandula minor est, nervei quidem ramuli per eandem subterlabuntur, inque plures furculos tenues, rectosque diducuntur palpebram versus contendentes; hinc est, ut sicut exiles quosdam ductus de illa glandula prodeuntes primo aspectu, & perquisitione mentiantur. Id fortasse alicui incantiori imposuerit. Scilicet haud uti in brutis, ita in homine proclive est illius glandulæ ductus attingere; multumque ego fallor, nisi bona pars eorum a quibus ponuntur, id conjecturæ innixi fecerunt. At tamen, etsi est vero plurimum simile, nos iis ductibus non destitui, de iis adhuc plus quam censent aliqui, in humanis oculis quærendum puto. In angulo autem interno oculi quæ sit glandula, quæque cartilago, semitotundo nimirum isto, & fere membranaceo limbo inquirentibus ultro conspicua, in vitulis quidem accurate, & diligenter ab Stenone traditum est. Porro in cane, in ove, & in similibus animantibus eadem ferme comperiuntur. Estque præterea & in ipso vitulo, & in his omnibus caruncula, quam vocant lacrymalem: eademque etiam in nobis in ipso angulo interiore oculi extremos inter palpebrarum

Obs.  
Anat. de  
Gland.  
Ocul.

Vid. Adv.  
VI. An.  
45.

num. 12.

Vid. Adv.  
VI. An.  
44.

limbos se ostendit. Ea nihil aliud nisi tuberculum quoddam oblongum est ex substantia quasi densæ, compactæque carnis; facileque ex duplicata, contractaque palpebrarum interiore membrana factum est. Atque iis parvis glandulis in his cunctis in quibus id vidi, animantibus insertitur, unde tenuissimi prominent pili, ita uti supra demonstratum est. Sed neque ea quæ in brutis, glandula, neque ea cartilago in hominibus reperitur. Loco tamen cartilaginei istius limbi cujus paulo ante mentionem faciebam, locata est in nobis caruncula inter, & oculum rubella quædam, & semilunaris membrana, quæ ex duplicata interiore palpebrarum tunica constructa est. Hæc in obvio quocunque homine una cum caruncula longe conspicua est, diductis præsertim manu palpebris, oculoque ad angulum externum abducto. Et tunc facile etiam est ibidem lacrymalia puncta, seu foraminula duo perspicere in palpebrarum limbo interiore, ubi prominentia exigua est, alterum quidem in palpebra inferiore, alterum autem in superiore, sic ut inter bina

foramina caruncula fere interposita sit. Quæ quidem ex inspectione carunculæ usus cognosci potest, si non verus, certe ad veri similitudinem propius accedens, quam hi qui eidem passim adscribi solent. Nam quod humorem lacrymalem minime separet, id nempe ex ejus substantiæ descriptione paulo est ante subindicatum. Quod autem operimenti usum præstet ei meatui qui a proximo osse incipiens ad nares introrsum pertinet; uti est a plurimis existimatum; id vero tam a veritate alienum est, quam quod alienissimum. Hæc mea igitur opinio est. Humor qui oculum, & palpebras alluit, sive is ab innominata, & subpalpebralis quoque glandulis, ut in brutis, sive aliunde etiam in nobis destillat, assidua palpebræ inferioris contractione, crebroque superioris motu, angulum internum versus continenter adigitur eadem ratione qua extrinsecus in oculos illa ipsa ad eum angulum propelluntur. Itaque ne illic aggestus turpiter per eum angulum redundet in genam, sed lacrymalibus exceptus punctis, in nares, fortasse ad muci dissolutionem, corrivetur, propterea in ipso extremi anguli hiatus, interque ea puncta carunculam lacrymalem positam judico. Ea namque effluxurus humor non modo continetur, verum proximis utrinque punctis quasi sistitur, atque ingeritur, dum hæc palpebrarum frequenti motu, carunculam versus apprimuntur. Quam carunculam, aut saltem eam oculi partem quæ carunculæ continens est, ut tanto facilius attingerent, in ea quam dixi, prominentia puncta lacrymalia insculpta sunt. Neque forsitan diversa admodum Galeno mens erat, cum inter disputandum de carnei illius corporis quod oculi majori angulo incubat, hoc est de carunculæ utilitatibus, hæc conscribat. *Ne igitur per angulos excrementum effluat, neve assidue lacrymemus; prædictis meatibus corpora hæc carnosæ fuerunt apposita, quæ prohiberent quidem, ne oculorum excrementa per angulos vacuarentur, ad proprios autem meatus impellerent: & cætera quæ libro de usu partium decimo, undecimo autem capite licet reperire. Quo ex capite alia præterea quæ huc spectant, duo cognoscuntur, unum quod ductus harum glandularum quæ circa oculos sunt, quos nuper in brutis memorabam, Galeni solertiam non fugerunt (a); alterum quod neque puncta lacrymalia eundem latuerunt, neque illud quod ab his punctis aditus ad nares usque perpetuus aperiatur (b). Post vero sunt ea puncta a Berengario (c) commemorata; a Falloppio (d) autem non ea tantum, verum & isti in quos producuntur, meatus, sinusque præterea per quem meatus ad narium cavitatem pertingunt, luculenter proposita sunt. Quæ hic loci ante istorum ductuum descriptionem minime admonerem, nisi animadvertissem, a multo recentioribus Anatomicis aut unum modo, aut utrumque etiam eorum punctorum in elaboratis aliquoquin, & magnis humani corporis historiis esse prætermisum, tum a Professore nobilissimo, atque ab his qui illum sequuntur, perpetuum ab illis punctis ad nares aditum fuisse alicubi inter noviter inventa connumeratum. Igitur hic aditus initium capit ab lacrymalibus punctis. Hæc autem non in caruncula lacrymali, ut ab aliquo positum est, sed in eo in quo proposui, loco sunt constituta, haud tamen in ipsis tarsis, quod plerique ajunt, sed ad tarsorum internos limites insculpta sunt. Non enim ulla omnino sunt lacrymalia*

Vid. Adv.  
VI. An.  
56. 57.

(a) Ad motum etiam facilitatem due quoque glandulæ in utroque angulo extiterunt, altera partibus infernis, altera supernis, quæ meatibus non obscuris humidum in oculos effundunt: similiter ac glandulæ, quæ linguae radici adjunctæ salivam in os derivant. (b) Quæ in palpebris sunt, tenuia admodum foramina, quæ paulo sunt extra majorem angulum: ad nasum enim usque pertinent, &c. (c) Anatom. anatom. ventr. suprem. In substantia palpebrarum in quolibet angulo, seu canto versus nasum sunt duo foramina parva sensibus manifesta, unum in superiore palpebra, aliud in inferiore. (d) Duo foramina parva in angulo interno posita (quorum unum est in palpebra superiori, alterum in inferiore) in viventibus adhuc hominibus, si quis inspicere voluerit, apparentia. Quæ foramina habent meatus, qui sub caruncula exiunt, vel exiunt, id est, dicta ununtur in quendam communem sinum in narium cavitatem desinentem per canalem proprium in osse squamoso quod internum angulum occupat, insculptum. Observation. Anatom. p. mihi 212. In quibus & glandulas palatinas p. 211. & tunicarum ventriculi, atque intestinorum structuram p. 159. & sequentibus. & fortasse etiam renum tubulos p. 179. aliaque præterea esse proposita, a me alibi indicatum est.



malia puncta in limitibus eorundem externis, quæque in his a Fabricio, atque ab alio Anatomico statuuntur, ea videlicet nihil esse aliud possunt, nisi duo orificia glandularum sebacearum quas supra in palpebris describebam. Etsi vero idem quem modo agebam, Fabricius punctorum lacrymalium angustiam longe infra verum extenuabat, cum in cadaveribus omnino illa sensum effugere, docebat; re tamen vera ea admodum angusta sunt foraminula. Quamobrem fortasse proxima caruncula lacrymalis tenuibus, uti dictum est, instruitur pilis; ut nimirum quidquid viscerum ad angulum internum compellitur, aut abstergendo, aut certe implicitum retinendo, prohibeat, ne exigua adeo foramina obstruantur. His autem latiores multo sunt duo meatus, in quos ea foramina producantur. Isti vero postquam carunculam lacrymalem inter se mediam fere excipientes, ad canalem qui in subjecto osse insculpitur, accessere, albo quasi nervæ membranæ amisso colore, in ampliorem confluunt tubum, crebris sanguineis vasculis, & fortasse etiam glandulosa substantia rubescentem. Qui priusquam narium tunica continetur, ipso suo extremo fine & orificio contrahi solet: sicque hæc quæ ad nasum a punctis lacrymalibus via est, in utroque extremo coarctatur: quod pariter in bobus, aliisque brutis servatum invenio. Nullaque præterea valvula est, qua sursum, deorsumve permeans quodpiam fluidum impediatur. Quamobrem videlicet possunt & medicamenta oculis adhibita non multo post inunctionem emungi, aut etiam expui, quod a Galeno observatum est, & vicissim exceptus ore aliquis fumus, obstructis postmodum naribus, ipsoque ore, ad palpebras usque compelli, indeque, ut in quibusdam videmus tabacisugis, emitti: quarum rerum meminisse haud omnino inutile fortasse erit his, qui earum viarum affectionibus medicinam facere studuerint. Desinit porro is tubus in nasi cavitate, non exiguo sane ab extremis naribus intervallo. Quod si aliqui ad narium extremitatem pertingere, tradiderunt, ii certe brutorum, non hominum dissectionem in humana historia spectarunt: sed hoc nihil est, cum hos ipsos in eadem historia describere ad verbum ex Stenone videamus illum quoque alterum narium ductum quem iste; ut canibus modo, atque ovibus peculiarem, proposuit. Quod vero addidit peritissimus Vir Needhamius de quodam foramine e medio eo tubo palatum versus tendente, neque mihi esse adhuc licuit tam solerti, ut illud perspicerem, neque ulli ex tot præstantissimis hujus ætatis Anatomicis licuisse, compertum habeo.

23. Nimius sim profecto, si in quacunque parte se se offert aliquod Anatomicorum dissidium, in quo mihi quidpiam sit observatum, id omne exequi nunc contendam. Præstabit igitur, ut cunctis fere aliis, quamlibet gravibus, & nobilibus controversiis in aliud tempus omittis, de iis potissimum verba faciam, quæ attineant ad has partes quibus de partibus sæpius antea locutus sum. Ita enim minus ad absolutam earundem historiam deerit: eaque de causa nuper quoque dum res obsoletas referrem, non per omne corpus; ut potuissis animadvertere; pervagabar, sed in genitalibus, atque in larynge potissimum subsistebam.

Laryngis igitur Cartilagine (ab his enim initium ducam) ab Realdo Columbo pleræque in numero ossium habitæ sunt, quod in consistente præsertim ætate non modo osseas, sed medullosa refertas substantia sæpenumero comperisset. Ejus judicium Viri minime a Casserio probatum est. Observatio vero (de qua nunc agere constitui) ea ratione a Diemerbroeckio accepta est, uti addiderit, rarius id contingere ut eæ cartilagine

osseæ fiant; quod autem medullosam in senibus substantiam obtineant, id vero negat posse facile demonstrari. Illud non me fugit, quæ ratione uterque possint discrepantes adeo observationes habuisse. Sed mihi certe nihil frequentius in laryngis dissectionibus oblatum est, quam senum, aut etiam ad senectutem inclinantium hominum thyroideam, & cricoideam aut osseas, aut ossescentes videre, multasque intus cellulas in thyroide quidem ad latera potissimum, in cricoide vero ad partem posteriorem. In his autem cellulis medullosam substantiam ea persæpe copia inveni, ut levi cartilaginum earum, seu potius ossium, compressione per foramina quibus illæ, & cricoides imprimis pertunduntur, prodiret. Quare aliquando dubitasset, annon ejus liquoris pars circumjectorum musculorum pressione ad obliniendam laryngem eliceretur, nisi præter arytenoidæas, & epiglottidis glandulas, parvas etiam alias cognovissem, quibus interior cricoidis tunica in eundem finem instructa est; essetque præterea suspicatus, annon idem liquor ad arytenoidum articulos scanderet, ubi vulgato Naturæ instituto mucilagini admisceretur, præsertim cum foraminulum quoddam singulare ad posteriorem capitulum cricoidis extremitatem interdum vidissem; sed alia quæpiam quæ hic explicare necesse non est, ab hac me dubitatione ferme retraxerunt. Cæterum in cricoide adhuc etiam cartilaginea & multas aliquoties cellulas, & magnam in his medullosæ ejusdem substantiæ copiam inveni, contra atque plures de cartilaginibus in universum agentes posse fieri, arbitrati sunt. Multoque etiam sæpius totam arytenoidum basim cellulofam vidi, & medullari liquore turgentem, quamvis istas cartilagineas videre osseas potuerim nunquam. De cartilagine laryngis reliqua epiglottide rem etiam unam animadverti qua in re Anatomici non conveniunt: quæ etsi minoris momenti est, attamen propter Figurarum emendationem prætermittenda non videtur. Sunt multi qui epiglottidem ita describunt, atque delineant, uti ab latiore basi in angustum apicem extenuetur. Contra alii inferiorem illius partem multo apice contractiorem proponunt. Cum his meæ observationes consentiunt.

24. Super proximæ *Asperæ Arteriæ Cartilaginibus*, quonam loco esse definant semiannulares, varia ab Anatomicis tradita sunt. Pars enim scribunt id fieri ut pulmones attigerunt. Alii autem extra pulmones, ut qui ajunt, id accidere ubi arteria in bronchia diducitur, quive ubi œsophagus ab illa secedit, quique ubi eadem primum in thoracem descendit. Horum quidem assentiri possum nemini. Etenim non isti modo arteriæ parti quæ intra thoracem est, sed & duobus in quos primum scinditur, bronchiorum ramis semiannulares cartilagineas obtigere. Illos autem alios facilius sequar qui, velut primo agebam loco, cartilagineas nolunt esse amplius semiannulares simul atque intra pulmones ventum est; quanquam scio, oppositum statui ex Galeno (a) a celeberr. Vesalio (b), atque ab his qui Vesalii delineationes acceperunt. Porro illud sic concedo, ut perfici annulos, tamen negem, qui videlicet intra pulmones ex pluribus, & diversæ quidem formæ cartilaginibus compinguntur, ut Bauhinus (c), & Recentiores prodidere. Est Figura in nostris libris anatomicis qua arteriæ asperæ cartilagineas sic ostenduntur, ut non solum utrinque omnes in acutum definant angulum, sed interstitium quod in posteriore arteriæ parte est, illud quoque explere totum videantur. Hanc non minus miror Cl. Homini excidisse, quam a studiosissimo alio Professore in suam humani corporis Anatomiam receptam esse. Ex bove enim, opinor, ea Figura, non

Vid. Adv.  
V. An. 42.

De Carti-  
laginibus  
Asperæ  
Arteriæ.

(a) De us. part. l. 7. c. 3. (b) De hum. corp. fabr. l. 6. c. 4. & alib. (c) Theatr. Anat. l. 2. c. 27. ubi loquens de bronchiorum ramis, *Quorum* (inquit) *cartilagineas nunc triangulares, nunc quadratas, nunc alio modo formate per pulmones ad extremum diffeminantur.*



non ex homine expressa est. Constat namque, in bobus, & consimilibus animantibus multo eas cartilagine esse longiores, ut quæ postquam consuetum in nobis arteriæ spatium ambivere, productis ulterius suis jam solutis extremitatibus super dorso ejusdem arteriæ passim connivent, credo, ut defendant, ne rudi, ingentique transeuntium illac ciborum mole animæ aditus intercludatur. Quo fit etiam, ut paulo æquiores Præcl. Ruyschio esse potuissent qui completos fere annulos reprehenderunt in postica vitulinæ tracheæ parte ab eodem sculptos in eo Iconismo in quo ulteriores bronchialis arteriæ ramificationes primus demonstravit. Namque hujus initium, atque insertionem jam quondam cum arteriam magnam describerent, Galenus (a), & Fernelius (b) tradiderant; ut magis mirandum sit, a multis post Ruyschium scribentibus, eandem restitutam modo, auctamque bronchialem in descriptione universæ aortæ esse prætermittam. Cæterum illud in asperæ arteriæ dissectionibus non infrequenter reperitur, ut nempe aliquot ejus cartilagine extremis invicem connascentur, utque aliquot multo cæteris latiores sint. Quæ si in ulla alia, certe in prima cartilagine observavi: quippe hæc non raro per se latior, non minus raro ob unius, itemque alterius cartilaginis unionem latissima est. Longitudine quoque, & imprimis figura dissimilis aliarum est; nam sæpe omnium brevissimam vidi, forma autem plerumque ad triangulum accedentem. Quæ ferme omnia & in brutis aliquot observavi. Memini etiam in sene quodam & asperæ arteriæ, & bronchiorum cartilagine in medio osseas, & in his medullosum quidpiam vidisse. Sed de hisce cartilaginibus satis.

Vid. Adv.  
V. An. 32.

De Glandulis, & Lacertis Asperæ Arteriæ.  
T. 1. sub Lit. F.  
T. 2. Lit. O. O. O.

25. Nunc porro quid in *Glandulis Asperæ Arteriæ* Anatomia Professores discrepent, videndum est. Esse autem glandulas in ea arteria, jam usque a Laurentii (c) temporibus notum est. Sed qua magnitudine, & quo loco eæ glandulæ posita sint, id vero inter omnes minime convenit. Namque animadverti, Anatomicos, maximam partem, miliares illas & exiguas dicere, & delineare, atque in tunica interiore, aut prope hanc, earum sedem constituere. Contra perpaucos, & in his Cl. Bidloun (d) exterius super musculosam tunicam ponere, item docere, sæpius illas turgentes admodum inveniri: ex his etiam aliquem non ita exiguas delineare. Quibus ego Anatomicis non assentiri non possum. Nam certe in toto asperæ arteriæ, primorumque bronchiorum dorso, qua cartilagine intermittunt, sublata exteriori tunica, crebræ statim glandulæ in conspectum dantur, figura subrotundæ, & ovals, sed compressæ, varia autem magnitudine, at miliaribus pleræque majores: hæc per subjectas fibras carneas intra arteriam asperam canaliculos transmittunt suos. Ea namque, & continentibus bronchiis ab antica parte secundum eorum longitudinem discissis, atque intus absterfis, appressoque subtus digito, sic ut eæ glandulæ comprimantur, certæ mucilaginosi humoris guttulæ prodeunt, & subjectorum foraminum indicium faciunt. Hiant autem foramina hæc passim per totum quo annuli cessant, interstitium, ea tamen ratione quæ nunc demonstrabitur. Extant in tunica interiore eæ lacerti quidam insignes ex albicantibus fibrillis compacti. Hi digitos aliquot supra asperæ arteriæ divisionem initium capiunt, & secundum

Vid. Adv.  
V. An. 37.  
38. 39. 40.  
41.

ejus longitudinem dispositi, interstitiumque illud quod memorabam, tenentes, ubi ad secundam bronchiorum divisionem pervenerunt, ibi primum solent per omnem undique bronchiorum superficiem ad istorum extrema versus decurrere. Quorum lacertorum usum nunc perquirendum non existimo. Porro ea quæ dicebam, foramina, eæque guttæ in his tantum locis se se offerunt quæ loca ab iis lacertis, fibrillisve eorum intermittuntur. Sunt etiam alii intra asperam arteriam lacerti quamque cartilagine cum subjecta colligantes, quos perexiguos esse musculos, ante omnes videtur Andreas Laurentius (e) indicasse. Vidi hos ego aliquando admodum extantes, nonnullosque eorum superata una, vel altera cartilagine, tunc demum implantari, perque omnia esse eorum lacertorum similes qui non raro ad duræ matris septum medium, & interseptum eminentes adeo & præstantes occurrunt, præcipue in certis quibusdam capitibus; ut recte a Cl. Pachiono (f) admonitum est. Sunt autem & sub iis lacertis brevioribus parvæ aliæ glandulæ e propriis foraminulis humoris guttulas emittentes. Eæ cum inter unam, atque alteram cartilagine potissimum sint constitutæ, simul atque breves hi contrahuntur lacerti, unaque ad alteram cartilagine adducitur, suum necessario humorem transmittunt. Nec dissimili ratione quotiescunque eæ fibræ carneæ contenduntur quæ inter unam, atque alteram cartilagine extrematatem per dorsum arteriæ asperæ ductæ sunt, non potest non is liquor propelli qui per canaliculos inter eas fibras transductos ab illis quas primo loco descripsi, glandulis corrivatur. Quas quidem glandulas si quis optet diligentius cognoscere, is inferiorem ejusdem arteriæ truncum inspiciat; hic enim solent; nec sine ratione; & majores esse, & confertiores. Quod si præterea in eorum cadaveribus perquiret quos inflammatio pulmonis sustulerit, cum in his lento, & subalbido ichore scateant, atque turgere multum soleant, minimo negotio in conspectum dabuntur.

26. Inter reliquas glandulas quæ factæ in asperæ arteriæ gratiam existimantur, facile *Thyroidæa* præcipua est. De qua duas præsertim video inter Anatomicos esse dissensiones, alteram, an glandula una sit, alteram, an peculiari ductu infundatur. Sunt ergo perpauci qui unam glandulam esse, ponunt, in quibus sunt Hornius (g), atque Casserius, (h), quorum iste tametsi alicubi in hac re sibi ipsi non constat, unam tamen pinxit in eo Iconismo qui postea a Bartholino, & Diemerbroeckio reculus est. Sed pars multo maxima Anatomicorum binas esse glandulas, tradunt, tum Vesalius (i), quique ejus delineationibus usi sunt, hinc atque hinc unam a lateribus summæ asperæ arteriæ, inque medio penitus distinctas depingunt. Quos ego ab ovium, boumque, & consimilium brutorum anatome fuisse deceptos, dubitandum non existimo, propterea quod in hisce animantibus ea pars glandulæ quæ utrumque lobum continuat, quamque isthmum a nupero quopiam Scriptore vocatam scio, cum gracilis valde est, tum vero, superaggesto, intertextoque adipe, latere solet. Contra in homine longe ea pars conspicua est: quæ infra cricoidem in transversum posita lobi utriusque, non supremam, ut aliquis pinxit, sed infimam solet partem connectere. Inde lobi utrinque ad thyroididis latera

De Thyroidæa, aliisque a liquor Glandulis.  
T. 1. Lit. M. N. o.

Vid. Adv.  
V. An. 35.

(a) Altera vero pars arteriæ quæ a corde se promit, quæ major est (vulgo Aorta descendens) ad spinam deflectitur, quintam thoracis vertebra ascendens, & inde per totam jam spinam usque ad latum os descendit, primum propaginem quandam tenuem emittens quæ in eas dividitur thoracis partes quibus pulmones adjacent. Extrema autem ipsius ad arteriam (id est; ut in margine; ad tracheam arteriam) usque ascendunt. De dissect. venar. & arter. c. 9. & alib.

(b) de part. corp. hum. descript. c. 12. ubi incipit exponere propagines aortæ descendentes. Primus in tanta productione ramulus editur in eam pulmonis regionem quæ spatium inter quintam vertebra, & cordis basin medium implet, cujus extrema in asperam arteriam sursum adducuntur. (c) Hist. anat. l. 9. c. 14. Observavimus aliquando in asperæ arteriæ rivis exiguas glandulas tum ad sustentationem, tum ad humectationem. (d) Anat. hum. corp. Tab. 25. F. 3. (e) loc. cit. Interjectæ sunt inter annulos (tracheæ) membranae, in brutis quidem omnino exangues, in homine (quod nemo adhuc observavit) musculosæ; ut videantur cartilagineum spatia opplere muscoli perexigui se se in modum X interfecantes non secus ac intercostales. (f) De duræ Mening. fabr. c. 1. (g) Apud Bartholin. Anat. quart. renov. l. 2. c. 11. (h) De Laryng. Tab. 15. F. 3. (i) De ham. corp. fabr. l. 2. c. 21. Fig. 2. 4. 5.



Vid. Adv.  
VI. An.  
92.

latera inferiora pertingunt ; ut tota glandula crescentis lunæ imagines quodammodo repræsentet , nisi quod plerumque ab isthmo , vel ab alterutro lobo exilis , sed longa Appendix glandulosa sursum per thyroididis faciem producitur . Et quando in huiusmodi disquisitiones descendimus , haud alienum est admonere , etiam Prostatas a multis Anatomicis ceu duas glandulas esse propositas , quas tamen antiquissimus Auctor Herophilus ( *a* ) ἀδυνειδὴ παραστάτην , & post hunc Vesalius ( *b* ) , Fuchsius ( *c* ) , veltrique Arantius ( *d* ) , & Varolius ( *e* ) , atque alii præterea etiam Recentiores , quos inter Cl. Littrius ( *f* ) , corpus , ut revera sunt , unicum appellavere . E contrario autem Tonsillæ glandulæ , quas , sicut sunt , ita duas esse , Majores tradiderant , a præcellente huius memoriæ Anatomico una continens , & perpetua glandula dictæ sunt , nempe ob interjectam in extremo palato , & linguæ radice glandulosam expansionem : qua is quidem in re videtur , nisi ego plurimum fallor , sui se dissimilem præbuisse . Et si enim ejusmodi Viri , eorumque qui hunc sequuntur , auctoritas alios omnes , fere uno excepto Nuckio ( *g* ) , in eandem sententiam pertraxit , illud tamen certum est , utramque tonsillam consistentia , colore , secreto succo a memoratis expansionibus glandulosis satis differre , & præterea ab iisdem penitus esse distinctas , ut quæ propriis finibus continentur , tunicaque peculiari in ove præsertim , cane , bove ( in quo manifeste in tres divisæ sunt lobos ) circumcirca concluduntur . Sed ut eo unde digressus sum , redeam , unam quidem esse thyroidæam glandulam , certum est ; an vero ductum peculiarem habeat , ambiguum . Hinc enim Galenus ( *h* ) aut quisquis est auctor ille qui librum de Voce , & Anhelitu scripsit , negat , eam glandulam quemquam ejusmodi canalem obtinuisse ; idemque docet peritissimus Vir Casserius ( *i* ) : quorum ea res testimonium adjuvat , quod in ductuum consimilium anatome longe plus fuerint , quam a multis creditur , exercitati . Constat namque , eosdem in his ipsis librorum locis in quibus thyroidæ ductus esse , negarunt , maxillarium utrumque canalem agnovisse : qui canales enimvero , uti Eruditis notum est , neque aliis antiquis Anatomicis fuerunt ignoti , & in his Achillino vestro ( *k* ) homini , ut illis temporibus , bene docto , cujus in scriptis unum ( *l* ) quoque ex iis arcanis reperio quæ Fabricius ( *m* ) postea suo cuidam Amico observata primo esse , arbitratus est . Nec vero ex iis Anatomicis qui post Placentinum claruere , quemquam memini legisse qui in thyroidæa peculiarem ductum demonstraverit , etsi aliquot legi qui de ejusdem usibus ita scribunt , quasi eam intra laryngem ductum promittere , constaret . Novissime tamen Cl. Sodalis noster Nouefius in ea epistola quam ad alterum ex nostra Academia Præstantissimum Virum Dominicum Gulielminum quartam ( *n* ) dedit , non levem spem facit , peculiarem ductum in ea glandula a se compertum , cum aliis rebus anatomicis aliquando iri demonstratum . Interea autem dum vobiscum exercitatissimi hominis promissa expecto , atque desidero , ea non pigebit communicare quæ observanti mihi in thyroidæa glandula se se obtulerunt . Igitur cum eam glandulam tumefactam , & renitentem ; quo quidem vitii genere sæpe admodum solet tentari ; cultro

Morgagni Adversaria Anat. I.

anatomico pluries subjecerim , vidi illam quasi ex subrotundis vesiculis varia magnitudine , subflavoque , & lento liquore imbutis ex omni parte coagmentatam . Eæ vesiculæ nativi ipsi glandulæ acini esse videbantur , remorantis humoris vi in eam magnitudinem dilatati . Namque ipsa glandula , in sanissimo quoque corpore inspecta , ex innumeris constare frustulis , sive acinis invenitur : qui in bobus , isthmo glandulæ , aut extrema lorum crepidine luci obversa , subrotundorum specie corporum , nullo negotio conspiciuntur . Num vero ab acinis secretus liquor in lymphatica vasa , an potius in peculiarem ductum confluat , cum neque ipsa morbi vi distenta glandula , neque ingentia boum corpora , ut in quibus illa cæterarum partium amplitudini minime respondet , nihil adhuc mihi satis , ut cuperem , explorati , & certi præbuerint , non videtur hic pro re comperta esse ponendum . Relinquitur , ut quid conjectura assequi possim , aliis productis observationibus videamus . Illud itaque certum est , de thyroidæa glandula & in boum , & in hominum cadaveribus mollem quendam , & obliniendo , lubricandoque idoneum succum communi isti amygdalarum oleo longe consimilem ( quo succo ea plerumque multo imbutur ) dissecta , compressaque eadem , exprimi posse . Præterea animadverto , eam ipsam glandulam his quatuor musculis qui a sterni jugulique regione in os hyoide , thyroidemque cartilagine protenduntur , item supernis coracohyoidum ventribus subjectam esse sic uti nequeant hi muscoli in vociferandi , edendique motibus ad suos , qui retro nempe siti sunt , immobiles terminos omnino contrahi , quin continuo , prominens glandula , obnitentibus inprimis retropositis cartilaginibus , comprimatur . Ea cum se ita habeant , si porro ad notum respiciamus Divini Opificis institutum in salivalibus , in mucosis urethræ , aliisque glandulis prope , aut subter musculos ipsis quæ humectandæ sunt , partibus subservientes , opportunissime collocandis , nonne , Sodales , sic videtur , facile a thyroidæa ductum aliquem promitti aut in pharyngem , atque œsophagum , quos nempe ab lateribus illa attingit , aut potius in summam asperam arteriam , cui revera ad primæ cartilaginis , atque cricoidis latera arctissime annexa est ?

27. *Coracohyoides Musculos* , quos paulo ante memorabam , multi , gravesque Anatomici & nuperi , & antiqui , quanquam nuperi magis , sed tamen & nuperi , & antiqui a coracoide scapularum processu nasci , posuerunt . Contra alii , & in his Galenus ( *o* ) , Vesalius ( *p* ) , Valverdu ( *q* ) , Fuchsius ( *r* ) , ut reliquos nunc omittam , non a processu coracoide , sed ab eo scapularum latere quod coltam superiorem vocant , eosdem musculos deduxerunt ; ut minime scriptum ab Riolo ( *s* ) oportuerit , omnes Anatomicos perperam in processu coracoide illorum originem statuisse . Ego vero etsi posse fieri , non negabo , ut pars utraque Anatomicorum vere id quod posuit , aliquando observaverit , nunquam tamen memini , eos musculos coracoidi insertos , sed ei semper quod dicebam , scapularum lateri , conspexisse : Vosque idem mecum & alias , & cum nuper publice , pro Cl. Professore Valsalva Parmam accersito , humanum corpus disseccare jussus sum , plures observastis . Nempe inter processum co-

Vid. Adv.  
V. An. 45.

De Musculis Coracohyoidis.

T. I. Lit.  
T. V. x. Y.

B racoi-

( *a* ) Ita omnino apud Fuchsiu de hist. hum. corp. l. 4. c. 1. ( *b* ) De hum. corp. fabr. l. 5. c. 15. ( *c* ) loco modo cit. ( *d* ) Observat. Anat. c. 36. & alib. ( *e* ) Anatom. l. 4. c. 1. ( *f* ) Memoires de l'Acad. Roy. des Scienc. 1700. ( *g* ) Sialograph. cap. 2. in fin. ( *h* ) Tract. 2. Lingua autem habet duas glandulas in quibus sunt due venæ in quibus currit saliva ad linguam , & ad totum os . Collum autem habet duas glandulas in quibus generatur humiditas . - Sed ex duabus glandulis quæ sunt in collo , - non proveniunt venæ in quibus currit humor , sicut proveniunt ex duabus glandulis linguæ . ( *i* ) de Laryng. l. 3. c. 1. ubi transmissionem humoris thyroidæarum , ait , non fieri glandularum more quæ linguæ adjacent , a quibus due venæ ad linguam vergunt humiditatem salivalem sensim percolantes , sed omnibus omnino venis destitutas &c. ( *k* ) Annotation. Anatom. Duo fontes salivæ , in quibus stylus intrat , sunt manifeste aperientes juxta linguam : & ibi sunt carnes glandosæ . ( *l* ) Ibid. Uvea , cujus foramen est pupilla , aperitur in mediocri lumine , excessivo confringitur in suo foramine . ( *m* ) de Ocul. P. 3. c. 6. ( *n* ) Lettres de G. Desnoues , &c. ( *o* ) De anat. admin. l. 4. c. 10. & de vocal. instr. dissect. l. 4. c. 10. & alib. ( *p* ) De hum. corp. fabr. l. 2. c. 18. ( *q* ) Anat. corp. hum. l. 2. c. 12. ( *r* ) De hist. hum. corp. l. 2. c. 11. ( *s* ) Anthropogr. l. 5. c. 16. & Schol. Anat. &c.



racoidem, eumque locum unde is musculus initium capit, ea saltem ampla fissura interest quam recte Vesalius (a), & Fuchsius (b) finem quandam instar semicirculi appellant, Laurentius autem (c), Bauhinus (d), alique præterea, Iconismis sæpe propositis, memorare non omitunt. Quæ adjicere hic volui, cum ab Auctore præstantissimo dubitatum sciam, an quisquam omnium de hac fissura mentionem fecerit.

De Mus-  
culis La-  
ryngis  
Propriis.

De La-  
ryng. P. 1.  
c. 3. &  
alib.

De La-  
ryng. l. 1.  
c. 6. 17. 18.  
& l. 3. c. 6.  
Vid. Adv.  
V. An. 35.

28. Etiam in pluribus ex iis Musculis qui laryngis cartilaginibus sunt attributi, occurrere multa video de quibus non convenit inter Anatomicos Professores. Namque ut dicere prætermittam de gemino Epiglottidis Levatore, qui nempe musculi a gravissimis Anatomicis, permultis aliis, & merito quidem, reclamantibus, in nobis non minus, quam in bobus, ovibusque, positi sunt; at certe de duobus aliis musculis quos Fabricius eidem cartilagini deprimendæ addixit, non videtur reticendum. Igitur cum musculi Thyroarytenoidæ esse in plures videantur divisi, Fabricius supremas eorum partes pro Epiglottidis Depressoribus accepit, ut quas hujus cartilaginis radici infertur esse, contendebat. Contra Placentinus huic sententiæ posse accedere se, negat, propterea quod nullæ omnino musculorum eorum fibræ epiglottidis radicem attingant. Mihi vero etsi admodum sæpe accidit, ut in bobus summas eorundem musculorum fibras infimæ epiglottidi infixas compererim, easque præterea ceu in peculiarem, & extantem musculum & in iisdem animantibus, & in nostro genere conjunctas viderim, placet tamen potius ut Casserii judicium sequar. Namque animadverto, non immobili epiglottidis parti, qualis radix est, fibras hasce inferendas fuisse, si id Natura spectasset, ut earum ope illa cartilago inflecteretur; neque accideret, uti eadem fibræ modo radici epiglottidis, modo vero summæ thyroidei infixæ omnes reperirentur: quod ultimum in canis, itemque in vervecis larynge nuper mihi observatum est. De illo autem musculorum Pari cui Cricoarytenoidæ Posteriori nomen est, hic mihi aliquid dicendum esse, non existimo. Quamvis enim Professores nobilissimi universas eorum fibras & a cricoidis basi enalci, & recta sursum ire, posuerint, & quipiam insuper, hac quoque ætate, longe aliter atque oportebat, easdem fibras delineaverint; quamvis etiam Auctores, minimum, quinque legam qui eosdem omnino musculos in suis descriptionibus prætermittunt; sunt tamen hi musculi inter proprios laryngis fere maximi, tum vero facillime in conspectum dantur, ut proclive admodum cuique sit, utrum adsint, & qua tendentia, quibusque ex locis procedant, vel prima quaque inspectione cognoscere. Præstat ergo uti ad aliquid dicendum progrediar de aliis laryngis muscularibus fibris paulo indagatu difficilioribus, quas alii musculum, alii musculorum Par, quidam transversum, nonnulla pars oblique ascendens, alii denique Arytenoidæum, alii Cricoarytenoidæum Superius vocant: tot videlicet, & tantæ de divisione earum fibrarum, de tendentia, deque earum terminis sunt diffensiones. Quibus de rebus ita mihi observatum est. In bubulo quidem genere, itemque in ovillo eas inter fibras conspicuus tendo secundum laryngis longitudinem interjectus est: illo in duos musculos, seu potius in duos ventres partiuntur. Hinc Vesalius, ut quem publicis in Theatris non hominum, sed brutorum semper larynges dissecuisse, de Columbo oculato teste cognoscimus, eas fibras in geminos musculos bipartitas descriptione, atque iconismo proposuit: quem magna pars Anatomicorum secuta est. Sed ii quoque alii Anatomici qui duos musculos esse, negant, eum plerique tendinem in medio ponere non omittunt, eadem re, opinor, decepti, eo facilius, quod etiam in nobis alba

De hum.  
corp. fab.  
l. 2. c. 21.  
De Re  
Anat. l. 1.  
c. 13. &  
alib.

quædam lineola, ceu similis tendo, prodnci solet per earum fibrarum tergum, quæ tamen linea in superficie tantummodo hæret, penitusque integris & illæsis subjectis fibris, minimo negotio separatur. Porro in nobis quæ earum fibrarum anti-cæ, seu interiores sunt, hæ solent ab una ad alteram arytenoidem transversæ duci. Quæ vero post has locantur, sæpe in plures junctæ fasciculos, ab alterius arytenoidis basi, aut etiam a contigua cricoide exortæ, atque ad litteræ X similitudinem decussatæ, in oppositam arytenoidem infinguntur. Cæterum vidi etiam, neque admodum infrequenter, aut eas transversas fibras desiderari, aut esse unum modo obliquum fasciculum, aut denique eos fasciculos non decussari, sed hinc, atque hinc proclinasas fibras inter utramque arytenoidem, ad modum externi geniohyoidæ Paris concurrere, nisi quod nulla hic tendinosa linea interponebatur. Quæ nempe omnia minute hic persequi non me piguit tum ne adeo mirum sit, tot extitisse super re hac Anatomicorum diffensiones, tum quo magis magisque constet, non esse una agendi norma admirabilem Naturæ vim circumscriptam, sed alias hanc, alias illam operandi rationem insistere, modo in una generatim re sibi constet, atque unum eundemque usum dispari structura consequatur. Quod cum in aliis præterea musculis, in spermaticorum, vasorumque aliorum origine, & distributione, multisque rebus ejusmodi conspicuum sit, tum, meo judicio, in Osse Hyoide, iisque Sinibus quos appellant Pituitariis, longe est manifestissimum. Hyoide namque os teretibus alias ligamentis, alias membranis, alias vero cartilaginibus etiam, aut offculis longitudine, numero, figura diversis cum supernis cartilaginis scutiformis processibus, inprimisque cum processibus styloidibus colligatur. Pituitarii autem Sinus tot obnoxii varietatibus comperiuntur, ut demirandum minus sit, quod a pluribus ethmoidæi, a quibusdam vero multo insigniores sphenoidæi, & maxillares, ab aliquo demum præter frontales cæteri omnes, hac etiam tempestate, omittantur. Ut enim ego prætermittam, maxillares sinus, quod rarius est, nullos me in muliere quadam vidisse, certe ethmoidæos, qui sex omnino statuuntur, alias plures, alias vero pauciores numeravi. Sphenoidæos non sub sella, sed ante ipsam non semel vidi, aliquando inter se admodum inæquales, sæpe etiam duorum loco quam amplissimum unum inveni, nullos denique interdum comperi, quæ aliis quoque ante me accidisse, memoriæ mandatum est. Frontales vero in quatuor nonnunquam partitos, alias duos quidem, & inter se æquales, aliquando dexterum majorem sinistro, at non raro sinistrum majorem dextero observasse memini: quod item in Highmori Tabulis expressum est; ut mirum plane videri possit, contra a Viro peritissimo dextrum semper præ sinistro majorem esse pronunciatum. Vidi etiam a dextris frontalem sinum defuisse, atque ut paucis cuncta complectar, raro admodum contigit, ut illos sinus in uno atque in altero capite ad eundem modum adinvenerim. Quam porro varietatem uti ab Natura in his, atque hujusmodi rebus servari video, ita a pluribus qui de iisdem, rebusve similibus scripserunt, dissimulandam non putassem, si quidem veram earum historiam nobis erant proposituri.

29. Jam vero ut ad celeberrimam controversiam veniamus, multa super Hymene ab Anatomicis disputari, notum est: de quo cum alii alia scripserint, tum inter cæteros laudari video qui contractum vaginæ initium, quive anulum peculiarem, aut qui demum myrtiformes quasdam carunculas hymenem esse, posuerunt. Quorum primis ita assentiendum esse, judico, ut eorum tamen quos altero loco memorabam, sententiam pari-

T. 2. F. 1.  
Lit. k.

Vid. Adv.  
VI. An.  
89.

Corp.  
hum. Dis-  
quis. T. 16.  
F. 4.

De Hyme-  
ne.

T. 3. Lit.  
G. G.

(a) De human. corp. fabr. l. 1. c. 21. (b) De hist. hum. corp. l. 1. c. 25. (c) Hist. Anat. l. 2. c. 39.  
(d) Theatr. Anat. Vid. Explic. Tab. 16. lib. 2. Fig. 7. &c.



Vid. Adv.  
IV. An.  
23. 24.

De hum.  
corp. fa-  
br. l. 5.  
c. 15. &  
alib.

num. 13.

Vid.  
Gasp. a  
Rejes E-  
lyf. &c.  
qu. 39. &  
Bauh. Th.  
Anat. l. 1.  
c. 39.

Anthrop.  
l. 2. c. 35.  
Anatom.  
n. 32.

Var. Lect.  
l. 6. c. 25.

Nonnulla  
de Ova-  
riis, &  
Tubis Fal-  
loppianis.

pariter comprobemus: Sic enim mihi in virginibus integerrimis observatum est. Præter infimæ vaginæ angustiam, interna hujus tunica, ita uti in valvularum structura accidit, duplicata ibidem, & nonnihil primum ex vaginæ ipsius substantia, mox nihil ferme nisi tenuissima complectens vascula, circumcirca insignis annuli specie assurgit: quæ alii aliter, at satis commode Andreas Vesalius, ut mihi quidem videtur, exposuit. Nec raro contingit, ut ea tunica quæ annulum hunc facit, iisdem confertissimis prominentiis, seu majoribus papillis exasperetur quibus eandem in vagina inæqualem fieri, supra demonstratum est. Aliquando etiam eam annuli partem quæ urinæ meatui statim subest, lamellæ plures, aliæ aliis antepositæ efficiunt. Atque interdum accidit, uti ab eadem summa parte ex ipsa prorsus hymenis substantia firma lamina parvæ instatæ, aut columnæ modo deorsum recta demittatur, cumque annuli inferiore parte commissa, illud in duo spatium dividat quod medium intra annulum relictum est. Quod perraro fieri, credidissem, nisi & mihi nuper observatum esset, & publice Cl. Valsalva noster unum intra annum bis ostendisset: ut hinc intelligi jam possit, quare hymen interdum etiam *Virginea*, seu *Virginitatis Columna* ab eruditissimis hominibus sit appellatus. Porro qui carunculas myrtiformes hymenem esse, constituerunt, hi mihi intactas virgines aut dissecuisset, aut probe observasse non videntur. Carunculas namque istas nunquam ego nisi in mulieribus his comperi quas virum expertas esse, constabat. Quare ab Doctis Viris Riolano, atque Munnickio illud verissime factum censeo, quod eas carunculas non hymenem, sed dilacerati hymenis reliquias existimarent. Quod præterea ex forma, substantiaque illarum cognoscitur, & ex eo quod neque certus earum numerus est, sicut ne locus quidem. Neque tamen in his omnibus apparent mulieribus quæ virorum notitiam habuerint. Cum enim annulus alias angustior, alias latior, inque his valentior, in his infirmior, nec minore penis varietate in altero sexu reperitur, id nimirum aliquando accidat, necesse est quod Hieronymus Mercurialis ajebat, ut paulatim placido, diuturnoque concubitu longe lateque sine ulla effractione dilatatus annulus oblitteretur.

30. Multæ in muliebribus mihi occurrunt Anatomicorum dissensiones: quarum plures, ne longum hodie nimis faciam, in aliud tempus rejicio. Quare alias quid circa clitoridis usum sentiam, opportunius demonstrabitur: qua occasione ut in ovibus, & præcipue in vaccis ea mirifice intorqueatur, & quæ in naturalibus utrarumque prope clitoridem, quæque in vaccis sub ipso urinæ meatu fovea occurrat; duos præterea oblongos musculos qui taurini genitalis utrumque latus stipantes, denique infra coronam late inferuntur, aliæque hujusmodi proponemus. Sed de controversia celebratissima: rectene vivipararum animantium testes, & tubæ pro ovariis, atque oviductibus habeantur; quoniam aliis in utramque partem observatum est diligenter, & copiose disputatum; nempe operæ pretium facturus non videor, si aut nunc agere constituam, aut alias acturum me, spondeam. Quoniam tamen persæpe a me, Sodales atque Amici aliquot, postulastis, quid circa tubarum iter, & positum, quidque de testium constitutione observaverim, quæ res inter cæteras aliter ab aliis in ea controversia poni so-

Morgagni *Adversaria Anat. I.*

lent: ne quid obsequio, & necessitudini negasse videar, hæc modo obiter habeatis. Est Celeberrimus nostrorum temporum Anatomicus qui in suis Chirurg. Observationibus ita scripserit: nisi tot cadavera dissecuisset, nunquam fuisse se crediturum, tubas Falloppianas frequenter adeo in mulieribus obstructas esse. Ego vero, etsi tanti Hominis fides longe spectatissima mihi est, libensque fateor, meum hunc in re anatomica mediocrem usum nullo modo esse cum longa Viri exercitatione comparandum, eodem tamen veritatis studio affirmare non verebor, me sæpius tubas primo quidem tentamine, primaque inspectione alicubi, & præsertim ad uterum, occlusas existimasse, re tamen vera post accuratam perquisitionem, dissectionemque vix unquam clausas comperisse. Neque interim nego, id eas aliquando vitium tentare; at sæpe adeo & frequenter afficere, id vero fateor minime mihi in cadaverum dissectionibus respondere. Quod autem ad tubarum positum, ac tendentiam attinet, etsi alias aliter inveni dispositas, longe tamen sæpius ita memini comperisse, ut ab eo positu quem in Graafii Tabulis habere video, maximopere discrepent. Postquam enim tubæ testium dorsum conscenderunt, velut a Cl. Viris Stenone, & Sbaraglio vestro observatum est; tum frequenter solent post testiculos se se demittere, infraque istos suis, alias deorsum, alias sursum spectantibus orificiis propendere. Denique non dici potest, quam sæpe aliquid in testibus seu potius ovariis invenerim quod ab sana nativæ eorundem constitutione longe esset alienissimum. Namque ut omittam pure taboque plenas vesiculas quas incredibili prorsus numero in teste quodam ad magnitudinem pugni adaucto nuper cum Amicis conspexi, aut alias in alio teste repertas ceu vesiculas quasdam duas quarum altera offescebat, altera jam ossæ plane evaserat, aliæque ejusmodi, videlicet quæ non ita esse frequentia solent; certe intra testiculos quasdam cellulas sæpe invenio quarum aliæ prasina, aliæ cinerea, prope omnes vero etiam ferruginea & nigra tunica continentur, inque his nigrum quoddam, & molle corpus quod nisi concreti sanguinis grumus est, nihil tamen magis quam grumus sanguinis esse videtur; Qua de re, aliisque præterea consimilibus cum fortasse olim in sectionibus morbosorum cadaverum sim dicturus, hunc eadem, cæterisque in quæ obiter incidi, jam dimissis, ad ulteriora properabo.

31. Ex omnibus Prosectorum dissidiis quæ in mulierum naturalibus adhuc supersunt, tria, non amplius, seligemus quæ circa totidem Fluidorum in iisdem partibus se se ostendentium scaturigines & fontes versantur: hæc tria cum legero, aliud hodie ex meis Adversariis Anatomicis non proponam. Igitur præter lacunas quæ circa extremum urinæ meatum desinunt, indeque, ut Alexandro Benedicto (a), aliisque præterea notum fuit, non prolificum muliebri semen ejaculant, Regnerus Graafius (b) in ea Tabula in qua vaginam a posteriore parte ostendit apertam, duo, vel tria inferius in ipso vaginæ orificio adjecit foramina, quæ nulla tamen peculiari descriptione, nulla explicatione exposuit, & ab latere tantum dextero collocavit. Hoc facto nuperi adeo, atque solertis Anatomici ea videri poterant in dubium vocari quæ ante ipsum Spigelius (c), Rolfincius (d), Bartholinus (e); quique præterea ab

B 2

hoc

T. 3. Lit.  
Q. Q.

Vid. Adv.  
IV. An.  
14.

De Mu-  
lier. Org.  
Apud  
Swamer.  
Mir. Nat.  
De Vivip.  
gen. Sec-  
pl. 2.

De Lac-  
nis Fossæ  
muliebris.  
T. 3. Lit.  
G. G.

(a) Hist. corp. hum. l. 2. c. 25. Menstrua ex venis quoque duabus secundum os pubis juxta urinæ exitum erumpunt: ex ea parte & faminarum non prolificum semen in coitu effunditur tanto in plerisque impetu, ut masculorum more longius exsiliat. (b) de Mulier. Organ. (c) De hum. corp. fabr. l. 8. c. 19. Duo cæca foramina statim apparent diductis labiis, sed ferme tantum in vivis, cum admodum parva sint, in quibus serosus quidam humor non parva quantitate prodit qui maris pubem in coitu madefacit. (d) Ordo, & method. generat. dicatar. part. P. 2. c. 41. Duo foramina ad latera vestibuli sinus muliebris utrinque parva ruga velut operculo resecta occurrunt, &c. (e) Anatom. quart. renov. l. 1. c. 32. In fossa diductis labiis apparent duo foramina, sed fere tantum in vivis, inprimis post coitum, vel in prægnantibus teste Plazzone apud Rhodium, cum admodum parva sint, in quibus serosus quidam humor non parva quantitate prodit qui maris pubem in coitu madefacit. Utrinque parva ruga velut operculo resecta, notante Rolfinchio. Quo tendant meatus, ignorat Lindannus. Non dubito, esse vasa excretoria, seu lymphatica ex glandulis fossæ serum profundentia, velut in superioribus ductus salivales.



hoc citantur, de hujus generis foraminibus jam tradiderant. Hi namque bina foramina unde in concubitu serum quoddam profunderetur, unum utrinque ab lateribus fossæ, ceu res perpetuas, & exploratas, perspicue, & diligenter posuerant. Cui dubitationi etsi postea occurrit Cl. Casparus Bartholinus (a), sive ut alii malunt (b), exercitissimus Verneyus, unam utrinque glandulam sub plexu retiformi inveniendū peculiari ductu, nimirum, ut ego existimo, bino eodem Spigelii, & cæterorum foramine, ad vaginæ initium pertinentem; quoniam tamen circa istas res aliquanto aliter observasse mihi videor, id omne vobiscum, qualecunque est, Sodales optimi, communicabo. Primum itaque illud compertum mihi est, præter lacunas ad glandosum urethræ corpus pertinentes, de quibus hoc quidem loco non agemus, Foramina cætera singularia quæ circum vaginæ initium statim ante hymenem, vel si hic clacceratus est, ante carunculas myrtiformes, aut sedem earum disponuntur, haud raro duobus plura inveniri. Alias namque bina, modo terna, aliquando etiam quaterna in singulis utrinque lateribus numeravi. Præterea nonnunquam accidit, ut inferius prope in medio unum viderim. Nuper quoque unum sub ipsa ferme clitoridis glande suberat in quo brevis ductus in transversum positus definebat: quali, opinor, ductu ea forte matrona decepta est quæ sibi de clitoride semen profluere, cum Diemerbroeckio conquerebatur. Porro ea foramina quæ ab uno latere fossæ extant, neque ordine, neque loco, neque numero his quæ ex adverso posita sunt, magnopere solent respondere. Suntque item aliqua eorum quæ leviter prominent, alia quæ minime: atque in propatulo interdum sunt, interdum vero carunculis antrosum concidentibus illorum aliquot operiuntur; ut hinc quoque factum videatur, ut complurium Anatomicorum perspicaces alioquin oculos subterfugerint. Cuicunque tamen eorum vel crassiorem setam immittere nihil prorsus negotii est. In singulis namque ductus crassitudinis modicæ terminatur, longitudinis autem, & tendentiæ disparis, sic ut alii sursum vergant, alii deorsum, alii apicem auricularis digiti transversim adæquent, alii excedant, contra alii infra hanc longitudinem sint. Ex his autem ductibus qui a lateribus medii sunt, unum ab utroque latere aliquoties vidi qui ad glandulam subrotundam pertingeret magnitudinis non contemnendæ, inque eo loco constitutam qui locus a Casparo Bartholino indicatus est. Erant intra glandulam, quasi receptaculi & pelvis loco, plures vesiculæ sive cellulæ altera in alteram apertæ quæ limpidi humore redundabant: ex his illi ductui initium erat. Sed neque vesiculas, neque ipsas potui glandulas in omni cadavere comperire. Etsi vero nulla mihi glandula, nulla vesicula apparere solet unde ductus cæteri exoriantur, semel tamen inter infimam vaginam, & anum duas cellulas vidisse memini quibus de cellulis unus, atque alter inferiorum ductuum proveniebant. Solent ductuum eorum occasione duo vaccina vasa commemorari quorum bina pariter plerunque orificia, aperta vagina, super ipsa extrema urethra conspiciuntur. Hæc mihi non in vaccis modo, verum & in ovibus apparere: nec fortasse in aliis ejusmodi brutis desiderantur.

32. Sicuti vero inter dissectionum Magistris convenit, ex hisce ductibus qui ad vaginæ orificium sunt, salax illud serum quod perperam vocatum est semen mulierum, profilire, sic non immerito inter eosdem dubitatur, num aliqua feri ejusdem portio ab ipsa quoque cervice uteri corripitur. Cum ergo Hornius (c), itemque Graafius

(d), & præterea qui utriusque auctoritatem sequuntur, pituitosum ejusmodi serum ex cervicis uteri foraminulis elici posse, proposuerint; contra alii, in quibus esse animadverto Verheyenium (e), atque Bergerum (f), glutinosum & viscidum succum ex iisdem porulis prodire, testantur; additque ille, credibile esse, hoc ipso, non alio, glutine in his omnibus quæ utero gerunt, internum, ut notum est, matricis osculum impediri. Sed rursus Professores alii existunt qui, ut glutinosum ibidem succum agnoscant, hunc tamen a cervice uteri destillare, non concedunt. Namque alterum memini legere qui ejusdem prorsus rationis mucum & in Falloppianis tubis, & in superiore utero inesse, tradat, ita uti ipsius origo multo altius repetenda videatur; alter (g) vero infra uteri orificium esse, ait, plexum glandulosum, & subrubentem, mucosumque, ubi comprimitur, manantem: per hunc, quamvis fortasse non æque semper conspicuum, eam viscidam lentamque mucilaginem separari. Neque hic videtur prætermittendum quod Cl. Sodalis Novæsius (h) ante hos quinque & viginti annos in uteri orificio observavit. Huic nimirum parva quædam peculiaris seminis inesse conceptacula, quod semen ei quidem quod in virilibus paratur testibus, colore, & consistentia respondeat, quodque ex subrotundis tuberculis, expressionis vi in exteriori ejusdem osculi membrana excitatis, per foraminula quædam prorumpat. Et hæc quidem omnia legenti mihi comperta sunt. Dissecanti autem ad hunc modum observatum est. Sive ego mulierum, seu vaccarum uteros secem, eadem mihi quæ innumeris quoque Professoribus, lenti muci, & limpidi, nisi quod ad flavum nonnihil vergit, in summa vagina, itemque in cervice copia occurrit. Qui autem succus in suprema cervicis parte est, reliquoque utero, quippe est in tubis Falloppianis, is vero mihi satis dissimilis videri solet; ut illius propterea descripti muci scaturigines & fontes in ipsa cervice, osculoque uteri quærendos credam. Quos dum assidue perquiro, ecce quasdam vesiculas animadverto varia magnitudine, omnes vero subrotundas, aut ovales, internam prope totam cervicis faciem confertis agminibus obtinentes. Hæc non mihi primo observatæ sunt; namque eas ibidem sæpenu-mero comperiri, auctor olim fuit Graafius (i): quas postea Barlius (k), atque Ortlobius (l) confirmavere, & Præstantissimus quoque Littrius (m) observavit. Attamen suspicatus interdum sum, easdemne isti quas ego, vesiculas consideraverint, cum plerique eorum hydatides esse, judicent, addatque Ortlobius, eum qui inerat, humorem ab inflicto iisdem vulnere non sine saltu prorupisse. Ut ut est, certe ego lentum semper istum humorem, seu potius mucum esse, observavi, quem ex iis vesiculis multum exprimo, quemque sicuti cum liquore hydatidum quæ circa testes, tubasque occurrebant, aliquando comparatum, magnopere inveni dissimilem, ita ejus muci qui in cervice, & summa vagina est, nunquam non simillimum animadverto. Porro ex vesiculæ nunc plures, alias pauciores intimæ cervicis tunicæ sunt intertextæ, ita uti ex altera parte in cervicis cavitate promineant, ex altera intra ejus substantiam se se recondant. Et vesiculæ quidem in plurimis hæc sunt. Minus sæpe autem in suprema cervice, circumque uteri orificium inveni, etsi aliquando hoc ipsum vidi confertissimis earum agminibus exornatum. An autem in hisce partibus, inque tota etiam cervice, quando nempe in hac quoque desiderantur, multo ex vesiculæ sint minores, anne potius alte intus conditæ sint, merito aliquis

Anat. l. I.  
c. 26.

T. 3. \*\* &  
Lit. H.

De Ovar.  
Mulier.  
Vid. Adv.  
IV. An.  
35.

De fontibus  
cujusdam  
muci  
ad cervicem  
uteri  
occurrentis.

T. 3. Lit.  
L. L.  
Vid. Adv.  
IV. An.  
39. 40.

(a) De Ovar. Mulier. (b) Traité du Fœtus par M. Tauvry, & Anatomie Raisonnée. Vid. etiam Zodiac. Medic. Gallic. A. 1680. M. Mart. &c. (c) Prodrom. (d) De Mulier. Organ. c. 8. (e) Corp. hum. Anatom. tr. 2. c. 23. (f) Physiolog. Medic. l. 2. c. 1. (g) Cl. scilicet Joh. Jacobus Harderus in Apiar. obs. 58. in schol. & alibi. (h) Zodiac. Medicogall. 1681. M. Februar. & Lettres de G. Desnoues, &c. p. 70. (i) De Mulierum Organis c. 8. (k) Les Nouvelles Découvertes, &c. Tom. 3. l. 2. c. 2. (l) Histor. part. & æconom. &c. Dissert. 34. (m) Mémoires de l'Acad. Roy. des Scienc. 1701.



quis suspicetur : Ego quidem ex uteri osculo , nullis apparentibus exterius vesiculis , multos circumquaque globulos descripti muci aliquando expressi , vidique præterea vesicas aliquot intra cervicis ipsius substantiam penitus latentes : quas & Cl. Meryum ( *a* ) intra osculi uterini substantiam comperisse , non ignoro : suntque eadem facile ea seminis conceptacula quæ nimirum ex Sodalis exercitatissimi observatione paulo ante referebam . Quæ cum ita sint , vestra est peritiæ , Academi- ci , utrum eæ vesiculæ sint veræ hydatides , judicare . Ego sane non multum ab eo absum , ut esse glandulas , concipiam , unde is lentus & glutinosus mucus destillet qui præter cæteras quas alibi attigimus , utilitates , hanc etiam præstet , ut in prægnantibus ; sive ea concepti seminis vis sit , sive primo contractum , ut multi volunt , ipsius uteri orificium morari cogat , atque conerescere ; certe longe densior & spissior factus , cum postea ulterioribus gestationis mensibus orificium id deducatur , subeuntis aeris injurias opportunissime defendat . Ceterum an ad muci ejusdem separationem is quoque glandulosus plexus conducatur quem aliqui infra uteri orificium statuunt , me vero nunquam animadvertisse , confiteor ; inprimis autem , an eæ vesiculæ sint hydatides , anæ sint glandulæ , vestrum , ut dixi , judicium facio ; ego in re hac nihil adhuc certi propono .

num. 14.

De Men-  
struorum  
scaturigen-  
e .T. 3. Lit.  
M. M. M.

33. Super menstruo cruore quavis causa , & quo modo fluat , varia a Philosophis , & Medicis ; unde vero prodeat , non minus varia a Medicis , & Anatomicis disputantur . Sunt namque aliqui rem prorsus abditam , atque incertam esse , con- fidentes : quo in numero sunt celebris Vir Tau- vryus ( *b* ) , & Medicus longe eruditissimus Hieronymus Mercurialis . Municeps meus ( *c* ) . Con- tra alii doctissimi homines , & in his Realdus Co- lumbus ( *d* ) , Carolus Piso ( *e* ) , & præterea Rolfincius ( *f* ) , Cochburnius ( *g* ) , Bohnius ( *h* ) , Verducus ( *i* ) , Ortlobius ( *k* ) , & nuper quo- que , ut modo cæteros prætermittam , Joh. Go- thofredus Bergerus ( *l* ) eum cruorem non e fun- do uteri , sed e vagina destillare , ceu exploratam rem compertamque pronunciare . Et revera Pi- so , Bergerus , Verducus , Bohnius se se ipsos in earum cadaveribus quæ sanguine adhuc profluen- te decesserant , ita comperisse , testificantur . Ad- ditque præterea Bohnius , super Vesalium , atque Highmorum qui se vidisse oppositum tradunt , certe Professorum esse neminem qui luculentis ob- servationibus istorum dicta confirmaverit . Tum eorum vim quæ iidem conspexerant , sicut est in- genio , & doctrina ornatissimus , contrariis ratio-

num momentis elevare non prætermittit . Ex ad- verso tamen præter hos duos longe nobiles Ana- tomicos quos contra a Bohnio dictum est , Adria- nus Spigelius ( *m* ) , Regnerus Graafius ( *n* ) , Petrus Dionisius ( *o* ) , & ; quoniam perspicuæ observationes requiruntur ; Exercitatissimus Lit- trius ( *p* ) celebri non ita pridem allata sectio- ne , aliisque aliquot indicatis , ab uteri ipsius pa- rietibus cruorem menstruum prodire , arbitrantur . Cum quibus me quoque facere repetitæ observa- tiones compellunt . Cum enim virginis quæ , men- struo sanguine profluente , interierat , itemque u- nius , & alterius mulieris quibus is fluxus paulo ante obitum aut fuisse , aut certe instituisse vide- batur , genitalia , annexasque partes annis superio- ribus dissecuerim , postquam illum qui utero , va- ginæque inerat , sanguinem , ichoremve sangui- neum ablui , atque abstergi , jussissem , hæc sedula inspectione observavi . Neque in vagina , neque in cervice quidquam erat quod cruorem ex earum parietibus prodire , significaret . Contra autem u- niversum uteri fundum in ea cui sanguinem de- fluxisse , constabat , in reliquarum vero altera o- mne fundum , ejus suprema parte excepta , in al- tera autem & totum fundum , & proxima cervi- cis pars sanguineis undique maculis distingueban- tur . Ex quibus maculis vel mediocri expressio- ne cruentas guttas elicere nihil prorsus negotiū erat . Id cum in cervice , aut in vagina pari ex- pressionis vi tentaretur , nihil omnino proficieba- tur . Illud præterea adjiciendum est , me in plur- rimum postea cadaveribus quibus fortasse non ita pridem sanguis menstruus profluxerat , non in va- gina , non in cervice , sed in eodem uteri fundo similes , at multo dilutiores , maculas conspica- tum , ex his subcruentas guttulas eadem ratione prolucuisse ; ut facile intelligeres , ea loca scaturi- gines & fontes esse unde vis cruoris statis tempo- ribus profunderetur . Neque tamen negabo , de ipsa quoque interdum vagina cruorem menstruum depluere , ab Highmoro ( *q* ) , Diemerbroeckio ( *r* ) , Graafio ( *s* ) inductus quos sentire eadem , non ignoro , inprimis vero tantorum Hominum auctoritate & fide compulsus qui se quidem , ut ante docebam , sic observasse , testificantur .

34. Atque hæc , Sodales , in præsentia sufficiat ex meis Adversariis Anatomicis prælegisse . Jam enim omnia confecisse videor quæ ab initio exe- qui constitueram , ut quædam ab nemine adhuc proposita , ut quædam his temporibus fere obso-leta , ut super quibusdam rebus de quibus aliter ab aliis traditum est , quid observatum mihi esset , cum Academia communicarem .

Vid. Adv.  
IV. An.  
27.

( *a* ) Histoire de l'Acad. Roy. des Scienc. 1701. ( *b* ) Traité du Fœtus . ( *c* ) Prælection. Pisan. de hom. ge- nerat. ( *d* ) d. Re anat. l. 6. & 11. ( *e* ) Observation. &c. ( *f* ) Ordo , & meth. generat. dicatar. part. P. 2. c. 25. ( *g* ) Œconom. corp. anim. ( *h* ) Circul. Anat. Progymn. 16. ( *i* ) Traité de l'usage des parties , &c. Tom. 1. c. 16. ( *k* ) Hist. part. & œcon. &c. Dissert. 19. ( *l* ) Physiolog. Med. l. 1. c. 20. ( *m* ) De hum. corp. fabr. l. 8. c. 20. ( *n* ) De Mulier. Organ. c. 9. ( *o* ) Nouvelle Anatomie Demon. 4. sect. 2. ( *p* ) Memoi- res de l'Academ. Roy. des Sciences 1702. ( *q* ) Corp. hum. Disquis. anat. l. 1. P. 4. c. 4. ( *r* ) Anatom. l. 1. c. 25. ( *s* ) De Mulierum Organis c. 9.

## Adversariorum Anatomicorum I. Finis.



# FIGURARUM EXPLICATIO.

## T A B U L A I.



Xhibet laryngem, & tracheam, id est asperam arteriam, una cum œsophago, & lingua, thyroidæ glandula, nonnullis musculis, atque altera omoplata, omnia fere ab anteriore parte aspe-  
cta.

- A. A. Cartilago scutiformis.
- b. Altera ex ejus Prominentiis de quibus num. 6. Altera autem in Fig. 1. Tab. II. ad lit. b. evidentius in conspectum datur.
- C. Epiglottis.
- d. Ligamentum ejusdem Medium.
- e. Alterum ex ejus Ligamentis Lateralibus.
- F. Arteria Trachea, & nonnulla bronchiorum pars secundum eorum longitudinem aperta, ut conspici possint interni eorundem longiores Lacerti, atque inter hos hiantia excretoria oscula earum glandularum quæ in Tab. II. Fig. 1. ad lit. O. delineantur.
- G. Œsophagi portio, cujus, ad literam
- h. Superior pars, sive Pharynx, quatenus necessarium est, indicatur.
- i. Ossis hyoidis cornu alterum.
- K. Lingua, & glandulosa expansio ejus radici superinducta, ad cujus expansionis anticos limites occurrit frequenter

- l. Foramen de quo num. 8. quemadmodum fuit in eo cadavere unde hæc Tabula descripta est. Cætera autem quæ in lingua hac exhibui, cum nihil ad hæc Adversaria spectent, hic propterea non explicantur. Quod & de partibus nonnullis subjectæ scapulæ, aliisque similibus, si quæ forte & in ulterioribus occurrent Tabulis, prædictum volo.
- M. Thyroidæ glandulæ alter Lobus; namque alter tribus explicandis musculis non est, consulto, denudatus.
- N. Isthmus, ut vocant, ejusdem glandulæ.
- o. Appendix ipsius glandulæ sursum producta, re-  
luti erat in hoc cadavere.
- p. p. Musculi cricothyroides, seu maris thyrocricoides.
- q. q. q. Musculi Sternothyroides, quorum dexteri maxima pars consulto amputata est.
- r. Alter ex Hyothyroidibus Musculis.
- S. Alter ex Musculis Sternohyoidibus.
- T. Alter quoque Coracohyoides Musculus; sic Anatomicis vocitatus, quanquam non inseritur in ullam partem ejus scapulæ processus qui
- V. Coracoides appellatur; sed trans hiatum ejusdem scapulæ qui a Vesalio, aliisque
- x. Sinus instar semicirculi vocatus est, infigitur in
- Y. Scapulæ ejusdem costâ superiore.

## T A B U L A II:

FIGURA I. ostendit laryngem, nonnullosque ipsius musculos, musculos quoque sternohyoides, atque item tracheam arteriam, ac prima bronchia, glandulasque, & fibras istorum quoddam, & omnia quidem a tergo spectata.

- A. A. Cartilago scutiformis.
- b. Altera ex Prominentiis ipsius, quarum altera in Tab. præcedente ad lit. b. indicata est.
- C. Cricoides cartilago.
- d. d. Summitates processuum superiorum utriusque arytenoidis cartilaginis.
- e. e. Utriusque glandulæ Arytenoidæ summa pars.
- F. Epiglottis cartilago.
- g. Summitas alterius Ventriculi laryngis, veluti erat in hoc cadavere; sunt enim Ventriculorum Appendices alias majores, alias minores; ut hinc quoque fieri videatur, ut natura alii graviore, alii acutiore voce sint, juxta ea quæ num. 16. sunt proposita.
- h. Alter ex musculis thyroarytenoidæis, ejusdem Ventriculi infimam regionem amplectens, qui ablati cricoarytenoidæo laterali, ex parte in conspectum venit.
- i. i. Musculi cricoarytenoidæi postici.
- k. Arytenoidæarum fibrarum posteriores, sive exteriores, sicut in cadavere hoc inveni.
- l. l. Os hyoide.
- M. M. Musculi sternohyoides.
- n. n. Eorundem tendineæ Inscriptiones, sive Aponeuroses.
- O. O. O. Tracheæ Arteriæ, & primorum in quæ hæc diducitur, bronchiorum magnum qua annuli cessant, interstitium exteriore tunica detracta, ut subjectæ statim Glandulæ, quales fuerunt in hoc homine, appareant, vasis sanguineis irrigatæ. Harum vero excretoria oscula in 1. Tabula sunt descripta sub lit. F. Separata autem est in

summa arteria, & deorsum ducta illa, ut sic loquar, tunica, cui glandulæ propositæ intertextuntur; ut interiores

p. Fibræ carneæ transversæ conspici queant.

FIGURA II. proponit laryngem secundum ejus longitudinem posterius sectum, atque expansum, quo multa intus conspicienda apparere possint.

- A. A. Scutiformis cartilago.
- B. B. Cartilago cricoides, in cujus sectionibus cellulæ, sicut in hoc homine occurrere, in conspectum dantur.
- C. Epiglottis cartilago.
- D. D. Arytenoides cartilagines.
- E. E. Glandularum Arytenoidæarum Crura longiora; breviora enim latent sub Ligamentis superioribus statim explicandis.
- f. f. g. g. Ligamenta quibus arytenoides, & thyroides inter se connectuntur, superiora, atque inferiora.
- h. h. Ventriculorum laryngis orificia.
- I. I. Prima tracheæ arteriæ cartilago ea figura, & latitudine qua mihi sæpius inventa est. Conspicua autem sunt in tunica & hanc cartilaginem, & sequentem, itemque cricoidem, epiglottidem, & c. obvelante excretoria subjectarum glandularum foramina.

FIGURA III. pars est præcedentis Figuræ antrorsum inclinatæ; epiglottide deorsum vi tracta & reflexa, ut ea ratione orificiis Ventriculorum dilatatis, initia Appendicum eorundem a. a. in conspectum veniant.

FIGURA IV. Ventriculi sinistri laryngis, sicut in cadavere isto occurrit, magnitudinem, & figuram proponit.



FIGURA V. demonstrat epiglottidem per medium ferme secundum longitudinem ejus dissectam, ea ratione ut omnia quæ num. 3. de cartilagine eadem traduntur, hac inspecta sectione conspici queant.

- a. Epiglottidis facies concava, quæ & posterior, sive interior, foraminibus excretoriis pertusa.
- b. Cartilaginis ejusdem substantia illis foraminulis, seu parvis tubulis, & majoribus præterea hiatibus pervia, illisque etiam foveis in utraque facie excavata, & veluti corrosa quæ præd. num. 3. memorantur.
- c. Epiglottidis glandula per utramque illius superficiem extensa, cisque foveis excepta, atque illis hiatibus in utramque partem transmissa de quibus modo indicatum est.

FIGURA VI. exponit Articulationem unam cricoidis cum arytenoide, hujus item cavitates, glandulam quoque unam Arytenoidæam, &c.

- a. Cricoidis ab anteriore parte despecta, & per medium secundum altitudinem ejus discissæ portio dextera.
- b. Dexteræ quoque Arytenoides, quæ eo usque extrorsum retrorsum inclinata est, ut possit
- c. Ejus Sinus conspici per quem, &
- d. Capitulum in cricoide extuberans, Articulatio efficitur. Ea vero tenuis lacinia qua capitulum hoc interius ambitur, illa nempe est quæ mihi ex mucilaginoso constare glandulis reputatur.
- e. Arytenoidis processus superior.
- f. Ejusdem processus inferior.
- g. Una ex cavitatibus anteriori arytenoidis faciei insculptis, quibus parte sua posteriore alte excipitur
- h. Arytenoidæa glandula, quam extractam hic propono.
- i. Glandulæ Arytenoidææ Crus brevius.
- k. Crus ejusdem longius.
- l. Columella intrinsecus secundum hujus cruris longitudinem ducta.

T A B U L A III.

O Stendit muliebres partes generationi infervientes per medium posterius secundum longitudinem earum discissas, atque explicatas.

- A. A. Pudendi Labia deorsum extensa.
- b. Glans clitoridis.
- c. Ejus præputium.
- d. Summa pars Suspensorii clitoridis, & labiorum ligamenti quod ea parte, ossi pubis innestebatur qua ex parte d. littera posita est.
- e. Nymphæ propriis Sebaceis glandulis obsitæ naturalibus vix aliquanto evidentioribus.
- f. Meatus urinaris circa quem oscula occurrunt earum lacunarum quæ ad glandosum corpus pertinent quo urethra ambitur. Hujus autem corporis prominentia, seu protuberantia de qua num. 13. recta supra meatum conspicua est.
- G. G. In eadem fere linea in qua meatus urinaris, sive in ipso vaginæ orificio explicatus Hymen ostenditur, & ante hunc alia oscula, lacunarum scilicet Fossæ muliebris, sicut in cadavere hoc inveni, quarum unum vel alterum ductum delineatione subindicavi. Porro
- \*\* Extrema sunt ductuum earum Prostatarum quæ Casp. Bartholini appellantur.
- H. Earundem una extracta, & cum inclusis vesiculis adaptatis, continuatoque ductu seorsum ostensa.
- I. I. Vagina, in qua rugæ non quidem circulares, sed certis in locis cessantes: eademque exiguis prominentiis crenatæ quas papillas dices & in

- hac, & in aliis minus attritis, scilicet magis naturalibus, Vaginis conspicuas.
- k. Uteri osculum.
- L. L. Cervix Uteri, & in ipsa Vesiculæ de quibus num. 32. persæpe occurrentes; Valvula item de quibus num. 14. in hac atque in aliis integrioribus uteri cervicibus obviæ, & deorsum quidem conversæ.
- M. M. Fundum Uteri, & in eo macula, ut licuit, subindicatæ, quales in virgine, fluente adhuc menstruo sanguine, ex capitis ictu demortua, alias mihi conspectæ sunt.
- n. n. Tubarum Fallopii illa extrema quibus in angulis Uteri supernis hiant.
- o. o. Testiculorum ligamenta; quibus Tubarum partes Utero proximæ, ut quæ antea subsistebant, necessario in hac Figura obductæ sunt.
- p. p. Testes, sive Ovaria: quorum dorsum postquam Tubæ conscenderunt, deorsum post ipsos se se demittunt, infraque eos orificiis propendent alias sursum, scilicet eosdem versus testes, alias vero deorsum spectantibus; ut in hac, aliisque mulieribus observatum mihi frequentius est.
- Q. Q. Tubæ eo positu delineatæ quem modo frequentius mihi observatum dicebam.
- Ligamenta autem Uteri rotunda, & lata ex his rebus sunt quæ hic indicare nihil attinet. Quæ de re, & majoris etiam perspicuitatis Figuræ causa latorum ligamentorum pars multo maxima amputata est.

T A B U L A IV.

FIGURA I. demonstrat palpebras oculi dextri a posteriore sive interiore parte aspectas, glandulasque earundem a Meibomio propositas, a me vero inter Sebaceas recensitas, carunculam præterea, punctaque lacrymalia, meatusque quibus hæc ad nasum pertingunt.

- a. a. a. Palpebrarum interior tunica.
- b. Cilia.
- c. Tarsus superior, & in hoc ejus glandulæ Sebaceæ quæque in proprium foraminulum ad limbum palpebræ desinentes.
- d. Tarsus inferior, & in hoc pariter eæ glandulæ.
- e. e. Puncta Lacrymalia, singula in peculiari prominentia insculpta, & in suos Meatus producta.
- f. Major Ductus in quem duo illi Meatus conflunt. Porro oblongum illud tuberculum, quod inter Meatum utrumque proponitur, Caruncula Lacrymalis dicta est, retrorsum, atque extrorsum revoluta, iis tuberculis minimis instrata unde tenuissimi, brevesque prominent pili de quibus num. 12. & 22.

Morgagni Adversaria Anat. I.

- g. Ductus ejusdem Majoris extremum, in nasi cavitate, cujus tunica portiuncula circum relicta est, apertum.

FIGURA II. Muliebris mammæ papillam, circumpositamque areolam repræsentat, per quam ea tubercula, sive eæ glandulæ Sebaceæ disseminantur de quibus num. 12.

FIGURA III. Aortæ initium exponit, vase secundum ejus longitudinem secto, atque explicato, quo valvulæ ejusdem, & in his corpuscula quædam, & fibræ conspiciantur, de quibus num. 19.

- a. a. a. Corpuscula quæ qualia in cadavere hoc erant, singula in singularum valvularum occurrunt limbo, fibra tendinea firmato.
- b. b. b. Valvularum fibræ carneæ quarum aliquot ad Corpuscula pertingunt.
- c. c. Arteriarum coronariarum initia.



FIGURA IV. demonstrat penem paulo interius a corpore abscissum, & ferme resupinatum, ut in aperta urethra hujus Foramina, seu excretoria peculiarium canaliculorum oscula, aliaque hujusmodi conspici queant: Suspensorium quoque ejusdem penis ligamentum, continuatamque huic tunicam, nec non Sebaceas coronæ glandulas repræsentat.

A. A. Spongiosum urethræ corpus secundum ejus longitudinem inferius cum tota urethra per medium discissum, & ad latera utrinque diductum; ut conspici interna urethræ facies possit, & in hac primum ab littera

B. usque ad

C. Majora quædam peculiaria Foramina in media superiore urethræ parte in eadem recta linea secundum longitudinem ejus disposita eo loco, numero, figura, ac magnitudine qua in hoc cadavere conspecta sunt. Ut vero unus saltem ex Canaliculis qui singulis Foraminibus continuantur, ejusque interioris faciei parva foraminula conspici queant; ex adverso litteræ

D. Eorundem Canaliculorum fere maximus per longum apertus est, & diductus. Erat autem istius

osculum, sive Foramen contra eandem litteram D. Porro conspicua etiam sunt præter ea majora Foramina, Foraminula alia minora, passim per eandem urethræ faciem occurrentia: quorum nonnulla quod a retenta materia turgent, subrotundorum corpusculorum alicubi speciem præbent.

E. Suspensorium penis ligamentum, quod ossi pubis ea sui parte innectebatur a qua parte E. littera apposita est.

f. f. Tunica penem succingens ab eodem ligamento producta, sive eidem continuata.

g. Hujus pars tunica a superficie corporum penis nervosorum separata, & deorsum retracta.

H. Præputii retrorsum ducti pars. In hac autem conspicuum est

i. Frenum, & nonnulla glandula statim explicanda, etiam super ipso freno & in hoc cadavere, & in aliis a me conspectæ.

K. Corona penis, ejusque glandula Sebacea (appello namque juxta observationem Cl. Littrii qui has primus, quod sciam, descripsit: quanquam alius ex Academia nostra Anatomicus se multo antea novisse, confirmat) sicut in hujus penis corona disponebantur.

F I N I S.





JO. BAPTISTÆ  
MORGAGNI  
ADVERSARIA  
ANATOMICA ALTERA.  
OBSERVATIONES COMPLECTUNTUR  
DISTRIBUTAS  
IN L. ANIMADVERSIONES

*AD LIBRUM I.*

THEATRI ANATOMICI  
CL. V. JO. JACOBI MANGETI

SERENISS. REGIS PRUSSIÆ ARCHIATRI.



VENETIIS,

MDCCLXII.

~~~~~

EX TYPOGRAPHIA REMONDINIANA.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

JO. BAPTISTE

MORGAN

ADVERSARY

AND TOMMY ALLY

OF THE AMERICAN

REPUBLIC

IN THE AMERICAN

REPUBLIC

THE AMERICAN

REPUBLIC

OF THE AMERICAN



AMERICAN

REPUBLIC

OF THE AMERICAN

REPUBLIC

OF THE AMERICAN

Illustrissimis atque Excellentissimis Viris
 HIERONYMO VENERIO EQUIITI,
 FRANCISCO SUPERANTIO,
 LAURENTIO THEUPOLO EQUIITI
 Ædis D. Marci Procuratoribus, & Rei
 Litterariæ Triumviris,
 TOTIQUE TRIUMVIRUM LITTERARIORUM
 ORDINI
 PRÆSTANTISSIMO

Joannes Baptista Morgagnus S. P. D.



UÆ dum Novam Institutionum Medicarum Ideam Vobis ,
 AMPLISSIMI VIRI, commendarem, in hoc ferme tempus pro-
 miseram, ea nunc Adversaria, verbo eadem, re autem longe alia ac putaveram;
 Vestro Inclyto Nomini inscripta edo. Post quæ siquis primos earum Institutionum
 libros expectat, non videtur is meminisse, me illos quidem hac conditione pollici-
 tum esse, dum ne interea esset aliud in quo potius a me elaborari, Vobis placeret.
 Placuit autem Vobis, atque adeo Augustissimo Senatui ad quem ea de re ante hos
 duos

duos annos retulistis, ut ab nobili ad quam primo vocatus fueram, Medicinæ Scho-
la ad multo ampliorem in Theatro Vestro Anatomico Locum transirem. Itaque est
mibi certe in animo, siquando possim, aliquam saltem earum Institutionum particu-
lam expolire, ut unus aut alter homo omnium (intelligo quid loquar; sed nolo in
quemquam gravius dicere) ut unus, inquam, aut alter nimis jejuno animo, & an-
gusto inde etiam aliquando discat assiduum, & a Principibus Viris probatum alio-
rum laborem imitatione dignum, non invidia existimare. Nunc tamen, ut & mibi
constem, & Vobis quibus proxime, & secundum Deum id debeo cum pro Vestra
excellenti, eximiaque Virtute, tum pro Vestris in me plurimis, maximisque Benefi-
ciis, obtemperem; quantum cura, studio, vigiliis eniti, atque efficere potero, &
quidquid temporis ex anatomicis non modo publicis, sed & privatis exercitationibus
eripiam, id omne eo conferam, ut nobilissimæ, & rei physicæ, ac medicæ apprime
utilis Scientiæ Anatomicæ Studiosi meis opusculis adjuventur. Qua in re si Vobis,
Vestrumque similibus, hoc est Sapientissimis, & Candidissimis Viris, velut adhuc pro
Vestra, atque eorum Humanitate contigit, satisfecero; satis uberem capiam fructum
industriæ meæ; deinde illi iidem quos dixi, homines vellicent quantum possunt, &
refragentur, non laborabo.

— „ Demetri, teque, Tigelli,






„ Discipularum inter jubeo plorare cathedras: „

Vos autem, VIRI AMPLISSIMI, hæc interim Adversaria qua soletis, Benigni-
tate excipite, & valete.

D. Patavio Nonis Octobr. MDCCXVII.



ADVERS. II. TABULA.





A D V. C L.

JO. JACOBUM MANGETUM

M. D. & Sereniss. Regis Prussiae Archiatrium.



LX QUO Patavii de Theatri tui Anatomici editione, V. Cl. auditum est, quæ mea fuerit de illo opinio atque expectatio, tum Auditores, Amicique norunt mei, quibus id tanquam absolutam totius Anatomies Ideam pollicebar, tum Vir Doctissimus, & utrique nostrum amicissimus Joannes Fantonus, ad quem sæpe, & diligenter de eodem scripsi, non ignorat. Nec sane aliter mihi videbatur existimandum. Nam ut illiusmodi Opus, quale & vulgata ejusdem inscriptio promittebat, magnum in rebus, vel certe in scriptis anatomicis usum, ingentes autem sumptus requireret; quis aut illum in eo non speraret qui se se antea in Bibliotheca Anatomica colligenda, ornanda, edenda semel, atque iterum exercuisset, aut his Cramerum, & Perachonium impares crederet? Igitur sic existimanti, summa eorundem optimorum hominum liberalitate Theatrum ipsum allatum est. Quo vix inspecto, ex typorum nitore atque elegantia, Tabularum autem copia, & magnitudine facile intellexi, tantum ab iis sumptus esse factum, quantum ad Anatomiam omni ex parte perfectæ editionem satis esset; sed neque a te curæ, & studii quidquam esse prætermisum, vel cursim primo, ut sit, lecta Præfatio confirmabat. Nam ut ex Operis inscriptione, non tantum integram totius corporis humani in suas partes, ac minutiores particulas evoluti, & quasi resoluti fabricam ex selectioribus Veterum, & Recentiorum omnium Observationibus relectam; -- verum etiam quicquid ad rei anatomicæ illustrationem pertinet, per -- Tabulas æneas -- niti, de explicatum, speraveram; sic ex iteratis in Præfatione promissis id tanquam factum gaudebam: Anatomicorum videlicet Inventa, omnia in unum Corpus esse collecta: -- & undique conquisitis Figuris, ex illis Tabulas confectas esse, -- ex quarum paulo diligentiori examine totius Anatomiae idea non parum accurata conquiri posset. Huc aliæ accedebant pollicitationes, non parvi faciendæ: illud te acturum, eo ordine qui maxime naturalis videatur: -- Auditorum vero Tractatus -- pro instituto complendo integros adhibiturum, aut ex iis saltem quicquid ad rem faciat, immutatis verbis excerpturum, ipsis honorem debitum intemeratum relinquendo; id enim multo satius tibi visum esse quam eos imitari, qui per se, & aliis innominatis, de omnibus differere volentes, aut levius ea perstringunt, aut etiam in plagii vitium incurrunt: -- Neque tamen Autoribus ita mordicus adhæsurum; quin sæpius ab iis

secedens, dogmata ab ipsis prolata modeste aliquid quando vellices, subjunctisque aliorum inventis vel illustres, vel etiam corrigas, -- non ommissis etiam in Tabularum explicationibus correctionibus, ac mutationibus necessariis. Quæ atque alia hujus generis in tua Præfatione cum legissem, & ad hujus finem jam pervenissem, post quem verbum illud addis de nonnullis, tuo Operi insertis, in quasdam ex meis Figuris Animadversionibus; a te mecum perhumane actum esse, existimavi, sive profitendo: illud nequaquam a te esse factum, ut rixas inter Viros Doctos, tibi quam maxime observandos, moveres; -- sed ut exinde pateret, accuratissimorum etiam Professorum Tabulas -- non Autorum suorum, sed Delineatorum, ac Sculptorum culpa erroneas esse, sive admonendo, id non in nostris modo Tabulis, sed & in multis aliis usu venisse, & in illis nominatim, quæ a Graafio, Willisio, aliisque publicæ luci expositæ sunt. Quod enim Viris in re anatomica exercitatissimis declinare minime licuit; cur ego graviter ferrem, si post tot denique annorum examen ostenderetur, id a me, cum eas Figuras edidi, admodum sane adolescente, declinari non potuisse? imo vero cur non potius tibi multum deberem, quod qua in re, hoc est in aliis *modeste corrigendis*, nullam peculiarem excusationem prætenderes, in ea re mihi nominatim te quasi excusatum atque purgatum esse, voluisses? præsertim cum, cæ Animadversiones a te non essent, sed ab eo homine cujus ego *Celeberrimo* nomini semper, ut opinor, parcam (utinam per tui nominis *Præclarissimi* auctoritatem ejus etiam scriptis parcere licuisset) ab eo, inquam, essent homine, qui cum, sicuti in loco ostendimus, nobilem Anatomicum Ridleyum, varia -- commenta perperam effinxisse, cum summum rerum Inventorem Malpighium, nil in hepate præter novi vocabuli introductionem innovasse, & ne magnos Viros Jo. Alphonsum Borellum, & Franciscum de le Boë Sylvium commemorem, quorum opiniones quasdam alterius quidem *insonnia* dixit, alterius autem, fabellas, vaniloquia, deliramenta, cum Recentiores denique, turpissima ignorantia obcæcari, & horum quidem pleraque in tuo Theatro, te silente, dictitaverit, non erat sane cur timeres, ne cum eo mihi rixa esset propterea quia in quibusdam ex meis Figuris nonnullos haud meos, sed Delineatorum, & Sculptorum lapsus, te excusante, sibi animadvertere visus esset.

Itaque omni hoc tibi asseveratione confirmare possum, V. Cl. eo me animo ad tuum Opus legendum cognoscendumque processisse, ut si hoc tuis

tuis pollicitationibus, veluti sperabam, atque optabam, respondere, aut etiam non longe ab iis abesse, intelligerem; meis Auditoribus, & quibuscunque præterea seu lingua, seu calamo possem, quod jam ante institueram facere, tanquam absolutam Anatomem ideam commendarem. Atqui ego a prima ejus pagina usque ad primi Voluminis extremam (illud enim aliquanto diligentius evolvi) & quantum præterea de altero Volumine, hanc illamve partem pervolutando, potui cognoscere, invitus comperi quod magis invitus dicam, non quædam, neque multa, sed plurima cum præclaris illis tuis promissis minime congruere. Nam, ut ab ultimis incipiendo ad priora revertamur, ita in Tabularum Explicationibus, correctiones, ac mutationes necessarias, omisisti, ut cum plurimas ex Bidloo Figuras describas, in has autem ipsas extent Clari in primis Anatomici Cowperi Explicationes aliæ accuratissimæ, utilissimæ, ac prorsus necessariae; tu non modo quidquam ex his non afferas, sed hujus totius (quod tamen est maximum) Cowperi Operis vim, institutum, & pulcherrima quæque ignorare videaris. Quid autem tu ipse in earum, cæterarumque ejus generis Figurarum Explicationibus præstiteris, facile intelligunt ii qui vel solas XXVIII. & XXI. ex proximis Animadversionibus legent. Non modo enim correctiones, & mutationes necessarias a te esse omisissas, cognoscent; sed novas insuper, gravesque hallucinationes additas esse, perspicient; tantum sæpe abest, ut, quæ ex tuis Auctoribus protulisti, aliorum inventis vel illustraveris, vel etiam correxeris. Quæ autem ratione, plagii vitium, declinaveris, ego quidem non satis intelligo, cum vel Auctoris omnium manibus contriti Verheyenii nonnulla Capita, ut de Membrana Musculosa, ut de Venis, ut de Membranis, & Ligamentis, ut de Renibus, & Uteribus, in tuorum Librorum primi videlicet Cap. III. VIII. XI. secundi autem Cap. pariter XI. ferme tota, non ex ejus nomine, quod aut retices, aut non ea qua par fuisset, ratione memoras, sed ex ejus verbis, quorum multa ne mutas quidem, agnoverim. Illud vero sæpius miratus sum præsertim in Tabularum Explicationibus cum alienis, tum etiam nostris, te, ut tibi visum est, alia verba addidisse, alia omisisse, alia permutasse, idque nullo (ne in Indice quidem Capitum, ut alioqui institueras) facto ejus rei indicio, eodemque modo in exhibitis Auctorum Opusculis cum horum divisionem in Capita semper, Præfationes autem, haud raro utiles, fere semper, tum aliquot interdum Capita, plures nonnunquam Figuras, ut Graafii nominatim, & Valsalvæ, prætermisisse. Quibus ex rebus efficitur, ut Lectorum multi tuo isto silentio, imo illa pollicitatione inducti: te, Tractatus integros adhibiturum, aut ex iis saltem quicquid ad rem faciat, immutatis verbis excerpturum; credituri quidem sint, se aut illos integros, aut partem certe eorum immutatis verbis habere; num autem habeant, tunc maxime sentient, cum aut quædam producta ab aliis loca perquirent, aut quædam ipsi eorum qui vivant, producent. Nam quod, eum ordinem qui maxime naturalis videatur, non selegeris, neque hunc eundem quem selegisti, constanter tenueris, & ex aliis, & ex ipsa etiam I. Animadversione satis patebit. Porro ex Tabulis a te collectis, quæ, obsecro te, totius Anatomiae idea non parum accurata conquiri potest, aut qua ratione, quicquid ad rei anatomicae illustrationem pertinet, nitide per ipsas explicatur; cum multis in Figuris multa tui Scalptores, te silente, omiserint, aut, minime servata proportione, delineaverint? quod ex his quidem Adversariis in Tabulis præsertim nobilis Anatomici Vieussenii, ex cæteris autem & in aliorum, & in meis ipsis Figuris ab iis factum esse, planum fiet; cum quædam Corporis humani Partes, ut, exempli causa, Mesocolon, Musculi Triangulares, Costarum Levatores, An-

conæus, Recti majores antici Capitis, Occipitales, alique plures; ne Sinus Pituitarios, Frontalibus exceptis, omnes hic memorem; tuis in Tabulis sint prætermisissæ? cum denique in iisdem, in iisdem, inquam, de quibus tu loqueris, ne unam quidem Figuram inveniam in qua aut Renes, aut Cor, aut Pulmo, aut Vasa magna suis in sedibus ostendantur? Postremum est, idemque gravissimum, te qui, integram totius corporis, humani in suas partes, ac minutiores particulas evoluti, & quasi resoluti fabricam ex selectioribus Veterum, & Recentiorum omnium Observationibus retectam, in hoc Opere promiseras, primum in selectu ipso ita esse hallucinatum, ut pro Malpighii, Cowperi, Littrii, aliorumque hujus ordinis Anatomicorum Descriptio- nibus nullo modo prætermittendis verba nobis obtruseris novi cujusdam Scriptoris qui Cowperum, ut ipse fatetur, non legit, Malpighium autem, ut ego ostendam, non intellexit; deinde pluribus, iisque omnino memorandis aut Anatomicis, aut certis Anatomicorum libris usum non esse; sunt enim alii quos ego pro re nata commemorabo, fere etiam omnes addendi quos Heisterus iterum ac tertio a te omisos notat in Præfatione ad Compendium Anatomicum ad me pridie Kal. Septemb. dum Animadversionibus in Theatrum tuum plerisque absolutis, hæc scriberem, a Cl. Auctore allatum, qua etiam die ab Amplissimo Inclytæ Academiae N. C. Præside Luca Schiöckio ejusdem Observationum Centuriæ V. & VI. redditæ sunt: quam diem adscribere hic volui, ne siqua forte in iisdem Animadversionibus occurrant aut generatim adversus Verheyenium, aut speciatim de Valvulae Intestinalium, Mammarum, & Cerebelli structura cum Heisteri castigationibus, & observationibus aliqua ex parte congruentia, iis ex libris sumpsisse aliis videar quæ ante multum tempus me non modo scripsisse, sed & ipsis indicasse, atque ostendisse, mei Auditores non ignorant. Ceterum ut nunquam mihi injucundum erit, in quæ Solers ille Anatomicus inciderit, in eadem me incidisse, ita in præsentia valde lator, quod cum ipse quoque in calce Præfationis, se varia, præterea habere dicat circa hoc tuum Opus, adhuc monenda, minus Lectores mirabuntur, me præter ea quæ hæcenus monui, illud novissime addere: non paucas in tuo Theatro non modo Particulas, verum etiam Partes humani Corporis; ut vel in solis Musculis Animadversio XXI. satis ostendet; non describi, & plurima demum tam aliena a vero proponi, quam quæ alienissima.

Quæ cum omnia non sine summa admiratione in tuo Opere deprehendissem; intellexi, mihi pro officio, & pro amore veritatis longe aliter de ipso in posterum esse loquendum. Quod hoc ipso anno in tradenda Anatomie cum facere cœpissem sic tamen ut judicii mei rationem afferrem; ex eo tempore meorum Auditorum nonnulli postulare atque adeo pro suo jure flagitare non destiterunt, ut scripto aliquo edito, vitanda in illo Theatro loca indicarem. Hanc ego rem ut Tironibus, & plerisque aliis eo Opere usuris prorsus necessariam esse, cognoscebam, sic plures secum trahere difficultates, perspiebam: primum me in Alteris Adversariis scribendis jam occupatum, & valetudine hoc anno minus prospera utentem, non satis esse habiturum temporis, ut omnes ingentium horum Voluminum paginas excutere, & reprehensionem negligentiae apud multos vitare possem qui procul dubio ita dicerent: de illo errore nihil scripsit; hallucinationem istam non animadvertit; hanc omissionem non attigit. Quam tamen difficultatem ita declinari posse, vidi, si pleraque eorum quæ in Adversariis scripturus eram, inter has Animadversiones scriberem, hæcque ipsas Adversaria inscriberem; qua videlicet inscriptione quasi confessione quadam mea apud omnes intelligentes, & æquos homines constaret, me non aliud in hisce angustiiis temporis mihi

sumpsisse, nisi ut in quæ, in pervolutando tuo Theatro forte incidissem digna quæ notarentur, ea tantum, iisque ipsis quibus statim potui, verbis indicarem. Alterum erat, idque multo gravius, quo ab eo scribendi genere retrahebar, me quo non facile alter vivit magis ab aliorum reprehensione & natura, & voluntate, & vitæ institutione remotus, contra Virum gratia, & auctoritate florentissimum repente aggredi ad scribendum. Quod tamen ipsum intellexi multiplici a me posse ratione, molliri; si nonnulla etiam ex tuis ultro probarem, & confirmarem; si, ut occasio ferret, aliorum quoque, qui ante scripsissent, & nominatim Verheyenii, lapsus notarem; si quæ in tuo Opere coarguerem, de iis ita ad te ipsum scriberem, ut tuum potius iudicium exquirere, quam interponere meum viderer, & si denique quidquid scripsissem, non ante ederem, quam & tecum communicassem, & tibi placere, perspexissem.

Jamque hoc animo sex vel septem primas Animadversiones conscripseram; cum omnes noti, ignotique, ut forte sermo de tuo Theatro exoriebatur, ita stomachari, & indignissime factum dicere; absentes etiam Amici fere omnes per litteras monere: in eo aperte id agi, ut ex meæ existimationis detrimento, si Diis placeat, alter crescat. Quid enim aliud sibi vellent in tanto Figurarum numero in meas dumtaxat appositæ Animadversiones? Num Figuræ aliæ omnes undequaque perfectæ? Imo plures prorsus rejiciendæ. Num meæ negligentius quam cæteræ, ex naturæ archetypo desumptæ? Imo vivere adhuc, & valere Bononiæ Michaellem Angelum Cavazzonum, & Franciscum Franciam, ita illum pingendi, hunc autem scalpendi peritos, ut non ignorent, in rebus anatomicis, naturæ potius, legibus, quam picturæ, esse intervendum: hos ambos, & Cavazzonum potissimum (longe enim major est in delineatione difficultas) testari apud eos posse qui mearum Figurarum aliquam cum vero, ut par est, conferre nescirent: illas omnes assiduo plurium hebdomadarum studio ex ipso naturæ exemplari descriptas esse, me semper, nec frustra quidem, præsentem, sed hoc modo, modo illud monente; nullam unquam lineam, nisi dimensionibus pluries ex archetypo desumptis duci, sinente; quæ ductæ erant, nisi prorsus cum eo congruerent, integralque adeo interdum Figuras meis manibus delente, ut dubitem, num quæ aliæ in toto isto Theatro sint Figuræ quæ majori Auctoris diligentia, atque adeo sedulitate ex vero descriptæ fuerint. Quod igitur Præfationi jam absolutæ seorsum de istis in me editis Animadversionibus additum esset, id Amici non dubitabant, non eo quidem pertinere, ut te mihi uni excusatum velles; quando in neminis præterea Figuras Animadversiones apposuis- ses; sed eo potius spectare, ut id seorsum, & extenso quasi digito iis etiam qui forte non adverterent, indicares. Te commentitiam, Delineatorem, ac Scalptorum culpam, aliis atque aliis quæ in iis Animadversionibus objiciuntur, & ad quæ legenda primo statim e limine Lectorem mit- tis, prætendisse: ejusdemque dissimulationis fuisse quod in *quasdam* ex meis Figuris eas Animadversiones esse, dixeris, quasi vero nescires, ita in omnes esse, ut ex hoc ipso Animadversionum istarum iniquitas intelligi possit; nam nisi de industria errare voluissem, in omnibus certe, non ita facile potuissem. In eo autem maxime tuam prudentiam desiderabant, quod cum diceres: illas Animadversiones, nequaquam a te esse editas; ut rixas inter Viros Doctos moveres, illud interea non videres, te ipsum alienas lites in te derivare vel quod eas Animadversiones (quas facile cum anatome nunquam contulisses) temere probares, dum a te editas esse, diceres, ut exinde pateret, accuratissimorum etiam Professorum, Tabulas non parum sæpius erroneas esse; vel quod ederes. Se enim minime dubitare, quin cum

meum esset de duobus Adversariis utrum vellem eligere, Auctoremne illarum, an Editorem, cumque Auctor ejusmodi esset, ut huc conveniret illud Taciti: „ & atteri fordidum, & vincere in- „ glorium; „ Editorem non feligerem.

Quæ cum sæpe Amici inculcarent; ego etsi istas Animadversiones interea (sunt enim omnes in altero Volumine) & cunctas, & diligentius perpenderam, ac pleraque eorum quæ Amici monebant, vera esse, perspexeram, atque ita mecum esse actum a duobus quos ne cogitando quidem unquam læsissem, imo dilexissem, atque observassem, non grave profecto esse non poterat; Amicis tamen referebam: istas Animadversiones (quod ipsi quoque fatebantur) ejusmodi esse, ut vel sine ulla responsione per se ipsas brevi concidere, atque interire, oporteret: mihi propterea esse in animo, cum cætera in Theatro tuo notarem, eas transilire, tum ne quis crederet, me non studio veri, sed eam ob causam in reliqua tot loca Animadversiones scripsisse, tum quia eo, sicut ipsi norant, ingenio essem, ut vel provocatus lites semper, & concertationes non minori contentione quam qua alii nonnulli videantur quærere, declinarem: illis ergo ommissis, cætera in quibus a te dissentirem, tecum esse, ut constitueram, communicaturum, & si tibi non displiceret, editurum.

Tum vero iidem Amici hoc primum negarunt, cum eo me communicare verum esse Animadversiones in ipsum edendas, qui Animadversiones in me vulgandas non modo mecum non communicaverit, sed eos omnes qui id mihi indicare potuissent, sedulo, ut videtur, celaverit. Deinde, nonnullis sibi adjunctis quorum consilium pro imperio esse mihi debet, illud quidem concessere: si istæ Animadversiones ab earum Auctore editæ seorsum essent, futurum fuisse instituto meo locum, ut silentio videlicet, ac dissimulatione confutarem. Cum vero tu, V. Cl. easdem & non obscure probaveris, & in tui Theatri luce præter omnium expectationem posueris, non esse mihi committendum, censuere, ut si de iis tacerem, vel auctoritatem tuam contemnere, vel causæ optimæ diffidere, vel ejus demum oblitus viderer esse Loci in quo me Augustissimi Senatus iudicium collocavit. Se igitur mihi esse auctores, ut non modo eas Animadversiones, tanquam tela a te conjecta, acriter repellerem; sed ut omnes intelligerent, qua cura, & diligentia, quanto veri studio, qua rei anatomicæ peritia, passim in tuo isto Theatro judicaveris, darem etiam atque etiam operam ut liberis, rebusque respondentibus verbis tuas tam crebras, tam graves, tam incredibiles hallucinationes in bono lumine collocarem, ne dum forte tibi parcerem, mihi primum, deinde & plerisque Lectoribus qui, nisi planissimis verbis iis veritas demonstraretur, non agnoscunt, nocerem. Neque enim mihi, dum priora mea Adversaria extabunt, testimonium esse defuturum quam longe alia ratione scripturus fuisset, nisi tu prior editis in me non modo iniquis, sed etiam contumeliosis Animadversionibus provocasses. Meam namque cum in omni vita, tum in scribendo moderationem modestiamque satis omnibus perspectam esse, ut liquid modo aut in alios acrius, aut de me elatius forte scribam, id omnes ab ipsa potius causa quam a mea natura esse, intelligant, neque id fieri asciscendæ laudis gratia, sed contumeliæ repellendæ.

Tuli graviter & acerbe in eum me locum esse adductum, ut aut meam consuetudinem atque institutum defererem, aut tantæ Gravium, atque Prudentium Amicorum, Fautorumque voluntati, imperioque adversarer. Itaque ex eo tempore cæteras Animadversiones ita scripsi, ut in aliis meam consuetudinem retinerem, in aliis ipsorum consiliis obtemperarem. Sic in XXI. Animadversione conscribenda, ipsis morem gessi; in multis aliis ejus generis omittendis, mihi. Etsi enim illa Animadversio præter Epilogi utilitatem alia etiam

etiam habet ob quæ fortasse, singulis tuis Capitibus absolutis, consimilem Animadversionem multi Lectores desiderabunt; tamen ut omnes intelligerent, me illam ipsam impulsam, coactumque scripsisse, reliquas de eodem genere prætermisi. Quod si quo in loco acrius, aut si in alio vicissim jocosius rem agere videbor; veniam, ut spero, mihi dabunt quicunque Animadversiones in me editas diligenter expenderint, vel potius quæ ego ad earum primam respondeo, perlegerint. Atque hoc meum novum scribendi genus maxime velim probari ab omnibus; sed levissime tamen feram, si forte minus probabitur aut ab iis qui videntur communes esse inimici Scriptorum omnium, aut ab iis qui cum severissimi esse soleant in causa propria, lenissimi sunt in aliena.

Quod reliquum est, in his, & in proximis, quæcunque adversus te edam, Adversariis omittam ordinem scribendi meum, conservabo tuum, pagina semper ad libri oram adscripta quam in paginam erit Animadversio, aut locus Animadversionis; sed & tuarum paginarum columnæ, ut vocant, sic indicabuntur, ut secunda sit inspicienda, si numero punctum apponatur; prima, si nullum. Hac ratione satis consultum erit Tironibus, iisque omnibus qui aut Theatrum tuum sine meis Animadversionibus, aut has sine illo nolent inspicere; quanquam & his qui Theatro carent, satis prospeximus, locis in quæ Animadversiones quæque cadunt, satis clare expositis, vel quod sapius fecimus, descriptis. Siqui autem erunt qui observationes, & judicia anatomica malint legere, quam lites & controversias nostras cognoscere; iis vero inservient Indices quorum ut singulos post singula, sic universos in unum contractos post Sexta, eademque, ut opinor, ultima hujus generis Adversaria collocabo. Cæterum num in Sextorum calce Figuras simus edituri hisce omnibus Adversariis respondentes, interea deliberabimus. Nam priorum quidem Figurarum editione uti apud æquos, & intelligentes Viros gratiam magis quam optaramus, consecuti sumus; ita apud eorum dissimiles non levis nostri, mitto sumptus, at laboris, & studii, atque incredibilis dum conficerentur, assiduitatis & diligentiae fructus tulimus longe diversos. Alii enim eas dissimularunt, alii, nobis innominatis, usurparunt, alii depravarunt, alii denique, te Mangete, probante, atque edente, ut *fabulosas*, si Diis placet, & *magnificas* redarguere, atque traducere conati sunt.

ANIMADVERSIO I.

Anatomes
tradenda
methodus,
ejusque
Elementa.

Inquirenti mihi sæpenumero quæ causa sit quare multis eorum Juvenum qui ad rem anatomicam discendam se conferunt, hæc longe magis quam sit, difficilis ad cognoscendum & impedita esse videatur, id demum eo fieri compertum est quod secundum pervulgatam rationem in eadem instituantur. Dum enim ducto initio, ut mos est, a communibus Corporis Integumentis, hæc fibræ, glandulis, arteriis, venis, nervis constare docentur, necesse est, in singulis prope verbis hæreant propterea quia quid fibra, quid glandula, quid arteria, quid cætera illa sint, nemo antea monstravit. Ostenduntur deinde ipsis abdominis musculi, ostenduntur intestina, & proxima ex ordine viscera; hæc pariter ex iisdem compingi particulis, audiunt; quæ autem hæc, qualesque sint particulæ, adhuc ignorant. Denique cum quæ de fibræ, & quæ de glandulis integumentorum, musculorum, intestinorum, plerorumque viscerum tradita fuerant, vix ac ne vix quidem amplius memoria tenent, tum vero tandem aliquando quid fibræ sint, quidque glandulæ, docentur, nimis quidem fero; nam priora illa omnia hoc interea exciderunt facilius, quod minus, dum traderentur, intelligi potuerunt. Id ne meis Auditoribus contingeret, quo primum die ad Anatomem tra-

dendam accessi, eodem ab Similarium Partium, sive ab Anatomes, ut ego appellare soleo, Elementorum ostensione initium duxi: & Syntheticam Methodum, quam Riolanus discendæ Anatomiae aptierem esse, falsus est, a multorum Veterum, & nonnullorum Recentiorum Anatomicorum libris in hoc Patavinum Theatrum invexi eo majori Tironum commodo atque utilitate quod si quid forte in libris prima lectione non intellexeris, at secunda intelligere satis potes; in Theatris autem si quid non statim perceperis, sæpe & id perit, & multa insuper quæ sequuntur. Quorsum hæc omnia? fortasse inquires, V. Cl. Eo nempe ut institutum commendem tuum, qui ab iisdem Elementis inceperis. Quod si præterea in eorum notione, enumeratione, atque ordine tecum, mihi convenisset; nihil mihi optatius contingere potuisset. Verum quod attinet ad eorum notionem; Partes Similares esse, tu dicis, quæ, in quacunque demum Corporis parte reperiantur, ejusdem ubique videntur naturæ, & indolis: quæ quidem ratione contendere aliquis posset, ipsos digitos esse partes similes, & quidem meliori jure quam sint per te Musculi; plures enim Musculi sunt magis dissimiles inter se, quam quilibet digitus, sive a dextris, sive a sinistris, sive in inferioribus, sive in superioribus artubus dispositi. At enim digitus, inquires, non in toto corpore reperitur. Addis namque: Partes illas quas sub Similarium nomine hæcenus designavimus, Generales præterea dicimus, quia in toto corpore, earumque grandiores, præcipue in artubus, & trunci exterioribus reperuntur; easdemque Partes etiam infra vocas, universales, & toti corpori communes; quasi vero Os secundum naturam in toto corpore, hoc est in ipsis quoque visceribus reperiretur, in iisdemque Cuticula, Cutis, Panniculusque Adiposus, & Carnosus (nam hæc omnia sigillatim inter ejus generis Partes reponis) observarentur. Quæ cum constet non ita se habere; illud relinqueretur, ut existimarem, tibi, toti corporis ambitui, scripturo, toti corpori, excidisse; nisi pariter constaret, in abdomine, hoc est in ea parte ambitus corporis quæ imi ventris anteriora late obducit, neque os, neque cartilaginem inveniri, & nisi tu ipse duos illos Panniculos, & præsertim Adiposum, nonnullas partes corporis non ambire, infra fatereris. Hæc dum tu explicas, ego malo Similarium Particularum nomine Simpliciores accipere: & facilioris doctrinæ gratia earum plures quasi gradus, duas autem quasi classes agnoscere; earum quæ omnibus insunt Partibus, & earum quæ plurimis. Omnibus inesse concipio Fibras, & quæ ex Fibris, ut omnia, compinguntur, Membranam, Nervum, Arteriam, Venam, Lymphæ Ductum, & Glandulam. At plurimis, non autem omnibus, inesse Partibus Adiposas Cellulas, Cartilaginem, Os, Ligamentum, Tendinem, & reliquum, hoc est perfectum completumque Musculum, agnosco. Non autem video, cur tecum præterea enumerem Cuticulam, Cutem, Panniculumque Carnosum, nisi reliquas etiam omnes & Membras, & Musculosas Partes sigillatim velim inter Anatomica Elementa recensere: quod quidem esset non summa Partium Similarium genera universe attingere, sed singula generum, atque adeo specierum individua persequi nominatim. Atque de Simpliciorum Partium notione, enumeratione, & ordine quid mihi videatur, satis indicatum est. Restat, ut quem tu secutus sis ordinem, videamus. A Fibris, & recte quidem, initium capis. Deinde ad communem divisionem Corporis reverteris. Reverteris, inquam; nam inter Procemii initia jam Corpus diviseras. Sed vide, an non multo utilius fuisset istam divisionem post absolutam Similarium Partium tractationem instituere? Tunc enim singulis jam notis ossibus, ab Lectore intelligi potuisset quidquid de Ventrium finibus in his, aut illis ossibus constitutis, & quod consequitur, de cujusque visceris

Anthropogr. l. I. c. 27.

TOM. I. pag. 1

12 13

2

sceris sede doces. Nunc autem de Ossibus non ante agis, quam Corporis Integumenta, omnesque præterea Musculos describeris, contra atque Veteres Anatomici, & multi etiam Recentiores consuevere, qui ut musculorum intelligi possint termini. Doctrinam de Ossibus præmittunt. Denique post Ossa ad vasa, ad Glandulas, atque ad eas de quibus post ipsas statim Fibras commodius fortasse egisses, Membranas procedis; nam neque Integumenta Corporis, neque Musculos, neque Ossa, neque Glandulas, neque Vasa penitus intelligere potest is qui Membrana quid sit, ignoret. Mitto, ipsa Integumenta sine Glandularum, & Vasorum notitia intelligi non posse, velut a principio dictum est. Mitto alia ejusmodi. Hoc unum addo. Si a Methodo Synthetica, idcirco relaberis ad Analyticam, quod, ut infra dicis, primo mavis eas Partes, quæ oculis per se patent, seligere, atque inde ad alias quæ non ita, per se manifestantur, sed cultro anatomico re-ferari volunt, pervenire; certe Fibræ; a quibus tamen incepisti, & multa quæ de ipsis tradis, sine cultri ope ostendi non possunt; deinde cum detractis Integumentis, ad Musculos jam pervenis, & de omnibus agis Musculis, num per se oculis omnes ex ordine patent Musculi? annon ad plures ostendendos ossa ipsa prius retegenda, dimovenda, & partim quoque diffringenda sunt, atque oblimanda? Quæ omnia cum ita sint, ego quidem haud satis scio, an tuus iste ordo, ut tibi in Præfatione visus est, ita omnibus maxime naturalis videri possit.

ANIMADVERSI O II.

I 3 **T** Res intra paginas bis a te dividi humanum Corpus, paulo supra indicatum est. Sed neutro in loco inter ejus divisionis membra Colum includis, partem corporis ut minime contemnendam; ideoque ab Aristotele, Ruffo, Oribasio, Riolo in suis corporis divisionibus non omittam; ita neque recte, neque commode ad caput, aut ad thoracem referendam. At vulgo, inquis, ita dividunt; quasi vero non esses pollicitus, te sæpius ab Auctoribus secessurum, & ab ipsis prolata -- vel illustraturum, vel etiam, correcturum. Illa quoque vulgo dictitari, non sum nescius quæ paulo post de viscerum intra imum ventrem sede proponis. Si quis tamen in ejusdem ventris doloribus, tumoribus, vulneribus nihil aliud, nisi vulgarem istam respiciat doctrinam, næ ille haud raro hallucinabitur. Namque ut hic mittam incredibiles quæ vi morbi contingunt, in situ intestinorum perturbationes, aut fundi ventriculi infra umbilicum extensionem, quarum illas in gravi ventris convulsioni sæpe obnoxii, hanc autem in edacibus, atque bibonibus prudens Medicus potest facile suspicari; in nonnullis certe inveni hepar, minime alioqui morbosum, ad lienem usque protensum; at in multo pluribus eam Coli intestini partem quæ transversim sub ventriculo duci solet, ita deorsum incurvatam deprehendi, ut in aliis, sub, umbilicalis regionis medio, sita esset, ubi tu, omenti extremam fimbriam naturaliter poni, doces; in aliis multo infra umbilicum propenderet, & nominatim in Virgine in qua ab hepate secundum lineæ albæ abdominis sinistrum latus ad pelvim usque pertingebat, inde vero ad lienem reflectebatur. Neque ego quidem contendo, in plurimis rem non ita esse, ut vulgo proponitur; illud tantum dico, in tot vicissim cadaveribus hæc multo aliter quam communis opinio ferat, inveniri disposita, ut nisi in eorum sedibus tradendis, has varietates indicemus, tum historia anatomica manca sit, tum quæ ab hac pendent, Medicina, & Chirurgia sine crebro erroris periculo esse non possint.

Morgagni Adversaria Anat. II.

ANIMADVERSI O III.

I N I. Tabulæ Figura I, Verheyenii, ex quo hanc describis, errorem non emendas. Nam pro fibris D Circularibus, sive potius Annularibus, fibra proponitur quæ ad figuram pertinet, non circularem, sed ellipticam. In Figura autem 2. cum litteræ Q dexteræ, quam Bidlous ad ilia etiam indicanda eo in loco inscripserat, tu sedem non mutaveris; miror, cur ita mutaveris Explicationem, ut per illam ipsam litteram Inguina velis commonstrari. In Tabula denique II. litteram E nullo modo, D autem vix invenio. Hæc tamen fere omnia tam parvi esse momenti, fateor, ut nisi in ipsis primis deprehendissem Tabulis, memoraturus non fuissim. Itaque his missis, de Cuticulæ potius natura, & generatione pauca addamus. Et nobis quidem nihil aliud esse videtur Cuticula, nisi ipsa summa cutis superficiès, quæ quia ab assidua primum aquæ amnii in utero, ac deinde aeris extra uterum compressione, rerumque contactu tenuissima vascula comprimente, atque adeo illius nutritionem, & intimam humectationem prohibente, duratur, & quasi callescit; ideo insensibilis & quasi emortua est, ut non difficile ob resiccata pleraque vincula dissolvi ac divelli possit. Sic autem intelligitur, quam facile ubi avulsa est, iisdem de causis reparetur, item quare quæ partes corporis frequentius, graviusque apprimuntur, ut pedes, manusque rusticorum præsertim atque artificum, in iis multo crassior cuticula fiat. Sed & alia quæ a te memorantur, sic proclivè admodum est explicare, videlicet, cur laminæ plumbi multum conferant, ad cuticulam producendam; cur hæc tenuior, quidem, sed tamen respectu texturæ densior & compactior sit ipsa cute; cur nulla detur communicatio inter cutem, & cuticulam per vasa sanguinea, aut alia; cur denique in dissolutæ a cute cuticulæ superficie interiori semper advertantur remanentiæ innumeræ papillarum cutanearum avulsæ, ac laceræ. Cæterum hac ultima Ruyschii observatione admissa, qua clarius patet id quod alioqui negari non potest, scilicet cuticulæ avulsione una cum multis vinculis non prorsus adhuc resiccatis, adhærentes subjæctæ cutis particulas dilacerari; non satis intelligo quid tu & Verheyenius, qui fere iisdem verbis utitur, inter cæteros cuticulæ usus hunc etiam quod inserviat vasorum cutis orificiis obturandis, ideo proponatis, quod, cutis ea denudata humores serosos, ac sanguinolentos de se perpetim magna cum molestia fundat. Quid enim id opus est per resecta orificia vasorum explicare quod laceratis cum cute ejus vasorum parietibus, non sequi non potest?

ANIMADVERSI O IV.

I N reticulari, inquis, corpore, non vero in cuticula, aut cute proprie sic dicta, possumus tam esse nigredinem qua tincti sunt Æthiopes, observavit Malpighius, alique post cum Anatomici. Tu tamen idem sine ulla dubitatione Glissonii verbis infra uteris, in quibus non obscure traditur, Æthiopum cuticulam nigricare, ex Riolani, ut opinor, observatione, qui in Æthiopis anatome se vidisse, testatus erat, solam cuticulam nigredine infectam, subjæctam autem cutem nive candidiorem. Ego vero cum Amicis Venetis observasse memini, Æthiopis quem dissecuimus, & cuticulam, & subjæctæ cutis superficiem non albo, sed nigro, aut certe nigricante & fusco colore infectas fuisse. Quod quidem si in quocunque Æthiope observaretur; Riolanus credendus esset de profundiore cutis parte verba fecisse, Malpighius autem pro certa posita aliorum traditione de Æthiopum cute & cuticula albicantibus; id quod tu ex ipso retulisti, ex

C

pro-

3.

4

De Cuticulæ natura, & generatione.

4

5

5.

Anatom. l. 1. tit. 2. c. 3.

5.

De sede nigredinis in Æthiope.

8

Anthropogr. l. 2. c. 4.

Exercit. de Ext. Tactus Organo

6

propria non observatione, sed conjectura (quod ejus etiam verba significant) deduxisse. Cum vero paulo infra scribis: „vasa glandularum cutis „excretoria e Cl. Stenonis demonstratione, ex- „tus valvula tenuissima, e cuticula ipsa emanan- „te cooperiri, quæ pro varia sua tensione, vel „relaxatione transpirationem permittat, vel im- „pediat: „primum vereor, ne multi existiment, quæ pellicula a Malpighio observata est, eam Ste- noni a te tribui; deinde quod ea instar valvulæ esse possit, id quoque Malpighius suspicatur, non affirmat. Glandulæ autem Sebaceæ earumque utilitates cum magnam partem ad ipsam cutem pertineant; mirari hic subit, & plerasque earum a te prætermitti, & inter eas paucas quas me- moras, nonnullas enumerari quæ non sunt cutis, ut nominatim quæ sunt in palpebris; hæc namque sunt non in cute, sed in cartilaginibus palpebrarum.

Ibid.

ANIMADVERSIO V:

6. De Cute, Pilis, & Unguibus nonnulla.

Cutem „in ore, naribus, oculis, auribus, „pudendis, &c. „non perforari quidem, sed potius intro reflecti, censeo. Ita enim cum tunicis eas omnes caveas succingentibus continuata est, ut in illarum multis ipsa cutis structura non prorsus obliteretur: ut in meatu auditorio reticu- lare corpus, & pili ostendunt; qui cum sebaceis glandulis neque intra ipsas statim nares, neque, si quis recte sciat inspicere, in caruncula, lacry- mali dicta, desiderantur. Huc etiam sebaceæ glandu- læ quæ in pudendis sunt, pertinent, & quæ ibidem sunt, papillæ. Nam superficiem linguæ structura ita structuræ cutis respondet, ut nihil magis.

Cæterum quod attinet ad „Cutis, ut vocas, „quali appendiculas, „non omnes pili „e cu- „te proprie excrescunt; „nam quod infra ex Ruyschio doces: „radices pilorum -- sæpius „-- in pinguedine ipsa implantatas quasi appare- „re: „ita verum est, ut ipse olim Colum- bus pinguedini affixæ esse, observaverit; ne- que quidquam sit facilius quam in pube, „habi- toris præsertim mulieris, integumentis alte dis- sectis, id demonstrare. Videndum quoque tibi est, ne quod ex Malpighio, & Chirac de fol- liculis doces in quibus „tanquam in testis flora- „libus radican- tur „pilorum bulbi, id Lectores credant de pilis omnibus ostendi posse. Idem Malpighius quod adversus distinctionem pilorum „in Congenitos, & Posterigenos „adjicere te, dicis, satis docuerat. Ad eundem quoque Auctorem aliquanto, opinor, melius quam ad Glissonium, Lectorem potuisses rejicere quod at- tinet ad „colores, & rectitudinem, aut cri- „spationem „pilorum. Hæc Malpighii loca Verheyenium mirarer non vidisse, nisi illud ma- gis mirandum esset, hunc in tota sua, etiam ite- rum edita atque aucta, Anatome nihil de Un- guibus dixisse. Cæterum unguem a radice rece- dentem „novas papillas accipere, atque inde il- „lius crassitiem sensim inter procedendum auge- „ri „mihi quidem in majoribus pedum ungui- bus aliquoties inquirenti non ita perspicuum fuit, ut ex Auctorum lectione speraveram. Utcunque id est; unguem non tantum cum cuticula, sed cum ipsa quoque cute esse continuatum, certe in galli indici dissectione, cum qua & pedis bubuli consensit anatome, mihi etiam satis superque ex- ploratum est. Postremo quod Glissonium ais de unguibus in ignem conjectis scribentem, & ex ea observatione nonnulla deducentem, unguibus „ad- „jicere etiam pilos potuisse: „neinpe in superio- re, ut videre potes, Capite jam adjecerat.

De Part. Continent. c. 6. n. 6.

ANIMADVERSIO VI.

Recte facis, quod pinguedinem „e sanguine, „in numerosissimis arteriis, quæ cellulas „membranæ adiposæ undique perreptant, con- „tento, immediate deducis. „Sæpe enim inter dissecandum, in superficie sanguinis ex amputatis vasis fluentis micantes plurimas quasi olei guttu- las observavimus; ut nisi huic observationi dece- ptio aliqua subfuerit, pinguedo ea ratione inesse cruori videatur, ut illius intra adiposam mem- branam congestio nihil aliud requirat, nisi eam quam admittis „per modum cribrationis in va- „rios illius loculos depositionem „aut quocun- que alio mechanico modo explicare aliis placeat glandularem secretionem. Quod si eorum loculo- rum structuram, qualem Malpighius indicavit, hoc in loco non omisisses; ipsa fabricæ analogia id confirmare potuisset. Tota enim Adiposa Membrana ex sacculis constat instar lobulorum ex quibus glandulæ conglomeratæ componuntur; sac- culi autem pinguis globulis, quasi glandulosis acinis, referti sunt, ad quos vasa pertingunt san- guifera. Quam nos structuram multo facilius at- que evidentius in Tumoribus inprimis five Ex- crescentiis quibusdam Membranæ Adiposæ perspe- ximus, quæ ex eorum sacculorum laxitate, aut etiam ex revehentium vasorum compressione, vel obstructione ortum traxisse videbantur. Ut enim pinguedinem intra eos sacculos per arterias im- portari, non dubito, quos non modo, ut tu, in junioribus, sed & in adultis animantibus in- terdum ita sanguine infecta, sæpius vero, ut in hydropicis, sero commixta pinguedine plenos vidi, ut in illis carnem, in his gelatinam mentirentur; ita ex iisdem sacculis pinguedinem per venas referri, ex aliorum observationibus conjicio; atque adeo verisimile esse, censeo, præter sanguinem, & lympham, quibus nonnulli salivam, bilem, animales spiritus, ipsumque semen adjungunt, pinguedinem quoque assiduo quodam circuitu cir- cumferri. Cur autem huic pinguedinis circuitui explicando iis vasis non utar quæ Malpighius adiposa nuncupaverat, alias indicabo. De qui- bus illud tantummodo hic dicam: ista, quæcun- que ea sint, vasa ita a Membrana Adiposa, ejus- que cellulis Malpighium distinxisse, ut non in- telligam, qua ratione a te scribi potuerit: „Ufus pinguedinis in Membrana descripta, seu „in iis cellulis quæ Illustris. Malpighio vasa „adiposa dicuntur, collectæ, &c. „Sed neque illud assequor, in his quæ de Panniculo Carnoso subjicis, quæ Verheyenium, cujus non sententiis modo, sed & verbis ipsis uteris, possis quodam- modo vellicare perinde quasi etiam ipse „for- san „eum Panniculum cum musculo quorundam ani- „malium cutaneo confunderet „quem tu inte- rim non aliis rationibus præter eas quas ex ipso accipis, Verheyenio, distinguis. Quod si ulla in re is erat reprehendendus, in ea potius erat in qua te cum eo consentientem apprime video, scilicet in hoc Panniculo, ut a Membrana Adi- posa distincto, humano Corpori tribuendo; quan- quam ipse minus distinguere videtur, cum ejus- dem Membranæ „exteriorem lamellam vocet „Membranam Adiposam, interiorem autem „Carnosam, & Musculorum Communem „quas tu videlicet pro tribus distinctis habes Membran- is, atque Integumentis. Attamen ne ipsa qui- dem interior Membranæ Adiposæ lamella aliud quam Membrana Adiposa est. Si enim eæ pin- gues membranæ quæ inter musculus & musculus alte subeunt, nihil aliud sunt, ut recte Cowpe- rus admonuit in Anatomia Corp. Hum. Tab. opinor, IV. (dum enim hæc scriberem, id Cow- peri opus apud me non habebam) nisi continuata eoque se insinuans eadem Membrana Adiposa qua corporis ambitus obtegatur, & de qua nunc sermonem habemus; necesse profecto est, ut illa hujus lamella interior, seu quæ musculos contin- git,

12. De Pin- guedine, ejusque Cellulis.

Exercit. de Omen- to infra in Thea- tro 246

Vide in Ephem. N. G. Cent. V. Obs. 27.

13

De Pan- niculo Carnoso, & Mem- brana Musculo- rum Com- muni. l. i. tr. 2. c. 5.

15.

git, illa quoque ipsa Membrana Adiposa sit. Quid ergo Panniculus est Carnosus, & quid Membrana Musculorum Communis? Si pro distinctis, & universalibus accipiamus Integumentis; in nobis quidem nihil sunt. Si vero eo nomine intermixtas, atque interruptas Integumentorum quasi portiones intelligamus; videmus sane multis in locis num fibras carneas, & expansiones musculares interjectas, subjectasve Membranæ Adiposæ, tum latas, & magnam partem tendineas expansiones pluribus musculis superinductas. Hæcæ quædam vincula musculis in sua sede continendis & corroborandis inserviunt. Illæ vero sive earum in quas inferuntur, Partium, sive ipsius etiam pinguedinis motui, de quo paulo ante dictum est, famulantur. Sed de Integumentis jam nimis multa. Itaque super Tabula III. eorundem ostensioni dicata, illud unum admonebimus, ut videas scilicet, annon certis quibusdam amplificatis minimarum Particularum Figuris, quas & hic, & in aliis Tabulis sine ulla animadversione ex Bidloo proponis, majorem quam par sit, fidem habere videaris.

ANIMADVERSI O VII.

De Musculis quædam.

Osteolog. infra in Theatro 109.

16.

18. 20. 21

Exercit. de Mot. Musc.

Traçt. de Respir. Sect. 1. c. 7.

Paragr. 2.

19

Perlibenter scirem, cur inter ea quæ ad Musculos pertinent, Mucilaginosas Glandulas hic omiseris, a Cloptone Havers inter musculos, & circa tendines observatas. Non enim ob earum parvitatem omisisse, credo, cum præsertim intra tendinum quorundam vaginas non ita exiguæ illarum aggeries nobis conspicuæ esse soleant; tu autem hic ne ea quidem quæ tu ipse, prorsus inconspicua esse, dicis, prætermittas, ut quod nervi, in omnes musculi partes per fibrillulas oculum, etiam microscopio armatum, tenuitate sua effugientes, transversaliter inferantur. Verum ut iis fibrillis quæ videri nullo pacto queunt, sepositis, de his quæ conspicuæ sunt, quasque adeo in Tab. IV. Fig. a per litteram F ostendis, sermonem habeamus; si nos volebas tibi facile assentiri, iis Fibrillis primum atque adeo præcipuum in musculari motu munus tribuenti; ante occurrendum a te erat Willisii observationi ex qua habemus: „ in vivisectionibus „ -- si membrana musculi detracta, fibræ quædam carneæ, fibrillis quibus connectuntur, dissectis, ab aliis separentur, & prorsus solutæ „ reddantur; in omni motu illas ita singulares, „ ac liberas, pariter ac alias simul compactas, „ corrugari. „ Quod Swammerdamius quoque ex Anatis vivæ sectione confirmat, docens: „ in „ omni musculi fibra, etiam a reliquo corpore „ musculi separata, contractionem dictam (*hoc „ est muscularem*) observari ad oculum posse. „ Hæc igitur nisi prius tollantur, neque tibi, neque Joanni Mayow, neque Philippo Verheyenio, neque aliis, quicumque iis transversis fibrillis necessarium aliquod ad carnearum fibrarum contractionem officium tribuunt, adstipulari posse videor; sed in ea in qua ad hoc tempus fui, sententia persto: eas fibrillas cum propria cujusque musculi membrana munere, officioque convenire, scilicet ut carneas fibras in sua quasque sede conservent, ne ab ea, dum agunt, avellantur: idque eo libentius censeo, quod idem placere nuper didici Viro Eximio Joanni Bernoullio, dum ejus auream de Motu Musculorum Dissertationem perlegerem, mihi dono datam a Cl. V. , tantoque Patruo vere digno Nicolao Bernoullio, in hoc Florentissimo Gymnasio rei mathematicæ Professore. Cæterum in tuæ ejusdem Tab. IV. Figura 3. frustra a Lectoribus perquirentur istæ Fibrillæ ad litteram E memoratæ, quas tamen in archetypo Willisiano frustra non quærent. Illud in Willisii Explicatione incassum quærent: eas fibrillas, ut tu, quasi ejus verbis, refers, esse „ potius nerveas „ quam membranaceas: atque utinam id unum inter ejus Explicationes, atque has a te descriptas interesset. Sed & graves Ope-

Morgagni Adversaria Anat. II,

rarum errores sæpe faciunt, ut necessario ipsi Auctores sint consulendi, velut in Figuræ 5. Explicatione *supposita* pro *seposita*; in 6. autem *in carne*, quod pro *in cane* scriptum esse, quis posset divinare?

ANIMADVERSI O VIII.

Verum, ut tuis dimissis Operis, ad te ipsum propius redeam, & planum facere hinc incipiam, te contra atque in Præfatione pollicitus eras, „ in Tabularum Explicationibus correctiones, & mutationes necessarias „ omisisse, neque in tuo Theatro Figuras deesse in quas potiori jure quam in meas, Animadversiones addere potuisses; age, hujus ipsius IV. Tab. Figuram 9. inspiciamus. Atque illud primum scire ex te, cupio, num Coracohyoidis Musculi extrema ad semicirculi modum finiantur? Deinde num tendo duobus ejus musculi ventribus interjectus, tam valde atque adeo enormiter, cum iisdem ventribus comparando, extenuetur? Postremum illud est quod mihi abs te responderi, velim, num recte a peritissimo alioqui Auctore in hujus Figuræ Explicatione dictum sit: Coracohyoidis „ ventres „ junctis tendinibus in medio convenire, contra quam in aliis omnibus totius corporis musculis observari potest? „ quasi vero, ut de aliis musculis taceam, maxillæ inferioris Digastrici ad eundem prorsus modum constructi non essent. Post hæc, leviora videbuntur, quæ tamen Lectorum causa non omittemus: in Fig. II. insertionem fibrillarum in fibras ex Joannis Mayow archetypo diligenter non exprimi, Explicationis autem ejusdem finem apud Auctorem ita se habere: „ Et sicut Fibræ arte conjunctæ „ Tendines; ita Fibrillarum collectio ex parte „ saltem aliqua ipsas fibras componere videtur. „ Uti in Figura apparet, quæ Fibrarum, & Fibrillarum series exhibet, quatenus in musculis „ diu satis coctis conspiciuntur „ quæ verbacum his quæ a te referuntur, si quis contendet, næ ille quid a te adjiciatur, quid omittatur, quid mutetur, aperte perspiciet. Jam vero ut prætereamus; nisi quis Auctorem consulat; quid sibi velit Figura 13. & cui bono sit Figura 14. (quæ ad Diaphragmatis contractionem explicandam excogitata est) non facile intellectum iri; quam vellem posse inspicere eam de Motu Musculari Dissertationem ex qua post hæc multa adducis. Nam quod in Stenoniano Experimento non motum dumtaxat, sed & sensum intercipi, observemus; id Verheyenio quidem novum esse visum, atque adeo incertum, non mirabar ob notam hominis in aliorum libris perlegendis incuriam. At vero Medico & Erudito, & Monspelienfi id ipsum vocari „ novam experimenti circumstantiam, nec „ ab aliis observatam, nec a semetipso usquam „ expectatam „ non mirari certe non posse, cum vel ante hos triginta annos ipsum etiam Vieussennium, Monspelienfis Academia decus, & lumen, observasse id, constet, adeo ut memoria teneam, me olim cum primum in eum Vieussennii locum incidi, quæ hic de „ inducta nervearum fibrillarum flacciditate „ imo de Spinalis Medullæ prohibito influxu subjiciuntur, continuo esse & suspicatum, & cum Doctissimo, amicissimoque Viro Jo. Antonio Stancario Prof. Bonon. locutum. Itaque istam, ut dico, Dissertationem, quam frustra adhuc perquisivi, libenter inspicere; ut enim ex his quæ tu refers, ingeniose scriptam esse, video; ita his quæ fortasse in hac quoque aut omittis, aut adjicis, aut mutas, plane cognititis, facile ejus quam dixi, rei, aliarumque præterea ejuscemodi omnis mihi admiratio eximeretur. Nam alia quoque in his quæ ex Dissertatione eadem refers, me morantur: in arteriarum Spinalis Medullæ descriptione anticam ejus arteriam neminem quidem: eandemque Medullam „ simplicem „ esse dici nervearum fibrillarum fasciculum, quæ a „ cerebro, aut cerebello exoriantur „ perinde quasi constaret, nullas earum a corticali Spinalis

19.

De Mot. Musc. c. 2.

De Experimento Stenonis ad Musculorum motum pertinente. l. 2. tr. 1. c. 34.

21.

Nervogr. l. 3. c. 1.

22

22.

23

nalis Medullæ substantia exoriri. In his etiam quæ continuo subjiciuntur: „ etsi vis contracti „ cerebri, aut cerebelli quæ movendis per priora „ nervorum paria spiritibus sufficit, sufficere quo- „ que videretur iisdem per vertebrales nervos pro- „ pellendis; -- certum tamen esse, motum a con- „ tracto cerebro aut cerebello spiritibus inditum „ per vertebrales nervos fluxuris, ob mollem, ac „ flaccidam medullæ substantiam penitus elangue- „ scere, & debilitari, spiritusque pulsionis de- „ lectu in ipsis nervorum principiis substitutos „ esse, nisi spinalis medulla motu quo ipsa gau- „ det systaltico, calcar, torpidis adderet, eos- „ que in partes quibus destinantur, vi & impul- „ sione nova urgeret atque propelleret: „ in his, inquam, hæere me, fateor. Neque vero ob id tantum dico quod iis omnibus commune est qui animales spiritus a cerebri, cerebelli, & medullæ motu propelli per nervos in Partes, existimant: cur scilicet illa propulsione, contraria spirituum a Partibus ad cerebrum *undulatio* quam ad sentiendum necessariam esse, ponunt, nequaquam interrumpatur? quanquam hujus rei indubium exemplum haberi a nobis, animadverto, in radiis imprimis ipsius lucis, qui ut diversis, contrariisque motibus se se interfecent, non tamen propterea suum quisque iter non servant. Igitur ob id potissimum dico, quod inferior Spinalis Medullæ tractus, qui præsertim in Stenoniano illo Experimento privari videtur influxu sanguinis, quique adeo hic est potissimum attendendus, non „ mol- „ li, ac flaccida substantia „ est, cum ex nervis constet in sejunctos & pia meninge indutos fasciculos jam collectis; ut superiore in cerebro, cerebello, maximaque medullæ parte propulsione vi persistente, spirituum motum in iis „ penitus „ elanguescere & debilitari „ oportere non videatur. Sed in aliis etiam hæreo. Cum enim in I. Postulato positum sit: „ Si arterias spinalis me- „ dullæ in aliqua ejus parte, intercepto sangui- „ nis commeatu, a solita pulsatione feriri con- „ tingerit, systalticam contractionem in eadem „ medullæ parte subito cessaturam esse, conse- „ quens est; „ ostendendum sane esset, in Stenoniano Experimento in medullæ extremam partem sanguinis commeatum intercipi; nam si ostendatur: *consuetum* dumtaxat sanguinis commeatum in ipsam intercipi, non autem omnem, & propterea arterias in extrema medullæ parte „ tan- „ tum solito debilius „ pulsare, non autem prorsus feriri; non consequetur sane: „ eandem me- „ dullæ portionem sanguine privatam, atque adeo „ contractionis omnis expertem esse. „ Porro omni sanguinis influxu in eo Experimento istam medullæ partem orbari, ne ipse quidem Ingeniosissimus Dissertationis Auctor ostendi posse, credit; obstat enim patens superiorum ejus arteriarum cum inferioribus communicatio: qua via sufficientem cruoris copiam tunc influere, minus facile negabit, si animadverterit, tum in superiores medullæ arterias eo plus sanguinis ex Aorta irruere, quo major ejusdem copia intra eandem Aortam supra injectum vinculum congeritur, tum in arterias medullæ inferiores eo plus sanguinis ex superioribus influere, quo minor ob interclusum per lumbares sanguini aditum, in illis resistentia est. Cæterum mitto hic quærere, an muscularis contractio duræ meningis quemadmodum a Cl. amicissimoque Pacchiono circum cerebrum & cerebellum agnoscitur, ita locum ullum circum medullam spinalem habere possit: nam si posset; veræ originis ejus arteriarum, & propulsione spirituum quæ ab ejusdem quoque meningis vi repetenda esset, ratio certe aliqua in hac disquisitione fuisset habenda.

Vide in-
fra Ani-
madv. 36.

23

ANIMADVERSI O IX.

PLura in his quæ in proximis paginis afferuntur, sciens volensque prætermitto. Jam enim aveo cognoscere quid in Tabularum Brownii Explicationibus præstiteris, quas omnes videlicet „ non parum a te esse immutatas ac correctas „ diserte in Caput indice nonuisti. Initium tu quidem ducis a Frontalium, aliorumque Faciei musculationum Explicatione; quam nemo dubitabit multo utilius, atque commodius ad eas Tabulas differri potuisse in quibus ob majorem amplitudinem longe clarius atque facilius a Lectoribus perspecti essent. Cæterum ad Frontis musculos quod attinet, lis est inter Anatomicos, recta ne, an potius extrorsum inclinatæ eorum fibræ ad supercilia descendant. Tu vero quasi illud indubium foret, sine ulla hæsitazione eos sequeris qui Chirurgis auctores sunt, ut in frontis abscissibus „ fibrarum ductus sequentes deorsum scilicet „ pellum recta diducant. „ Nos autem quoties perquisivimus, toties eas fibras non rectas, sed ad tempora inclinatæ invenimus. Additque inspectioni nostræ pondus præter Columbi, Fabricii ab Aquapendente, & aliorum auctoritatem constans etiam Eustachii consuetudo qui non modo in Figura I. Tabulæ tibi XVIII. sed in quibuscunque hos musculos pinxit, semper ita pinxit, ut vel magis inclinatæ eorum fibras ostenderit quam nos vidisse meminerimus. Temporalis vero musculi originem (in qua describenda Verheyenius quoque deficit) a cognomine etiam osse repetere debebas; nervos autem ejus, quos „ a tertio, quarto & quinto pari „ esse, doces, vide, quæso, hoc tantum, quomodo Lectores tui possint intelligere, quibus longe aliter ac solebant Veteres, nervorum paria es in loco enumeraturus. Diligentius quoque fecisses, si non modo in processus mamillares, sed & in proximam partem ossis occipitis inferi Mastoïdes, tradidisses: quos ita capitis flexionibus *sufficere*, pronuncias, ut duo Rectorum Capitis anticorum paria oblivisci videaris. In Bicipitis Explicatione (quam melius cum Brownio ad aliam Tabulam distulisses in qua ejus origines conspicuæ essent: quod & de multis aliis, ne pluries id memorem, dictum puta) in Bicipitis, inquam, Explicatione necesse est, ut plura Brownii verba quæ tu, opinor, solus intelligis, nobis explices: „ Oritur, inquit ille, primo extrinsecus a supra- „ prema parte Acetabuli scapularis ejusdem ubi „ que substantiæ, & transit sub ligamento commissuræ, quæ scapulam ipsius Acetabulo committit, supra caput Ossis humeri. „ Tu, quæso, qui hæc verba exscribis, doce nos qui ad hoc tempus credidimus, eo transire sub articuli humeri & scapulæ ligamenti, quid sit ligamentum istud commissuræ quæ scapulam ipsius acetabulo committit? Nam quæ ille continuo subjicit: „ & „ per canalem sibi a natura attributum, in cuius „ termino desinit, & vincitur ligamento sibi „ proprio, ac peculiari „ hæc ultro quidem explicavisti, sic verba hæc referens: „ & per canallem sibi a natura attributum decurrens, in humeri „ termino inferiori desinit, ibidem per ligamentum sibi proprium ac peculiare devinctus. „ Hoc vis scilicet: in ossis humeri inferiore extremo desinere, huic devinctum per ligamentum peculiare. Quid, si hoc ligamentum cum eo canali quem videlicet in capite humeri complet, erat omnino conjungendum? Quid, si nemo ignorat, musculus ad flectendum cubitum spectantem, Bicipitem in osse humeri finiri non posse? Quid si tu ipse hoc confiteris, dum eum inferi, mox doces, sub radii initio superiore?

Porro hic prætermittenda non est emendatio Verheyenii, qui in hujus musculi descriptione non modo ligamentum & canalem de quo dictum est, omittit; sed de fine ejusdem musculi ita loquitur quasi non radii, sed ulnæ infingeretur.

Qui.

De muscu-
lis Fron-
talibus.

39

De Re
Anat. l. 5.
c. 3. De
Chirurg.
Operat.

l. 1. tr. 4.
c. 12.

39.

Myogr.
ad Tab.
20.

De Bicipi-
te Cubiti.
l. 1. tr. 6.
c. 9. l. 2.
tr. 2. c. 4.
in ejusd.
Tab. 1.
Fig. 3.

Quinimo id ita habuit persuasum, ut alibi etiam docuerit, & pinxerit; inter initia vero historię Musculorum Cubiti eam quasi regulam posuerit: os ulnæ, sustinere musculos quibus cubitus flexitur. Quod autem istam alteram tendinis Bicipitis partem de qua tu Cowperi anatomicas & chirurgicas producis observationes, omiserit, minime in eo miror quem constat nullum Cowperi scriptum vidisse; quanquam istam saltem, membranam validam per cubiti longitudinem universam, sam musculis omnibus circumdatam, eosque in sua sede instar ligamenti alicujus transversim continentem, iisque etiam pertinaciter, propriæ musculorum membranæ modo adnatam, ex ipsis quoque non recentibus Anatomicis, & nominatim ex Casparo Bauhino poterat cognovisse; qui præterea cum scripsit: Musculi Membranosi tendinem, ligamenti cujusdam transversim ritu, omnes fere femoris, & tibiæ musculos -- circundare, & in sua sede continere eo modo quo, & cubitum occupantes muscoli obducebantur, comparationem ipsam Cowperi inter duo ista, cruris, & cubiti musculis circumjecta, involucri præripuit.

Theatr.
Anat. l. 4.
c. 22. Ibid.
c. 31.

Myotom.
Ref. c. 33.

ANIMADVERSI O X.

Brachialis Externi, sive Extensoris Cubiti longi cum nullam integram in his tot Tabulis delineationem exhibeas; inspicere Lector poterit Eustachii Tabulæ tibi XV. Figuram II. ad lit. n. m. Qua vel obiter inspecta, illud etiam facile cognoscet, ab scapulæ inferiore, non parte, sed costa, neque, ab humiliore capitis humeri parte, sed ab osse humeri aliquanto intervallo infra ejus caput exoriri. Verum si hic explicares Musculos qui toti in respondente Tabula V. non apparerent, paulo certe levius esset ferendum. Quid autem de musculo proximo Subscapulari dicemus, qui in eadem nullo modo apparet, neque adeo apparere potest, nisi aliis musculis remotis, ut in Eustachii Tab. tibi XVI. Figuram II. ad lit. h; aut scapula etiam extrorsum ad latus ducta, ut in seq. Tab. XII. Fig. VI.? Quem enim hic Subscapularis inscripto nomine exhibes, partem esse Latissimi Dorsi, tam certum est, quam quod certissimum. At saltem quem non recte iconismo exhibes, eum verbis recte describeres. Verum neque a basi tantum scapulæ oritur, & quibuscum compares musculis, quando, tendine cæteris latiori, inseri, dicis, non satis intelligitur. Jam vero cur Extensores Carpi sub transverso hujus ligamento coerceri, omittis, quod de proximo Flexore non omittis? Cur item illud horum Extensorum, Flexorumque officium siles de quo recte admonuit Verheyenius, scilicet, si duo Cubitæ simul agant, feriantibus Radiæis, movere manum introrsum; si duo vicissim Radiæi, extrorsum? Quid? quod Oblique Descendentis Abdominis musculi ut unum principium admittis falsum, videlicet, a ligamento e transversis lumbalium vertebrarum processibus enato, sic unum finem omittis verum, in osse videlicet pubis. Non me præterit, quinam, & quot dissentiant; verum non modo ego semper ita inveni; sed Cowperum quoque, ut alios omittam, sic video invenisse. Neque illud pariter ignoro, quot sequaris, dum scribis: ejusdem musculi, tendinem, ut sit in duobus, aliis subjectis, peritonæi processus, cum vasis, &c. iisdem conclusis, in viro; in muliere rotunda uteri ligamenta, circa inguina successive pervadunt. Ex hoc autem processu, sive lace, ro, sive supra modum in latitudinem aucto, oritur Hernia. Attamen de varia hujus processus, & quod consequitur, de varia herniæ in vario sexu natura alibi dicemus; hic autem illud non reticebo: quod de subjectis Obliqui Interni, & Transversi musculorum tendinibus sine ulla hæ-

Morgagni Adversaria Anat. II.

litatione affirmas, ab iis scilicet processibus pervadi, id mihi non parum dubium videri, cum Transversi præsertim tendinem, non foramine, neque, ut Obliqui Externi tendo solet, dimidiato foramine pertusum, sed integro suo inferiore limbo iisdem processibus transversim superpositum invenire consueverim. Porro in his quæ habes de Tricipite, ut cætera mittam; illud mirum; te nullam ejus partem ab osse pubis deducere, unde omnes (usque adeo evidens est magnam partem inde oriri!) deducebat Riolanus. Magis autem mirum est, te, quomodo loqueris, musculis quoque ipsis perinde quasi vasa essent, ramusculos tribuere. Neque admiratione caret quod Rectum femoris musculus ab origine ad patellam pergere cylindricum, doceas, vel quod ipsum ita in Tabula exhibeas quasi inferiore non modica parte sub Vastis lateret. Certe perlibenter scirem, cur nulla horum in Brownio emendaveris, aut cur demum Membranosi Explicationem ipsis ejus verbis sic absolveris: deinde cooperiens patellam, & obturatores duos, in externa sui parte, inseritur ibidem, & femur directe extendit. Nam primum quid vobis velitis hic atque infra in Tibialis antici Explicatione, cum Obturatores dicitis, plerisque sane obscurum erit; Tirones fortasse etiam de musculis Obturatoribus dictum intelligent; cur igitur id ambiguum, improprium, & certe insolens nomen non explicaveritis, haud video. Sed multo minus video, quomodo Membranosus musculus femur extendat. Nam ut mittam hic quære, an peculiari modo, & magis fibulæ infigatur quam tibiæ, & an crus abducatur; certe cruri, non femori infigitur; itaque crus, non femur movebit. Minime autem dubito, quin Brownius primum, deinde & tu non animadverteris, loco femoris tibiæ fuisse scribendam, cum videam, eadem de causa Verheyenium (qui præterea multo minus quam vos, carnæ hujus musculi portionis exiguitatem, & fines explicat) contrario prorsus errore pro femore tibiæ scripsisse, cum docuit: hunc musculus, in exteriori tibiæ latere situm esse, imo in eodem, quamvis brevi, Capitulo rursus eundem errorem bis erravisse, ut cum dicit: Rectum, Vastos, & Cruræum, a parte anteriori tibiæ spectabiles; item Vastos, huic, illive tibiæ lateri adjacere; & in proximo etiam Capite, dum Gastrocnemium, ab utroque processu tibiæ nasci, scripsit. Quæ errata non hic notarem, nisi Tironibus negotium facessere posse, scirem, atque a priore editione in posteriores quoque, Auctore non advertente, & iis qui ipsas curarunt, irrepisse.

ANIMADVERSI O XI.

Vidimus, quid in V; nunc quid in Tabulæ VI. musculis, tuis præstiteris emendationibus, videamus. Et primum quod de Buccinatoris musculi ulibus plura ex Verheyenio exscriptis, places, magis placiturus, si ut in Præfatione promissas, eorum auctorem nominasses, magisque etiam, si ex uno exscriptorum usum, Verheyenium ipsum, & Brownium in descriptione ejusdem Buccinatoris correxisses. Quæ enim, obsecro, hic musculus, oblongare oris rimam, posset, si utramque terminum ad gingivas obtineret? Et sane longe aliter se rem habere, cognoscere ex cadaveribus poteris, aut saltem ex Figuris Bucetii, imo ipsius potius Eustachii, necnon ex Cowperi descriptione: ex qua etiam intelligere potuisses, illum quem Brownius memorat, tendinem, esse ipsum ductum salivalem superiorem. Sed ut aliorum Tabulis dimissis, ad tuam hanc VI. redeamus; notandum quidem est, eodem Bicipitis inscripto nomine haud eundem musculus in dextero atque in sinistro brachio monstrari. Illud tamen magis notandum est; cum in eadem Tabula Brachialem

41.

Anthropogr. l. 5.
c. 41.

42

43

l. 1. tr. 6.
c. 12.

l. 1. tr. 6.
c. 10.

41
De Abdominis musculis quædam.
Myotom. c. 1.

42.
l. 1. tr. 4.
c. 11.

Ad Spig.
l. 4. Tab. 1.
Tab. in
Theatr. 18.
Fig. 1. & 3.
Myotom.
c. 10.

sive Brachium Internum explices; qui in ista ipsa Tabula eo nomine unicus inscribitur musculus, longe aliam rem esse. Gracilem vero in proxima Tabula demonstrare poteris; in hac enim apparere non potest. Quem autem pro Gracili in hac exhibes, ipse est Sartorius, & quem pro Sartorio, est Vastus Internus, & quem denique pro Vasto Interno, Rectus est. Nec leviora errata sunt in iis qui pro Tricipiti, & Seminervoso ostenduntur, admissa. Et hæc quidem in ipsa Tabula. In Explicatione autem quod de vagina per quam Pollicis Pedis Flexor transit, ne verbum quidem, dissimulare possum; at quod hunc, & proximum Perforantem musculum ad latus cruris externum contra tuas ipsas Explicationes, in Tabula & exhiberi innuas, & exhibeas; qui nempe musculi ad oppositum malleolum occurrunt; id vero dissimulare non possum.

In Peronæorum insertionem erravit (quomodo posteriores editiones, aut certe Colonienfis habet) Verheyenius qui utrumque in os metacarpi minimi digito respondens inseruit; Non modo enim neutrum; quod evidens est; in os metacarpi; sed alterum certe in os metatarsi, & pollicis quidem respondens, inserere debuisset. Id te quoque voluisse, opinor, etsi cum Brownio scribas os *tarsi*, non metatarsi; nam os tarsi pollicis conjunctum, ut dicis, non est; metatarsi est. Atque ut ad Tabulam VII. transeamus; Supraspinalem oriri ab *integra* basi scapulæ, evidentissime falsum est; neque ita certe dixerat Brownius; sed „ ab integra basi scapulæ supra spinam. „ Ille tamen quæ de Bicipite hic admisces, fere omnia scripserat, sinistrumque in Tabula Deltoidem inscripto; ut tu quoque facis, Bicipitis nomine exhibuerat. Ille quoque perperam, ita Latissimum Dorsi pinxerat ac si ejus fibræ ab ipsa origine, distinctæ, & carneæ inciperent: quem errorem neque Eustachius, neque Casserius, neque Veslingius admiserunt. Habere tamen solet hic musculus per fasciculos fibrarum in progressu ex costis acceptos, aliam quoque ex parte originem, quam vos omittitis, non autem Cowperus. Qui cum addat, absente Terete Minori, vidisse se ab inferiore scapulæ angulo, alio carnearum fibrarum fasce Latissimum augeri; ego vero aliquoties vidi vel eo musculo non absente; quinimo Lyserum animadverto de hac re, ceu semper observanda, verba fecisse. In Lumborum autem Quadrato utrum denique magis mirer? an quod ita alienum a vero, & Figuris cæterorum Anatomicorum pinxeritis, an quod cum vertebrae lumborum movere *prorsum*, fateamini, *Lumborum* tamen *Extensorem* vocetis? Sed levia hæc sunt præ his quæ continuo additurus sum. Non potest musculus a musculo origine, fine, figura, sede, longitudine, cæterisque conditionibus magis differre quam Seminervosus a Glutæo minimo. Et tamen hujus descriptionem pro Seminervosi descriptione attertis: quod statim intelligent omnes qui istam vestram descriptionem cum descriptione Glutæi minimi, cujuslibet Anatomici, & nominatim Spigelii contendunt, imo tui ipsius, quæ videlicet, ut ego animadverto, ex Spigelio ad verbum exscripta est. Sed Brownium tamen aliquis ita potest defendere, ut in Typographum culpam omnem derivet, qui a Seminervosi titulo, & notula, hujus omissa descriptione, continuo ad proximam Glutæi minimi descriptionem transiliverit; ita enim contigisse, & Musculorum additus Index, & Figura 32. (quæ tibi est Tab. XXII.) in cujus Explicatione id notamus, & verba potissimum quæ de Glutæis universe in illius fine descriptionis subjunguntur, satis videntur indicare. Te vero quem nulla ejusmodi res defendit; quemque insuper pollicentem esse, meminimus, in Tabularum Explicationibus correctiones, ac mutationes necessarias, qua unquam ratione excusabimus? præsertim cum iis quæ ad Glutæos pertinebant, verbis amotis, eorum loco posueris: „ hunc muscu-

lum Tibiæ flexendæ occupari. „ Nam si tuus iste Seminervosus, in tertiam impressionem maxillæ Rotatoris inseritur; „ femur certe movebit, non tibiæ. At fortasse Tabula exactior est? Nihil minus, ut quæ in sinistro femore Seminervosi nomine Bicipitem monstrat, atque ita non cæteris dumtaxat Tabulis, sed sibi etiam ipsi quæ longe alia in altero commonstrat femore, repugnat. Prætereo, Subpopliteum musculum, quem Anatomici jam docuerant, non nisi remotis Gastrocnemio, & Plantari ostendi posse; in hac tamen Tabula iis minime dimotis ostendi, & rhomboidæa quidem figura, & fibris cruri perpendicularibus: quæ cum vero haud quam consentiunt.

ANIMADVERSIO XII.

Am vero ad X. Tabulam transeamus, si modo illud præmonuerimus, Figuras omnes quas in Tab. VIII. & plerasque earum quas in proximis Tabulis undeviginti exhibes, Casserii nostri esse, non autem ejus quem tu Auctorem laudas, Brownii. Quod ergo attinet ad X. Tabulæ Figuram 1. quæ quidem ex Cowpero est; quoniam in Caput Indicis, Explicationibus hujus Tabulæ notam correctionis apposuisti, credent fortasse aliqui, te hanc Cowperi Explicationem correxisse. Sed quoniam hic sub illius nomine adscribis: „ Hujus hæc est Explicatio; „ alii vicissim credent, a te nihil esse mutatum. Re tamen vera cum Cowperus in Explicatione sua nil fere nisi nuda nomina posuisset; tu plures, ex Brownio etiam, cum visum est, sumptas descriptiones admiscuisti. Quo fit, ut quædam Cowpero, imo ipsi veritati repugnantia proponas, ut dum musculos Palpebrarum Orbiculares „ in can-

46

46.

Myotom. c. 9.

Vide supra 19.

Myot. c. 18. Anthropol. l. 5. c. 15. De hum. corpor. fabrica l. 4. c. 5. Syn. Anat. c. 13.

47

Myot. c. 6.

bicu.

De Nasi,
aliisque
Faciei mus-
culis.

bicularis Palpebrarum, per quam nimirum depressa supercilia adducuntur. Constrictorem vero Alarum Nasi cur dicis omissum, quem tu ipse, vi-
sum pene fugere, neque per fibras suas com-
mode depingi posse, fatearis? Nimirum Cowperus pro fictitio habuit, & propterea omisit. Ego certe quoties quæsi; quæsi autem sæpe, & in perquam nasutis; de eo videre nihil potui: nihilque credo vidisse Eustachium, alioqui pro sua diligentia non omissurum. Quæret hic aliquis, cui ergo musculo constringendarum alarum nasi munus assignemus? Habebimus infra in Tab. XX. ex Cowpero musculos duos ei rei addictos. Sed quoniam illi ita nares arctant, ut superius labrum una deprimant, videmus autem, etiam eo labro non depresso nares arctari; videntur profecto alii præterea musculi esse quærendi. Itaque animadvertimus in Eustachii Tabulæ tibi XVIII. Figura 1. & 3. & in hac quidem adlitteram a musculum ad latera alarum nasi, segmentum annuli imitantem, proponi, a quo easdem coarctari posse, non est dubitandum, præsertim si inferius extremum sub earundem alarum latere habeat recurvatum, ut semel observavimus. Verum candide nobis fatendum est, in pluribus deinceps cadaveribus neque talem, neque qualem Eustachius delineat, eum musculum nobis occurrisset: occurrisset autem musculum non ex curvis, sed ex rectis fibris constantem, modo ex ossis quarti maxillæ superioris qua latus nasi constituit, crepidine super interna membrana nasi ad modum institæ infra nares superius labrum versus descendente, alias vero aut ab eodem osse extra illam crepidinem, aut ab ejusdem crepidine qua basim extremam narium constituit, necnon a Sphinctere labrorum oblique per eandem membranam narium ascendente; ut non minus in his variam Naturam deprehenderimus quam in plerisque aliis faciei musculis. Sic ab osse jugali fasciculum fibrarum non contemnendum ad Proprium labri superioris Elevatorem musculum dimissum bis vidisse, meminimus. Sic Zygomaticum musculum in tribus aliquando finiri fasciculis, observavimus, quorum duo labro eidem, alter angulo labrorum infigebatur. Sic Cowperianos labrorum musculos a gingivis oriundos, interdum vix conspicuos esse, notavimus; ut reliqua ab aliis etiam adnotata discrimina prætereamus, & in his illud Bartholini, qui Elevatoris Alarum Nasi; non, ut tu dicis, Constrictoris; appendicem ad labrum superius demissam vidit. Neque vero mirari convenit, quod faciei musculi non omnes omnibus eodem & numero, & modo contigerint; nam illa admirabilis facierum & vultuum varietas inde quoque est deducenda. Verum ut ad id redeam cujus causa hunc sermonem institui; ego sane ita censeo: contractionem alarum nasi, quoniam vel cum labri superioris depressione, vel cum ejusdem elevatione contingit, tunc quidem potissimum a musculis illis Cowperi qui in tua Tab. XX. lit. D. indicantur, nunc vero ab iis qui in 1. Figura X. Tabulæ ad lit. C. EE. monstrantur, esse repetendam; hi enim, dum turgent, alas nasi ab lateribus, & ab inferiore quoque parte comprimunt, & partim obducunt. Unum addam priusquam ab hac Figura Brownii recedamus, Communes Labiorum Elevatorem, & Depressorem illum quidem pro Elevatore Labri inferioris, hunc vero pro superioris Depressore perperam indicari. Figura autem 3. Cowperus non, Capitis Musculos posteriores, sed Capitis, & Colli Musculos plures repræsentari, inquit, probe conscius, in hac Figura, ut ceteros mittam, desiderari musculos Occipitales; quos Verheyenium nunquam vidisse, antea mirabar, nunc autem magis miror, a te in omni hac tua de Musculis tractatione esse prætermittos. Nam ut Falloppium, Columbum, Platerum, Riolanum, Bauhinum, Bartholinum hos proponentes non vidisses; at Cowperi certe descriptionem, eamque præterea quæ ab Amplissimo Pontific. Ar-

Morgagni Adversaria Anat. II.

chiatorum Comite Lancisio Tabulis Eustachii; qui illos musculos in pluribus pinxit Figuris, adjecta est, in manibus habuisti. Porro hic quoque in Spleniorum descriptione longe abis a Cowpero, atque adeo a vero, præsertim dum eorum insertionem in transversos processus secundæ & tertiæ colli vertebræ, a nobis etiam sæpe observatam, omnino prætermittis, multoque etiam magis dum Rectos Majores Capitis inter, Colli Musculos, numeras, & denique, ut alia præteream, dum Obliquos Superiores inveniri, dicis sub Musculis Rectis, & tenuem protuberantiam a qua Recti Minores oriuntur, vertebram colli primam circumdare. In Figuram 4. quam Brownii esse, dicis, nihil habes quod adnotes, nisi Explicationem musculi Semispinati, quem in ea reperiri, inquis, cum cæteri musculi jam explicati sua nomina propriis, ut tu ais, inscripta locis exhibeant. Ego vero plura habeo quæ notem. Namque, ut omittam, vel septimæ colli vertebræ spinam in ista Figura bifidam delineari; qui pro musculo Splenio in ea ostenditur, scito esse Transversalem; qui autem pro Semispinato & ibi indicatur, & a te explicatur, is facile est Spinalis; nam certe Semispinati in ista Figura est tantum particula superior, ii scilicet tendines qui inter tui Semispinati inferiores tendines, & dorsi vertebrae occurrunt. Hæc omnia nisi mihi credis, crede tibi, cadaver aliquod inspiciendo, vel quod tibi facilius erit, consulendo Explicationem ejus Casserii Tabulæ quæ ad Librum quartum Spigelii VI. est; ex hac enim istam suam Brownius descripsit. Ex ea quoque Tabula cognoscere poteris, Semispinatum a spinis ossis sacri, & lumborum minime nasci, neque vertebrarum, nisi thoracis dumtaxat, spinas ab ima ad summam tendine instruere: quæ videlicet tu doces. Non ignoro, Semispinatum videri posse continuationem Sacri, & Transversalis Colli; sed vel hac re posita, loquendum est aliter, nec eo nomine sic ambigue utendum est.

ANIMADVERSI O XIII.

IN Tabula autem XI. tibi repugnant ipsæ Figuræ 1. & 3. dum istum musculum Geniohyoidem a media parte inferioris maxillæ, seu mento oriri, dicis, a nomine, ut puto, deceptus. Non enim ab ea tantum maxillæ regione, sed maximam partem ab ejus lateribus enascitur, ut propterea præstet cum Cowpero Mylohyoidæum vocare. Sic ortus, perpaucas modo postremas fibras hyoidis basi immediate inserit; nam pleraque eidem infigit media tendinea lineola in quam uterque musculus convenit; nisi potius utrumque pro unico musculo Pinnato accipiamus. Itaque multum a vero aliena est horum musculorum delineatio quæ in Figura 4. a Brownio ex Veslingio sumpta, exhibetur. Eademque in remanca est non delineatio quidem, sed descriptio Verheyenii, qui dum usui hujus musculi a te quoque proposito addidit quod lateraliter moveat, non de Pari, ut facit, sed de altero tantum musculo loqui debebat. Quid? quod idem Verheyenius prorsus omittit usum Stylohyoidis (sic enim malo quam Styloceratohyoidem vocare quem sciam, non tantum cornibus hyoidis, sed & basi infigi.) Usus autem ejus est præter id quod tu dicis, etiam retrorsum movere. Quod autem Digastricum ais vel per hunc musculum transeuntem, vel sub eo inveniri, primum semper cum cæteris Professoribus vidi; alterum nunquam memini observasse. Cæterum cum in Adversariis prioribus tum descriptione, tum Figura, quæ tibi est 3. in Tab. CIX. veram Hyothyroidis & Sternothyroidis insertionem proposui, qua in re non modo veteres, uno fere excepto, ut postea cognovi, Eustachio, sed & recentiores Anatomici, & in his accuratissimus aliqui Cowperus, peccaverant; sperabam, hunc errorem in posterum sublatum iri præsertim in re vera

47.

48

48.

De nonnullis ossibus Hyoidis, Laryngis, & Linguae musculis.

l. i. tr. 4. c. 18.

Ibid.

num. 6.

Myot. c. 15.

Anat. quart. re-
nov. l. 3.
c. 10.

47

l. i. tr. 4.
c. 10.

adeo, atque perspicua. Sed postquam Verheyenium in Figura quæ tibi est Tab. LXXXVIII. K. magnam partem ejusdem erroris retinuisse, vidi, nunc te video vel in descriptione totum retinere. Addis alios in utriusque musculi usu; nam cum arcuare glottidem consueverimus, elevante laryngem Hyothyroide, diducere autem, deprimente Sternothyroide, quod facile animadvertes; si laryngis locum in acutis, & gravibus vocibus attendes; tu contra, Hyothyroidem dilatare, Sternothyroidem arcuare glottidem; tradis. Præterea in Sternothyroidis origine non modo cum Verheyenio, & Cowpero mancus es, claviculas omittendo, a quibus magis fere quam a sterno pronascitur; sed magis credens Figuræ isti 4. quam 2., eandem ubique magnitudinem servare doces, cum vere ab lato suo principio recedens, multum inter ascendendum contrahatur: quod præter Casserium ex quo illa 2. Figura est, etiam Eustachius docere te poterat in Tabulæ tibi XVIII. Figura 5. & 12. Cricothyroidem vero (nam cur tecum addam *anticum*, cum nullus ejusmodi posticus sit?) quis in ista 1. Figura intelliget, nihil habentem eorum quæ Casserius in sua, unde hæc descripta est, Figura expresserat, nisi hic superfluas, quæque adeo duorum foraminulorum specie imponunt, litteras o o? Porro usum quem ipsi assignas, Verheyenius reprehendit, & contrarium adscribit; ego utrumque, sed alium alio tempore præstare, credo. Musculorum autem istorum quos, in Tab. X. descriptos, dicis quod paulo post etiam in Explicatione Figuræ 3. iteras, eorum scito ne unum quidem in ea Tabula descriptum esse. Coracohyoides oritur quidem a latere, live a costa, superiore scapulæ, ut ego in memorata superius Figura pinxi, sed non juxta processum coracoidem, multoque minus ab eodem processu, ut secure Verheyenius vel in altera editione docet. Quod ergo tu addis, eundem musculum, per scapulam oblique transire, num verum sit, ex his ipsis intelligitur. Quod autem, ut subjicis, feratur in Mastoidem, qui subter Mastoidem meat, & inferatur cornibus hyoidis, qui etiam proximæ basi inseritur, hæc nimirum ejusdem diligentia sunt. Num vero Sternohyoides, ejusdem sit ubique latitudinis, & consistentiæ, primum quidem eadem te secunda tuæ Tabulæ Figura docere poterat; alterum vero id quod nos de ejus musculi nervosa inscriptione in primis Adversariis scripsimus, & in Figura tuæ LXXXVIII. Tabulæ 16. delineavimus. De hac ego admonitus nescio quid Verheyenium correxisse, putabam, eam forte inscriptionem in dubium revocasse propterea quod in cadaver aliquod incidisset (qualium ego in maximo numero nonnulla postea vidi) in quo non ita clare appareret, aut etiam deesset. Sed salva res est; nihil ejusmodi. In hisce, inquit, musculis observat, Morgagnus inscriptionem nervosam, seu potius, ut ego statuo, tendinosam; quasi vero ubi de istiusmodi inscriptionibus loquimur, nervosum & tendinosum apud Anatomicos idem non esset, vel quasi ego diserte *tendineas* non dixissem. Quanto satius fuisset, ut non id sibi statuendum sumpsisset quod ipse jam statueram, sed accuratius hujus musculi originem proposuisset. Non modo enim a sterno, ut tu quoque ais, exoritur, sed etiam a clavicula, idque ita evidenter, ut Cowperus in contrarium errorem currens, non a sterno, sed a clavicula tantum nasci, tradiderit. Geniohyoides, fateor, *mox* (idest ut te velle, puto) modo fuit descriptus; nam etsi in Explicatione hæcenus examinata Figuræ 1. Mylohyoidem, sive Geniohyoidem Obliquum, ut Verheyenius vocat, vel ut alii, Externum describere debebas, a nomine tamen deceptus Geniohyoidem hunc Internum, qui modo esset explicandus in hac 2. Figura, jam ibi descripsisti. Musculum vero Hypoglossum, seu Basiglossum quomodo ais, oriri a basi ossis hyoidis; si te tua ipsa Figura docet a mento intrinsecus super

Geniohyoide Interno nasci? Veslingius, ex quo descripsit Brownius Figuram tuam quintam, a lingua extra suam sedem deposita, & ut in ea Figura disposita deceptus ipse alios decepit, dum tendineum fibrarum omnium illius musculi memoratum initium, in eadem Figura per illam albedinem quæ per transversum in utroque hoc musculo pingitur, satis apprensus, pro nervea substantia his musculis interposita, accepit. Quod si ea arrepta huc atque huc ad latera linguæ elevatos musculos reclinaffet, tunc vidisset, minimam partem eorum fibrarum, quas ipse omnes ab osse hyoide oriri credebat, ad ipsum finiri. Videbis hunc musculum ita diductum a Verheyenio in tuæ Tab. CIX. Figura 6. in qua & a Cowpero Fig. 11. delineatur: apud quos, & præsertim primum, meliorem ipsius descriptionem, & quod consequitur, meliores usus invenies. Vocant autem ambo, & jure quidem, Genioglossum. Nam quem Verheyenius Basiglossi nomine & describit, & in eadem Figura ostendit, pars est Ceratoglossi: quem etsi nos quoque pluries vidimus quasi divisum in duos; non tamen propterea augendum numerum musculorum censemus, eoque minus quod etiam Geniohyoidem Internum in sua facie interna utrinque similiter divisum vidisse meminimus.

At Genioglossus qui in Figura 4. indicatur, recte a Veslingio inter musculos ossis hyoidis relatus est, atque adeo ipse est Geniohyoides Internus de quo dictum est supra. Tu vero affers descriptionem neque ipsi, neque ulli (quod sciam) musculo convenientem, nisi quod ex parte aliqua vero Genioglossi de quo diximus, videtur convenire. Myloglossum, qualem Verheyenius in ea quam memoravimus, Figura adumbrat, utcumque interdum vidisse memini; qualem tu hic de sententia multorum veterum Anatomicorum proponis, non facile memini. Ceratoglossum autem etiam a basi ossis hyoidis deduco. Thyroarytænoidem, ab inferiore parte thyroidis oriri, ut dicis, falsum est, ut & Cricoarytænoidem lateralem, ab inferiore, Cricoidis. Figuras denique 8. & 9., quas Brownius pariter ex Veslingio descripsit, ita video depravatas, ut in hac Epiglottis, in illa autem Cricoides, & postica facies asperæ arteriæ; in qua completos annulos exhibes; non agnoscantur. De ista autem Arytænoidis musculi delineatione, deque tua ipsius descriptione non esse opus arbitror me alia dicere postea quæ in Adversariis prioribus, ut plerumque observanda, proposui. Quæ si non Verheyenius, qui in sua nimirum & sententia, & cum hac ipsa pugnante delineatione persistit, quam tu habes in Tab. LXXXVIII. Fig. 9; at Eustachii certe auctoritas in Tabulæ tibi XVIII. Fig. 15. & 16. luculentissime confirmavit. In quibus cum ea quoque confirmata sint quæ de fibris Cricoarytænoidis postici indicavi, sursum; non recta, ut tu ais; sed oblique progredientibus; satis erit ut de eodem musculo unum subjiciam: non inseri ipsum in Arytænoidis, ut tu dicis, interiora, qua ratione Arytænoides abducere non posset, sed in exteriorem tum lateralem, tum posticam ipsius basim: quem terminum proposuisset Verheyenius oportebat, si quem hujus musculi usum tradit, eum volebat posse intelligi; trahit autem Arytænoidem extrorsum atque retrorsum.

ANIMADVERSIO XIV.

CUM alibi alias esses, easque magis accedentes ad verum, Pharyngis Figuras allaturus; mirari satis non possum cur hanc attuleris in qua, nonnullis ex ipsis veteribus Anatomicis non diffidentibus, certum est cultri ope quosdam musculos esse effictos. Sed tamen quid in Explicatione dicas, videamus. Musculi Stylopharyngæi de tot quæ Veteribus quoque notæ erant, insertionibus eam unice commemoras quæ nec Cowpero, nec Valsalvæ Anatomicis cum in aliis Partibus, tum in hac præsertim exercitatis, est

Synt. Anat. in Explic. Tab. Cap. 11. Fig. 14.

l. 1. tr. 4. c. 19.

49

49.

num. 28.

Ibid. & in Tab. 2. Fig. 1.

l. 1. tr. 3. c. 11.

Tab. XI. Fig. 10. De Pharynge, & ejus, atque Uvulae musculis.

l. 1. tr. 4. c. 18.

Ibid.

Advers. l. num. 7.

Myot. c. 13.

Advers.I.
num. 8.

est nota ; mihi vero non satis certa , in linguæ , videlicet radices : , qua vel admissa , non tamen video quomodo œsophago , ut refert , aut contrahendo , aut dilatando possit inservire . Idemque alteram omittis a me restitutam in os hyoide , & supremam thyroidem hujus musculi insertionem , imo illam quoque ita obviam , ut vel a tua Figura indicetur , in latera pharyngis , qua posita potissimus hujus musculi usus intelligitur , ipsius videlicet dilatandæ . In Sphenopharyngæi descriptione id unum laudo quod videaris utcumque agnoscere , uvulam ad pharyngem pertinere . Video quidem quem musculum isto nomine Veteres illi indicaverint ex quibus descriptio qua uteris , desumpta est ; sed idem video , neque illum , neque hanc ad musculum quem eodem nomine in Figura ostendis , quidquam attinere . Neque minus intelligo quos musculos voluerint illi iidem Veteres a quibus tua Cephalopharyngæi musculi descriptio petita est ; sed neque ii musculi ea ratione eoque ductu fibrarum ab infimo cranio , primave colli vertebra descendunt quo istos in tua Figura Cephalopharyngæos descendere video . Neque hæc quam exhibes , Œsophagæi figura , neque ejus origo ab lateribus thyroidis vera est ; ut ex anatome , & ex Cl. amicissimique Valsalvæ , quas alibi producis , Figura , & descriptione Cricopharyngæi qui unicus verus Œsophagæus , sive Gulæ Sphincter est , satis constat . Œsophagæus autem dici non potest , Vaginalis , Gulæ Musculus ; , hic enim nihil est aliud nisi ipsa totius œsophagi tunica carnea . Atque adeo ipse Cowperus , unde , istis primis verbis exceptis , cætera quæ consequuntur , describis , non nisi interiores ejusdem tunicæ fibras Œsophagæi continuationem esse , credit , cum exteriores ab arytenoide cartilagine deducat ; rectene , alii viderint . Mihi sane neque id facile videtur ; neque interiores fibræ esse spirales , neque demum de humano quidem œsophago Steno ea quæ hic dicitur , docuisse . Musculos autem istos quos a Brownio , an a Crounio potius , adinventos dicis , plures ante hunc Anatomici sub nomine Externorum , & Internorum Uvulæ proposuere , & diligentius quam vos , eorum tum historiam , tum usus describere : quibus in rebus Verheyenius vel magis quam tu , reprehendendus est . Ambo præterea inter musculos Uvulæ Pharyngostaphylinos , & Glossostaphylinos Valsalvæ , meumque Azygon omittitis . Sed ut illum , & musculos de quibus filetis , præteream ; Pterygopalatinus , quo illum nomine etiam Cowperus appellat , quomodo ad Uvulam , ut vobiscum plerique putant , pertinere queat , non video , cum illius tendinem observare soleam in ipsam extremam osseam palati oram infigi . At Sphenopalatinum ad Uvulam quidem pertinere , concedo , sed lato , ut tu dicis , tendine inferi , nego , cum propriis carneis fibris inferi , sciam , quas in magnam triangularem expansionem late deorsum explicare , observavi . Porro quod ad proximam Figuram attinet ; ut musculum colli Longum in medium tertiæ vertebræ corpus desinentem , Scalenum autem non modo a prima , sed etiam a secunda costa enatum , sic Levatorem scapulæ a transverso primæ etiam vertebræ processu , ut multi Anatomici adnotarunt , ortum interdum vidisse , memini ; interdum quoque ab occipite alterum exortum musculum se Levatori comitem dedisse , & cum ipso se eodem inseruisse , non ignoro ; hoc tamen , ceu perpetuum , non erat in ista Figura proponendum . Quod autem Levator lato tendine non modo elatiori , sed etiam inferiori , ut doces , scapulæ angulo inferatur , id unquam aut a me , aut ab aliis visum esse , non memini . At si cui Figuræ opus erat & inscribi , & a te confirmari quid repræsentaret , certe huic quintæ opus erat ; quam videlicet esse Diaphragmatis , neque simplices , & æquales utrinque caudæ , neque musculi posterioris defectus , neque locus œsophago assignatus , neque alia quæ lubens prætereo , ulli unquam in-

Vide
Tom. II.
394Myotom.
c. 16.

50

Advers.I.
num. 8.

51.

dicare potuissent . Serratus autem anticus minor neque quantam tu ex ejus nomine credis , cum acuminatis ferræ dentibus habere solet similitudinem , neque (quod gravius est) dum a quatuor illis costis ad coracoidem scapulæ processum pergit , versus Scapulam , ut tu dicis , descendit . , Postremo Subclavium inferi , ut tu item dicis , , in totam prope longitudinem primæ costæ , ita est a veritate alienum , ut satis sit innuisse . Tu vero eo diligentius hunc describere musculum debebas , quo negligentius ipse est in Figura indicatus ; nam loco ipsius clavicula ostenditur sinistra , eaque ipsa perperam picta ; dextra autem , Summus Humeri , inscribitur . Id consulto Figuræ archetypo Casseriano , ita ut dico , se habere , intelliges .

In L. 4.
Spigel.
Tab. 13.

ANIMADVERSI O XV.

Musculos quos Steno appellavit Costarum Levatores ; diu ante ipsum cognovit Casserius : quod colligo ex hujus Tabula quæ ad Spigelii Librum quartum VI. est ; in qua etiam Tabula , ut & in proxima VII. Interospinales Cowperi mihi videtur adumbrasse . Nam cur singula spinarum cervicis interstitia bifariam secundum longitudinem divisisset , cæterarum autem nequaquam , nisi sublatis qua diligentia erat , tendinibus , & ligamentis quæ illos musculos inquirentibus a primo obducunt , eosdem vidisset ? At certe , ut dixi , in Tab. VI. a sinistro Spinæ latere statim extra Semispinatum Levatores Costarum delineavit . In hac vero oportebat Verheyenium eosdem inquirere , non autem in Scriptis Spigelii , in quibus non de ipsis , sed de origine Intercoastalium Externorum verba fieri , allatus a Verheyenio Bartholini locus significat . Idem Verheyenius , ut facile solet imposita ab aliis nomina reprehendere , ideo non probat ; eos musculos Costarum Levatores appellari , quod præter ipsos plures sint alii qui hunc præstent usum ; ipse ergo mallet Supracostales nominare , quali vero præter eos nulli alii supra costas positi essent . Quid ? quod indicat , posse in dubium revocari , utrum iidem musculi ab Externis Intercoastalibus sint distincti , qui in proximo Capite nihil dubitat , inventos a se (ut credit ; nam fuisse olim ab Eustachio delineatos , animadverto in ejus Tabulæ quæ XVI. tibi est , Figura 2.) musculos quos vocat Intracostales ab Internis Intercoastalibus , plane esse distinctos . , Ego imposita ab aliis nomina haud esse censeo ita facile mutanda ; alioqui si ii Levatores , ut ego aliquoties inveni , ita semper invenirentur , ut connexis lateribus Serrati unius ingentis musculi utrinque speciem præberent ; Serrati Postici Maximi longe melius possent vocari . Multo minus censeo , Magnorum Virorum in re anatomica diligentiam esse carpendam . Itaque etsi , modo rem sciam , ego quidem de hujusmodi distinctionibus non plus cæteris laboro ; placet tamen Verheyenius , cum miratur , Bartholinum eos musculos non fuisse ulterius persecutum , & cum satis ostendit , se pro distinctis habere , & quod in dubium revocari posse , indicat , id non line allata anatomica ratione facit . Tu vero , Manete , quos Musculos peculiariter delineavit Casserius , & pro distinctis habuit Steno , cur tanquam minutias despicias , aut qua ratione ab Externis Intercoastalibus non judicas esse distinguendos ? Quoniam , usus , inquis , habet , rum fibrarum -- idem videtur cum aliis omnibus Externis Intercoastalis fibris , forsan exquisita hæc in partibus per minutias quasdam distinguendis diligentia minus necessaria est : , quæ quidem ratio aut nulla est , aut omnes non magni musculi , qui usu conveniunt , & inter se proximi sunt , tamen origine , ac tendinis & fibrarum carnearum positu discrepant , ut hos discrepare concedis , pro uno tamen eodemque musculo sunt habendi . Tu autem qui eos musculos quos tanti Viri distinxere , distinguendos esse , negas ,

De Mus-
culis In-
terspinali-
bus , &
Costarum
Levatori-
bus .L. I. tr. 6.
c. 7.

51

De hum.
corp. fab.
l. 4. c. 13.

gas, quomodo ex uno eodemque musculo duos facis, dum Levatorem Scapulæ a Levatore Patientiæ distinguis? De eo Spigelius qui primus id nomini ejus addidit, Secundus, inquit, Scapulam attollens, & Levator dictus; a me vero per jocum, Patientiæ Musculus. Quid clarius apud omnes, quam Levatorem Scapulæ, & Musculum, seu ut Cowperus etiam vocat, Levatorem Patientiæ, eundem esse musculum? Tu tamen singulos singulis iis nominibus significari musculos, putas. Nam cum supra Levatorem Scapulæ in Figura 3. explicasses, in 7. Levatorem Patientiæ præter necessitatem, tuamque in cæteris musculis consuetudinem rursus explicas, ita utraque inter se conveniente (quod in eodem musculo necessarium erat) explicatione, ut te mirer non sensisse, præsertim cum eundem illum quem in priore, errorem erres, dum hunc musculum in scapulæ, supremam, infimamque partem, inferi, scribis. In Serratis autem plerisque, atque aliis musculis vel inter scapulas, & costas, vel inter has, & vertebrae ductis, & cum utrisque commissis, animadverto, tum alios plures, tum Verheyenium, & te mancos esse, dum eorum usum in movenda alterutra tantum parte coercetis, qui in movenda indiscriminatim hac, vel altera, ut hæc, vel altera mobilior sit, procul dubio versatur. Hæc dicta puta de Anticis præsertim Serratis, & de Postico Superiore, in quorum propterea vero munere determinando & tuendo ita se angit Verheyenius in calce Capit. 7. Tract. 6. Lib. 1. Præterea in Serratis Posticis describendis alterum eorum usum omittitis, scilicet ut dum suo lato tendine colli, & dorsi musculos complectuntur, & coercent, his eandem utilitatem præstent quam cubiti musculis membraneum Bicipitis tendinem præstare, adnotavimus: quod pariter ante Cowperum Veteres etiam cognoverunt. Sed hæc leviora sunt. Illud gravius quod impossibilem usum Serrato Postico Inferiori assignas. Nam quomodo costas, ut doces, attollat musculus qui ex inferiore origine ad easdem ascendit, ut ego cum Præstantissimis Anatomicis observare consuevi? Eustachius namque in ejus Tabulæ quæ tibi est XV. Figura 2. sic delineavit: & sic quoque in ista tua 8, quam ex Brownio esse dicis, delineavit Casserius; nam quod illam quoque infimam a sinistris partem ad costas pertinere, Bucretius credidit, nec fieri id potest, neque ipsum credo Casserii mentem esse assecutum, quæ ab altero latere manifestissime elucet; quanquam in tua Figura insertiones Serrati cum descendentes Sacrolumbi tendinibus confunduntur, & continuantur ob non bene intellectam Casserii delineationem, quæ etiam in superiore Figura misere depravata est. In ejusdem Sacrolumbi descriptione aliquot cum Verheyenio errores habes communes. Nam etsi recte ad hunc musculum duos tendines pertinere, statuis, in singulas costas immisos, quos Verheyenius tantum aliquando credit esse binos; cum eo tamen ignoras, Sacrolumbum per eam sui superiorem partem quam Diemerbroeckius Cervicalem Descendentem musculum vocat, cum transversis aliquot cervicalium vertebrarum processibus conjungi solitum esse, & illorum binorum tendinum interiores, ut bene est a Casserio in tua ista Figura 8. indicatum, descendere, cum exteriores ascendant: Quapropter ignoretis quoque hujus complexi musculi usus, necesse est, videlicet aliquando per exteriores tendines costas depressendi, alias per interiores attollendi, nonnunquam cervicem erigendi, aliosque ejusmodi qui quantum ab eo uno quem affers, differant, satis intelligis. In proximo quoque Dorsi Longissimo pariter erratis, dum de ejus altera insertionem in costas siletis, a me, & a Cowpero etiam visa: quod eo magis miror, quo magis intelligo, te illa quæ de utrobique, & separatione hujus musculi addis, ex Cowpero innominato contra ea quæ in Præfatione pollicitus eras, ita sumere ut verbum fere verbo reddas. In eo quoque peccatis quod

rarenter admodum contingere, creditis, hunc eundem musculum ad occiput usque ascendere, eoque pone mamillarem processum infigi; nam id ego in quatuor cadaveribus continenter dissectis observavi.

ANIMADVERSIO XVI.

IN Tabula autem XIII. ipsæ te Figuræ 2. & 3. & 4. cum tuis earum Explicationibus collatae evidentissime redarguunt quod pro Octavo Humeri musculo Casserii, ejusdem Nonum, & vicissim describeris, ita inter se ortu, fine, magnitudine, cæterisque conditionibus discrepantes, ut nihil magis. Cæterum ante Veslingium Riolanus eum musculum Anconæum appellavit quem musculum miror Verheyenium nunquam vidisse, qui præter Extensores cubiti Longum, & Brevem, etiam Brachium Externum viderit. Ipse profecto Riolanus, qui primus hanc quoque appellationem excogitavit, cum ex eo quem Verheyenius cum plerisque Longum dicit, Longum, & Brevem faceret, alium Brachium Externum (quod & Cowperus facit) non agnoscebat præter illum ipsum musculum quem Verheyenius vocat Brevem. Utcunque id est; mihi certe nimio plures videntur tres illi cubiti Extensores qui vulgo solent enumerari, cum inferiore parte & carnea & tendinea ita coherentes invenire soleam, ut sine laceratione tres fieri distincti musculi nequeant. Nec obstant origines distinctæ; nam neque Biceps, neque hic ipse Extensor Longus etsi geminam distinctam singuli habent originem, in plures tamen musculos solent dividi. Non hæc dico ut receptæ consuetudini me opponam, quam imo miror a te non esse observatam qui nulla allata præteritionis causa, aut saltem mentione, de Extensore cubiti Brevi ne verbum quidem habueris; sed eo dico, ut constet, non satis esse causæ quare istum præterea quartum musculum admittamus. Idem Verheyenius, & tu quoque in eo manci estis, quod quibus digitis Perforati, & Perforantis tendines immittantur, non dicitis. Illud gravius, quod cum ipse omittat illa non minus necessaria quam valida, vaginalia, ut vocant, ligamenta per quæ ejusmodi musculorum tendines sub pedum digitis coercentur; tu & in pedibus, & in manibus omittas. Iisdem sub metacarpo, & sub metatarso coercentis tendinibus, qui alioqui tracti suis ex sedibus exilirent, & finem propter quem cum digitis palma, aut planta contrahuntur, impedirent, Palmaris, & Plantaris tendines subtenduntur. Sed de Plantari postea in loco; nunc de Palmari illud addam, non videri hic te, & Verheyenium, Cowperum, aliosque plures Anatomicos advertisse id quod ego post Bucretium in Explicatione hujus, & proximæ Casserianæ Figuræ, observavi, scilicet perpetuum non esse ut musculus Palmaris inveniatur, sed interdum, idque non rarissime, Palmarem tendinem ex annulari carpi ligamento exoriri. De Carne autem ista musculosa Quadrata quam Verheyenius omittit, Cowperus autem Palmarem Brevem vocat, hunc ipsum consulere potuisses. Nam quod attinet ad Lumbricalium insertionem in latus (quod tu omittis) digitorum internum; hac omissa, eorum quem indicas, usum non posse intelligi, per te ipse videre satis poteris. Interea lætor quod postquam tot Brownii errores exscripsisti, aliquos agnoscas in ejus Extensorum Digitorum manus Explicatione; nam, Peritissimæ, mi harumce Tabularum Autoris in hac re explicationem vix concipi posse, dicis. Verus tamen harum quoque Tabularum Auctor fuit Casserius, cujus Explicationes non habemus. Quam vero iisdem Bucretius addidit, ea cum Spigelii, & Cowperi descriptionibus quod ad hos Extensores attinet, satis convenit. Cæterum; quod tu & plerique Anatomici haud bene prætermittitis monere; cum multos alios digitorum, & imprimis pollicis musculos aliter in aliis se se habere.

De Serrato Postico Inferiore.

In Explic. Tab. 3. ad lib. 4. Spigelii.

De Sacrolumbo.

l. 1. tr. 6. c. 8. Anatom. l. 5. c. 6.

De Longissimo Dorsi.

Myotom. c. 24.

Anthropogr. l. 5. c. 25. De Cubiti Extensoribus.

l. 1. tr. 6. c. 9.

De Musculo Palmaris.

Tab. 21. ad lib. 4. Spigel.

Myot. c. 27.

De musculis Digitorum.

habere deprehendamus, tum Extensores præ cæteris, in numero præsertim, & distributione tendinum, alias aliter invenimus; errantque adeo quicunque, hoc monito non adjecto, horum musculorum certam aliquam descriptionem, ceu perpetuam, & constantem proponunt. Tu vero, nullo, lam forsan meliorem atque accuratiorem, Laurentiana esse, censet, ideoque ipsam producis, neque agnoscis, quantum cæteræ quas postea indicas, ab eadem differant, aut advertis, hunc ipsum a te adeo laudatum Laurentii locum unum ex iis esse quos Riolanus in Animadversionibus reprehendit: ubi & ea quæ in altero loco, a te mox pro accuratissimo afferendo, de Interosseis a Laurentio traduntur, non ita sibi accurata videri, scribit. Porro quod ad Pollicis Extensores attinet, nimirum oblitus videris, te supra in Explicatione Tabulæ V. totidem fere verbis hanc ipsam descriptionem proposuisse. Quod autem musculos in 2. Figura istius Tab. XV. depictos, dicis vel in hac ipsa, vel in XIV. describi, scire averem, ubi in his descriptus sit musculus qui sub nomine Pollicem Abducentis depingitur, idque eo magis quoniam Bucretius in Casseriano archetypo istum musculum non explicavit; neque eum Casserius (quod vos fecistis) cum tendine interiore Extensoris carpi exterioris conjunctum exhibuit. Tu quidem in Tabula XIV. Pollicis Abductorem descripsisti; sed si eam explicationem cum isto musculo comparaveris, facile intelliges, te longe alium musculum descripsisse. Postremo in Tabulæ XVI. Fig. 1. Abducentis Indicem in eadem peculiariter indicati peculiarem explicationem omittis; in 2. autem Figura Primum Digitorum Extensorem pro Secundo indicas, & vicissim, contra atque in 1. Figura Tabulæ XV. indicatum est. Quod autem ligamentum annulare etiam in posteriore parte carpi occurrat, musculosque coerceat, recte in eadem illa 2. Figura ostensum est: quod Verheyenius videtur ignoravisse.

ANIMADVERSI O XVII.

TU qui corrigendum tibi Brownium sumpseras, quare Tabulæ XVII. Figuram 2. quæ siqua alia falsis atque abnormibus nominum musculorum inscriptionibus misere fœdata est, ne uno quidem verbo emendas? Mitto enim quod pro primum Pollicis internodium Abducente Primus Pollicem Abducens inscribitur, & pro primum Pollicis internodium Flectente Flexor Pollicis Primus; & in Primo secundi Pollicis internodii Flexore Flexoris nomen omittitur; hæc, inquam, mitto, & si vis, etiam defendo. At præter hæc, pro Secundo, & Tertio secundum Pollicis internodium Flectentibus alter quidem Secundus Pollicis Flexor inscribitur, alter vero, cum unus modo eorum sit, Secundus, & Tertius Secundi Pollicis Flexor dicitur. Ad hæc cum in hoc subjecto digiti minimi Abductor sit divisus in duos (qua de re Cowperus videri potest) eorumque alter in situ, alter extra situm ostendatur; primus inscribitur, Duo minimi, alter, Digiti Abductores extra situm, ut si Lector has inscriptiones jungat, utrumque extra situm esse, perperam credat; si disjungat, nihil intelligat. Quid, quod cum in Interosseis indicandis multo gravius peccetur; nam ut cæteros errores præteream; nulli Interosseis annulari digito intervenientes indicantur, sed contra aliquis eorum qui ei digito assignari debebant, Minimum Digitum Abducens inscribitur; quid, inquam, quod tu hæc tam gravia, & evidentia errata in tua Explicatione non emendas; non emendas autem? imo vero etiam incredibilem in modum auges, dum hosce ipsos musculos Interosseos eisdem cum *Lumbricalibus* jam supra explicatis esse, doces; qui quantum inter se differant musculi, non est ut dicam. Hæc omnia ut ego animadverto, ita se habere, cognosces, si Casserii Figuram ex qua

hæc descripta est, videlicet Tabulam XXVI. ad Lib. 4. Spigelii, ejusque Figuræ Explicationem inspexeris. In Tab. XV. explicanda Supinatoris radii Brevis nullum alium proposueras usum, nisi quod manum in inferiora cogat. Nunc Supinatoris radii Longi usum esse dicis, radium coge, re cum manu ipsi adjuncta aliquantulum introrsum, ac etiam antrorsum. Quinam ergo musculi non deorsum, aut antrorsum, qua de re hic non est locus agendi, neque introrsum; nam id officium est Pronatorum, quod tu de ipsis agens omisisti; sed extrorsum radium cogunt? nam nisi extrorsum radius cogatur, manus supina fieri non potest. Cum qualis a Cowpero, & a me origo Psoæ inventa sit, memini, miror cur tu, & Verheyenius, & plerique Anatomici ab infimis etiam thoracis vertebris ita deducatis, ut perpetuum id credere videamini. Miror quoque, cur Psoas parvus, qui haud ita perraro inveniri solet, ab eodem Verheyenio ne memoretur quidem; a te vero, & plerisque alterum illius extremum unde potissimi ejus usus notitia pendet, ignorari esse in osse pubis implantatum, quemadmodum Cowperus docet, & ego pluries inspiciens deprehendi. At Lividum, cujus tu usum omittis, ego minime soleo lividum invenire, imo eo lividiorem Tricipitem aliquando vidisse memini. Illum musculum cur Verheyenius omiserit, nescio; nam si proximi Tricipitis partem credidit, hunc cum nonnullis Quadricipitem vocare debebat. Marsupialis musculi, sive Obturatoris Interni Verheyenius omittit Marsupium: quod ideo non agnovit, neque ejus figuram, & positum, & cum Obturatoris tendine conjunctionem animadvertit, quia ex ipso, ut plures solent Anatomici, dissecto Trigeninorum secundum, & tertium *anonymos* effecit. Tu vero ejusdem musculi usum, quamvis non omissum a Brownio, omittis: & præterea cum in Figura, superducta huic musculo pingantur primum ligamentum ab osse sacro ad ischium protensum, deinde nervus insignis cruris; ligamentum pro eodem nervo indicatur, te non corrigente. Verum, ut de Tabula etiam XIX. ejusque Explicatione pauca dicamus: quorsum hic ista ad Praxim Chirurgicam pertinens Chordæ magnæ per futuram curatio? & in proximis sex Tabulis superiores Figuræ cur locatæ, quæ omnes alibi, ut ordo poscebat, nonnullæ etiam nusquam (tanti enim erant faciendæ) collocari debebant? Sed quando illius historiam curationis (cui tamen similem, ipso fatente Cowpero, viderat Veslingius) referendam sumpseras, certas quasdam circumstantias prætermittere non debebas, ex. gr. de magno dolore questum esse ægrum, cum acus per superiorem tendinis secti partem traduceretur; quamvis in ipso dissectionis loco vix Chirurgi digitum perciperet, & quando acus per inferiorem partem tendinis adigebantur, non doleat: inprimis autem Cowperum curationem istam, ut fatetur, non fuisse instituturum, nisi aliquando in tendine tibiæ equinæ insignia vasa sanguifera vidisset; hinc enim demum permotus est, ut speraret, tendines quoque dissectos conglutinari posse, modo partes vicinæ illæ, & dissecti tendinis extrema solerter ad se invicem sine ulla, vel saltem notabili vasorum sanguiferorum compressione adducta essent. Hæc, inquam, circumstantia non erat omittenda, ut appareret omnibus minutæ, velut ipsi vocant, atque adeo comparatæ Anatomæ osoribus quantum hujus notitia ægris sanandis utilis sit. Non credit tamen Cowperus (idque etiam erat adjiciendum) vasa sanguifera ad tendinis fibrillas protensa, in cæteris semper animantibus, ipsoque adeo homine a truncis per medium Chordæ magnæ dispositis distribui, sed interne prope digitorum, ac tarfi musculos accedere, & recedere; quamobrem monet Chirurgos, ne eandem curationem aggredientes, pinguedinem, & membranas prope hos musculos a tendine separant, ne commercium hujus cum vasis sanguiferis una tollant.

Vid. Tab.
27. ad l. 4.
Spig. Fig.
2. cum
Explicat.

53.

52. 53

De utraque Psoa.

Myotom.
c. 32.l. 1. tr. 6.
c. 6.

55.

Myotom.
c. 28.

Obs. &
Epist. 15.

54.

ANIMADVERSIO XVIII.

Tab. 33.
ad l. 4.
Spigel.

De muscu-
lo Obsura-
tore Inter-
no.

IN Tab. XXII. pro Livido Triceps musculus ostenditur, & ab eodem sinistro latere pro Semimembranoso Semimembranosus, & vicissim. Non ignoro, primum Explicatorem hujus Figuræ Casserianæ Bucretium eadem censuisse; sed idem scio, in ista ipsa Figura explicanda ita illum dormitavisse, ut dexterum Obturatorem Internum istuc in suo situ apparere, dixerit, quo nihil est evidentius falsum, & quanquam Casserius ejusdem musculi utrinque plures quatuor tendines pingat (quod in vestra ista Figura, quæ & in aliis peccat, non ita clare, & exacte descriptum est) ille tamen quatuor tantum illius tendines in Explicatione memoraverit, quasi vero in dissectionibus nunquam plures quatuor inveniremus; quæ in re magis accuratum ipsum Cowperum, aliosque præterea Anatomicos fuisse, optarem. Sed his missis, quem nomine Quadrigemini ostenditis, & describitis, musculum quis ex nomine unquam intelliget? Nam cum Quadrigemini sint quatuor plerisque eorum qui hoc nomine utuntur; quemnam de quatuor vultis? Conjectura igitur opus est ut intelligamus, velle vos Quadrigeminum qui plerisque eorum Quadrigeminus quartus dicitur, sive ut nunc usitatissime, musculus femoris Quadratus. Et conjectura quidem tanto magis opus est, quod ut in usu ejus musculi prætermittendo deficitis, ita in ejus exortu proponendo redundatis; deducitis enim, ab origine ossis ilei, quæ origo quid sit, aut certe quomodo hic musculus os ilium attingat, ut hoc nomine passim nunc utimur, fateor, me cum Cowpero ignorare.

56.

Myot.
c. 16.

De Pharynge, & ejus Musculis.

Et si vero idem Cowperus in sua Musculorum Pharyngis descriptione, istaque ipsius Pharyngis Figura in multis laudem promeretur; habet tamen quædam quæ probari minus debent. Nam primum quod ad progressum & finem Stylopharyngæorum attinet, cum ea omittit quæ a nobis sunt in XIV. Animadversione memorata; tum addit, eosdem musculos in mediam & posteriorem pharyngis partem utrinque ita convenire, ut dexter cum sinistro jungatur. Paris autem Pterygopharyngæi non modo, ut alias indicavi, nomen diu ante Cowperum notum fuit, sed etiam origo, & quod tonsillas, proximamque lateralem ac posteriorem pharyngis partem complectatur. Num vero tonsillas immediate complectatur, & num hi iidem musculi sint qui ab radice linguæ & ossis hyoidis extremis proveniant, alii viderint; nos quæ de ipsis observavimus, in Epistola de plerisque Uvulæ, & Pharyngis Musculis jam olim scripsimus. De vero autem Œsophagæo, & Vaginali Gulæ cum supra dixerim in illa eadem Animadversione; hic tantum addo: ejus musculi quem Cowperus hic vocat Œsophagæum, non posse esse partem illam quam superior littera *b* inscripta designat, & quam tu haud recte *expansam* dicis, cum, ut Figura quæ imo replicatam exhibet, atque anglica vox a Cowpero adhibita postulant, reddere debuisses *elevatam*. Nam illa pars, ut ex ipsa Figura patet, provenire non potest ex cartilagineis scutiformis lateribus ex quibus ipse Œsophagæum deducit; sed per fibras, quas ille aliquanto magis deorsum inclinatas pingere debebat, non autem transversas, neque ab lateribus amputare, sed persequi, longis utrinque expansionibus ad os usque hyoide pertinet. Sed neque subjectarum omnium usque ad Œsophagum fibrarum totam longitudinem, & laterales expansiones, ut par erat, delineavit. Quod denique pertinet ad eam lineam mediam secundum totam fere longitudinem pharyngis ductam in quam Pterygopharyngæos, & Œsophagæum docet convenire; ego quidem ut in pluribus pharyngibus eandem vidi, ita in pluribus frustra oculis, & cultro perquisivi; quinimo aliquando sinistri Hyopharyngæi, & Thyropharyngæi fibras vidi superato lineæ illius loco, per oppositum latus ascendendo porro per-

gere. Illud non negavero, in suprema demum pharyngis parte non modo lineam, sed latius, ut recte pingit, firmum, albumque interstitium me sæpius vidisse. Quod quidem tendinem esse, censo per quem Hyopharyngæi, & Thyropharyngæi musculi, illuc suis ad angulum his quidem acutum, illis autem obtusum ut plurimum convenientibus fibris spectantes, vel cum basi cranii, vel, ut sæpe vidi, cum primæ vertebræ antica parte connectantur. Eo enim versus, tanquam ad immobilem terminum, contrahere eosdem musculos, puto, ut laryngis, quam inter deglutendum attolli, videmus, ascensum una eademque opera adjuvent, quemadmodum in ea quam dixi, Epistola indicavi.

ANIMADVERSIO XIX.

GAstrocnemius Internus in Tab. VI. a te memoratur quidem, sed non explicatur; nam unde, quæso, ejus originem esse, dixisti? Id eo minus prætermittere decebat, quod nonnulli, in quibus Verheyenius, in eadem origine deficiunt, a fibula tantum repetentes, quam a tibia quoque deberent deducere. Et si autem non ignoro, non modo Spigelium quem describis, aut alios qui potius exscribendo quam secando, Anatomicorum nomen quæsiere, sed & pares Spigelio Prosectores sine ulla hæsitazione tradere, Plantaris tendinem sub planta pedis expandi, ut hic musculus Palmari vere respondeat, & jure Plantaris appelletur; ego tamen cum exercitatissimis Anatomicis Vesalio, Columbo, Lysero, aliisque simpliciter fatebor, me nunquam esse potuisse tam solertem, aut tam felicem, ut id viderim. Nempe in omnibus in quibus id quæsi, cadaveribus (quæsi autem in pluribus) teretem Plantaris tendinem vidi ad magnam Chordam ab interno latere non tantum, ut tu dicis, adnexum, sed ita firmiter adnexum, ut demum per non brevem tractum non nisi lacerando, separari posset. Quæ res et si satis esset ad intelligendum, quantulamcunque vim musculi Plantaris vel sub plantam producti & expansi, ultra insertionem Chordæ magnæ pervenire non posse; tamen addam, vel sic laceratum ejus tendinem cum Chorda magna omnino ossi calcis infixum, me vidisse ita ut nihil quidquam commercii haberet cum ea tendinea expansione quæ sub plantam pedis ab eodem produci creditur. Quæ cum ita sint, minus miror, quod nonnulli Anatomici, & in his Cowperus, Plantaris musculi corpus, & totum istum oblongum tendinem aliquando non invenerint. Non tamen propterea negavero, in aliis cadaveribus potuisse ab aliis ita rem observari, ut a te proposita est; imo puto, Casserium, ut hanc varietatem exprimeret, hac in Figura 2. Tabulæ XXIII. aliter atque in prima proximæ Tabulæ XXV. istius oblongi tendinis imam partem delineasse. Illud tantum contendo, non debuisses vos ceu perpetuum id tradere quod tam sæpe aliter se habere, certum est. Porro certum quoque est, jure a Cowpero istum de quo dicis, Chirurgum fuisse notatum; atque utinam alios quosdam ex eadem natione hoc exemplum comprimeret qui cum inventorum exterarum nationum iniqui sint existimatores, eorum tamen subinde nonnulla, sive quod scire dissimulent, sive ut malim credere quod ignorent, jam ab aliis proposita esse; ut nova, & propria magnifice edunt. Nam quos Cowperus ut descriptos jam a Falloppio nostro, Rectos Laterales Capitis musculos, & ut a se inventos, Rectos Anticos Minores ante aliquot annos proposuerat, sibi nuper Chirurgus ille arrogaverat. Cæterum musculos istos omnes diu ante Cowperum viderat, & descriperat Eustachius, ut in Epistola super hujus Tabulis ad Amplissimum Virum, & Fautorem meum Beneficentissimum Lancisium scripta, jam indicavi. Illud nunc addo, Rectos Anticos Minores vel melius ab Eustachio fuisse descriptos quam ab ambobus hisce

57 43

l. 1. tr. 6.
c. 13.

De muscu-
lo Plantari.

Myotom.
c. 34.

57

De Rectis
Capitis
Lateralibus, &
Anticis
Minoribus.
in calce
Tom. II.
Theatri
pag. xi.

recen.

c. 22.
Vid. Aft.
Lipf. An-
ni 1699.
M. Se-
ptemb.

Vid. ibid.

loco cit.

recentioribus Anatomicis. Nam Cowperus quidem *recta* eosdem ascendere in Myotomia scripserat; quanquam in hac postea Epicrisi errorem ex alterius descriptione, ut conjicio, agnoscens, ad finem rectum vergere, aliquanto castigatius dixerit. Alter vero, qui recte, & secundum anatomicum, oblique ad interiora, pergere, scripserat, dum eorum finem est descripturus, processum styloidem omnino ab re in medium trahit, docens, in quendam, sinum illi processui anterieus insculptum, implantari. Horum igitur errorum nullus non modo in Figuris Eustachii huc spectantibus, quæ tibi sunt Tabularum XVI. Figura 2. & XVIII. 8. & 13. sed in ipsa quoque descriptione ante hos 150. annos edita, quæ apud te est pag. 26, reperietur. Cæterum Figuras quæ Cowperianis huc pertinentibus in proxima Tab. XXV. succedunt, nullam aliam video causam cur hic posueris, nisi quod in eo undetu descripsisti, Libro cum his illas fortuito conjunctas inveneris.

ANIMADVERSI O XX.

57.

I. I. tr. 6.
c. 14.

De Extensore Digitorum Brevi.

Myotom.
c. 35.

De Extensore Digitorum Pedis Longi.
Ibid. c. 36.

Cultr. Anat. l. 4.
c. 12.

Pollicis Pedis Extensorem Spigelii verbis describis; erant tamen in his quæ emendationem exposcerent. Nam quæ possit hic musculus ferri, ad tria pollicis internodia, cum pedis pollex duo tantum habeat? Quod vero attinet ad ejus tendinem in duos diremptum, recte quidem dicis, aliquando id contingere; qua in re deficit Verheyenius; qui quod bis pro tarso hic memorat carpum, non primæ, sed alterius editionis, ideoque inepti Correctoris error facile est, quamvis vel in prima, ubi de Extensore digitorum pedis Longo verba fiunt, eundem errorem inveniam. At quod alter eorum tendinum in os pedis inferatur, etsi fieri posse, non negavero; tamen, ut Figura Casserii qua uteris in hac Explicatione, significat, & Riolanus, alique accuratiores Anatomici observant, in os potius aliquod metapedii inferi dicendus erat: quod quidem, hic a te desertus, dixerat Brownius, idemque in tribus illis internodiis pollicis minime erraverat. De Extensore secundi digitorum pedis internodii, sive Extensore digitorum Brevi miror, Verheyenium ita scribere ac si pluribus Anatomicis esset ignotus quem vix uni Bartholino ignotum esse, nunc memini. Nam quod ad Veteres attinet, etsi inter Abductores referrent plerique; optime tamen agnoscebant, & vel ipso Verheyenio, atque adeo Cowpero diligentius describebant, animadvertentes, multo sæpius ad minimum digitum quam ad pollicem, non pertinere, quod & Eustachii Tabulæ tibi XIV. Figura 1. & Casserius in suis Figuris (quanquam in ea quam tu hic affers, negligentia Scalptoris id perspicue non apparet) confirmant: quo in casu nos olim vidimus, fasciculum quendam carneum peculiarem digito minimo prospicere. Quas ad Tabulas hic eo magis provocandum credidimus, quoniam Cowperus eam partem istius musculi quæ pollicis inservit, pro peculiari & distincto hujus Extensore, quem Brevem Pollicis vocat, & seorsum describit, habendam esse, docuit, ea allata causa quod ipse frequenter ab eo musculo distinctam invenerit; cum haud modo nos, sed & exercitatissimi earum Tabularum Auctores conjunctam invenire consueverint. Quod autem de Extensore altero, Longo, digitorum pedis tradit Cowperus, videlicet quod in quinque tendines dividatur, quorum unus in metatarsum, non in digitos, infigatur, & nos vidimus vel in cadavere in quo tres distincti Peronæi (tot in aliis etiam interdum vidimus) occurrebant. Quod consulto addimus propter ea quæ a Lysero de illo quinto tendine, ab ipso quoque observato, scribuntur. Nam refert ad quendam musculum quem a Riolano Peronæum Flexorem vocari, dicit, & quem tamen ipse commixtum esse cum illo Extensore, negare aperte non audet; certe Cowpe-

rus pro uno eodemque musculo habet. Cæterum an is quintus tendo sit perpetuus, ego quidem affirmare nondum possum. At is quem Spigelii verbis hic describis, Pollicis musculus Adductor, si ut inscriptum illi in Figura nomen, & ipsa descriptio satis significant, idem est cum eo quem cæteri Abductorem Pollicis nominant; ubi, quæso, eum quem cæteri Adductorem ipsius Majoris, Cowperus vero absolute Adductorem vocat, describis? Non enim est musculus quidam rarus, aut ignotus, ut a te, & Verheyenio prætermitti debuerit; nam præter eos Anatomicos quos Cowperus indicat, Casserius ita olim delineaverat, ut illa ipsa Veslingii Figura quam Cowperus citat, scilicet Capitis 19. quinta, ex Casserianæ Tabulæ ad Spigelii Lib. 4. XLIII. Figura 1. descripta sit. Quid? quod in ista ipsa Figura qua tu hic uteris, idem musculus a Casserio pictus est, ut & in Tabulæ tuæ XXVI. Figura 2, in illa duplex, ut est a nobis aliquando observatus, in hac autem simplex, quem Bucretius, & vos quamobrem cum Interosseis confundatis & pro uno ex Interosseis ostendatis, non video, cum, spatia illa interossalia non repleat, sed prorsus extet atque emineat, sede, obliquo positu, origine, magnitudine ab ipsis omnino distinguendus. Quod cum non feceris, neque ullum musculum qui pollicem ad reliquos digitos cieat, hoc est verum ejus Adductorem, peculiariter describeris; nescio, quomodo Transversalem quem eum motum præstare, fateris, Adductorem Minorem, vocare possis. Multo autem minus intelligo, quæ fieri potuerit, ut Verheyenio hic musculus ita fuerit ignotus, ut de autoritate, & verbis Bartholini ipsum describere coactus sit. Quod utinam tu quoque fecisses; sic enim Lectores tui unde oriatur hic musculus, intelligere potuissent. Non enim (quod ex verbis tuis te velle, divinatione quadam assequor) ex ligamento articuli primi minimi digiti semper oritur, sed ex ligamento quoque articuli primi digiti proximi, idque ita sæpe ut ego nunquam nisi ex hoc, vel potius ex osse metatarsi ad eum articulum conveniente procedentem invenerim, quod & Cowpero videtur contigisse. Denique longe diligentius Lumbricalium tendines, & tendines Perforantis in ista ipsa XXVI. Tabulæ Figura 2. tum delineando Casserius, tum indicando, explicandoque Bucretius se creverant. Hic quoque id quod vos, Lumbricales extra situm, inscribitis, Portionem earum nosam esse, dixit, a qua Lumbricales Musculi enascuntur, Quod, ut cæteros omittam, cum ante ipsum diserte docuisset Vesalius; miror, Cowperum de hac Lumbricalium origine ita scribere ac si ab Anatomicis proposita non esset. Sed multo etiam magis miror, Verheyenium non modo hanc originem, sed ne carneam quidem istam portionem, si minus dissecando, at certe exscribendo, non vidisse, cum in eadem Spigelii, sive potius Casserii, Tabula ex qua suæ Tabulæ XXVII. Figuram 4. se descripsisse, confitetur, sit in Figura 3. evidentissime delineata. Has tu ambas Casserii Figuras in tua habes Tabula XXVII. num. 1. & 2. Sed in prima cum Scalptorem vestrum corrigere debuissetis qui Lumbricalium tendinum aliquem non suo loco inseruit, aliquem etiam (si Diis placet) per fissuras tendinum Perforati trajecit; ipsi alios errores additis, dum Lumbricalium unum modo recte indicatis; pro reliquis autem tribus Perforati, & Perforantis tendines ostenditis. In eadem quoque, & cæteris Figuris nonnullos musculos pro Interosseis habetis qui omnino extra ossium sunt intervalla; suntque illi quos Cowperus, septem tantummodo veros Interosseos numerans, pro Flexore pollicis Brevi, & Flexore primi ossis minimi digiti describit; ejus tu sententiam si non sequi volebas; at referre certe poteras.

58.

De Pollicis Pedis Adductore.
Myotom.
c. 35.

58.

De Transversali Pedis.
I. I. tr. 6.
c. 14.

Myotom.
c. 36.

Ad Lib.
4. Spigel.
Tab. 40.
Fig. 1.

De Musculis Pedis Lumbricalibus.

De hum. corp. fab. l. 2. c. 60.
Myotom.
c. 36.

In Explic. ejusd. Figuræ.

Myotom.
c. 36.

ANIMADVERSI O XXI.

Nunc quando tuam istam totam de Musculis singillatim, tractationem perlegimus, consideremus, num Lectorum utilitati, & commo-
fatisfaciat, atque adeo num tui ipsius pollicita-
tionibus respondeat. Atque ut de ordine fileamus,
quo neque incommodior esse alius poterat, dum
ex. gr. a labrorum uno musculo ad musculum cu-
biti, ab hoc autem ad musculum femoris conti-
nuo transilis, neque tamen constanter uteris; nam
ubi ad artuum inferiorum interiores musculos ex-
plicandos jam descendisti, repente ad labrorum &
capitis musculos reverteris; nonne inter initia
hujus tractationis promiseras, omnium prorsus
,, corporis musculorum descriptionem,, eorun-
demque,, per Tabulas,, explicationem? Quæro
igitur, ubi descriperis Proprios Labri tum supe-
rioris Depressores, tum inferioris Elevatores? ubi
Capitis Rectos tum Laterales, tum Minores An-
ticos? ubi Abductorem Indicis, ubi Gastrocne-
mium Internum, ubi Pollicis pedis verum Addu-
ctorem? Quæro item, qua in Tabula Triangula-
res, Costarum Levatores, Anconæum delineave-
ris? At dices, illos si non descriptos, at deli-
neatos, hos si non delineatos, at descriptos exhi-
buisse. Fateor; attamen hoc neque tuis pollicita-
tionibus, neque Lectorum utilitati, & spei ullo
modo respondet. Quanto ergo minus his respon-
det, quod Palpebrarum Elevatorem, Oculi ipsius
sex musculos, musculos item internæ Auris qua-
tuor, & ut meum modo Uvulæ Azygon præter-
mittam; Glossostaphylinos, Pharyngostaphylinos,
& denique penis musculos Transversales ne me-
moraveris quidem. Sed dices, te alibi hos om-
nes musculos & describere, & delineare. Non
diffiteor; hic tamen erant commemorandi, & hinc
ad ea loca nominatim, Lectores erant remitten-
di. Quid autem dices de Occipitalibus? An
ideo a te prætermittos quod non perpetuo occur-
rant? quasi vero Pyramidales abdominis musculi
(ut alios modo præteream qui perpetui non sunt)
ab aliis atque adeo a te ipso in musculorum tra-
ctatione prætermitterentur. Sed num Recti quo-
que Majores Antici Capitis, num Extensor Cu-
biti Brevis, num denique Cruræus a te sunt ullo
in loco vel descripti, vel delineati? Num dices,
hos in adjectis Theatro Eustachianis Tabulis oc-
currere? Fatebor; sed rursus dicam, te tamen tua
hic promissa non implevisse, neque Lectorem de
his nominatim ibi videndis admonuisse; illudque
inprimis quæram, num si illæ Tabulæ antequam
Theatrum tuum prodiret, inventæ non essent
infra 307. (nam certe non hoc dumtaxat Capite, sed & II.
Libro ex parte, jam scripto, ipsas adhuc expe-
ctabas) num, inquam, in tuo hoc toto ingenti
Opere par fuisset, Musculos non paucos; & jam
diu notos prorsus omissos fuisse? At saltem in
cæteris quos descriptione, & Tabulis exhibes,
musculis te recte gessisses. Verum, ut mittam
tuas descriptiones, ut supra ostensum est, haud
raro in historia, atque usibus & mancas, & fal-
sas esse, & cum Figuris non consentire; nonne
supra vidimus, te Geniohyoidem Internum pro
Externo, Genioglossum pro Geniohyoide Inter-
no, Coracoidæum pro Terete Minori, & vicis-
sim, & quod omnem omnium Anatomicorum fi-
dem superabit, Glutæum Minimum pro Seminer-
voso descripsisse, & Musculum Patientiæ pro Mu-
sculo a Levatore Scapulæ diverso proposuisse?
Verum puto in Tabulis diligentior fueris, in
quibus, ut ostendi, Latissimus Dorsi pro Subscu-
pulari, Sartorius pro Gracili, Vastus Internus
pro Sartorio, Rectus pro Vasto Interno, Biceps
pro Seminerroso, Transversalis, & Spinalis Col-
li pro Splenio, & Semispinato, Perforati, &
Perforantis Pedis tendines pro musculis Lumbricalibus,
Clavicula pro musculo Subclavio, de-
mum qui musculi in latere cruris interno sunt;
in externo, & qui in uno femore haud male; in

altero ejusdem Tabulæ pessime monstrantur; ut
præteream, in quadam Tabula satis clare deli-
neatos Interosseos Manus musculos te disertis ver-
bis Lumbricales esse, dicere. Non ignoro, te
magnam erratorum istorum partem facile esse in
ipsum Brownium rejecturum, cujus tu & Expi-
cationibus, & Tabulis, ut Peritissimi (sic enim
soles appellare) Viri usus es. Sed ut mittam, te
hujus errata & corrigere debuisses, si volebas
,, Anatomiam ideam non parum accuratam,, ut in
Præfatione promiseras, ex selectis a te Tabulis
acquiri posse, & te correcturum, recepisse, quan-
quam aliquando, ut ostensum est, potius adauxe-
ris; quid demum te movit, ut ex tot Myogra-
phis unum istum Brownium potissimum seligeres?
Num egregiæ istæ Explicationes, quarum multis
ne uteris, maluisti alias, quemadmodum ego
animadverti, ex Spigelio, non ignobili sane Ana-
tomico, sed tamen, ut his temporibus, non un-
dequaque perfecto, ad verbum exscribere, idque
ita sæpe, ut quæ Musculorum Descriptiones pa-
gina 55. & quinque item proximis a te habentur,
eæ omnes, una vel altera excepta, & per-
paucis ac levioris fere momenti quæ adjecta sunt,
verbis, in IV. Spigelii Libro ad eundem prorsus
modum legantur: quod quidem longe honestius
tibi fuisset ultro confiteri, quam invitum ex me
audire. At Tabulæ, opinor, Brownii te abri-
puere; Brownii scilicet quæ omnes propemodum
sint Casserii, quæ autem hujus non sunt, earum
plures sint Veslingii, quædam etiam in Bartho-
lini, aliorumque libris reperiantur; Brownii, in-
quam, in quibus nihil ipse sui aliud habet, nisi
quod sæpe ita depravaverit, ut vel Musculi non
agnoscantur, vel non satis distinguantur, imo ut
de Serratis Posticis Inferioribus, & Lumbricalium
tendinibus ostendi, cum aliis musculis commi-
sceantur. Sed Brownius, inquires, singulis mu-
sculis singulas appellationes commodissime inscri-
psit; quæ nimirum aut parvos musculos ita ob-
ducunt, ut amplius non appareant, aut alienæ
prorsus, & falsæ sunt, aut denique (si id tanti
visum esset) aliis etiam Tabulis a te poterant in-
scribi. Quanto enim magis, Mangete, præstitis-
set Myotomiam Cowperi Reformatam latinam
facere, & (quando de Drakii Tabulis quas vi-
dere nondum potui, judicium ferre non licet) haud
aliis uti delineationibus quam aut ejusdem
Cowperi etiam ex Appendice ad Anatomiam sum-
ptis, aut eorum ad quorum ipse Tabulas in sin-
gularum musculorum descriptione remittit. Hac
certe ratione cum tot Anatomicos anglice nescien-
tes tibi devinxisses, tum maximam eorum errato-
rum partem quæ supra notavimus, declinare po-
tuisses.

Has Mu-
sculorum
Tabulas,
atque
alia Dra-
kii pluri-
mum lau-
dat Hei-
sterus in
Præfatio-
ne Com-
pendii
Anatom.

ANIMADVERSI O XXII.

Recte facis quod de Ossibus generatim ser-
monem habiturus, Osteologia uteris Clop-
tonis Havers. Magis tamen operæ pretium fe-
cisses primum si curasses, ut latina ista versio
anglico Auctoris scripto fidelius (nam id plures
olim audivi optantes) responderet, deinde si ad-
notationes aliquanto crebriores adscripsisses. Nam
ex causa si nihil aliud ex iis quæ Summus Ana-
tomicus Malpighius cum de cæteris Ossibus, tum
de Dentibus observavit, dignum videbatur quod
a te huic Capiti adderetur; at quæ de fibris ten-
dinosis, & de ligamentis subrotundis scripsit per
quæ, præter periosteum, & tunicam, ac carnem
gingivarum, dentes firmitus cum suis alveolis col-
ligantur, hic prætermittere non debebas. Cæte-
rum nunquam ipse legi quæ de Accretione, &
Nutritione sentit hic Auctor ingeniosissimus, quin
mirarer, eum qui, ne de inaccessa, & inimitabi-
li ratione qua partes primitus delineantur, verba
facere cogeretur, maxime probabile esse posuit,
easdem jam ante ovuli fœcundationem ab Divi-
no Conditore fuisse in eodem delineatas, eum
qui cum Tyfone agnoscit, universum corpus esse
vascu-

60

In Op.
Posth.84
26. & seq.
supra 61.

96

vasculare, cum denique qui censet, Nutritionem per maximum vitæ spatium, hoc est ab Accretionis fine ad mortem non in partibus solidis reparandis, sed in harum tubulis, & interstitiis distentis servandis consistere, eum, inquam, miratus sum, simpliciorum hypotheseum, ex his tribus magnam partem convenientem, explicandæ Accretionis non vidisse; sed multis precario nimium adstructis, in alia omnia ivisse. Illam vero hypotheseum alter deinde Solertissimus Anglus vidit, ut nos ab eo labore, quem nostris olim Auditoribus eandem ut propriam (sic enim putabamus) proponendo sumpsimus, hic prorsus liberaverit. Porro quæ de Ufibus Medullæ Auctor scripsit, cum relegerem; hæc redegerunt in memoriam: rem ipsius conjecturæ nonnihil adversantem in multorum Scorbutorum dissectione invenisse Poupertium, ossium videlicet epiphyfes penitus ab iisdem sejunctas, ut in illorum motu, ob ossium & epiphyfium inter se collisionem crepitus efficere-tur, & sic ossa potius quam ligamenta contra atque Auctor hic conjicit, in iis quidem Scorbuticis accusanda essent.

Memoir.
de l' A-
cad. Roy.
des
Scienc. A.
1699.

105.
106.

ANIMADVERSI O XXIII.

De Muci-
lagine, &
Glandulis
Mucilagi-
nosæ.
c. 38.

c. 5.

c. 8.

109

107

c. 28.

106

CAROLUS Stephanus, ut vetustissimos Anatomicos nunc omittam, in I. de dissect. Part. Corp. Hum. Libro Ossa, inquit, genu articulum constituentia, recipiunt ab adipem circumfuso quiddam humoris viscosi, & pellucidi, atque albuginosi, quo juvatur motus, & fit multo facilius: quod singulis majoribus articulationibus, est commune, præsertim coxendicis, cubiti, humeri, spondylorum, ac pedum. Sic Andreas Laurentius Hist. Anatom. Libro VI., articulorum ligamentis adipem crassum innasci, scribit, partes atterendas illinentem, siccari prohibentem, & ad motum faciliores reddens, tem. Quæ ex Jacobi Sylvii sumpsit Isagoges Anat. Libro I. ubi talis adeps nunc solus, nunc cum humore crasso, & lento commemoratur quo etiam tendines illinuntur; talis quoque adeps in ischii acetabulo, & genu agnoscitur idemque humor viscosus esse dicitur tertiæ Medullæ Spinalis tunicæ, & vertebri, & articulis omnibus circumfusus. Ex his atque aliis quæ nunc sciens prætermitto, satis intelligitur, non modo mucilaginis proprietates ob quas est ab Havers cum albumine ovi comparata, & plerisque ejus usus, sed etiam mucilaginosas glandulas non prorsus fuisse veteribus Anatomicis ignotas; qui tamen adipem potius esse quam glandulas, crediderunt, cum revera non semper in homine undequaque, ut Havers ait, sint rubræ; sed sæpe eas & in genu, & in cubito, & in coxendicis acetabulo, & juxta quosdam tendines magnam partem flaventes fere ut proximum adipem observaverim. Quid? quod ex his glandulis unam ab Auctore non memoratam, a Cowpero autem; si recte memini; in Appendice ad Anatomiam Corp. Hum. additam, quæ scilicet limbo adhæret peculiaris illius cartilaginis quæ inter retusum maxillæ inferioris processum, & sinum temporalis ossis interjacet, eam quoque glandulam vidisse Stephanus videri potest. Nam in eodem Libro illam cartilaginem, ait, in mollem quandam substantiam desinere: ibidemque, contineri veluti mucosum quandam humorem viscosum ac lubricum, motionem faciliorem efficientem. Hæc ideo attuli quod Havers hic semel atque iterum dicit, has glandulas nunquam antea fuisse observatas; non vero quod negem, fuisse ab ipso primum diligentius perlustratas, atque descriptas, sive structuram, sive situm, sive duo in quæ divisit, genera attendas, & nominatim primum, disgregatarum videlicet quas ab nemine (quod sciam) ante ipsum visas esse, confiteor, neque tamen minus admitto, cum ipse in eo ligamento, sive, ut Havers loquitur, in ea membrana quæ articulum genu immediate ambit, eas aliquando evidentissime ob-

servaverim hic illic in vesiculas, vera mucilagine turgentes, dilatatas, quarum etiam una in Semilunari genu cartilaginis alte condita erat. Nam quod attinet ad conglomeratas, non dubito quin ullus sit qui in omnibus articulis facile non admittat, cum vel in minimis omnium juncturis, cricoidis scilicet cum arytenoidibus non desiderentur, ut ex nostris observationibus alias propositis liquet. At sunt præterea in aliis locis de quibus neque Havers loquitur, neque tu addis, ut alibi fortassis inemorabimus, admittendæ. Illud quoque ab Havers fortasse, at certe non satis perspicue indicatum, de structura earundem conglomeratarum ex Cowperi Anatomia poteras aut addere, aut illustrare: eas nempe non per breviam, & patula, ut glandulæ e. g. faucium, orificia hiare, sed ductus excretorios in lacinias sive fimbrias ultra propriam superficiem protendere intra sinum articuli flaccide propendentes, quo tum eorum obstructio, tum mucilaginis regurgitatio, tum nimia hujus excretio impediatur. Hæc autem earum glandularum structura vel olim nobis ita evidens fuit, ut antequam Cowperum legissemus, dum limbum earundem tenuiorem illum, & rubentem elevaremus, ac digito supposito explicaremus; in tot rubra quasi fila divisum non modo in genu, sed & aliis in articulis quibusdam majoribus luculentissime observaverimus.

Advers.
Anat. I.
num. 150.

ANIMADVERSI O XXIV.

Nullam ego satis gravem causam videre possum quare Havers adductus fuerit ut existimaret, mucilagini quidem peculiarem officinam esse assignandam in qua antequam a sanguine seceretur, elaboretur; oleo autem medullari, pinguedini, cæterisque a sanguine secretis succis non item, aut etiam ut quod a lienis glandulis posse fieri, opinatus est, id a mucilaginosæ glandulis fieri posse, non crederet, aut denique ut quando peculiarem officinam mucilagini attribuere volebat, lienem potissimum seligeret. Nam quod ait, nunquam non in splene, talem succi speciem, reperiri, idque ab nemine qui sensibus præditus sit, negari posse; vereor ut plures adstipulatores inveniat. Quod autem pervulgata extracti lienis experimenta suæ favere sententiæ, credit; ea contra maximopere adversantur. Nam Cl. Zambecarius qui in pluribus canibus id experimentum habuit, non eos pigros & tristes fieri, sed vegetos & alacres perstare, observavit. Malpighius autem illum in quo non ita absimile experimentum instituerat, socios promptitudine & alacritate æquasse, testatus est. Neque nos ipsi tum Bononiæ apud Cl. Valsalvam, tum hic apud Cl. Vallisnerium ejusmodi canes humi jacentes, ac otiosam torpidamque vitam ducentes, aut ad motus, concitatos præsertim & crebros, redditos, ut Havers putat, ineptiores observavimus, qui contra non minus quam antea solerent, ultro citroque discurrere atque saltare vel pluribus ab excisso liene interjectis annis pergebant. Cui rei si sine mucilagine oleum medullare sufficeret; neque ea opus esset, neque oportuisset ab eodem Havers supra statui; per mucilaginem lubricitatem ejus olei utiliter augeri, & multo minus; mucilaginem, potissimam rem, videri per quam ossium articulorum extrema lubrica reddantur, & conserventur, ut animal quotiescunque opus est, has partes facillime movere possit. Cæterum isti Drelincurtii observationi quam Auctor ad ea confirmanda adducit quæ de rheumaticorum dolorum causa disseruit, libenter, ut apparet, addidisset alteram Fabricii ab Aquapendente. Hic enim in Chirurgicis Operationibus, Capite de Articulorum Uisione (ubi de Mucoribus sermonem habet in 58. Aphorismo Sect. VI. memoratis, a nobis autem per nimis aquosæ mucilaginis in articulis redundantiam explicandis) vehementem dolorem describit mulieris cui tumor mobilis,

De Muci-
lagine
quædam.

III

III

Exercit.
de Liene,
infra in
Theatro
357

Vid. &
Heister.
in Ephe-
mer. N.
C. Cen.
VI. Obs.
25.

109.

114.

lis, parvæ castaneæ magnitudine paulo supra car-
pum interna ex parte obortus erat. Hanc ille sa-
navit tumore exsecto, in quo vitream, ut loqui-
tur, pituitam concretam invenit, tendines inter-
nos contingentem. Quam quidem Havers mucila-
ginem fuisse ab acidis succis coagulata, non
valde, ut opinor, dubitasset. Postremo Auctor
intra cartilagineas caveas, sive interstitia sub sen-
sum non cadentia recte concipit, ut ipsarum fle-
xilitatem, & vim elasticam explicet. Ea inter-
stitia minor cartilaginum quam ossium, gravitas
confirmat: quæ Cartilaginum proprietates etiam hic
ab eodem omissa est; ipsa tamen etiam in causa
est ut Natura cartilaginibus potius quam ossibus
usa sit, certis præsertim in locis, ut puta in lim-
bis palpebrarum. Sed dum Auctor ex adverso
cartilaginibus negat caveas sub sensum cadentes,
spongiosam videlicet illam internam structuram
quæ in ossibus observatur, & in ea vesiculas, &
medullare oleum intra ipsas secretum; cum his
non consentiunt ea quæ nos multoties in cricoi-
de adhuc cartilaginea, multoque etiam sæpius in
arytænoidum (quas nunquam offesa factas videre po-
tuimus) tota basi observavimus, velut in Adver-
sariis prioribus scriptum est.

A N I M A D V E R S I O XXV.

CUM Havers istius suæ Figuræ, i. in Tab.
XXVIII, Explicationem supra per se dede-
rit; cur aut ad illam Lectores non remittis, aut
hic eandem non iteras? aut quando alteram tu
addere voluisti, cur non illius quidem, sed tuam
esse, non mones, maxime cum quædam sis non
de sententia illius Auctoris intermixtura? Pleri-
que enim qui hanc legent, ut illius esse, credent,
sic putabunt, ipsum quoque docuisse: laminas istas
ossium per, claviculos osseos, colligari: quæ
sententia omnino Cl. Gagliardi est. Havers enim
de claviculis, sive ut Malpighius mavult, ipso
non diffidente Gagliardo, de productionibus &
ramis a fibris laminarum ut aliorum, sic ad per-
pendiculum per proximas laminas missis, Havers,
inquam, ita de his rebus multum siluit ut ego
aliquando dubitaverim, an non pori transversii
quos in compactioribus etiam laminis vidit, &
medullaris olei distributioni inservire, docuit,
foraminula potius plerique fuerint per quæ ut i-
gnorata, sic disrupta, & hinc illinc fortuito
evulsæ claviculorum partes transmitterentur; id-
que eo magis quod ex Præfatione Gagliardi, a te
omissa, constat, hunc quoque in primis perqui-
sitionibus nil nisi foraminula in lamellis vidisse,
at in posterioribus majori diligentia & cautela ad-
hibita, per ea foraminula transmitti claviculos,
demum invenisse. Prætereo, istam a te Explica-
tionem ita negligenter esse scriptam, ut venis at-
tribuere videaris, quod arteriis medullaribus con-
venit; ut sacculos medullares vesiculis appensos
esse, improprie satis dicas; & denique ut fora-
mina per quæ oleum medullare ex ossibus in jun-
cturas defluit, ea quidem ipsa esse, ajas, in eo-
rundem ossium extremis, attentis oculis facile ob-
servabilia, cum id Auctor dixerit de iis quæ in
sinibus qui a latere occurrunt, sunt foraminibus;
ea autem quæ in extremis sunt, exilia admodum
esse, dixerit, & quæ detegere in multis ossi-
bus difficile valde sit. In Explicatione au-
tem Figuræ 4. mucilaginosas majores glandulas a
minoribus, sive conglomeratas a disgregatis mi-
nime distinguis, quinimo has atque illas videris
confundere. Quid te, obsecro, cogebat, ut hæc
atque alia ejusmodi hisce Explicationibus admi-
sceres de rebus ab Auctore jam satis traditis? vel
ut nominatim Explicationi Figuræ 5. falsum, &
a Figura ipsa satis refutatum titulum præpone-
res? Quæro enim, quænam ex delineatis in ea
glandulis illæ sint quæ, ut tu dicis, in genu po-
stica parte extant? Havers quidem in Dissertatio-
ne has quoque commemoravit; non alias tamen
aut descripsit, aut delineatas hic a se dixit (quæ

enim id quod non fecerat, se fecisse, dicere po-
terat?) nisi tres circa rotulam, atque ideo in an-
tica genu parte sitas. Sed utinam tres istas glan-
dulas & quæ item in Figura 4. proponitur, sem-
per fideliter in delineatione saltem exhibuisses.
Verum cum multo hic minores exhibeas quam in
Bibliotheca Anatomica exhibueras; aut hic, aut
illic ab archetypo recesseris, necesse est. A quo
utinam, quando tibi recedendum erat, imminuen-
do potius, quam augendo glandularum folliculos,
recessisses. Tantum enim abest ut ea qua in Thea-
tro pingis, magnitudine iidem appareant; distin-
ctos folliculos in majoribus hisce glandulis secun-
dum naturam constitutis certo dignoscere nun-
quam potui. Neque multo exactior fuisti in Ga-
gliardi Iconibus, & Explicationibus exhibendis.
Nam Claviculi qui per litteras peculiare in Fi-
guris 14. & 21. indicantur, eorumque extrema in
8. frustra a Lectoribus perquirentur. Explica-
tionibus autem ipsius (nulla, ut soles, ejus rei
significatione facta) non modo aliquid detrahis,
sed plura intermiscis, & in his quædam quæ,
nisi ego plurimum fallor, ipse consulto præter-
misit, ut in Explicatione Fig. 13. & 21. In illa
enim cum ipse exteriorem Dentium substantiam
ostendens, Externum Involucrum cum suis fila-
mentis, ostendere se; dixisset; tu addis osseis:
quod videtur ille subtraxisse, quoniam eam sub-
stantiam tanto osse duriori esse, non ignorabat,
ut, interdum plusquam lapideam induere natu-
ram, scripserit, ipsamque, præsertim chaly-
be collisam interdum non secus ac silices per-
cussis, scintillas igneas emittere. Et sane cum
eandem alio atque subjectam osseam dentium par-
tem colore observamus, tum Malpighius alteram
ab altera ita distinguit, ut illam, filamentosam
crustam, hanc, osseam substantiam, absolute
appellitet; Havers autem qui eorum filamen-
torum situm, & figuram omnium diligentissime
consideravit, illam diserte pronunciat esse, na-
turæ lapideæ, & optimo jure lapidem nomina-
ri, hanc alteram, revera esse naturæ osseæ.
Denique Cl. Hirii junioris Observationes in den-
tibus habitæ ut cum memoratorum Virorum Ob-
servationibus mirum in modum congruunt, ita
dentium involucrum a subjecto osse penitus dif-
ferre, confirmant. Quæ cum ita sint, vides ut
cautius illud osseis reticuerit Gagliardus quam tu
addideris. Sic quoque in Figura 21. cum ille
in extremitate femoris plurima foramina;
quæ in tua tamen Tabula non apparent; ostendisset,
usum autem reticuisse; tu continuo addidi-
sti: pro unctuositate medullari ex ejusdem ca-
vitate trajicienda. Videlicet quem ille usum
possibilem, & citra rationem non esse, in sua
Dissertatione affirmavit, cum tu secure & sine ul-
la prorsus dubitatione in hoc loco constituisti;
rectene, an secus, hic non judico (neque enim
aut hic, aut paulo superius id quæro) illud mi-
hi satis est, constare, te tuis Auctoribus eas sen-
tentias in Explicationibus, Lectore ne suspicante
quidem, supponere, in quibus ipsi in suis Disser-
tationibus non fuere.

A N I M A D V E R S I O XXVI.

CUM quæ de Ossibus generatim ex Spigelio
addis, ea te dicas, propriis ipsius ac im-
mutatis verbis, proferre; quis crederet, te
vix duobus primis versiculis, ac ne vix quidem
prolatis, plurimos transilire, & deinde aliis ex-
hibitis octo, plus una pagina prætermittere?
Quod etsi non sine certis rationibus a te factum
intelligo; decebat tamen aliqua nota id significa-
re, ut Lectores si voluissent, reliqua in Spigelii
libro videre potuissent. Vidissent autem ex iis
quæ sentit de Ossium Doctrina, cæteris omni-
bus necessario præmittenda; te a nobis non
sine causa esse in I. Animadversione redargutum.
Idem similiter decebat facere tribus vel quatuor
aliis in locis, & præsertim ubi duas paginas to-
tas

De Glan-
dulis Mu-
cilagino-
sis.

129

supra 74.

Op. Posth.

supra 85

Hist. de
l'Acad. R.
des Scien.
A., 1699.

76

130

De hum.
Cor. Fab.
l. 2. c. 2.

tas omittis. Quatuor autem vel quinque alia loca decebat omnino non mutilare; in quibus nimirum Spigelius vel utilitates eorum quæ est descripturus, vel rationem quam est secuturus, perpaucissimis verbis proponit, vel vocum ambiguitatem tollit, vel denique quid in vulgo recepta Symphyseos divisione hic mutet, quidque novi addat, fideliter monet. Sed dices, te verba quidem Spigelii omisisse, non tamen (quod unum receperas) mutasse; quasi vero minus grave esset orationis ipsius contextum quam verba mutare. Attamen & verba ipsa mutavisti. Nam cum Spigelius recte scripsisset: Occipitis in infante, tria, sunt ossa, nonnunquam plura; tu perperam, tria sunt ossa, nunquam plura: Quam mutationem quoniam si velis, Operarum negligentia facile adscribam; tu certe sub initium secundi illius, & sexti Capitis ita verba aliquot mutavisti, ut plura tamen eorum cur mutare debueris, non appareat. Quæ ideo hic commemoro (levia enim hæc esse, scio) quoniam eo magis mirum est, te alia quæ omnino mutanda erant, neque mutavisse, neque subjecta animadversione notasse, ut putata cum ille non una cum homine in utero generari, sed edito in lucem sætu nasci & accedere, dicit, non dentes modo, sed, ossa pedii omnia, contra atque tu ipse ex Kerckringii Observationibus es traditurus; vel cum ossa capitis esse dicit quinquaginta novem, totius autem corporis trecenta & novem; nam secundum notulam a te paulo supra interjectam, illa in unum & sexaginta, hæc in trecenta undecim mutare debuisses, tum ut tibi constares, tum ut quissimum illam seorsum inspiceret, in errorem ne traheretur. Denique, ne nimis sim, ubi Spigelius de articulorum mucilagine ita scribit quasi ea semel educta reparari amplius non posset; pendent ea quidem ab ignoratione eorum quæ Havers explanavit, ad quem recte idcirco Lectorem remittis; Attamen ut eos Chirurgos reprehendendos esse, fateor qui articulorum vulnera nimis sero ad cicatricem deducunt, ita vicissim monendos fuisse Chirurgos, credebam, ne propter ea quæ se observasse, scribit Spigelius, nimis cito eadem occluderent. Hinc enim oriri posset Hydrops Articulorum, ut vocat Hildanus in singulari quem de hoc Affectu edidit, libro: quem Affectum etsi Havers ne memoraverit quidem, & Hildanus ipse a, viscoso, & veluti mucilagineo, articulorum humore non deducat; cum tamen postea ichorosam materiam ex ita læsis articulis fluentem, albumini ovi non multum ab similem esse, confitetur; satis indicat, ejus Affectus ideam sine distincta cognitione glandularum mucilaginosarum haberi perfectam non posse, quarum tunc secretio ob vim, ut ajunt, stimuli aucta, & ex parte etiam depravata concipienda est.

ANIMADVERSI O XXVII.

DE Tabulis XXIX. & XXX. earumque Explicationibus non eram verba factururus, quamvis Scalptor plura ossa in unum jungendo, ut in prima earum a sinistris quartum & primum os maxillæ superioris, in altera os jugale & maxillam inferiorem, alia magis distorquendo, Typographus autem, ut alia mittam, Externa Humeri Protuberantia pro Interna scribendo, a Cowperi archetypo & autographo, unaque a vero aberraverint. Sed deinde in Explicationibus perlegendis quas ita ex Cowpero sumptas credebam ut verbum verbo reddidisses; animadverti, hic quoque nonnulla te interfere de tuo voluisse. Namque ut omittam græcas appellationes quas aut nullis aut omnibus ossibus debebas adscribere, atque alia istiusmodi; certe Cowperus ad primæ Tabulæ num. 60. illa non habet quæ tu addis: Ex his ultimis ossibus componitur Tarsus: quodcum dicis, neque intelligitur quot de ossibus dicas, & quamvis de quatuor ultimis, ut nonnulli olim solebant, dictum intelligere Morgagni Adversaria Anat. II.

tur; id tamen non modo receptæ his temporibus consuetudini, sed & iis quæ tu ipse in proxima pagina præmiseras, & alibi sequeris, repugnaret; ibi enim Tarsum septem habere ossa, proposuisti. Quanto præstitisset ut tempus quod in ejusmodi rebus addendis posuisti, in aliquo Scalptorum Cowperi lapsu emendando posuisses, ut cum in altera Tabula numerum 5. indicem partis ossis sphenoidis, proximæ ossis frontis postremæ parti inscribere, vel saltem in ipsis Cowperi verbis aliquanto melius intelligendis. Nam cum ad primæ Tabulæ numerum 11. hæc ejus sententia sit: articulari cum osse temporum posteriorem maxillæ inferioris processum vocatum Condylodem; tu sic vertis, ut eundem processum, articulari, dicas, illi temporum ossi, seu processui qui condiloides dicitur, ut cogantur Lectores qui anglice nesciunt, existimare, ita scilicet Cowperum esse hallucinatum, ut sinum ossis temporis excipientem cum maxillæ processu excipiendo condylode confuderit. Similiter cum ad alterius Tabulæ num. 24. vertis: Superior Ulnæ pars, quæ vocatur Olecranium Cubiti; quis non existimet, Cowperum non modo significationis, & originis τὸ ὀλκράνιον, sed communis Anatomicorum consuetudinis ignarum fuisse? Et tamen ille non scripsit: quæ vocatur Olecranium Cubiti, sed, quæ vocatur Olecranium, sive Cubitus. Atque ut protinus ad Tabularum Bidloei Explicationes transeamus; cum in Caputum Indice profitearis, te has ipsas Explicationes, pro majori perspicuitate, sæpius mutasse; quæro, num majori perspicuitati inserviat quid sit & in Figura 2. Tab. XXXI. ignorare? ejus enim litteræ explicationem Bidloianam omisisti. Explicationis autem Figuræ 5. prima verba dum mutasti, cur non & sententiam magis veram reddidisti? Ita enim os Occipitis est crassius, ut sit etiam ex parte tenuius, ut Verheyenius recte admonet; quamvis ipse, illa pars quæ sit, non satis doceat. Est enim non, circa magnum foramen, cum os circa ipsum, ut vel hæc Figuræ probe ostendunt, in limbum soleat crassescere, sed circa ipsum limbum; posterius, idque ab lateribus, non autem circumcirca; certe non ibi ubi Verheyenius per A litteram monstrat; ibi enim os crassescit in duos processus, internum videlicet, atque externum; quanquam hic quem tu per litteram D ostendis, & de quo non satis perspicue cum Bidloo dicis, ipsum quoque primæ vertebræ jungi, pluribus in craniis multo minus quam in tua Figura, protuberat.

ANIMADVERSI O XXVIII.

DE Sinu isto ossis temporum exteriori qui maxillam inferiorem excipit, eo videlicet ipso quem paulo supra animadvertimus, non a Cowpero quidem, sed a te vocari Processum Condylodem; de eo, inquam, non est satis cum Bidloo, Verheyenio, & plerisque tradere, cartilagine esse obductum, sed præterea cum veteribus Anatomicis hic multo accuratioribus, & nominatim cum Stephano altera peculiaris cartilago est addenda quam in Animadv. XXIII. memoravimus. Quæ parte, inquit iste, maxillæ inferior ad ossa petrosa inseritur, in ea videas; præter cartilaginem omnibus ossium exire, communem, aliud etiam corpus cartilaginis, articulationi mediæ interjectum, crassum, & foratum: quod nos tamen vere perforatum nondum vidimus, sed tantum; ut ejusdem Stephani verbis alio in loco scriptis utamur; ab extremis spissum, ac prominens, lævigatum, ac durum, a medio tenuissimum; sic ut medium quidem, cum objiceremus lumini, pelluceret; non ita vero limbus ellipticus, in quem circumcirca crassescerebat. Caterum quid de hujus cartilaginis usu sentiamus, in XXXI. Animadversione indicabimus. Porro Tympani caveam Membranæ Tympani subjectam esse, ut dicit Bidloous, D vel,

134.

135.

136.

136.

De osse Occipitis.

l. 1. tr. 5. c. 4.

Peculiaris Cartilago inter maxillam inferiorem, & os temporum.

De Diff. sect. Part. Corpor. Hum. l. 1. c. 25.

Ibid. c. 28.

130.

131.

134.

134.

133. De Mucilagine.

c. 1.

c. 3.

135. ad n. 21.

135.

137

I. r. tr. 4.
c. 17.
I. r. tr. 5.
c. 5.

vel, ut tu, Membranam Tympani hujus cavæ *imponi*, errores sunt ab iisdem partibus non in situ naturali inspectis proficiscentes: quo & illi Verheyenii pertinent: processum longiorem incudis, perpendiculariter descendere, in antrum tympani, stapedem vero esse in hujus cavitatis fundo: & alibi, partem crassiore ossis sphenoidis, palati basim, ac fundamentum, esse, scribentis. Cæterum ad *maiores* illam tuam *perspicuitatem* pertinet, ut opinor, quod ossis temporum foramina, & nominatim magnum pro nervo auditorio apertum, quæ in hac Explicatione Bidlous; quamvis non appositis, ut sæpe solet, litteris; indicaverat, tu prorsus prætermiseris, cum solempne aliis sit Anatomicis, iisque etiam qui accuratam, ut tu in Præfatione pollicituses, totius Anatomiae ideam non promittunt, in singulorum ossium, & præsertim cranii, tractatione peculiaribus, & communia foramina per quæ vasa, nervique transeunt, nexulque item ossium inter se, ut puta hic ossis temporum cum osse occipitis, non omittere. Porro 9. & 10. Figuræ Explicationem non ita perspicuam reddidisti ut intelligam, quomodo cavitates labyrinthi *rotundæ* sit, aut quomodo ejus anfractus sint *plurimi*, cum vobis quidem, tribus canalibus semicircularibus esse plures non possint, aut denique quomodo auditus ossicula, in prima cavitate, ut & in secunda introitu, Tympano scilicet, ac Concha, recondita sint. Illa contra perspicue intelligo: eos canales, & cochleam, membrana vestiti, tenuissima; quod etsi vos sine ulla dubitatione proponitis, Cl. tamen Valsalva falsum esse, asserit: & labyrinthi cavitatem per specialem aperturam, Fenestellam ovalem dictam, cavitati cochleæ se jungere; quod nemo falsum esse, non ignorat. De proximis autem Figuris quatuor, earumque Explicationibus censeo, satius esse sile-re quam pauca notare. Non satis profecto erat, Lectorem moneri: de his rebus in alia parte hujus Operis accuratius tractari; ejus erant oculis hæc abnormes Figuræ, & non meliores Explicationes subtrahendæ: in quibus utinam illud saltem admonuisses: musculorum mallei qui brevior pingitur, eum multo longiorem fuisse pingendum; & contra, quarti ossiculi imagines hic multo æquo majores exhiberi; quod tantum abest ut feceris; in Figura 11. hoc ossiculum aliquanto etiam majus quam Bidlous, exhibuisti.

Tabulæ etiam XXXII. Explicationes, quamvis nullo ejus rei signo in Indice Capitum appposito, ita mutavisti, ut cum Bidloi sententia (si quis bene attendat) non sit in Figura 1. suturam temporum, (neque enim ad litteram H quidquam ossis temporum apparet) ostendere; tu, si Diis placet, ostendas: cumque ille in 2. Figuræ Explicatione, cranii exteriorem lamellam interiore evadere durior, dicat; tu contra dicas, interiore exteriore. E contrario in Explicatione Figuræ 4. plurima servata a te video quæ vel majoris perspicuitatis, vel ipsius etiam veritatis gratia omnino erant mutanda. Falsum namque est, ossium secundi paris maxillæ superioris foramen esse glandula lacrymali repletum; ut in I. Adversariis ostendimus. Falsum est, in orbitæ inferioris ima portione, dentes recondi; intercedit namque *Cavitas* ista *perampla*, sive Sinus Maxillaris. Falsum est, huic ipsi Sinui medullæ quidpiam, & multo magis *medullæ copiam* inhærere. Falsum denique est, quintum par ossium maxillæ superioris, palati insignem partem constituere, cum postremam tantum ipsius particulam componat, ut vel in proximæ Tabulæ Figura 1; quanquam non sit a tuo Scalptore ita distincte expressum, neque a te (ut de osse non antea ostendo oportebat) indicatum; satis apparet. Hæc ipsius veritatis gratia mutanda erant; perspicuitatis autem hæc quoque mutanda. Primum enumeratio istorum ossium Bidloana cum superius recepta Cowperiana concilianda erat; quod enim quartum par Cowpero est, Bidloo est ter-

tium, & quod huic quartum, illi est quintum. Deinde illud antrum quod circa sellam turcicam esse dicitur, dici debebat ipsi ab anteriore parte subiectum, & plerumque in duo esse divisum; si quidem hic, ut par erat, Sphenoidæos indicare Sinus volebas; si volebas, inquam, nam Ethmoidæos omnes in hac de Ossibus tractatione a te video prætermisissos; nullos autem vel hic, vel alibi, præter Frontales, delineatos. Præterea Spongiosum quod dicis os, aut cribriforme tibi erat appellandum, aut nasi ossa turbinata quæ & plerique appellant Spongiosa, ita hic erant describenda, ut num pro illius partibus, an vero potius pro distinctis ossibus ea acciperes, appareret, & sic vocabuli ambiguitas tolleretur, de quibus quidem ossibus tu hic ne verbum quidem. Postremo; ut alia prætermittam; erat tibi de osse Spongioso alia ambiguitas tollenda quam Lectori ingeris, dum ais: ejus pars qua capiti jungitur; hoc enim de osse capitis, & pluribus ex partibus cum capite conjuncto dictum, æque perspicuum est ac si quis de osse aliquo metacarpi diceret: ejus pars qua manui conjungitur.

ANIMADVERSIO XXIX.

Quis autem dubitare potest quin ea quoque aut mutare, aut notare debuisses quæ ex Bidloo in Tabulæ XXXIII. Figuræ 2. Explicatione adducis: Sapiientiæ Dentes sic a *plebe* vocitari; quasi vero a Cleanthe, a Cleanthe autem? imo vero ab ipso divino Hippocrate *συνθε-
νιστοι* non essent appellati: Dentesque universe, ex continuo labiorum motu exterius esse læves; non modo enim anteriores, aut anteriorius tantum sunt læves, sed & posterius, quo scilicet labiorum motus non pertingit: Et, priores molares duos esse reliquis minores; nam nisi ut plurimum, aut quid tale addas, ipsa quæ explicatur, Figura 3. repugnat. Quæ autem in Figura 6. ejusque Explicatione proponuntur, eorum pleraque ut cum diligentissime habitis aliorum observationibus quas supra tu ipse attulisti, convenient, tu videris. In Figuræ 8. Explicatione errat quidem Bidlous in cornibus ossis hyoidis quæ per litteram E indicare debebat, per litteram D indicandis. Hæc enim littera non cornua; sed vincula ostendit per quæ illud os cum supernis scutiformis cartilaginis processibus colligatur, ut vel ex ejus Tab. XXIV. quam ipse commemorat, constare tibi poterat. Non tamen ita errat Bidlous, ut tecum dicat, os idem aut per cornua, aut si mavis per ea vincula styloidei processui adhærere, cum huic adhæreat per longe aliud vinculum, ex eo fere loco cui littera B imposita est, initium ducens. Horum omnium vinculorum variam in variis subiectis naturam in Adversariis I. indicavimus. Cæterum in ea cum styloidei processu connexione, ad suspendendum, & firmiter sustinendum os hyoide & annexam linguam atque laryngem instituta, & in quæ priores Anatomici diligentiores sane fuerant, erravit pariter Veslingius, ab Riolano propterea in Animadversionibus redargutus, ejusmodi reprehensione quæ aliquanto melius in Verheyenium nunc caderet, illam prorsus omittentem. Denique ut mittam in Explicatione Figuræ 13. de spinis vertebrarum colli ita verba fieri, quasi secundæ spina bifida non esset; quid est quod in 15. Explicatione dicis, istas scilicet dorso vertebrae, singulari obduci membrana adipe repleta, ferta? Quæret enim Lector, num istæ solæ, num exterius, an vero interius; si autem interius, quomodo iste adeps in obelis non ita crescat, ut Medullam Spinalem comprimat? Quæ autem ratione hæc posses magna ex parte perspicua reddere (quod te curasse, appositum in Indice nota significat) ipse monstraverat Bidlous, dum hinc ad Figuram 8. Tabulæ IIC. Lectores remisit. Quæ in Tabula cum nihil ejusmodi occurrat, planum est, aliam aliquam huc pertinentem indi-

138.

139

139.

num. 38.

Syn. A.
nat. c. 11.
I. r. tr. 4.
c. 18.
140

De glandulis Muscularibus ad parietes intervertebrarum.

Theatri
Tom. II.
339. &
seq.

137.

138

num. 22.

indicare voluisse; eam autem esse X, indubium mihi est, ut ex Figura ejus 8. satis intelligitur: quam et si Bidlous, ut fuit in hisce conscribendis Explicationibus negligens, non explicavit; ex his tamen quæ in Figuræ 6. ejusdem Tabulæ Explicatione habet de quarto Spinalis Medullæ Involucro, quo videlicet pinguedine, glandulisque, præsertim posterius, referto totam eam Medullam obvelari, dicit, explicare satis possumus. Itaque eam mucilaginem, easque, ut Cowperus vocat, pingues glandulas mucilaginosas videtur significasse quas ad internos vertebrarum parietes observamus, quasque Anatomicis etiam veteribus sub nomine humoris viscosi, & adipis, mollisque substantiæ non fuisse prorsus ignotas, in XXIII. Animadversione indicatum est. Tabulæ quoque XXXIV. mutationis signum in Indice Caput apposuit. Neque tamen ita Explicationem Figuræ 4. mutatam video, ut legam, non posticam, sed inferiorem istius lumborum vertebræ faciem ostendi. Neque ea quæ de Costis universe continuo subjiciuntur, mutata invenio. Sed de ipsis ita verba fieri adhuc, video quasi omnes costæ sinum illum in margine inferiore insculptum haberent; inferiores autem omnes, imo (ut tu nonnullis interjectis verbis, iis quæ in calce Explicationum hujus Tabulæ adduntur, aperte repugnantibus, planissime explicas) *Spuriæ* quinque Sterno per cartilaginem colligarentur; hæ denique tubercula per quæ cum vertebris articulantur, nulla haberent, sed eæ tantum quæ vertebrae attingunt superiores; atque alia ejusmodi, quæ ita generatim dicta a veritate sunt aliena. A qua evidentissime alienum est id quod in Figuræ 5. Explicatione retines: extremum Costarum Tuberculum C, quod nemo nescit cum Sinu Corporum Vertebrarum articulari, illud esse quod cum Sinu Transversorum ipsarum Processuum articulat. Neque te in XXXV. Tabula diligentior ostendunt aut servatæ in Figura 2. litteræ ita oscitanter dispositæ, ut per litteram G cum Eminentia Scapulæ secunda indicari deberet, prima & tertia indicentur, aut in Figuræ 5. Explicatione Ensiformis Cartilago pro tertio, sive infimo Sterni Osse proposita.

ANIMADVERSI O XXX.

DE Officulis Sefamoideis neque ex Tabula XXXVI. in qua ipsa ostenditis, neque ex ejus Explicatione scire Lector poterit, quibus digitorum articulis, & qua ex parte apponantur: quas res miror, Verheyenium quoque prætermisisse. Non modo enim ad accuratam Anatomie historiam absolvendam, verum etiam ad ipsorum officulorum utilitates inquirendas sunt necessariae. Nam qui ex. gr. noverit, a parte articulorum interna eadem apposita officula inveniri, is non facile credet, idem ipsa quod patella, præstare, ne ossa videlicet luxentur propterea quia non ut patella, ab ea parte, a qua facilius imminet luxationis periculum, apponantur. Verum tantum abest ut tu de iis rebus aliquid adjicere volueris; quod Bidlous indicavit, nonnulla eorum in poplite sita esse, sustulisti. Quæ et si nonnulli Anatomici, & in his Verheyenius, nunquam vidisse videantur; Fallopius tamen, ut erat in dissectionibus exercitatus, non omisit; sed tantum monuit, de iis duobus officulis, „ sæpe sæpe „ pius alterum deficere, nunc internum, nunc „ quoque & externum. „ Nos certe qui alterum eorum in nonnullis cadaveribus, & in uno internum nominatim invenisse meminimus ea magnitudine, ut picta in hac Tabula longe superaret, extrinsecus gibbum, qua vero contiguum femoris caput excipiebat, concavum; cum superiore hyeme Sceletum summa diligentia pararetur ita ut multo minora officula sefamoidea invenirentur, & in his quatuor quorum singula singulis minimorum digitorum cum metacarpo, & cum metatarso juncturis intrinsecus, sed

Morgagni Adversaria Anat. II.

ab externo tamen latere, apposita erant, tam certe scimus quam quod certissime, ne unum quidem illorum in poplitibus fuisse. Cæterum, ut his missis ad ea quæ de officulis sefamoideis generatim doces, redeamus, illud sane est gravius quod cum a peritissimis Anatomicis, imo, ut Spigelius loquitur, ab omnibus fere doctioribus duodecim tantummodo in singulis manibus ejusmodi officula recenseantur (quod & tu ipse paulo ante fecisti) cumque is ipse numerus Veslingio æquo major; & jure quidem optimo; videatur; tu hunc ipsum Sefamoideorum numerum non singulis manibus; sed singulis digitis attribuas. Quem locum a te satis observatum non esse, ego facile existimassem, nisi in eodem verba mutavisses; cum enim Bidlous, „ Horum numerus, scripsisset, in singulis ut plurimum digitis „ duodecim est; „ Tu, „ ut plurimum in unoquoque „ que digito duodenarius est „ rescripsisti. De tribus autem Vinculis per quæ in Explicatione Tabulæ XXXVIII. Femoris caput suo acetabulo affigi, scribis, primum membranaceum agnosco, quod vaginæ instar totam femoris cervicem obducens, hanc quoque, non sine magna utilitate, intra articuli productam caveam includit. Teres quoque ligamentum illud brevius, & internum agnosco. Illud vero cartilagineum quod secundo loco a duobus prioribus distinctum memoras, neque ipse agnosco, neque alios agnoscere Anatomicos, invenio etiam qui de Ligamenti diligentius scripsere. Num illud vis additamentum marginis acetabuli, natura inter cartilaginem & ligamentum media, atque intra membranacei vinculi vaginam libere inclusum? Sed illud, acetabuli cujus cartilagineum supercilium vocant, additamentum est, non capitis femoris cum acetabulo ligamentum. Hæc una ex illis erat rebus quas majoris perspicuitatis causa explicare debebas, nisi, quod Bidlous quoque fecerat, ita prope ranter hæc scripsisses, ut vel insignem illum qui inter duo femoris inferiora capita posterius est, sinum, tuto illac transmittendis majoribus cruris vas & nervis excavatum, indicare prætermiseris.

ANIMADVERSI O XXXI.

CUM vero ejusmodi res quas nemo facile prætermittit, a te negligantur; minus profecto mirandum est, quod a multis Recentioribus omittas, elegantissimæ sint licet, atque a veteribus Anatomicis descriptione & Figuris celebratæ, Tibiæ Cartilagines prætermittas. Non enim satis est dicere: quæ in suprema tibiæ parte sunt, cavitates duæ (cavitates, inquam, duæ; non, ut tu scribis, *cavitas*) singulæ singula femoris inferiora capita excipientes, eas cartilagineo limbo crassiore obduci; sed omnino ita tradendum est: quoniam eæ cavitates minus sunt profundæ quam iis capitibus excipiendis conveniret; non modo sua, ut cæteras ejusmodi, superinducta cartilagine eadem augeri, sed præterea singulas singulis peculiaribus cartilaginibus instrui, natura inter ligamentum & cartilaginem media, figura semilunari, inferius convexis, superius cavis ita ut quo magis ab utroque tibiæ latere versus cavitatum quibus imponuntur, centrum accedunt, eo magis ipsarum crassities extenuetur. Et quidem si nihil aliud Sapientissimus animantium Conditor spectasset, nisi ut his cartilaginibus eas cavitates augeret; huic rei proposita illarum structura suffecisset. Cum autem illud præterea addiderit, ut tam inferiore quam exteriore superficie sint prorsus liberæ atque solutæ, & non hac tantum, sed illa etiam læves, & mucilagine inunctæ, ac lubricæ; necesse est, aliam quoque utilitatem ab ipsis præstari, voluerit. Quod si hæc cartilagines cum membranaceo tantummodo ligamento quo genu articulus obvolvitur, exteriore ambitu connexæ essent; non vero etiam, ut ego observavi, multo firmitus

D 2

De Hum.
Corp. Fa-
br. l. 2.
c. 27.
134
Syntagm.
Anatom.
c. 17.
Imo Vide
Heister-
rum in
Ephem.
N.C. Cen.
VI. Obs.
29. & in
Compen.
Anatom.
num. 138.

141.
143

De Femoris
&
Acetabuli
Ligamentis.

Tibiæ
Cartilagi-
nes Semi-
lunares.

143.

Anatom.
of hum.
Bodies in
Explic.
ejusd. Fi-
guræ.

140.

141

De Officu-
lis Sefamoideis.

I. 1. tr. 5.
c. 16.
Observ.
Anat. ubi
de Muscu-
lis Pedis.

De Mot.
Animal.
Part. 1.
c. 9.;

supra
Animadv.
28.

144

colligarentur cum cartilagine summam tibiæ partem obducente, cujus nimirum foveæ, seu sinui in subiecto quoque osse tum antérieur tum posterior insculpto, suis quæque cornibus implantantur; multo facilius eam illarum utilitatem agnoscerem quæ ab Jo. Alphonso Borello proposita est. Hic enim ut has cartilagine, quas semilunarem Zonam appellat, posse, totas excurrere, & transferri ante, & retro, non dubitabat, sic factas credidit, ut earum motu, axis, ut vocat, revolutionis prorsum, retrorsumve transferretur. Utcunque est; harum cartilaginum, itemque illius quam inter maxillam inferiorem & os temporum similiter interjectam esse, diximus, is omnium optime usus assequetur qui cum in cadaveribus diligenter observaverit, tum eximiam illam qua pollebat Borellus, rerum mathematicarum peritiam adhibeat, ejus quoque rei non oblitus quod cum omnium nostri corporis Partium nullæ magis quam cartilagine sint elasticæ (quod cum aliunde constat, tum maxime ex globo ex cartilagine detornato constare, dicitur) facile hæ interjectæ cartilagine, dum undequaque a compressione se restitunt, certos quosdam, & præsertim alternos, sive tibiæ in ambulando, sive imprimis maxillæ quæ perpaucis & minus validis musculis deorsum agitur, in mandendo motus juvent. Denique in Tabulæ qua Pedis extremi Ossis monstras, XL. Explicationibus omittam, non satis perspicuum esse quod de quinque Metatarsi ossibus dicitur: „A Pollice, cui robustius subiectum est, reliqua ad usque digitum minorem, successive minuuntur; „nam neque longitudine minui, cum proximum quinque omnium longissimum sit, neque crassitie, cum subiectum digito minimo, non sit omnium tenuissimum, quinimo trium sit proximorum crassissimum, vel tuæ ipsæ Figuræ testantur. Sed ut hoc omittam; quo pacto omitti illa possunt: pro osse Cubiformi Minimum os Cuneiforme; pro aliquo autem ex Cuneiformibus Cubiforme, inscripto a te, qui in Bidloano archetypo omissus fuerat, numero 7. monstrari; aut de ossiculis sesamoideis ne verbum quidem hic fieri, quasi vero nulla, vel prorsus exigua pedibus essent data, cum duo inprimis maxima ei articulo supposita fuerint qui inter pollicem & os metatarsi intercedit, & quod prætermittendum non est; Figura tua secunda ea ipsa vel obiter insipientibus exhibeat. Verum non est mirum, qui centum viginti ejusmodi ossicula manibus tribuerint, eis nulla quæ pedibus assignarent, superfluisse.

ANIMADVERSIO XXXII.

De multiplici in
Fœtuum
ætare æstima-
nda,
difficultate.

Mirac.
Naturæ.

ET si Kerckringius, ut erat ditissimus, ex ingenti Fœtuum numero magnis undique sumptibus conquisito, quæ singulis mensibus sint eorum magnitudines, & mutationes, ostendere conatus sit; vincere tamen difficultates non potuit quæ ei rei certa atque perfecta ratione absolvendæ multæ se obijciunt. Nam præter ea quæ Swammerdamius animadvertit, non modo de tempore conceptionis haud raro incerto, sed etiam de varia in variis hominibus corporis magnitudine, illud mihi videtur addendum, plerisque ejusmodi Fœtus ante justum tempus ejectos, æquo minores, vel majores facile esse ob eas ipsas causas ob quas ejiciuntur, pravam videlicet naturam, vel inopiam, vel redundantiam nutrimenti, & quæ sunt ejusmodi; ut propterea in iis perquisitionibus illos potissimum Fœtus spectandos censeam qui a matre optime valente ob exteriorem quandam causam repente sint ejecti. Quæ cum ita sint, mirum non est, eundem Swammerdamium tum magnitudinem Fœtuum quos Kerckringius pinxit, reprehendisse, tum nominatim addidisse, se fœtum menstruum servare qui Kerckringii fœtum trium hebdomadarum non superet, hoc est qui dimidio fere minor sit eo quem Bid-

lous cum fœtus & trium, & quatuor mensium multo Kerckringianis majores exhibeat, fœtum contra novem mensium longe quam Kerckringius, minorem proposuisse. Cæterum amplius ille hiatus quem Fontanellam vocant, eo pertinere quidem videtur, ut facilius possit in partu & caput contrahi, & infans prodire. Cur tamen ejusmodi hiatus inter ossa potius sincipitis & frontis, quam sincipitis & occipitis relinquatur, ea mihi videtur esse causa quod majore periculo cerebellum quam cerebrum comprimeretur. Num vero somnium sit, ossa pubis in partu laxari, in Tertiis Adversariis videbimus. De Dentibus autem, quod quidem ad Fœtum attinet, non video, cur nihil doceat Kerckringius; Erant enim quæ olim Falloppius, alique tradiderunt, examinanda: quæ omnia non ita varia esse, credo, cum Falloppium & Malpighium videam in numero molarium Fœtus consentire. Atque illa erant saltem tradenda, quo tempore, cum præmature, & quo cum tardissime, apparere dentes intra alveolos incipiant; num dentium primordia nunquam sint, ut cæterorum ossium, cartilaginea, qua ex re Coiterus, dentes non ossa, sed peculiariter quædam duriora, candidiora, & solidiora corpora esse, colligebat, & denique unde & quomodo ea primordia incipiant, & progrediantur, num ex radice quadam, ut Diemerbroeckius contendit, & primis dentibus, & qui post horum delapsum ex iisdem alveolis erumpunt, communi, an potius & illi, & hidentes corpora sint penitus sejuncta. Poterat ergo Kerckringius in hac tractatione majorem diligentiam præstare, neque hic solum, sed & alibi, ut puta cum de Sinibus Pituitariis, & præsertim majoribus nihil dicit. Nam hoc ipsum quod vel in Fœtu perfectissimo nondum appareant, propter eorum usum perquisitionem minime erat prætermittendum; nec prætermittabant fane Veteres, qui & quo tempore in pueris observari inciperent, adnotabant. Vel cum paulo ante, foramina per quæ maxillæ inferioris vasa, nervique ingrediuntur, & egrediuntur, in Fœtu, tu etiam noni mensis ita dubie apparere, dicit, ut qui nesciret, ea in adultis esse, ne loquar, cum quidem eorum reperiret. Nam certe in pluribus Sceletis, quorum nonnulla etiam asservo, ipsius quadrimestribus non multo majoribus, ea ipsa foramina sunt manifesta. Sed multo magis Kerckringii diligentiam desidero ubi postquam os Ilium, dixit, antrorsum porrectum magnam acetabuli partem constituere, addit: „ac deinde descendens maximi foraminis margini attenditur; „huc enim ne pertingat, subiecta in ipso acetabulo ossium pubis, & ischii extrema vetant. Illud recte confirmat, tria hæc ossa ad constituendum acetabulum simul concurrere: quod Verheyenium miror, non modo nunquam observasse, sed neque apud alios quam apud Cl. Palsinium legisse. Nam præter Kerckringium plures antea Anatomici idem tradiderant, & multo diligentius Falloppius, Veslingius autem peculiari quoque iconismo exhibuerat; ut non recentiorum dumtaxat, sed & veterum Professorum libri non multum a Verheyenio versati esse videantur. Postremo quæ de alia aliarum costarum curvatura, & posito observavit Kerckringius, cum iis nostra Fœtuum Sceleti valde consentiunt. De numero autem costarum quod is confirmat, raro duodecimum excedere, rarius infra subsistere; nos quoque semel undecim costas numerasse meminimus; quæ tamen ab latere sinistro erat quinta, ea erat cæterarum latissima, & per geminam cartilagineam cum sterno committebatur.

Theatri
Tabul.
XL. &
XLII.

De Fœtus
Ossibus
nonnulla.

146

150
Obl. Anas-
tom.
Op. Post.

De Offi-
bus Fœt.
c. 4.

Anatom.
l. 9. c. 10.

151.

l. 1. tr. 5.
c. 13.

Obl. Anas-
tom.
Synt.
Anatom.
c. 2.

152

ANIMADVERSI O XXXIII.

154.
De Ner-
vis quæ-
dam.
Anatom.
Cerebr.
c. 2.

155

155.
Exercit.
de Cere-
bro.

170

169.

170

Vide
Theatri
Tom. II.
407

171

Nervi definitioni, seu potius descriptioni a Verheyenio sumptæ dum involucra addis, intermedium quo nervi, eorumque præsertim initia, manifestissime obvolvuntur, omittis: quod quidem nervorum involucrum minime est a Ridleyo prætermisum. Porro in iis quæ ex Listero adducis, erudito alioquin, & docto Viro, si notare nolebas: quæ de alio in medulla spinali atque in cerebro corticalis substantiæ loco videtur ipse ex Collins auctoritate producere, ea plures ante hunc Auctores habuisse, & nominatim Malpighium; at illud certe prætermittere non debebas quod profert quasi ab eodem Malpighio universe demonstratum: „nervos opticos tantum „ex membranis complicatis constare; „Nam Malpighius intra anfractuosa piæ matris complicationes albam cerebri substantiam tum in eorum descriptione memorat, tum in Figura ipsa ostendit: & quamvis eas complicationes, non in uno tantum animali, ut Eustachius, sed in pluribus piscium speciebus observaverit, candide tamen fatetur, easdem in aliis animalibus contra atque speraverat, non vidisse, ut quibus nervi optici quasi virgularum fasciculi ex medullaribus fibris quas suæ ambiunt membranæ, compositi obtigerent. Cum vero in iis quæ aut ex eodem Listero, aut ex aliis porro adducis, plura notari posse, intelligam; tum ex his quæ postremo loco ex Professore Cl. adscribis, non modo quædam sunt de quibus amplius quærendum censeo, verum etiam nonnulla sunt, quæ, ut hic quidem afferuntur, non video qua ratione (nisi forte precaria) explicari satis possint. Diserte enim affirmatur: „tametsi totum cerebrum interius lapidesceret, „dummodo per ipsius involucra membranosa sanguis libere fluere, posse spiritus animales per „propriis ductus a sanguine secerni, & exinde „mediantibus contiguis nervis ad singulas partes „amandari. „Generico autem cerebri nomine „non solum cerebrum proprie dictum, sed etiam cerebellum, & medulla spinalis intelligitur. „Neque hæc per ea quæ præmittuntur, faciliora sunt: „Spirituum secretionem non fieri per peculiare glandulas a vasis sanguiferis „distinctas, sed per ductus secretorios qui ab „ipsis vasis sanguiferis immediate oriuntur. „Nam etsi hoc admitteretur, non tamen intelligeretur, quomodo cerebro lapidificato, intra hoc adhuc ii ductus paterent ut ad initia nervorum intra ipsum alte recondita spiritus deducerent, sicuti non intelligitur, quomodo a „singulis ductibus piæque meningis sanguiferis vasis „spiritus fecernantur, quod pariter affirmatur. Etsi enim vel ad ipsam cerebri basim, ut dum hanc elevamus, animadvertimus, vasa quædam sanguifera ab una ad alteram meningem transmittantur, plura tamen in dura, seu ipsi propria, subsistunt; a quibus si spiritus fecernerentur, non nisi per vias precario per piam admissas ad cerebrum, aut ipsos nervos permeare possent. Illud quoque asseritur: si canis viventi notabilis nervus filo ligetur, ejusmodi ligaturam ex se quidpiam aliud præstare non posse quam contenti in nervo liquidi fluxum, præpedire, non autem intimas ligati nervi fibrillas distrumpere, quoniam soluto filo, sensus motusque ligatura sublata protinus restituantur. Quæ si, ita præsertim universe atque absolute, vera essent; verum esse non posset alterum quod tamen ego vidi, experimentum, pluries a Cl. Valsalva institutum, videlicet iis notabilibus nervorum truncis qui ad latera arteriæ asperæ per collum descendunt, filo arte constrictis, & illico solutis, canem intra aliquot dies mori eodem modo ac si illi nervi amputati essent. Tandem cum dicitur; „si medulla oblongata prima, inter, & secundam colli vertebra scalpello secetur, quo nervi omnes cerebri, cerebelli, & medullæ spinalis contiguitate totius

Morgagni Adversaria Anat. II,

„emporii confluent, in instanti animal perire; „cætera quidem intelligo; sed quomodo eo nervi omnes confluent, non video. Neque hæc tamen Cl. illi Scriptori objicio, qui suo in libro qua ratione ea accipi velit, fortasse declaraverit; illud dumtaxat contendo, ea omnia a te aut non sic proponi, aut explicari, aut demum notari debuisse.

ANIMADVERSI O XXXIV.

Inter ea quæ ad spirituum animalium existentiam in dubium vocandam a te supra proposita sunt, non postremum sane locum merentur duæ Cowperi animadversiones, ut quæ ex ipsa nervorum structura diligentius considerata trahuntur. Nunc igitur videamus, quid vicissim adversus easdem respondeas. Erat prima: liberum per nervos decursum spiritibus esse non posse, cum eorum tubuli non secundum longitudinem sint pervii, sed cellulis, globulos representantibus, interstincti. Respondes, te non videre, quomodo aliter quam per conjecturam hæc proponere potuerit Cowperus, cum ii tubuli sub oculos vel exquisitissimis microscopiis instructos non cadant. Ego vero non video, quomodo tua ista responsio ullum habeat locum, quando Vir ille quem tu merito *oculatissimum* vocas, ea ipsa, ut a se visa, ac perspecta diserte proposuit. Vide igitur, annon opportunius aliquanto fuisset respondere, eam quidem cellularum speciem se se Viro cujus fides non est in dubium revocanda, obtulisse; sed fortassis nihil aliud fuisse nisi areolas quæ inter fibrillas ad retis modum decussatas intercipiuntur; in iis autem fibrillis, aut in earum, si omnino sint admittendæ, cellularum parietibus, aut potius inter hosce ipsos parietes, veros nervorum tubulos esse concipiendos. Altera animadversio erat: spirituum motum nimis cohiberi, & tardari oportere ob variam nervorum diametrum, cum hi in suo exortu perquam angustii, in progressu hic illic, & præsertim ad plexus gangliiformes, multum dilatentur. Ad hanc tu animadversionem non modo nihil respondes, sed neque in toto hoc tuo Theatro rationem Lectori exhibes qua ad ipsam possit respondere. De nerveorum enim Plexuum, & præsertim eorum qui a Cowpero commemorantur, Gangliiformium natura neque in hac (quis crederet?) de Nervis tractatione, neque alibi vel unum verbum habuisti. Si enim tradidisses, Plexus ibi occurrere solere quo plures nervorum rami (quorum multos discedere tantum, vulgo imaginantur) conveniunt; inde facile Lectores intellexissent, ad plexus gangliiformes, & aliis similibus in locis non tubulorum diametros, sed numerum, aut intervallum augeri. Si docuisses, in memoratis plexibus nonnulla sæpe quæ in nervis ipsis non observantur, spectari, & nominatim colorem ad rubrum inclinantem interdum usque adeo ut supremus Intercoastalis nervi plexus cum subiecto nervi trunco spectatus, ita mihi nuper se obtulerit, ut primo aspectu musculi Digastrici superiorem ventrem cum tendine continuato mentiri posse videretur; Si hæc, inquam, atque alia ejusmodi docuisses; non difficile conjecissent Lectores, diversæ a nervis substantiæ, quæ ibi eorum tubulis interjiciatur, vel advolvatur, eorundem plexuum dilatationem ex parte deberi. Ex quibus non modo ad Cowperi animadversionem respondere; verum etiam alia pro sua quisque sententia conjicere potuissent. Alii enim ex eo colore majorem vasorum sanguiferorum numerum in plexibus gangliiformibus arguendo, in iis fortasse aliquam spirituum fieri secretionem, existimassent, phænomenis, & experimentis quibusdam explicandis non inutilem. Alii carneum non modo colorem, sed & contextum ibi esse, suspicantes, hinc novas vires ad promovendum nervei succi motum deduxissent, cujus gratia gangliiformes plexus ita nervis interjectos credidissent, ut pro-

D 3

moven-

160.
Alia de
Nervis,
& de eo-
rum Ple-
xibus
Gangli-
formibus.

172.

movendo lymphæ motui conglobatas glandulas, vas lymphaticis interjici, credunt. Sed hæc alii viderint; non enim ideo attulimus quod satis firma censeamus; sed ut appareat, sine horum plerumque descriptione, a te prætermittenda, eorundem usus ne investigari quidem posse.

ANIMADVERSIO XXXV.

173
De Infantibus sine Cerebro editis.

Exercit. Anatom. Chirurg. Decad. I. Exerc. 10.

Vide apud Ridleyum in Tom. II. Theatri 328

Histoire de l'Acad. R. des Scien. A. 1701.

NOVissime Listero satisfaciis eorum observationes objicienti in quibus, deficiente cerebro, & motus, & sensatio aliquatenus subsistunt. Quo in loco Fœtus nonimestris sine cerebro editi observationem commemoras a te habitam, & ad V. Cl. nostrique amicissimum Vallisnerium cum tuo de illa judicio missam. Equidem Bidloo assentiri nunquam potui, qui hujus generis a Clerico, & Kerckringio habitas observationes, pudendas fabulas, nuncupavit; quasi vero illi rem accurate non perspexissent, hoc est cerebrum quod intra cranium non erat, alibi, ex gr. ut ipse in simili fœtu invenerat, inter os occipitis, & primam secundamque vertebra lateri posse, ignoravissent. Siquidem ut aliquando id contingat; in omnibus tamen ejusmodi fœtibus non contingere, cum ex aliorum accuratis observationibus, tum ex ea quoque scio quam A. 1712. cum eodem Vallisnerio habui in infante quam ipse ad me miserat, justo tempore edita, optimo habitu totius corporis, cunctisque visceribus recte constitutis, nisi quod cerebri & cerebelli nullo in loco quidpiam ostendit. Itaque & tuam observationem admitto, & de ea judicium five Viri ejusdem Cl. massam carneam a te observatam cerebrum fuisse, conjicientis, five tui ipsius, a medulla spinali eo in fœtu omnes spiritus repetentis, eo laudabilius esse, fateor, quod & illæ conjecturæ suæ rationes plures adduxit, & tu in eo fœtu medullam spinalem bifidam, ac multo quam in aliis fœtibus ampliorem vidisti: quam etiam a Tyfione in non valde absimili infante, multo latiore solito, inventam esse, non ignoro. Attamen si ad alias ejusmodi fœtuum observationes te convertas; istiusmodi certe explanationibus minime poteris spirituum existentiam tueri. Namque ut mittam in ea quam ego secui, infante neque massam illam carneam, neque bifidam medullam fuisse, hanc autem æquo ampliorem nobis certe visam non esse; quid de fœtu a Cl. Littrio observato dicemus, in quo non cerebri dumtaxat, sed ne spinalis quidem medullæ vestigium ullum deprehendit? Quinimo in ea ipsa quam cum Vallisnerio observavi, infante undenam septimi, octavi, noni, & decimi nervorum paris initia spiritus hausisse, conjiciemus? Hæc enim non, ut Littrius, invenimus exsucca, sive, admodum & sicca, & dura; sed contra mollia, & omnino qualia, cerebro perite, & recens sublato, in cranii basi ostendi solent; ultra duræ matris, basin cranii investientis, superficiem prominebant.

ANIMADVERSIO XXXVI.

175

NUNC tecum ad distributionem, & extremum filamentorum nerveorum progressum pergamus, quem, per Tabulas sequentes abunde, ais, explicari, totum, ut in Caput Indice, loqueris, Systema nervosum demonstrantes. Frustra tamen hic Lector quatuor priorum Cerebri Parium, itemque septimi progressum perquiret. Quorum quidem nervorum Tabulas si ante eorum descriptionem neque recte, neque perspicue poni, intellexisti; cur Medullæ Spinalis, ejusque vasorum Tabulas ante illius descriptionem posuisti? Sed ad singulas Tabulas pergamus. In XLIV. miror, te, quod in proximis facis, non admonuisse, Figurarum omnium magnitudinem multo esse archetypo & naturæ, & Cl. Vieussenii minorem. Illud magis miror, in ea diminutione proportionem non esse servatam.

Cum enim istorum omnium vasorum longitudo tertia, ut minimum, parte sit imminuta; quorundam crassitudo non modo imminuta non est, sed adaucta: quod nominatim in trunco Arteriæ Spinalis Anticæ (Fig. 7.) manifestum est. Cæterum quod attinet ad lateralium plerorumque ramorum in hac, & similibus Figuris delineationem; fatebor candide quod in dissectionibus observare consuevi: non ita æqualiter, & exacte five loco, five sua cum trunco inosculatione dextros sinistrosque sibi invicem respondere. In Tabula etiam XLV. idem proportionum contemptus apparet. Nam vel in ipsa Figura 1. tribus quintis partibus diminuta longitudine, crassities tamen plerorumque nervorum fere eadem servatur.

Ejusdem diligentiae est, quod in Figura 2. fibrillæ per N & O indicatæ, ab altero latere omittantur, & quod contra, litteræ V V a Vieussenii Scalptore omissæ, alienissimo loco addantur: Ibi enim positæ nihil nisi extremam partem secundi Medullæ Involucris designant, ponendæ iis in locis in quibus in Figura 3. litteræ B B a Vieussenio ipso positæ sunt, si eam, Medullæ, spinalis partem quæ caudam equinam constituit, debebant ostendere. Sed graviores lapsus in Figura 4. deprehenduntur, quæ eandem caudam equinam diductam proponit. Qui ut intelligi satis possint; quid sit ea Cauda, aliquanto clarius quam in descriptionibus anatomicis legi soleat, dicendum est. Neque enim, quod multi credere se, ostendunt, ipsum Medullæ spinalis corpus, ex medullari, & corticali substantia compositum, ultra secundam lumborum vertebra multum producit, ut insipientibus eandem Medullam secundo Involucro adhuc inclusam, veluti in Figura 1, videtur. Sed eo dissecto, diductoque involucro, ipsis oculis, manibusque est obvium, quidquid infra eum locum teres Medullæ corpus mentiebatur, nihil aliud esse, nisi insignem quandam fascem nervorum, quos pia mater ita singulos seorsum involvit, ut nulla vi sectionis, aut distractionis adhibita, possint alii ab aliis statim diduci. In toto ergo hoc tractu non modico Spinalis Medullæ non est ejus corpus in quo spiritus possint secerni; sed hi tantum nervi sunt qui a Medullæ extremæ lateribus superius exorti, recta, lenissime hic illic curvati, descendunt, ut se se constituendis inferioribus nervorum Paribus ex ordine impendant. Hi ergo omnes nervi, seu mavis hæc oblonga principia nervorum ad latera præsertim, deorsumque diducta & explicata cum extrema illa ex qua oriuntur, Medullæ parte equinam caudam æmulantur, unde id nomen obtinere. Nunc cum Vieussenius in sua Tabula XXI. totam hanc caudam naturali magnitudine proposuisset, ac recte quidem adscriptas litteras explicasset; tu inde tuam Figuram 4. descripsisti, qua eadem nervorum principia, magnitudine minime diminuta, ais, exhiberi; & tamen eorum alia tertia, alia dimidia fere parte breviora quam Vieussenius, depingis; illam autem Medullæ extremam partem, ut proportio requirebat, nihil minuis, ut si ex tua Figura res sit concipienda, necesse sit, ut illius spatii quod inter extremum Medullæ corpus, & imum vertebrarum specum intercedit, magna pars inanis concipiatur. Accedit, te per litteras b. b. c. c. quæ vicesimi, & vicesimi primi Paris principia designant, extremam, sive, infimam illam, dicere, Medullæ partem, designari ita ut quid tibi velis in ista Explicatione, Lectores assequi non possint. Antequam ad proximam Tabulam transeamus, super hujus Figura 2. & 5. unum adjiciam. In 2. errorem judico Scalptorum, quod nervi Accessorii E E non multo tenuiores pingantur, quo inferiores sunt; id enim Vieussenius in descriptione non prætermittit; ego sane inferiorem eorum partem adeo tenuem observare consuevi, ut propterea circa eum quo cum Medulla junguntur, locum neque Verheyenii silentium, neque aliorum dissensum mirer. In

De Vasis Medullæ Spinalis.

178

Pars Medullæ Spinalis, Cauda Equina dicta.

177

178

De Nervis Accessoriis, & Inter-costali. Nervogr. l. 3. c. 4.

l. 1. tr. 7. c. 5.

5. in

5. in qua tu surculum q duplo quam archetypus, crassiorē proponis; nonnulla esse, non dissimulo, & nominatim nervi Intercoastalis exortum b, quæ num ita semper se habeant, ego, alique dubitamus.

ANIMADVERSI O XXXVII.

Cæterum & in ea ipsa 5. Figura, & in proxima Tabula XLVI, & in reliquis incredibilem Cl. Vieussenii laborem & solertiam eo magis commendo quo magis experiendo didici quid sit in ea parte Anatomies diligenter versari. Hinc est, ut minus facile ferendum credam, siquis Tabulas tanta cura apparatus aut pervertat, aut negligat. Itaque tuarum omnino partium erat, Mangere, prospicere, ne tui Scalptores non modo in iis vitiarent quæ supra notata sunt, sed etiam, idque multo magis, ne inverterent, quod magno & Tironum detrimento, & Professorum incommodo. in Bibliothecæ tuæ Anatomicæ altera editione fecerunt, in cujus Tabulis XC. XCI. XCII. & XCIV. id omne inversum est quod in superiore Figura 5, in Tabula XLVIII, & in hac ipsa XLVI. recta gaudeo ratione exhiberi. Has vero Tabulas neglexisse (si quidem vidit) Verheyenius videtur, cum ea quæ in Tabula hac XLVI. monstrantur, ex Willisio descripserit; in cujus delineationem nonnulla ex brutorum anatome irrepsisse, suspicari debebat tum quia sic in aliis ipsius contigit, tum vero inprimis quia in ea ipsa quam Verheyenius descripsit, arteriæ magnæ figura non hominis, sed bruti cuiusdam est.

De alijs
Nervis.

l. 1. Tab.
ult. Fig. 1.

Cæterum quo candore Vieussenii Tabulas commendo, eodem monendos Tirones esse, judico, uti ipsas ita inspiciant, ut non ignorent, non omnia quæ in ipsis spectant, ad eundem semper modum se habere. Non modo enim in minutis ramis Natura haud magis in nervis quam in vasis certæ cuidam legi se addicit, sed in truncis quoque ipsis, plexibusque majoribus non unam semper rationem observat. Sic ne a XLVI. Tabula recedam; cum nuper in collo & suprema thoracis parte Intercoastalis nervi truncum persequer, primum multo tenuiorem proximo orbi Parisi trunco vidi, deinde Plexum quidem intra thoracem observavi cui numerus 37 inscribitur; sed proximum superiorem qui per ∇ indicatur, non modo deesse, comperi, verum etiam qua ratione superior Intercoastalis truncus eidem Plexui 37 continuaretur, videre satis non potui. Surculos quidem tenues cum eodem Plexu commissos vidi, & in uno horum, transversim introrsum, non sursum pergente, plexum alterum gangliiformem, & ipsum transversim, non ad perpendiculum, positum; sed hæc nihil ad Plexum ∇ , & ad truncum Intercoastalis pone subclaviam arteriam inter duos Plexus adumbratum. Hæc idcirco non prætermittenda esse, duxi, quoniam neque Willisium, neque Ridleyum in Observationibus eadem quæ Vieussenius, vidisse hic, constat; & non desunt qui de nervi Intercoastalis continuatione, & natura quædam agitant ab his quæ vulgo traduntur, discrepantia. Sed fortasse hæc omnia ab alia in aliis occurrente nervorum dispositione proveniunt. Aliud quoque varietatis exemplum Plexus Cardiacus superior 43 præbet, ut quem inter arterias aliquando asperam & magnam, ut Vieussenius hic docet ad litteras QQ, alias magnam inter, & pulmonarem, ut Willisius describit, observasse, memini. Inter infimos quoque Paris Vagi truncos frustra nuper quæsi communicationem illam per ramusculum 19. & multo magis duplicem illam & alternam quam docet Willisius, cujus ductum sequitur Verheyenius in tuæ Tabulæ LVI. Figura 7. Vidi enim singulos truncos ab singulis lateribus recta pergentes, nullis, nisi tenuibus, emissis surculis quorum ab uno trunco ad alterum nullus transibat. Et hæc modo exempla sufficiant; nam cætera quæ & in hanc, & in proximas Tabulas adduci possent, ni-

Morgagni Adversaria Anat. II.

mis longum essent proponere. Quinimmo ita censeo: si nervorum perquisitio ita facile, & quod consequitur, ita crebro ut perquisitio vasorum sanguiferorum, in Scholis Anatomicis institueretur, esse plurima fortasse quæ etsi ut perpetua proponuntur, quod attinet ad originem, numerum, & connexiones nerveorum ramorum; non minus tamen varia deprehenderentur quam in vasis ex. gr. spermaticis contingere, videamus. Hinc est, ut non omnia phænomena quæ per certas nervorum connexiones vulgo explicantur, ita explicanda esse, judicem, sicuti vicissim nonnulla per easdem explicanda esse, existimo: atque adeo hinc est, ut quemadmodum probo quod non omnia quæ de usibus nervorum addi horum descriptionibus, & tabulis solent, adscripseris; ita minus probem quod nulla omnino quæ proponeres, ex iisdem selegeris. Quod reliquum est, cum me tædeat ad ejusdem generis errores notandos identidem redire, satis fuerit perpaucis hic indicare, te L. Tabulæ Figuras priores duas plus dimidia parte imminutas exhibentem, ea de re Lectores non admonere; & cum in utraque nervos proponas a parte tantummodo dextra, de ea re quod ad 2. quidem Figuram pertinet, admonere, quod ad primam, non admonere; & denique e contrario cum in Tabula XLIX. Dorsales nervos ab utraque parte repræsentantes, tamen dicere, eos repræsentari, a parte dextra. Sed in eandem Tabulam XLIX. illud præstat adnotare: ramusculorum d. d. d. d. &c. necnon e. e. e. e. &c. illos quidem dici a nervo Intercoastali in Dorsales immitti, hos vero ab Dorsalibus in Intercoastalem; nullam tamen satis firmam apparere rationem quare id potius quam contrarium, dicatur, aut quam utrosque ab Intercoastali in Dorsales, vel ab Dorsalibus in Intercoastalem immitti. Ejusmodi animadversio in complures pariter ramos qui inter unum atque alterum nervum, aut inter nervos & medullam deducti in superioribus Tabulis proponuntur, & huic, vel illis potissimum assignantur, afferri potuisset; sed satis erit hic semel indicasse.

185.

ANIMADVERSI O XXXVIII.

Nunc tecum ad Arterias progrediamur; quarum quidem tubum *cylindricum* esse, pronuncias. Id placuisse Viris quibusdam doctissimis, non ignoro; sed tamen ex Anatome Struthiocameli ab Experientissimo Vallisnerio nostro edita scire vicissim poteris, arteriam magnam ejus animalis qua hæc, digitorum quasi sex transversorum longitudine, nullam emittit propaginem, evidenter non *cylindricam*, sed conicam observatam esse a Viris Clarissimis, meique amicissimis Jo. Dominico Santorino Amplissimæ Civitatis Venetæ Protomedico, & Bernardino Zendrino, quorum ut ingenium doctrinis physico-mathematicis subactum nemini est ignotum, ita singularis in observando diligentia, & peritia mihi usu quoque ipso spectata est. Ex reliquis omnibus quæ de Arteriis habes, sunt in quibus cum Verheyenio recte sentis, sunt in quibus recte ab eodem dissentis; at sunt etiam in quibus non recte. Recte primum, ubi loqueris de Arteria Pulmonari, incuriam declinas qua ipse in utraque Anatomie suæ editione eam arteriam dixit, a cavitate cor, dis dextra sanguinem per pulmones deferre ad sinistram. Recte quoque cum eodem indicas, quibus in cadaveribus sanguifera vasa per arteriosi trunci tunicam extimam quasi ad retis modum reptantia nullo negotio conspiciantur. Sed non æque probare possum quod cum eodem in quibusdam aliis consentias, aut ab ipso dissentias. Namque ut omittam numerum tunicarum, quibus de rebus non libenter disputo; nonnulla quidem ex iis quæ anibo de earundem tunicarum natura docetis, in boum arteriis facile agnosco; sed eadem in humanis ut esse concipio, ita num satis evidenter ostendi possint, dubito. Multoque etiam

192

179.
Nervor.
Descript.
c. 3.

Ibid.

l. 1. tr. 1.
c. 4.

192.

De Arteriarum
structura.

etiam magis de nonnullis dubito in quibus a Verheyenio dissentis, & nominatim num. ii. de quibus dicis, succi, in vasis cavum stillare, possint; longe enim alia ratio est de succo intestinali cujus secretoriae glandulae infra muscularem tunicam ponuntur, atque de istis arteriolis quibus multo crassissima arteriarum tunica ex tot confertis fibrarum carnearum stratis compacta, esset penetranda. Ad hæc num. istæ ipsæ fibræ carneæ, spirales sint, & longitudinales, & num. hæc elevandæ ac dilatandæ arteriæ inserviant, veluti in intestinis, quasi vero in hac quoque re alia ratio non esset, ac satis causarum ad elevandam ac dilatandam arteriam in sanguine intruso, & ulterius vi propulso non haberemus. Et ego quidem in arteriarum intima tunica non modo nullas satis manifestas fibras longitudinales agnosco; sed qua ratione, cum non sint, apparere aliis interdum possint, assequi me, credo. Denique in arteriis nullas alias carneas fibras nisi annulares observo, neque alias in Figura 4. & 6. Willisii, & Verheyenii delineant, ut mirer, te in illius Explicationibus inter verba Auctoris, annulares esse, constanter docentis, potius & verius forsan esse spirales, nulla adjecta hujus tuæ additionis nota, intrusisse.

Vide infra in Tab. LI. & pag. 200.

ANIMADVERSIO XXXIX.

193. SED quid est, obsecro, quod inter Arteriarum descriptionem, earumque Tabulam nobis exhibes? Esse enim, sane admodum rarum, dicis; sed quid sit, non dicis. Estne Poema aliquod tuo isto Theatro dignum? Nam præter multa poetice magis quam philosophice excogitata, locutiones passim occurrunt Poetam magis, vel potius Archipoetam quam Anatomicum decentes: hac incurfione inchoatam iri incendiarum ejus salutis troadem: -- faces sævo valetudinis funeri itentidem febrilis Megæra incendat: -- sævior in thorace nidulans malorum tragœdia: -- subitam mortis pronubam elevare: -- polyposæ per eclypticam sanguinis coacervationes, & aliæ sexcentæ. Estne vero scriptum gallice, an latine? nam gallica hæc mihi videntur: cujus pollicitam historiam oculis tuis offerendam jam vado: -- corpora trajectionem, disputantia, &c. Sed hæc conor utcunque intelligere. Illa vero, nisi tu explices, frustra tento; videlicet in ea Paupercula, nostri Auctoris, operi commissa, cujus, virium robur hebetabat in dies, quæ acuta febris aculeo torquebatur, quid esset illud, speciale respiratio, nis convicium, ex quo ille morbi naturam subodorabat, ego assequi non possum. Præterea dum in eadem describit elustabilem respirationis oppressionem cujuscunque laboris sarcinae oblustrantem; ut immo nec gradus scandere, nec citatori gressu misella incedere sine maximo pectoris angore, vehementique palpitatione impar esset; hoc unum quæro abs te, Mange, affirmet, an neget? Huic in describendo morbo perspicuitati cadaveris descriptio respondet; ex qua frustra coneris intelligere, an expansio illa arteriæ magnæ esset instar sacci a latere appensi; ut Figura indicat, num. vero omni ex parte esset æqualis, ut ejus quo tota ibidem arteria implebatur, polypi occurrens in centro perforatio videtur significare. Et tamen id perspicue tradere & ad consequentes meditationes concipiendas, dijudicandasque, & ad historiam complementum erat necessarium. Nam in cadaverum dissectionibus modo una, modo altera ratione ejusmodi expansiones observavi, & in his superiore Januario unam multo ista majorem, & rariorem, ut cujus hiatus non inclusus polypus, sed arctissime adnata subjecti pulmonis pars, dura, & compacta, prorsus obstruebat. Verum sicuti non debebat esse in tuo Theatro, sic non erit certe in hisce ad ipsum Animadversionibus, longis morbosarum Partium descriptionibus locus, quem alibi opportuniorem ha-

De Aortæ Dilatationibus.

bebunt; quamobrem neque omnia quæ alioqui possem, in ista intrusa Dissertatione, sed ea dumtaxat notabo quibus Tirones admoniti, non facile obituum de ea judicium in errorem prolabantur.

ANIMADVERSIO XL.

193. Principio causa istius Aortæ expansionis inclusus polypus sine ulla dubitatione pronuncietur; cum tamen, ut postea ostendetur, rationes non desint, cur polypi causa ipsa arteriæ expansio videri possit. Cæterum ut res explicetur, multa præmittuntur de justa in sanguine principiorum mixtura, hujusque causis, quas esse ipsa principia, & cor, & vasa, constituitur. Quo in loco duo non sunt prætermittenda: Inter ea principia duplex & distinctum seri genus enumerari, subtile, & lentum; quasi vero id omne discrimen a varia aliorum principiorum sero, hoc est aquæ additorum, copia, & natura non penderet: Et vas quodlibet sanguiferum conos per tractum suum, angulosque adveniienti sanguini objicere ita ut propterea, in quacunque vasorum portione, ne principiorum sanguinis allisio ad illorum parietes, & ab his reflexio contingat; perinde quasi nulla alia vasa sanguifera præter arterias forent, & venæ in rerum natura non essent. Porro etsi tres positæ sint causæ convenientis miscelæ; incongruæ tamen una tantum agnoscitur, inæqualitas principiorum. Nam in cor impellens, & in vasa reflectentia ullam posse cadere inæqualitatem, negat idem Auctor qui eo ipso anno quo hæc scribebat, edita Historia Hepatica contendit, omnino dari, morbum in solido in, dependenter a fluido. Cum autem ab incongrua miscela duo potissima concretionum genera deducantur, rigidarum, & flexilium; patere dicitur, rigidas suis spiculis non affigi posse asperitatibus cordis, aut sinuum cerebri, sed tantummodo extremis vasorum angustis, & sic obstructiones, & inflammationes efficere; contra, flexiles non his angustis, sed illis inæqualitatibus adhærere, & sic principia polyporum constituere. Hæc, inquam, patere dicuntur; & tamen illud, opinor, magis patet: concretiones flexiles istas & gelatinosas, si crassiores sint, aut ab impulsu cordis, & arteriarum non ita valido urgeantur, facile in aliquorum vasorum angustis hæsuras esse. Nihilominus perinde ac si illa paterent, ex iisdem colligitur, polyporum primordia non alibi quam in cordis ventriculis, & cerebri sinibus incipere, idque eo magis quia præter superficiarum asperitatem, major iis in locis est viæ amplitudo, atque ideo cursus sanguinis retardatio. Quæ dum scriberet, videre profecto poterat, cum in Arteriæ expansionibus non modo via dilatata; sed & superficiæ interioris asperitas & inæqualitas soleat inveniri, nihil repugnare quo minus intra ipsas expansiones polypi inchoentur. Et nos revera in muliere quadam cum nihil uspiam polyposi, & nominatim in corde, & cerebri sinibus invenissemus, intra aneurysma tamen non magnum in quod sinistra ejus arteria subclavia expandebatur, adhærentem oblongum polypum observavimus.

193.

194

194.

Part. 2. c. 1.

195

De Polypis in iisdem Dilatationibus.

ANIMADVERSIO XLI.

195. Hic tamen quod secure a principio est pronunciatum, polypum videlicet propositæ expansionis causam fuisse, id sine ulla dubitatione tenetur. Itaque ad nonnulla explicanda symptomata quibusdam præmissis, & in his: sanguinem regurgitasse, & repulsum fuisse per venas a corde ad totum corpus, quasi valvulae in ejus mulieris venis nullæ fuissent; expansionis successiva productio sic explicatur. Polyporum in cordis caveis inchoatorum productiones directe quidem tramite Cavam, venamque, & arteriam pneumonicas tota libertate percurrabant; sed

195.

196

sed quæ Aortam pervadebat, ea cum parvo ab egressu e corde intervallo in flexum canalis, seu arcum *impingeret*; hinc, in elongatione ulteriori valde impedita, subsidebat, ibidemque adaugebatur. Hic vides ut obliviscatur, polypis per venas e corde productis redeuntis sanguinis motum obstare, itemque vasa illa pneumonica flecti paulo post in ramos, atque adeo truncum præsertim Cavæ Inferioris non in directum ventriculo cordis obverti. Sed tamen hæc prætereamus, & quid his adjiciat, attendamus. Sentit, inquit, obstaculi fixitatem sanguis, & trusione sua remove acriter nititur, unde expansiones parietum in vase &c. -- Præcipue autem elata sensim in aorta malefici corporis vastitate, una cum sanguine semper in hunc locum per cordis systolem arietante, tanta ejusdem vastis expansio, ut distractis usque ad ultimam cohaesionem, & renitentiam ejusdem lateribus, in amplam scissuram illud cesserit; qua tamen data porta eruptio non dabatur sanguineo torrenti, dum idem polypus, qui colubrum more sinum maternum dilaniaverat, nunc quasi criminis poenitens, consciusque quantum versaretur negotii ad hunc egressum prohibendum, laciniosis productionibus validis exactissime coalescebat cum laceratis arteriæ marginibus. Oh ingeniosum, Dii boni! Polypum, & vere, sicuti postea appellatur, *docilem*! Non dixeram ego, Poema hoc esse? Sanguis sentit, Polypus quasi ratiocinatur, Colubri maternum sinum dilaniant. Anatomicus, hisce omissis fabellis, quævisisset, an expansio illa Aortæ alia explicari ratione posset. Nam cum trahi in dubium nequeat, quod & noster paulo post inculcat, Aortæ arcum non longe a corde incurrenti sanguini objectum, hujus cursum subito, & violenter inflectere; facile intelligitur, si cordis impulsus nimium intendatur, & præsertim si Aorta vel a primordiis minus firma sit, vel ab erosivo aliquo principio (cujus indicia in Aortæ jam expansæ, aut hic illic ossificatæ tunicis evidentius prodere se solent) debilitata; facile, inquam, intelligitur, primum in hoc, aut consimili rerum statu Aortæ expansionem effici; deinde cur Aortæ dilationes ad illam, aut prope illam curvaturam frequentissime inveniuntur vel nullo præsentem polypo, ut pluries a me quoque ipso observatum est.

Sic autem dilatatæ Arteriæ parietes a sanguinis aucta semper mole, & pondere, atque assiduo incurso, concurrente etiam erosivo persæpe principio quo vel proxima ossa corroduntur; facile dilacerantur postremo, atque hiant. Quod si in sanguine lentæ concretiones redundent, proclive est intelligere, quod supra etiam indicatum est, qua ratione ob retardatum in dilatato tramite motum, & superficierum inæqualitates, intra excitatum jam aneurysma polypi incipiant, ibidemque ex multiplicibus depositionibus, & adhæSIONIBUS haud raro ita perspicue incrementum, ut sæpius intra aneurysmata polypos in plures curvas lamellas, persæpe albis particulis, & quasi punctis distinctas, observemus dispositos, quarum lamellarum exteriores, alias, & hæc alias, ut in capis videmus fieri, complectuntur. Hic igitur causarum ordo an ista in muliere habere locum potuisset, prius disquirendum erat, quam oppositus ita secure, & ex parte etiam fabulose statueretur. Sed his missis, ad reliqua progrediamur.

ANIMADVERSI O XLII.

IN historia, Pulmonum lobi sinistri, non utriusque, infarctus propositus fuerat; & tamen in explicatione ea causa adducitur quæ utrumque indiscriminatim lobum infarcire debuerit. In historia pariter, quasi quod Circæum, imo Gorgoneum, aperiretur proscenium, intima expansionis facies, lapidea incrustatione obducta, admirationem ingeminabat. In explicatione autem, vere Circæo aperto proscenio, illa admiran-

da crusta lapidea in *osseam* primum, imo *saxeam*, deinde in *tanquam lapideam*, postremo in vulgarem *osseam solidescientiam* transformatur, qualem nimirum in senum vasis majoribus quotidie, & haud raro in ejusmodi Aortæ expansionibus observamus. Causæ vero ejusdem ossificationis quæ cum tartaro vinoso in dolio, comparatur, me detinerent, nisi ad ea quæ de Asphyxia dicuntur, properarem. Mittam, duas causas poni quæ ad Asphyxiam faciendam *conspirare simul* debeant; & deinde secundam relinqui, ac primam tantum inculcari. Mittam alia ejusdemmodi, ut cum impedimentum requiritur, Aortæ parietibus *universè* advolutum; & continuo Asphyxiæ exemplum affertur in quo hoc impedimentum, ultra diaphragma non protendebatur; imo paulo post ex propria observatione affirmatur, semper in denatis ab hoc morbo occurrisse id impedimentum usque, ad medietatem arcus aortæ. Hæc, inquam, omnia mittam, & ad eas peculiare animadversiones quæ super Asphyxia proponuntur, morbo frequenti, nec tamen satis ad nostrum calculum per paginas Authorum ventilato, decurram. Principio ponitur: sicuti ad sanguinis circuitum perennem & validum concurrunt motus cordis, tanquam principalis, & motus arteriarum, tanquam substitutus, & vicarius, ita sine motu arteriarum adhuc circumire sanguinem in Asphyxia; quod mihi quidem nunquam ita verisimile visum est, ut investigandum non putaverim, num vere nullus in Asphyxia arteriarum sit motus; si autem vere nullus sit, num id omnibus, intimisque præsertim, arteriis commune sit. Cæterum hic, quasi ut illud verisimilius videatur, res longe minus verisimilis ut certa proponitur: hoc est sine motu cordis; qui paulo ante *principalis* statutus est; per solum motum arteriarum in casibus variis cruorem per vasa protrudi.

Quam ad rem probandam, ex quodam Auctore cor mulieris ita gangræna in superficie, & ventriculis vitiatum proponitur, ut ad tactus levissimos totum sub manu solveretur. At si vivente muliere, intermedia parietum cordis substantia tam laxa fuisset; ipsum sanguinis pondus cor necessario dirupisset. Præterea eandem vim arteriarum, ut *sola* videlicet possint, per tempus aliquod circularem trusionem sanguinis, efficere, duo alia confirmare dicuntur, *pulsio* non interrupta sanguinis ex arteriis in venas, ligato in cane vivente sinistro cordis ventriculo, vel, ut dicendum fuerat, ligata aorta ad sinistram cordis ventriculum, & integra in denatis transfusio sanguinis ex arteriis in venas. Equidem in duobus hisce casibus ob ultimum cordis impulsu, ob arteriarum se restituentium constrictionem, ob circum prementium Partium pondus ita concedo, maximam ut plurimum partem sanguinis ex arteriis in venas compelli, ut tamen addam, in non paucis cadaveribus me magnam sanguinis partem in arteriis observasse, & quod rei caput est, aliud esse, semel ab arteriis in venas sanguinem extrudi; aliud, *circularem* sanguinis motum *per tempus aliquod*, ut in ea de qua modo dictum est, muliere a solo arteriarum motu servari; nam nisi cor moveatur, semel restitutæ arteriæ dilatari amplius non possunt; non dilatatæ autem non possunt contrahi; atque ideo nisi cor moveatur, non possunt moveri.

ANIMADVERSI O XLIII.

Verum ad ulteriora veniamus. Supponit: Aortæ parietes usque ad arcus medietatem a cavo, & non distractili polypo obduci. Ex hoc duo *necessario* consequi, dicit. Quorum primum est: sanguinem a corde in aortam intrusum, non modo eos aortæ parietes qui polyposa crusta obducuntur, dilatare non posse, sed ne eos quidem qui deinceps in eadem aorta, ejusque ramis liberi occurrunt. Hujus bipartitæ consecutionis prima quidem pars, ex supposito polypo non distractili

196.

197

De Asphyxia.

De iisdem
Aortæ Di-
latationi-
bus, &
Polypis.
197.

193.

196.

194.

197.

ctili ita evidens est, ut mirer, probari; altera ita paradoxica, ut non mirer, non probari. Non enim probat qui, ut probare videatur, affirmat, superato aortæ arcu, deinceps, nullam per arterias occurrentem, re resistentiam, impulsus sanguinis in latum, determinantem; quasi vero ultra illum arcum aorta, ejusque rami sanguine non essent plena, aut nullæ occurrerent curvaturæ, obliquitates, divisiones; aut denique aortæ, ejusque ramorum figura ipsa non resisteret: quorum contraria ita omnia perspicua sunt, ut ab ullo, atque adeo ab eo ipso non ignorentur, ut qui duo postrema & supra, veluti indicatum est, & infra in Historia Hepatica inculcat; primum vero in hac ipsa pagina ex protrita inter Recentiores doctrina præmittit quasi unicam (qua in re fallitur) causam sanguinis impulsam ad latera arteriæ extrorsum cogenda determinantem. Sed invenit, opinor, rationem hæc omnia declinandi, poeticam tamen, ut solet, videlicet sanguinem intra eam partem aortæ quæ polypo obducta est, assuevisse niri tantum in longum, & non in latum, & sic mire illi uni deinceps motui insistere. Quod quidem in ejus systemate quod sanguis sentiat, non est mirum; imo in eodem mirum est, sanguinem ita docilem, huic eidem rei non assuescere, cum per fistulam, aortæ inclusam, aut cum per magnum hujus tractum ossificatum transmittitur; nam etsi parietes fistulæ, aut aortæ ossificatæ non dilatet, tamen ex Cl. Vieussenii, imo etiam Harvæi experimentis, & observatione constat, cum ea loca superavit, posteriores arterias dilatare. Nihilominus quasi ineluctabilibus rem confecisset rationibus, concludit: & sic, alta, quies in aortæ trunco, & propaginibus cunctis, absque ullo motu perennabitur. Quod erat probandum. Et tamen hic ausus est aliorum Tabulas ceu magnificas traducere!

Neufogr.
l. 1. c. 4.
Exercit.
Alter. ad
Riol.

ANIMADVERSIO XLIV.

Nunc quomodo alterum demonstrat quod ex eodem illo supposito necessario pariter consequi, dixerat, videamus. Erat illud: a solo cordis impulsu sine arteriarum subsidio posse vitam per quoddam tempus ferveri; non autem ultra. Hujus pariter bipartitæ consecutionis pars prior sic tantummodo probatur, ut affirmetur: sanguinem, etiam feriantibus arteriarum pressuris, non interrupto adhuc flumine per solam cordis virtutem, minori quanquam passu commovere posse, non secus ac navim medietate subtracta remorum impellentium. Verum enimvero si hoc genus probationum valeret, non dissimili ratione contrarium probari posset: sanguinem scilicet, cessantibus arteriis, a solo corde circumagi non posse non secus ac saxum quod non nisi a duobus hominibus moveri potest, altero cessante. Accedit quod etiam si sanguis a solo cordis motu circumagi posset; haud tamen non interrupto flumine, cessantibus arteriis, ageretur, propterea quia motus cordis ipse natura est interruptus, eaque de causa institutum est ut quo tempore sanguis a corde non movetur, ab arteriis se contrahentibus moveatur; alioqui non interrupto flumine non ferretur.

198

Sed ut consecutionis pars prior minime probatur; ita pars altera nimis probatur. Proposito enim tanquam, non omnibus manifesto, illo sine pulsationis arteriarum qui nemini ignotus esse potest, nisi cui Recentiorum vulgarissimi libri, & nominatim Viri Ingeniosissimi, & nobis dum viveret, vere amicissimi Dominici Gulielmini, sint ignoti; inde deducitur, tam gravia, & universalia quidem, ex pulsationis ejusdem cessatione detrimenta consequi oportere, ut non modo quod præfinitur, quatuor aut quinque diebus, protracta asphyxia; sed multo breviori ab ejus initio temporis intervallo mori homines, & quidem irreparabiliter, debeant. Et tamen Asphyxiam 14. ante obitum dies persistentem vidit Ballo-

De Sanguin. natura.

nus, atque ut non memorem duos quos novit Riolanus, sine ullo arteriarum pulsu sex & decem annos vixisse, cujusmodi quoque casum vidit Ronsæus; non omitam certe, propter inventos in trunco aortæ prope cor sanguinis concreti grumos, cum Parisiensem quem Bartholinus scribit quatuor mensibus ante mortem plane æφιστρον fuisse. Accedit, si ea & universalia; & irreparabilia detrimenta Asphyxiam necessario consequerentur, neque nos honestissimum Civem nostrum Andreæ Morellum observaturos fuisse toto eo tempore quo Asphyxia lethali correptus vixit, se de latere in latus prompte convertentem, satis alta voce, & recte loquentem, atque ad oblata sic satis bene se habentem, neque P. Servium Medicum Romanum, ut Bartholinus idem notavit, febre continua detentum, postquam sex dierum spatio pulsu caruisset, optime convalescentem fuisse; ut notissimas Hystericarum Asphyxias omittamus. Nimis ergo probat quod erat probandum; neque tamen recte probat. Ideo enim probat, venas in Asphyxia brevi fore, sanguine enormiter saturas, arterias autem fatiliter exhaustas, quia credit, in Asphyxia, etiam eo temporis puncto quo cor sanguinem non impellit, hujus partem ex arteriis in venas profluere, oblitus nimirum, eo temporis puncto ideo in nobis id contingere, quia arteriæ se se restitunt, has autem in Asphyxia, velut ipse superius constituit, ut non dilatantur, sic neque restituere se posse. Nihilominus quasi re demonstrata, pari magnificentia concludit: Quod erat probandum: atque adeo quasi ad Asphyxiam illustrandam nihil aliud relinqueretur: Et ut rei, inquit, Colophonem addam. Sed addat, per me licet, qui superioribus notandis jam fessus, non inquiram, num in viro, cujus sinister cordis ventriculus, solidissimus, mi polypi ingentissima mole, occupatus inventus est, & propterea repente mortuo, prosperissimam usque ad extremum fuisse valetudinem, prudenter censeatur; num pulmones in inspiratione pleuram attingant; num eorundem cum pleura per quædam stamina connexiones, morbosæ sint judicandæ; num denique adnexa Tabula sit, ex arte chetypo delineata, & omnia ad situm naturalem exhibeat. In qua ut mittam lineolas, pene omnem Tabulæ superficiem nova specie, ferarum instar, perreptantes (vascula dicerem, nisi etiam per superficiem unius polypi descriptas viderem) ut eas, inquam, & reliqua omitam, ac de Arteria magna, & cum ea communicantibus vasis tantum dicam; pars ipsius, I, quæ sub corde latere debet, in propatulo est; tubus R, per quem in foetu cum eadem arteria Pulmonaris communicabat, multo propius cor quam sit æquum, cum ipsa Aorta committitur; truncus O, Subclaviæ, & Carotidi dextris communis, & ea ipsa Carotis multo æquo majores delineantur: quæ duo postrema morbosæ hic esse, facile crederem, nisi & in Historia, & in Tabulæ Explicatione altum de hac re silentium observarem.

Ex his omnibus intelligis, opinor, Mangete, hoc Scriptum non esse tam solidum, neque Medicis Practicis ita utile, ut ipsum, nihil hic alioqui ad rem faciens, omittere, aut de eodem, præsertim ita prolixo, aliquid, ut de cæteris soles, detrudere non licuisset.

ANIMADVERSIO XLV.

Etsi in Animadversione XXXVIII. quædam in Tabula LI, ejusque Explicationibus notata sint; alia tamen restant, quæ hic notentur. Nimirum Lector est admonendus, nihil Willisium in Explicatione Figuræ 3. de istarum glandularum usu dixisse; in 5. autem Explicatione tunicam arteriæ intimam non, musculosam, ex parte, pronunciasse, sed, forsitan aliquatenus, musculosam esse, scripsisse. Interea cum id quod Willisio in Explicatione Figuræ 4. exciderat: a circularium fibrarum motu esse quod arteriæ pulsant, aliquam notulam desideraret; ca

Epid.
Enchei-
rid. Anat.
l. 5. c. 46.
Epist. Medic.

Cent. 2.
Obs. 7.

Cent. 4.
hist. 42.

197.

198.

199

Tab. extra
ord. 1.

199.

200

De nonnul-
lis Arse-
riis.

ea quidem verba mutata sunt, sed ita, ut rescriptum sit: „ ab earum motu præcipuam rationem „ pulsationis dependere: „ quod quidem num-
verum sit, ex superioribus Animadversionibus in-
telligi potest. Quod autem attinet ad Figuram
10; in *coalitu* Carotidum cum Cervicalibus deli-
neando Verheyenius errat, ut solet, cum Willi-
sio; qua de re erit facile alibi opportunior di-
cendi locus. Deinde Ramus F. æquo crassior
delineatur. De plerisque autem ramis qui a G. & H
deducuntur, aliisque consimilibus & in hac, & in
proximæ Tabulæ Figura 18. omnino adnotandum
erat, perraro ad unum eundemque modum divi-
sos, distributosque inveniri, cum vel in ejusdem
corporis uno ex. gr. brachio sæpe aliter se ha-
beant atque in altero. Arteria diaphragmatica
ad d. non apparet. Similiterque a Verheyenii
archetypo desciscit Emulgens sinistra, ut quam
ille & delineat, & tradit altiore quam dexte-
ram: quod tamen non, ut ipse credere videtur,
perpetuum esse, exercitatissimi Eustachii plures
Tabulæ, inter se comparatæ, satis docent. De-
nique ut cætera prætermittam; scire velim, quo
in loco hujus Theatri (quando in hoc Capite id
omittitur) plerorumque Vasorum sedes tradatur;
ut puta insignem illam Arteriam Cruralem C per
anticam femoris partem immediate sub Sartorio
musculo, & super, non, ut aliæ solent, sub so-
cia vena descendere, donec per inferiorem partem
musculi Tricipitis transmittatur ad poplitem,
ubi sub vena decurrere incipit. Hæc sane, at-
que alia ejusdem generis cum ad „ accuratam
„ Anatomies ideam „ concipiendam, tum vero
ad activam Medicinæ partem cautius administran-
dam longe magis utilia sunt quam superiora illa
de Asphyxia cogitata; & tamen illa fuscè tradita
sunt; hæc ne uno quidem verbo indicantur.
Quo minus jam miror, in hujus Tabulæ Figura
ultima de decem quæ adscribi, inscribere debe-
bant, litteris nullam inveniri; nam qua incuria
res omittuntur, eadem omitti litteræ facilius pos-
sunt.

ANIMADVERSI O XLVI.

EX iis quæ in superius Caput de Arteriis ani-
madvertimus, licet quidem multa intelligere
quæ in hoc Capite de Venis consulto a nobis præ-
termittuntur. Nonnulla tamen sunt quæ præterire
non possumus. Cum enim doces, Venam Vas es-
se cujus trunci in Cavam Ascendentem, ac De-
scendentem omnes terminantur; laberis profecto;
nam ut truncum venæ Portæ quam vix infra ex-
cipis, prætermittam; truncus certe Pulmonaris
venæ in Cavas non terminatur: quod eo magis
mirum est a te non esse animadversum, quoniam
Verheyenius, ex quo eorum quæ de Venis habes,
pleraque sumis, caute hunc errorem declinaverat.

In Willisii autem Explicationes, *spirales* qui-
dem fibras, ut soles, intrudis; sed evidentem er-
rorem non emendas in Figuris 2, & 3. quarum
una pro altera exhibetur. Similiter in Verhe-
yenii 18. Figuræ Explicatione non modo clam,
ut lubet (quod & in Bidloi Explicationibus fa-
cis) verba mutas; sed & ea assuis quæ ab Au-
ctoris sententia abhorrent, ut cum ipsum inducis
Venas Cavas, quas consulto, & recte Superio-
rem, & Inferiorem vocaverat, Descendentem et-
iam, & Ascendentem appellantem, nominibus vi-
delicet cum ambiguis, tum ejus in describendo
eandem venas instituto repugnantibus; Vel cum de
venis illis aliis Mediastinis c. c. „ seu potius (sic
„ enim ille scripserat) Diaphragmaticis superio-
„ ribus „ ipsum producis ita loquentem: „ quibus-
dam Diaphragmaticæ superiores dictæ „ quasi ve-
ro ipse hic fateretur, alios ante se ita vocasse
quas ut „ a nemine ante descripras „ alibi pro-
ponit; Vel denique cum rectæ illius explicationi
venularum bb: *Intercostrales a Vena Azygos*: a te
clam, & perperam adjicitur: & *aliæ inferiores*.
Interea autem dum talia adduntur, multæ lit-

teræ ab ipso Auctore adscriptæ, hic illic in Fi-
gura prætermittuntur; tantum abest ut quæ jure
meritoque addenda, aut mutanda erant, addan-
tur, aut mutantur. Erat enim (ut uno, vel al-
tero tantum exemplo utar) erat, inquam, Vena
Azygos, seorsum delineata, addenda ad latus huic
Figuræ, sub qua ita latet, ut vix ac ne vix qui-
dem possit intelligi. Erat etiam in Explicatio-
ne Figuræ 19. notula aliqua subjicienda iis quæ
de Vena Umbilicali ita delineantur, ac traduntur
quasi „ partim in Venam Portæ, partim etiam
„ in ramulos Venæ Cavæ infereretur. „ Sed
hactenus hæc. Nunc ad Vasa Lymphatica tran-
seamus.

ANIMADVERSI O XLVII.

IN iis quæ a te de Vasis Lymphaticis tradun-
tur, aliquid de eorum, atque adeo Lymphæ
ipsius causa finali frustra perquisivi. Frustra et-
iam expectavi, ut decerneres, quid Lectoribus cre-
dendum esset de Lymphaticis Pulmonum Vasis.
Vix enim legerunt „ nullis sensibilibus vasis lym-
„ phaticis pulmones instrui „ cum versa pagina
legunt „ ex pulmonis superficie vascula prodire
„ lymphatica. „ Et sane haud sunt insensibilia
in eadem superficie vasa lymphatica; imo ego vel
nullo prævio artificio, ibidem aliquando in cane non
modo ipsa, sed & „ varias illas anastomoses perpe-
„ xi quas cum vicinis lymphaticis componunt,
„ & de quibus alias pluribus „ scripturum se, Nu-
ckius hic promittebat. Cæterum quod attinet
ad injectiones quibus idem Auctor se usum scri-
bit ad lymphæ ductus detegendos, lienis quidem,
aere injecto per arteriam; testium autem, per ve-
nas; ego quidem cum Amicis Venetis non semel
vidi lymphæ ductus lienis vitulini (quo & Nu-
ckius est usus) superficiem perreptantes, aere in
ejus venam moderate immisso. Porro ex ejus-
dem observatione quod vasa lymphatica ab artu-
bus inferioribus versus thoracici ductus initium
pergentia, plures in homine quam in brutis con-
globatas glandulas subeant; ego illum istarum
usum confirmari posse, animadverto, quod videli-
cet lymphæ motum juvent; qui quoniam in no-
bis ob erectum corporis positum multo est per ea
vasa difficilior quam in brutis, ideo plures glan-
dulas, & brevioribus intervallis distributas vide-
tur requisivisse. Quæ autem a Nuckio interje-
cta hic sunt de Ureterum diametri inæqualitate,
toties vera esse, cognovimus, quoties perquisivi-
mus. Est autem nobis expeditissima ratio id ob-
servandi, atque ostendendi, quod alioqui prima
inspectione non solet apparere. Altero videlicet
eorum extremo obligato, aer per alterum immit-
titur; tum hoc quoque constricto, & in recenti,
& in sic reliccato uretere manifestum est id quod
Nuckius delineat, hoc est non uno, sed pluribus
in locis ureterum diametrum contrahi, & vicissim
dilatari. Quæ cum ita sint; planum est, causam
hujus inæqualitatis a Cowpero excogitatam con-
cidere. Id enim repetit ab Iliacæ arteriæ pulsa-
tione, quæ super se transeuntem ureterem dum
subinde constringit, efficiat, ut urina supra eum
locum aliquantum cohibita, ureterem dilatet;
quasi vero ad eum tantum locum hæc major ipsius
amplitudo observaretur. Cæterum quæ infra Nu-
ckius de Peritonæi Hydrope scribit, cum iis
quæ de eodem morbo in Commentariis Reg. Scient.
Academiæ Parisiensis traduntur, haud inutiliter
conferentur.

ANIMADVERSI O XLVIII.

TAbulæ LIII. Figura 15. illa ipsa est quam
miror, Verheyenium ideo sibi describendam
censuisse, ut „ plura vasa lymphatica, eorumque
„ ingressum in cisternam exactius repræsentaret „
cum non ignoraret videlicet, hanc Figuram ex
cane esse, non ex homine, qui quantum in his
rebus a cane differat (ut cætera omittam) ipse
Nu-

204.
Vid. Ad-
vers. I. n.
21. & in
Ephem.
N.C. Cent.
VI. Obs.
Heist. 27.

De Vasis
Lymphati-
cis, Glandu-
lisque,
iisdem in-
terjectis.

205

206.

209

209.
De Urete-
rum dia-
metro se-
cundum
naturam
inæquali

Append.
Anatom.

212.
& seq.
An. 1707.

l. r. tr. 2.
c. 13.

207. Nuckius supra docuit; ibi etiam confirmans, ubi inferiores pariter lymphæ ductus renum aliter descripsit atque hic ex cane delineavit: quos ipse cur a dextro tantum latere explicet, cum sinistris pariter & *insulæ*, & eadem insertiones conveniant, neque ipse video, neque te vidisse, credo, quando hujus Explicationis verba, quod in superioribus, more nimirum tuo, feceras, non mutasti. Verum ut ad Verheyenium redeam; ne in cane quidem ipso ita semper se habere cisternam, multoque minus ista omnia vasa lymphatica, existimandum, puto, qui in iisdem animalibus interdum illam viderim non qua delineat Nuckius, sed fere in vesicæ urinariæ vicinia incipientem, unde in conii inversi modum ascendebat ita ampla atque pellucida, ut lumine ab altero latere appposito, intermixti lymphæ, globuli aliquanto minus diaphani, ita celeri cum eadem cursu scandere post vicinarum Partium attrectationem & motum observarentur, ut nisi qui viderit, facile concipere nemo possit. Debat itaque Verheyenius non hanc, sed proximæ Tabulæ Figuram 1. describere; nam etsi lymphatica vasa aliter etiam in aliis hominibus se se habere, non est dubium; ea tamen Figura non ex canino, sed ex humano subjecto desumpta est. Jam vero ut ad te revertar; in Bibliotheca quidem Anatomica Tabulæ hujus LIV. modo memoratam Figuram 1. quæ ibi est Tabula CIX, ut & alias tum præcedentes, tum subsequentes Nuckii Figuras inverteras, & nominatim 31, & 41; quarum pariter inversio naturalem rerum situm immutat. Hic autem Nuckii Explicationes pervertis. Neque enim solum in tuo Tabulæ ejusdem LIV. titulo, delineare hic ipsum, ais, decursum vasorum lymphaticorum, per uterum muliebrem; sed cum ille in titulo Figuræ 1. „uterum fœmi-“, neum una cum lymphæ ductibus depingere se, dixisset; tu clam de tuo interjicis, per eum de-
218 „currentibus“, quando & ex iis quæ ille supra monuit, & ex ipsa Figura satis superque constat, nullos ipsum, per uterum muliebrem lymphæ ductus pingere; quapropter Figuram 2. adjecit; sed ne „per testiculos quidem decurren-“, tes „eosdem pinxit, sed ab iis tantummodo recedentes. Non addo: cum ipse scripserit, uterum se pingere „facie inversa“, te scribere „facie universa“, nam hoc atque alia ejusmodi errata, ut pag. 208. „oculorum“, pro ovulorum, arteriæ „teneritas“, pro tenuitas, etsi illius sententiam misere depravant, & Lectores turbant; non magis tamen incuriam tuam quam Operarum ostendunt. At si tibi Explicationes Nuckii mutare tam placebat, cur nihil in postrema mutasti? cur nihil interjecisti? Nam, modo id clam Lectores non fecisses, si aut istud cor non esse hominis, admonuisses, aut si pro Vena Cava Arteriam Magnam; pro Arteria Magna Pulmonarem Arteriam indicasses, tum Nuckii errorem correxisses, tum laudem aliquam promeruisses.

ANIMADVERSIO XLIX.

218. Sequitur Caput de Glandulis, ita dispositum; ut de harum structura judicium ferre neque commode, neque satis Lectores queant. Primum namque inducis Nuckium earum structuram a Malpighio propositam impugnantem, deinde Malpighium adducis eandem structuram in elaboratissima illa Epistola proponentem, tum vero quæ idem in Posthumo Opere Nuckio respondet, prætermittis. Et tamen ipse rerum ordo postulabat, ut primum Malpighii Epistolam, tum Nuckii dissensiones, denique Malpighii responsiones proferres. Sed de his ne ibi quidem Lectorem mones ubi Nuckius se dissentire a Malpighio, profitetur. Addit ille Catalogum, glandulas, ut inquit „a supremo vertice ad infimum usque pedem“, complectentem, ex quo

appareat, quotquot fuerunt ante ipsum Anatomici, omnes in tradenda glandularum serie defecisse, & Whartonum ipsum plurimas quidem proposuisse, sed multas intactas reliquisse. Non difficile est homini in præsentis Anatomies cognitione versato ostendere, in hoc quoque ejus Catalogo non pauciores fortasse glandulas omisas esse quam positas, & inter illas quasdam etiam quæ eo quo scripsit, tempore non ignorabantur. Tu tamen siles. Neque hæc eo noto quod Nuckii peritia, & diligentia non tanti apud me sit, quanti apud te esse, video; sed ne ob ejus auctoritatem silentio tuo confirmatam Tirones hic in errorem labantur. Hisce admoniti, cautius legent quæ sequuntur; non enim mihi vacat ad omnia quæ notanda essent, subsistere; quanquam nonnulla eorum alibi attingam, neque hic dissimulabo, in calce illorum quæ ex ipso adducis, dum negat „Cor, Musculos Incercostrales, Musculos Abdominis &c. ullis ditari glandulis“, aut ab his ad facilitatem motum humectari; Malpighium, Havers, Fantonum habere adversantes: dum vero addit: „ligatura injecta nervis ad glandulas tendentibus, tonum earum perire, & usu suo destitui, observabis; ipsum videri adversari sibi qui in Sialographiæ Cap. 2. „si ligatura, injecta, in nervum ad glandulam tendentem, aut transversim dissectetur nervus, non tamen ideo secretionem cessare, observabimus, sed tardiolem solummodo, & magis lentam procedere.“ Porro quod viscerum diu in aqua maceratorum, veluti in ea quæ sequitur, laudata Epistola etiam Malpighius observat, Vasa lymphatica impleantur & turgeant, hoc favere iis potest qui humorum e caveis corporis in vasa sanguifera reductionem sive in naturali statu, sive in morbofo per lymphæ ductus explicant. Quod autem Malpighius hic jam conjectura assecutus erat, scilicet cum vesiculis in lienis superficie tunc assurgentibus, ejus lymphæ ductus communicare, id postea reipsa sic esse, injecto aere deprehendit Nuckius, ut supra traditum est. Illud permirum est, cum nihil aliud Malpighius in tota hac Epistola agat, nisi ut ostendat, præter vasa sanguifera, & glandularum excretoria membranofum folliculum omnino ad structuram glandularum requiri, utrique illi vasorum generi interjectum; te tamen, & Verheyenium hanc ejus sententiam tam perspicue propositam, & tam sedulo inculcatam minime esse assecutos. Dummodo enim tu nescio quam substantiam succosam; ille capsulas quasi quasdam extrema vascula circumplectentes, aut firmantes, & sic cum ipsis corpuscula quædam aut globulos efformantes, habeatis, ita glandulas habere vos, creditis, ut nihil rationem aliud requirere, aut siquis dissentiat, de verbis tantum disputare, pronuncietis. Ratio autem requirit, ut quod tanto Anatomico, quantus quidem Malpighius fuit, in tot perlustratis ab ipso glandulis sensus ostendit, id ut superfluum sine acri, indubio, longoque examine non rejiciatur. Et cum, Mangete, questio incidit inter eos qui Malpighii Epistolam recte intelligunt, & Cl. Ruyschium, an pars aliqua sit glandulosa, an vero mere vasculosa, hoc nimirum queritur, sintne inter ejus arterias & vasa excretoria interjectæ membranofæ vesiculæ, ut Malpighius affirmat, an vero non sint interjectæ, ut contendit Ruyschius. Intelligis ergo, de verbis non disputari, atque adeo quæ tu in Præfatione, in qua hoc colligis, præmisisti, ea finiendæ huic contentioni apprimere, ut credis, non inservire.

ANIMADVERSI O L.

De Mam-
mis .De Venis
Lacteis .
223

IN Tabula LV. moneri Lector poterat, ea sub-
rotunda corpuscula quæ in Figura 2. per in-
ternam muliebris mammæ substantiam pinguntur,
non ita per se obvia, & distincta esse solere; ve-
rum de hac re in iis Animadversionibus quæ in
III. tui Theatri sunt Librum, fusius a nobis
scriptum est. Etsi vero Lactæas Venas chylo tur-
gidas in subiecto humano videre, ut supra inquit
Nuckius, rarissimum sit, eaque de causa Figurâ
9. digna sit quæ inspiciatur; nos tamen qui cum
alias, tum optime in eusarco Juvene vidimus an-
te sex horas suspendio necato, cui quatuor vel
quinque horis ante supplicium aliquantum vini,
mollitque in hoc panis, ut vocant, biscocti da-
tum fuerat, addimus, multo crebrioribus atque
longioribus ramis, seu mavis radicibus ultro no-
bis apparuisse ita uti non modo prope mesenterii
limbum, sed a tota atque adeo etiam ei limbo

opposita tenuis intestini superficie emergerent; in
qua dum albos illos ramusculos elegantissimos in-
spectarem, id etiam memini animadvertisse, quod
etsi sanguiferorum vasorum ductum sequi videren-
tur, non tamen exacte minora præsertim vascula
sequebantur. Postremo Caput de Membranis, &
Ligamentis satius erat, ex Verheyenio ad verbum
describere, quam, ne id fatereris, tam pauca de
tuo, & ex his ipsis pleraque aut falsa, aut du-
bia addere. Nam quod per ligamenta lata uterum
dorso connecti, dicis, id falsum est; quod, mem-
brana scroti media, hoc ais in duas cavitates
disjungi, eam quidem mediam, ut tu accipis,
membranam a Cl. Ravio in dubium saltem vo-
cari video; quod denique Meninges veros esse
Musculos, pronuncias, de Dura Cl. Fantonus, ut
nostri, dubitat; de Pia falsum est. Attamen
erant quæ adderes, si Veterum, multo in qui-
busdam Anatomæ partibus diligentiorum, vesti-
giis insistens, hic de Ligamentis figillatim sermo-
nem instituisses. Haftenus in Librum Primum.

233

Adversarior. Anatomicor. II. Finis.



FIGURARUM EXPLICATIO.

FIGURA I. ad XXVIII. & XXXI. Animadversiones pertinet,



Xhibet peculiarem illam Cartilaginem quæ inter os Temporum, & Maxillæ inferioris Processum retusum interponitur, huic Processui adhuc insidentem.

- A. Processus retusus Maxillæ inferioris sinister a parte anteriore, & latere interno despectus; quem ob positum (ne quis forte fallatur) multo crassior videtur quam sit.
- B. Cartilago illa peculiaris, ejus Processus summæ parti imposita, a superiore, sive convexa facie inspecta.
- c. c. Limbus ejus fere ellipticus, in quo ipsa crassior est.
- d. Media ejus pars, in qua subsidit, & extenuatur.

FIGURA II. eodem pertinet, Eandem Cartilaginem ostendit, sed pene undique discisso ligamento per quod ejus limbus Maxillæ Processui circumcirca connectebatur, ab hoc dissolutam, & retrorsum elevatam.

- A. Processus memorati eodem fere modo atque in superiore Figura inspecti summa pars, seu majoris capitulum, sua, ut cæterorum ossium capita in articulis solent, lævi cartilaginea crusta obductum.
- B. Peculiaris insuper huc addita Cartilago, elevata, & retrorsum acta, ut inferior, seu concava ejus facies inspicere queat, cujus media secundum longitudinem pars a retroposito lumine pellucet.
- c. c. & d. Eadem ostendunt quæ in Fig. I.
- e. Ligamenti Cartilaginem cum Processu jungentis circum eandem relicta portio; ob quam latior hic ipsa videtur quam revera est.

FIGURA III. eodem spectans, Illam eandem Cartilaginem monstrat, sed omnino a Processu sejunctam, extensam, & a superiore parte aspectam.

FIGURA IV. ad Animadversionem pertinet XXXI. Cartilagines Tibiæ Semilunares in sua fede representat.

- A. Ossis Tibiæ sinistræ extremum superius, ab anteriore parte visum Patella, & ligamenti omnibus ablati, antrorsum aliquantum inclinatum, ut pars ejus summa, quæ articuli genui partem constituit, illique insidentes Cartilagines undequaque in conspectum veniant.
- B. B. B. B. Ea de qua modo dictum est, summa pars Tibiæ, ut cætera articulorum ossium extrema, sua lævigata cartilagine obducta.
- C. Interior, &

D. Exterior Cartilago Semilunaris: ambæ a facie superiore, & concava aspectæ: quæ quia sunt a ligamento membranaceo quo genu articulum obvolvitur, circumcirca amputatæ, ob novam illam ab amputatione inæqualitatem in exteriori ambitu, & aliquam contractionem minus elegantes quam revera sunt, hic videntur.

FIGURA V. pertinet ad eandem Animadversionem, Eadem quæ superior, sed sub alio aspectu monstrat.

- A. Idem Ossis Tibiæ extremum, quod & in Figura IV, pariter insipientium oculos versus inclinatum, sed ab exteriori latere, & aliquantum a tergo conspectum.
- B. B. C. Omnino eadem quæ in IV. Figura, ostendunt.
- D. Cartilago Semilunaris Exterior, eadem quæ sub eadem littera in superiore Figura monstrata est, quamvis hic propter obliquitatem minor videatur. Hic enim ostenditur a sua sede elevata, & ad latus internum Tibiæ inclinata, tum ut facies ipsius inferior aliquantum convexa sic tamen ut fere plana sit (quod ab Artificibus expressum est non satis feliciter) inspicere queat, tum etiam ut quemadmodum ejus cornua subjectis foreis implantentur, appareat.
- e. c. Cartilaginis ejusdem Cornua.
- f. Ejusdem in ambitu, qua Ligamento membranaceo genu articulum obvolvendi connectebatur, crassities ex obliquo apparens.
- g. Crassities eadem in altera, sive Interiore Cartilagine melius ostensa.
- h. Tuberculum cartilagine instructum per quod Tibia cum supremo Fibulæ extremo jungebatur: quod, & prominentia pariter, super qua h. est, quæ in transversum sub B. ducitur, ob lateris ossis ad anteriora inclinationem sic apparent, aliter apparitura, si id erectum, & e regione aspiceretur.

Cæterum ad ea quæ de his Semilunaribus Cartilaginibus in memorata Animadversione scripta sunt, hæc præterea addi possunt: Observatum esse a nobis, Exteriorem ut ipso ambitu minorem, ita elegantiori forma solere esse quam Interiorem; quod & hi Iconismi quadantenus ostendunt: Quæ autem de usu a Borello ipsis assignato ibidem scripsimus, ita accipienda esse, ut intelligatur, ob eam quam proposuimus, causam non tantum motum iis Cartilaginibus nos concedere, quantum Borellus videbatur; non tamen quantum satis est ad eum quoque usum retinendum, adimere; tantum enim abest, ut hunc prorsus rejiciamus; ut Cartilaginibus pariter Maxillæ Inferioris de quibus supra dictum est, haud absimilem etiam usum, motibus videlicet ejusdem Maxillæ antrorsum, & ad latera, conducibilem, adscribendum esse, opinemur.

F I N I S.

JO. BAPTISTÆ
MORGAGNI
ADVERSARIA
ANATOMICA TERTIA.
OBSERVATIONES COMPLECTUNTUR
DISTRIBUTAS
IN L. ANIMADVERSIONES

AD PARTEM I. LIBRI II.

THEATRI ANATOMICI
CL. V. JO. JACOBI MANGETI

SERENISS. REGIS PRUSSIÆ ARCHIATRI.



VENETIIS,
MDCCLXII.

~~~~~

EX TYPOGRAPHIA REMONDINIANA.

*SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.*



TO PART I  
MORRIS

ADVERSARIA

AMERICAN TRUTH

ORIGINATIONS OF THE

DISSENT

IN L. AMERICAN

ADVERSARIA

AMERICAN TRUTH

CL. N. J. JACOB M. JACOB

NEW YORK, 1841



NEWELL

NEWELL

NEWELL

NEWELL

NEWELL



ILLUSTRISSIMIS ATQUE EXCELLENTISSIMIS VIRIS  
 REI LITTERARIÆ MODERATORIBUS  
 FRANCISCO SUPERANTIO  
 Ædis D. Marci Procuratori,  
 MICHAELI MAURO CENO,  
 LAURENTIO THEUPOLO  
 Equiti, ac Ædis D. Marci Procuratori,  
 TOTIQUE TRIUMVIRUM LITTERARIORUM  
 ORDINI AMPLISSIMO

Joannes Baptista Morgagnus S. P. D.



*NON* est cur longa epistola gravissimis obstrepam occupationibus quibus Vos, AMPLISSIMI VIRI, in Reipublicæ procuratioue distinemini. Quod enim mihi in his Tertiis Adversariis edendis consilium sit, in iis exposui litteris quas nuper Alteris præfixi. Virtutes vero innumeras, & cætera Eximia Ornamenta Vestra celebrare nec pro dignitate possum (quis autem possit?) & si possem, in epistola tamen non aggredere-



rer. Illud ergo unum relinquitur ut Vos orem, ut hoc quoque opusculum, quale id cunque est, & Vobis esse inscriptum, & gratum acceptumque habere velit. Quod tamen ipsum ne pluribus verbis a Vobis petam, Vestra ista facit cum omnibus cognita, tum mihi inprimis spectata Benignitas. Quamobrem potius D. O. M. precor, ut Vos omnes, **AMPLISSIMI VIRI**, & Patriæ, & huic Gymnasio quam diutissime servet, incolumes.

D. Patavio III. Idus Novembres MDCCXVII.












Fig. II.



Fig. III.




Fig. I.





# JO. BAPTISTÆ MORGAGNI ADVERSARIA ANATOMICA TERTIA

A D V. C L.

## JO. JACOBUM MANGETUM

*M. D. & Sereniss. Regis Prussiae Archiatrum.*

### ANIMADVERSI O I.



Ecundi Libri tui primis paginis vix inspectis, hunc intelligo priori non dissimilem fore. Nam ad Peritonæum quod attinet, te ita geris, V. Cl. ut Lectorem & supervacaneis lassēs, & inter se pugnantes implicēs. Supervacanea in primis

sunt his temporibus quæ ex Glissonio de Peritonæi, tunicarumque viscerum, ipsi inclusorum, exortu tam prolixo sermone exhibes. Pugnāt vero inter se præsertim quæ de Processibus Peritonæi ex eodem Glissonio, ex Nuckio, & ex Verheyenio adducis. Nam primus interiorē Peritonæi membranam ad initia eorum Processuum pertundi; & in herniis dilatari sive in viris, sive in mulieribus indifferētiatim docet. Nuckius id in mulieribus concedit; in viris negat. Verheyenius negat indifferētiatim, atque ideo in utrisque. Hic quæ Lectores scire possint, hos Processus, ut in viris, diligentius a Verheyenio; ut in mulieribus, a Nuckio; ut in utrisque, minus accurate a Glissonio esse descriptos; quæ, inquam, scire possint, quæro, te silente, imo Verheyenii Anatomiam ceu, non parum sane accuratam, & Glissonii Tractatum ceu, accuratissimum, dum singulorum verba afferes, laudante? Credent, opinor, Glissonio non modo in his, sed & in cæteris quæ, te pariter silente, addit, videlicet intra eosdem Peritonæi Processus quasi intra capsulas in viris musculos cremasteres descendere, in mulieribus ligamenta rotunda ad clitoridem deferri. Igitur præstitisset hæc ex Glissonio, doctissimo alioquin Viro, & in aliis diligentiore, prætermittere; eorumque vice, Diverticuli, ut Nuckius loquitur, Peritonæi Figuram ab hoc ipso editam producere, quam in Tabula LVI. ubi locus non defuisset, frustra quæro.

Cæterum num qua gula, vena cava, & reliqua de quibus Verheyenius meminit, transeunt, Peritonæum perforetur, an potius ad ea obducenda invertatur, aliasque de hoc genere disquisitiones prætergredior, ut de istis duobus quæ Poupartius Suspensoria Abdominis Ligamenta appellavit, quid sit mihi observatum, proponam, non jam dico in veterum Anatomicorum libris, in quibus eadem memorantur, sed in multis cadaveribus, in quibus longe aliam eorum naturam deprehendi. Refecto enim illo ipsorum extremo per quod ossi pubis affiguntur, eoque una cum continuato muscoli Obliqui Externi tendine ad latus sensim inverso, evidentissime comperi, ipsa non peculiaria ligamenta, sed imam tendinis ejusdem musculi oram esse. Fiunt namque ex fibris quæ proximis in continuato tendine sunt

*Morgagni Adversaria Anat. III.*

parallelæ, eadem cum ipsis figura, crassitie, colore, consistentia, eademque demum; quod potissimum attendendum est; cum fibris musculi carneis continuatione. Nam etsi infimarum ex ipsis perpauca, extremæ spinæ ossis illum in transitu annexi solent (nam & aliquando nullas earum annexas vidi) non tamen propterea non satis perspicue, respondentibus sibi fibris carneis, hæ quoque continuantur. Hæ fere ipsæ sunt quæ in fasciculum videntur constipari, sed neque teretem, cum ad modum institæ planus sit, neque latum, cum vix una linea Bononiensi latiore viderim, neque demum, quod rei caput est, aliud quam tendinis limbum reputandum, si ea qua nos indicavimus, ratione examinetur.

### ANIMADVERSI O II.

Non immerito veritus es, ne quæ de Omento ex Glissonio pariter adducis, ea nimis prolixa viderentur. Quotus enim quisque erit cui his temporibus non prolixa videantur cum primis pleraque eorum quæ de istis causis aut pinguedinis, aut figuræ Omenti per plures paginas differuntur? Profers deinde Malpighii de Omento Dissertationem, aliquot etiam Notis superadditis, velut in Indice admones. Sed hæ nimirum duæ illæ ipsæ sunt quas eidem Dissertationi in Bibliotheca Anatomica addideras; in quarum altera Omenti nescio quod Fermentum in scenam producis, in prima autem Vasa Adiposa, & inter hæc atque Membranam Adiposam communicationem adducta quadam observatione comprobare te, credis. Attamen in eum Malpighii locum nulla fortasse melior Nota produci poterat quam quod ipse interjecto ab ea edita Dissertatione triginta annorum intervallo, in Posthumo Opere eo quo præstabat, candore fassus est, „Vasum, inquit, seu ductum adiposorum existentiam non adhuc integre asserere audeo, licet circa ipsa exinde sollicitus plurimum me exercuerim. Nec sane ejusmodi Vasa videntur necessaria, quando quidquid iis potissimum tribueretur, per vasa sanguifera explicari potest. Nam arteriarum communicationem cum cellulis adiposis in II. Adversariis, te non dissentiente, posuimus; cellularum autem ipsarum ibidem memoratum cum venis commercium Malpighius hic satis indicat, dum testatur, se & in ranis, & in aliis animantibus, compressis præcipue striis adiposis trunco venæ portæ adnatis, manifestas olei guttulas una cum sanguine per eandem venam in hepatis cavum ferri vidisse. Cæterum ejusmodi observationes ut redditum pinguedinis comprobant tum generatim in venas, tum speciatim in venam portæ, sic firmant illum Omenti usum a Doctissimo Boerhaavio pro-

242

239  
& seq.

245

243  
De Vasis  
Adiposis.

Animad.  
6.

246.

De Omenti  
Usu.  
Institut.  
Medic. n.  
329. &  
seq.



positum, idest ut sanguinem pro bilis separatione ad hepar tendentem multis oleosis particulis opportunissime augeat. Quo usu admisso, animadverto, Mesenterii usibus hunc quoque addi verissimiliter posse, videlicet ut sanguini per suas mesentericas venas ab intestinis ad hepar ascendenti multas in transitu ex iis quibus copiose ornatur, adiposis cellulis particulas oleosas ob eandem causam admisceat.

## ANIMADVERSIO III.

**C**UM inter initia hujus Libri, ab imo ventre, secundum methodum Anatomicis familiariter ordiri te, dixeris, eamque in duobus superioribus Capitibus servaveris; in hoc repente, & nullam quidem petendo veniam, ad Œsophagum, atque adeo ad Pharyngem transilis; quasi vero & hæc Partes ut ventriculo continuantur, ita in imo ventre concluderentur: quod quando tibi facere placuit, cur & in Tabulis non fecisti? Sed his missis; quæ de memoratis Partibus ex Verheyenio producis, inspiciamus. Quod attinet ad carneam Œsophagi tunicam, scripserat is in prima Anatomies suæ editione, ab egregiis Viris (scilicet Wil-  
lisio atque Stenone) egregie sibi impositum esse, se, quod illam in homine ex spiralibus fibris constare, docuissent, quæ ex longitudinalibus, & annularibus efficiatur. Porro in altera, ex qua hæc tu profers, editione, ut admonitus a me fuerat in Adversariis Prioribus, ita Stenonem ipse quidem omisit; fibras vero longitudinales, & annulares, & rationem cur in his decipi quis possit, jure meritoque retinuit. Quarum tu rerum securus, tum hic, tum infra quoties ille fibras annulares esse, dicit, toties, verius, potiusque Spirales, esse, interjecta notula affirmas, sed vere, ut prædixisti, *levicula*. Nam si Verheyenius, ut ibidem fateris, accuratissime, de Œsophago scripsit; æquum sane erat, ut alterum Anatomicum ipsi opponeres qui id in humano, de quo agitur, Œsophago, accurato pariter & cauto instituto examine, se observasse, testaretur; imo ne hoc quidem satis erat; sed ut inter eos dissentientes judicium ferres, te ipsum, animo a præjudicata opinione libero id observare, conveniebat. Hoc si fecisses, ut ex meis observationibus conjicio, mecum in hac parte Verheyenium laudares; & in aliis potius in quibus files, reprehenderes. Nam ut de numero tunicarum Œsophagi non disputem, quem eodem ferme jure vel laugere ad septenarium, vel, quod in intestinis fecit, contrahere ad ternarium potuisset; quid de Pharynge, ejusque musculis sentiam, ex II. Adversariis satis apparet. Mirumque inprimis est, non dico alios Anatomicos, & hos recentiores, sed ipsum olim M. Tullium nonnulla de anterioribus, & summis Pharyngis terminis scivisse quæ Verheyenius ignoraverit. In secundo enim libro de natura Deorum antequam attingeret quædam quæ hic in fine a Verheyenio dicuntur: Œsophagum videlicet, sive, ut ipse Tullius loquitur, Stomachum, agitatione, & motibus linguæ cum depulsum, & quasi detritum cibum accepit, depellere; ipsius autem partes eas quæ sunt infra id quod devoratur, dilatari, quæ autem supra, contrahi; ante hæc, inquam, illa scripserat: Linguam, ad radices ejus hærens, excipit Stomachus, quo primum illa buntur ea quæ accepta sunt. Oris utraque ex partibus te tonsillas attingens, palato extremo, atque intimo terminatur. Hæc si Verheyenius aliique perpenderant, non facile Uvulam a Pharynge disceidissent. Quod reliquum est; de Œsophagi Glandulis hæc in brutis observavi. Interiores parvas quidem, sed creberrimas in gallinis, in ea etiam parte Œsophagi quæ infra ingluviem est, vidi. Itemque in testudinis terrestris Œsophago minutas conspexi, sed evidenter lenticulares, nonnullas præsertim quæ a coercita materia, aliquantum turgebant. In summo etiam vitulino Œsophago parvulas vidi & subrotundas, quæ, ex expresso contento humore, subsidebant: ut mittam latum crassumque annulum glandulosum, imum pharyngis orificium in cane cir-

cumplectentem, de quo in Epistola etiam dixi de plerisque Uvulæ, & Pharyngis Musculis. Et hæc quidem omnes glandulæ interioris Œsophagi faciem observanti conspicuæ fuerunt. Eodemque, opinor, pertinebant duo ovalia tubercula parvam nucem juglandem æquantia quæ intra infimum canini Œsophagi tubum prominentia olim inveni, altero etiam ibidem hiante, foramine grandiusculo sic ut mediocrem stylum admitteret. Hæc cum, me alio avvocato, Amicus dissecuisset, ex aggerie glandularum in eorum cavea hiantium compacta fuisse, retulit. De istis autem quæ Œsophago exterius assident, Glandulis, quam crebro in canibus turgeant, & a vermiculis quibusdam rubentibus, oblongis, & tenuibus incolantur, observationes ostendunt Experientissimi Redii, & Virorum Cl. Danielis Clerici, & Joannis Fantoni. Igitur in glandulas sic affectas cum ego quoque sæpe inciderim, & foramina per quæ cum Œsophagi tubo communicabant, ita facta animadverterim, ut omnibus conditionibus potius quam viæ ab erodentibus vermiculis temere aperta, meatus ab iisdem dilatati interdum esse viderentur; haud longe ab eo absimile ut cum Fantono, & Verheyenio existimem, has Glandulas additas esse ad magis lubricam efficiendam Œsophagi viam, dum præsertim a durioribus & æquo grandioribus, ut in canibus sæpe contingit, deglutitis premuntur. Quoniam tamen, iis Glandulis secundum naturam se habentibus, nullos evidentes meatus in cane, multoque etiam minus in homine vidisse memini; venia mihi dabitur, ut opinor, si tecum interea, Mangete, non abnuentibus Doctissimis Actorum Lipsiensium Scriptoribus, optabo, ut ejusmodi canaliculi, illique nominatim Thyroidæ Glandulæ, in cujus anatome aliquam, ut alias ostendi, operam posui, manifestius demonstrentur.

## ANIMADVERSIO IV.

**Q**UAM raræ sint observationes indubiarum atque evidentium Glandularum in tunica Ventriculi humani interiore, ex eo intelligitur quod nonnulli glandulas in eadem tunica non admittunt. Quos ut convinceret Eruditissimus Fantonus observationes commemoravit duas in duarum mulierum ventriculo habitas a Wepfero unam, a Peyero alteram. His ego tertiam addam quam ante hos decem annos cum Doctissimis Amicis Venetis habui. Scilicet interioris superficiem virilis ventriculi prope antrum pylori ad digitos transversos plures confertissimis lenticularibus Glandulis obstitam vidimus; quarum multæ manifestum in centro excretorium osiculum habebant. In altero etiam ventriculo humano ejusmodi Glandulas vidisse olim memini, sed neque elegantia, neque numero cum descriptis conferendas. Porro ad ordines carnearum ventriculi fibrarum quod attinet, et si Willisius, pro virili sua conari se, dicit, eam partem Anatomies hæcenus fere intactam tractasse; re; qui tamen Falloppii nostri Observationes Anatomicas, legent, non illos tantum, sed & alia quæ supra a Willisio de Ventriculo traduntur, jam olim ad eundem prorsus modum tradita inveniunt. Illud vero non invenient quod Willisius infra docet: in ipso videlicet Pylori foramine intam nervosam tunicam in molem oblongam, quæ instar Epistomii est, attolli. In mulieris quidem ventriculo haud procul ab eo foramine carunculam olim vidi oblongo petiolo internæ tunice inhærentem, & huic extrinsecus concolorem, intrinsecus autem ex rubro albicantem, ut unam e mesenterii glandulis imitari videretur. Aliasque item vidi ex ipso Pylori annulo laciniam quasi quandam dependentem. Et præterea in suis ut circum Pylori antrum peculiarem advolutum musculus, sic in ipso Pylori foramine duo crassa corpora cum iisdem Amicis vidisse memini quæ ingestis aut ante tempus egressuris, aut regressuris obstant. Sed in homine quod hoc munere fungatur nihil ibi constans & perpetuum est, nisi anaulus ille (seu mavis sphincter) ex fibris carneis & assurgente in duplicaturam circumcirca tunica nervea constructus quem a Willisio tum hic, tum in Figuris

De gli Anim. Viv. De Lumbrico Latino c. 13. Anatom. Diss. 3. supra 251.

253. Supplem. Tom. 6. Sect. 6.

De Glandulis Ventriculi. Anatom. Diss. 3.

De Ventriculi, & Pylori inprimis structura. 254.

256

253. De Glandulis Œsophagi.



omitti, neque a te in subjecta aliqua Nota addi, mirum est. Quæ autem de Ruminantium ventriculis ex Glissonio adducis, ejusmodi sunt ut non  
 259 satis sit Lectores ad Peyerî Merycologiam remittere, quo „ plenior „ ut dicis, historiam, & explicationem habeant. Et si enim hæc Glissonii pauca sunt, magis tamen sunt falsa  
 257. quam pauca. Nam neque pisces unico „ in universo „ ventriculo donantur; neque animantes pleræque aliæ ideo unico donantur, quia unum os & podicem habent; neque ruminantium œsophagus magis ad reticulum pertinet quam ad ventriculum primum; neque omasum transversis, sed  
 258 secundum longitudinem statutis pellibus stipatur, ut alia omittam quæ præter hæc in his ipsis quæ  
 259 affert ex Glissonio, Peyerus non jam supplet, ut manca; sed emendat, ut falsa. Omittam pariter non pauca verba quæ ut superioribus Figurarum Verheyenii in Tab. LVI. Explicationibus, sic ultimæ de tuo clam admisces; illudque unice quæram, cur hujus ipsius Explicationis initio in quo Ventriculum cum Intestinis annexis „ in naturali suo situ „ in Figura 7. exhiberi, dicis, nihil addas quo verior fiat. Nam si in Figura  
 261 2. ut supra dixeris „ partes in proprio situ „ proponuntur; „ vel ex sola Figuræ, utriusque collatione constat, in hac 7. in naturali situ non exhiberi. Nec sane ex instituto Naturæ; ut cætera prætermittam; aut intestinum Ileum ita in dextrum latus contractum est, aut processus vermiformis (qua de re postea dicam) ita sub Cæci fundo propendet. Monendi igitur Tirones fuerant, hic Intestina tantum ad situm naturalem accedere, quantum studium nonnulla, alioqui non ita bene apparitura, ostendendi passum est. Quæ vero in Explicationibus Tabulæ LVII. quarum primam non totam exhibuisti, notari possent, ea satis ex iis quæ supra de Œsophago, & Ventriculo diximus, intelliguntur.

## ANIMADVERSI O V.

De Tunica  
Intestino-  
rum Car-  
nea.

263. **T**unica Intestinatorum carneæ fibras interiores, Willisius docet, esse annulares. Tu vero id tibi „ arguendum „ esse, judicas propterea quia duo alii Doctissimi Viri esse spirales, tradidere. Verum enimvero ut hi duo a Willisio dissentiant; sic cum eodem; ut cæteros nunc omit- tam; prorsus consentit Verheyenius, in hujusmodi præsertim observationibus diligentissimus, ut par omnino fuisset, te antequam Willisium argueres, rem ipsam, omni præjudicata opinione seposita, tuis oculis examinare, idque eo magis quoniam alter eorum a quorum stas partibus, non  
 264 nisi in bobus & ovibus sic se observasse, confitetur; a quorum structura, quamvis ita se haberet, quam periculose ad humanam transitus fieret, nimirum ostendunt ea quæ supra de Œsophago ex Verheyenio produxisti. Accedit, te ipsum denique agnoscere, duorum quos laudas „ neutrum „ satis assertionem suam demonstravisse. „  
 252 Dum vero addis, „ abunde id præstitisse „ Vallisnerium nostrum; rem affirmas quam non ego modo, sed Vallisnerius ipse negat. Non enim quia in Struthiocamelo duplex Cæcum intestinum spirali extrinsecus ligamento, intrinsecus autem  
 265 valvula (quam ille tamen non dicit de ligamento ipso *emitti*) instructum descripsit; non, inquam, idcirco Vir Eruditissimus aut structuram hactenus inauditam, aut vero ad id quo tu trahis pertinentem se existimat proposuisse. Nam haud dissimilem structuram jam ante observatam esse, non ignorat, etiam in pluribus aliis animalibus quæ diserte memoravit, & quibus ego tres præterea addo piscium species, & in his duas ad Canum genus pertinentes; ejusmodi spirali valvula, ut olim cum Amicis Venetis vidi, in tubo intestinali donatas. Jam vero fibras ex quibus eorum Cæcorum parietes componuntur, ne memoravit quidem; & ne multis, quamvis illos ex carneis fibris spirali- bus constare, docuisset, non tamen Morgagni *Adversaria Anat. III.*

inde aut ipse deduxit, aut deducere alios posse, credidit, sic esse demonstratum, in humanis intestinis spirales fibras esse admittendas. Quas ne in cæteris quidem ejusdem Avis intestinis agnoscit, quanquam tu vel „ duplicitem ejus „ dem spiritalitatis demonstrari „ ab ipso, narres, in valvulis Coli, quarum „ extrema se in „ vicem decussare „ dicis, quando ille ea extrema nunquam contingere se invicem; valvulas autem, non ad spiræ modum, sed „ transversim „ disponi, affirmat. Non erat igitur cur Willisium argueres: qui si te arguere vicissim posset, fortasse quereretur quod aliquot in locis, nulla ejus rei appositâ nota, ipsius verba prætermiseris quibus sublatis, Lectores mirentur quid causæ sit quod cum tot vasa, & ductus ad intestina pertinentes enumeret, non nisi de sanguiferis dicat; 266 vel quod de Crassis intestinis tam pauca habeat, ut tu ipse qui Intestinatorum „ explicationem 262 „ satis accuratam ex illo repeti commode posse „ supra dixeris, hic repente e contrario fatearis, ejus verbis „ non satis accurate describi Intesti- 266. „ norum differentias, ac ex ipsis Crassa vix no- „ mine tenuis innotescere; „ eaque de causa te alia ex Glissonio adducere. Ad quæ dum in subjecta Notula admones de Ileî Diverticulis, & de signorum discrimine, cum haud ipse intestini tubus, sed ea dumtaxat Diverticula intra herniæ sacculum coercentur; in memoriam revocas non ea modo quæ de istiusmodi Hernia jam ab anno 1700. in Commentariis Reg. Scient. Academiæ Parisiensis a Cl. Littrio proposita fuerant, sed id quoque quod nos anno 1705. in Bononiensi Academia dis- 268 feruimus, videlicet posse illam Herniam contin- gere non tantum ab intercepta, & sensim deinde dilatata parietis intestinalis particula, sed & ea ratione quam Cl. Ruyschius postea edidit. Jam enim videramus ista Diverticula, illudque in- primis quod tunc Academiæ descriptum dedimus eadem qua Ileum, figura, & latitudine, & sub- stantia, duos autem transversos digitos longum, & cum ejusdem intestini tubo paulo infra mesen- terii limbum lato orificio communicans. Num vero ejusmodi Diverticula „ ut plurimum, si non „ semper, in Ileo occurrant „ alii viderint; mihi certe, & Verheyenio qui jam ante, unum delineaverat, & „ Processus Vermiformis extra- 268 „ ordinarii „ nomine proposuerat, non ita sæpe observata sunt; neque item sæpe Riolanus vide- tur observasse, qui nonnunquam tria notasse se, dicit. Cæterum anno post, herniam vidimus ab intercepto non Diverticulo quidem, sed inferiore tantum pariete Ileî factam qui in semiova- lem cavitatem laxatus erat. Ea tamen hernia cum vomitu, & alvi obstructione pertinaci ad mortem usque conjuncta fuerat. Sed de his alias. Illud tantum addo, non modo in Ileo, sed & in Recto intestino Diverticula me vidisse. Nam in cadavere mulieris quæ nullo unquam affectu ad eum locum pertinente laboraverat, in postico Recti pariete, tribus fere digitis supra anum, cellulam vidi minoris ficus magnitudine, ex eadem atque intestinum substantia, tunica interna lævissima, & orificio reliquæ cavitati ferme æquali cum ejusdem intestini tubo communican- tem.

## ANIMADVERSI O VI.

**C**UM plura in iis, aut ad ea quæ ex Glissonio, tanquam magis accurata, affert, notari possint, ego quædam tantum attingam. Et primum quod postremam Coli partem „ utrinque „ fundum vesicæ a posteriore parte amplecti, di- „ cit, & postea sursum per inguen dextrum „ prope locum a quo primum ortum sumpserat, „ ascendere; hinc sinistrorsum recurrere, seque „ inter Ileum, & spinam dorsi immergendo, ad „ supremam partem ossis sacri pertingere, „ ibique se in Rectum exonerare; „ hæc omnia Glissonium videre interdum potuisse, agno-

266

262

266.

268

De Ileî, &  
Recti Di-  
verticulis,  
& Herniis  
in quibus  
illa inter-  
cipiuntur.

In Expl.  
Fig. 3.  
Tab. 6.  
Anthro-  
pogr. l. 2.  
c. 14.

De Coli  
flexibus.  
269.



agnosco; semper vero, aut plerumque ita habere se, nego. Scilicet ut nonnunquam istam Coli partem tot tantisque spiris convolutam vidi, ut vel alias regiones quas Glissonius non memoravit, attingeret; ita haud raro observavi longe simplicius dispositam. Quod tamen non ita accipi velim quasi negarem, Colon priusquam in Rectum desinat, ad angulum inflecti. Ita enim ibi, & præterea in hypochondrio dextro inflecti, scio, ut mirer, cur plures Medici recentiores hypochondriacum illum dolorem cujus sedem vulgus in liene solet comminisci, ideo in proximo Colo esse, doceant, quod hoc in sinistro hypochondrio inflexum, facile propterea recrementa, aut flatus eo in loco moretur; nisi enim alia addantur, cum inflexio Coli in duobus præterea locis contingat, non satis intelligitur quare is dolor sinisterum potissimum hypochondrium frequentissime afficiat. Laudantur deinde a Glissonio qui Colon, in omnibus animalibus passim veluti in cellulas globosque subinde conformari, dicunt, obliti videlicet canum, aliorumque in quibus cellulis caret. Porro id quod dicit earum cellularum esse causam, num sit, ligamentum, & huic quidem soli intestino proprium, atque unum, in XIV. Animadversione videbimus. Jam enim & quædam ex multo pluribus quæ idem Glissonius recte scripsit, vicissim confirmemus. Nam primum quod Pingues illas Appendiculas Crassis Intestinis tributas dicit, ut eundem quem Omentum, in lubricandis intestinis usum præbeant; siquis animadvertat, Omento anterius, Mesenterio autem posterius sic intestina intercipi, ut maxima tamen Crassorum pars inter illas duas pingues, lubricantesque Membranas non excipiat, is facile intelliget, ob eam causam quam affert Glissonius, istas Crassis appendiculas additas esse. Sic enim nulla horum pars est quæ pinguedinem non habeat aditam, ex qua cum humore a Peritonæo secreto mixtura videlicet componatur illi analogæ quæ pariter ex pinguedine & mucilagine inter musculos, ut Havers docuit, apparatur. Nam ut hæc mollibus servandis ad faciliorem motum musculis, ita illa lubricis servandis ad peristalticum motum intestinis conducit, quæ quidem in aperto sanorum animalium ventre si statim contrectemus, non modo humida, sed etiam uncta invenimus. His de rebus consuli Cuvperus potest. Cum autem Glissonius doceat, esse, quædam in ano, Valvulas semilunares, & intra hos totos XL. annos vix unus aut alter Anatomicus de iisdem Valvulis sermonem injecerit; nos quid reapse de illis, & quid præterea observaverimus, eo diligentius adnotabimus, quo magis structura istiusmodi uti ibidem Naturam, animadvertimus. Nam ut rara omittamus, ut puta in Recto intestino supra extremam ani oram unum vel alterum transversum digitum bis valvulam a nobis visam admodum extantem, semel in plebejo quodam in quo ad annuli imaginem facta erat, & membrana esse videbatur, iterum in fure de quo capitis supplicium sumptum est, in quo ex fasciculo fibrarum carnearum fiebat, & dimidiatum anulum repræsentabat; certe in viperis ad extremi intestini foramen interior tunica ita replicatur ut speciem valvulæ exhibeat, statum, etiam vi immisum, intra intestinum coercentis, specillum autem non nisi lenta manu sensim demissum egredi, finentis, ipsa prius tunica in brevem tubulum in quem producit, evoluta, & extrorsum protrusa; ejus enim tubuli inferiori demum extremoque parieti ani foramen insculptum est. Sed ut his, aliisque animantibus dimissis, nunc humanam tantum structuram describam; infimum intestini Recti tubum intus ex omni parte columnæ quasi quædam cingunt secundum longitudinem ejus directæ, paulatimque angustiore ad summum fastigio extenuatæ. Hæ quanquam solent esse admodum conspicuæ, nonnunquam tamen minus prominent, certumque numerum minime ser-

vant; nam tres aliquando, aut quatuor, alias plures numerantur, & præterea minoribus aliis haud raro interpositis earum numerus adaugetur. Finnt autem ex contracta nervea intestini tunica, fibrisque insuper carneis instruuntur. Quas columnas etsi aliquis judicare posset ab occluso jam usque a primordiis ani sphinctere, fortuito ceu istas corrugationes fieri quæ sub clausi marsupii orificio circumquaque excitantur; ego tamen aliter existimandum esse, censeo. Porro inter basim unius atque alterius columnæ, singulæ membranae dispositæ sunt non absimili forma valvularum cordis semilunarium. Hæ contra intestini cavitatem conversæ objectæque sunt, ut revera adjuvare sphincterem videantur ne facile quidpiam, præsertim cum nimius aut humor ab intestinorum glandulis, aut aer ab reliquiis alimentorum redundat, invito homine elabatur. Non solum autem hæ Valvulæ alias plures, alias vero pauciores sunt, item majores, minoresve, propterea quod interstitiorum quæ inter columnas sunt, numerum, latitudinemque sequuntur, sed interdum quoque nullas esse, contingit. Caterum quoties ego has Valvulas inspexi, toties sane in mentem venit quantum hæ negotii in tenesmo exhibeant, dum aut acrium recrementorum ramenta, aut ascarides, aliudve tale inter se atque ultimas columnarum radices potissimum intercipiunt. Descendunt enim in iis angulis velut angusta quædam foramina, per quæ tenue specillum in breves exilesque ductus olim demisi: horumque unus in vesiculam definebat a media anteriore parte sphincterem inter atque intestinum delitescens. Ex ea turbidum humorem expressi: quo etiam credidi eandem ob causam Naturam uti quam ob causam mollia clysmata in tenesmo subduntur, ut si quid acre in illis Valvularum angustis restiter, id mitescat, & eluatur. Sed etsi Peyerus, alterque Anatomicus de iis ductibus ita loquuntur, ut credere quis possit, aut semper, aut persæpe observari; ego tamen in aliis, quæ postea secui, cadaveribus frustra ejusmodi meatus, & multo magis vesiculas perquisivi, si Juvenem excipias in quo non absimiles ductus, & cellulam in medio a posteriore parte locatam comperi.

## ANIMADVERSIO VII.

AD illa autem quæ ex eodem Peyero de Glandulis Intestinorum adducis, & speciatim quod ea ex parte qua Mesenterium cum Intestinis cohæret, illarum Plexus non occurrant, illud dignum est adnotatu quod neque Peyerum latuit, & nos sæpe in canibus mirati sumus. Scilicet cum Plexus ultimus, plerumque (nam & aliquando deesse, vidimus) sua amplitudine totam fere postremi Ileii superficiem occupet; non sine admiratione animadvertimus, ea tantum parte intermittere quæ Mesenterio respondet. In eadem quoque animantium specie semel atque iterum observavimus, singulas ex quibus Plexus efficiuntur, Glandulas contrario prorsus ordine atque ipsos Plexus decrescere. Nam cum hi quo longius ab Ileo ad Duodenum reverteris, eo minores, ut Peyrus quoque scripsit, occurrant; contra illæ quo longius a Duodeno ad Ileum descendebam, eo minores fiebant, ut postremæ dimidio essent minores quam primæ: quod ideo magis notandum censui quod Peyrus, & Verheyenius de his Glandulis generatim loquentes, contrarium videntur indicare. In cuniculo horum Plexuum plures pro diametro intestinorum magnos vidi; in vulpe autem inter singulas Glandulas reticulare quoddam corpus intercedere, audiavi, quod etsi Wepferus cujus hic verba adducuntur, omittit, non deesse tamen facile credo, cum vel in homine Harderus, microscopio adjutus, interpositas Glandulis lineas adnotaverit. Quod vero hic de Valvulis Conniventibus quædam interjicis, primum tibi videndum est, quomodo Verheyenio, & plerisque aliis satisfacias qui

De usu  
Pinguum  
Appendi-  
cularum  
Crassorum  
Intestino-  
rum.

Supra in  
Theatro  
109. &  
seq.

Anat. of.  
hum. Bo-  
dies.

271.  
Ani Val-  
vula, &  
Columna.

De qui-  
busdam  
Ani Ca-  
naliculis,  
& Cellu-  
lis.

Exercit.  
II. de  
Gland.  
Intest.

272  
De Intesti-  
norum  
Glandula-  
rum Ple-  
xibus.

272.

Certam.  
Epist. cum  
Muralto  
Epist. 2.  
l. 1. tr. 2.  
c. 11.

273.  
Vid. in  
Exercit.  
II. Peyeri  
de Gland.  
Intest.  
De Valvu-  
lis Intesti-  
norum  
Conniven-  
tibus.



qui earum *inventorem* Kerckringium credere non possunt, cum præter rugas Intestinorum veteribus Anatomicis notas, alias in iis Conniventes Valvulas non agnoscant. Cæterum in earum rugarum causis has esse ponendas, crediderim, ut sic aucta Intestinorum superficie interiore, villi & reliqua propria ejusdem organa ter fere quibusdam in locis multiplicarentur, utque certis in tractibus Intestinorum in quibus ob acclivem positum ascensus contentorum est difficilior, his additis quasi gradibus & fulcris proclivior redderetur. Non tamen propterea cæteros ipsarum usus inficior, & nominatim quod in tractibus Intestinorum declivibus præcipitem contentorum lapsum morentur, cum in quibusdam quadrupedibus in quibus rugas vidi nullas, multo longissima intestina observasse meminerim. Sed ut tecum ad Peyerii Glandulas revertar; quod is fatetur, illas alteras quæ lenticulæ similes sunt, sive mavis Solitarias, non ita expeditum fuisse in quodam cadavere perspicere; id, quemadmodum observavi, haud raro contingit, non, ut opinor, quod desint, sed quod aut omni earum succo excreto, subsidant, aut in certis cadaveribus sint admodum exiguae; nam & in cæteris solent multum ab ea distare quam sæpe in canibus assequi vidimus, lentis magnitudine. Sed haud raro illæ quoque inconspicuæ sunt quæ de eodem genere in Tenuibus Intestinis alias observantur. Non enim crassis dumtaxat, ut Peyerus credere hic videtur, solitariae Glandulæ obtigere; sed ut in sanissimo Juvene interempto vidimus, quales per proximum Colon, tales & per Ileum hic illic sparguntur, fere milii magnitudine, figura, & colore, excretorio autem osculo ita parvo, ut ad primam saltem inspectionem non occurrat. Id & in aliis pluribus cadaveribus vidi: interdumque accidit, ut per Ileum, & Jejunum creberrimas quidem, sed inæquali magnitudine, multas etiam ovali figura conspicerem; alias, ut inter minores ex quibus maximus ille & postremus Ilei Plexus componitur, majores hæc hic illic extantes viderem; semel, ut cum idem Plexus desideraretur, itemque semel, ut cum in Colo nullæ perspicui possent Glandulæ, in Ileo tamen hæ ipsæ crebræ essent, & longe conspicuæ. Quæ cum ita sint, cumque non aliis modo, sed & ipsi Peyero in altera quam de hac materia conscripsit, Exercitatione Solitariae Tenuium Intestinorum Glandulæ cognitæ fuerint; mirum est, te nihil de ipsis hic addere, & cum ex priorē Exercitatione tot verba adducas, ex secunda nulla proferre.

## ANIMADVERSI O VIII.

**S**uper novis Intestini Duodeni Glandulis prima tu quidem ex Cl. Brunnero exhibes; nos autem ob eam quæ postea indicabitur, causam perpauca adnotabimus. Etsi nos olim cuniculi Duodenum intus peculiaribus Glandulis inæquale videramus, sensim quo magis a ventriculo recederes, decrecentibus; etsi etiam postea ex libro de Cicuta Aquatica noveramus, Wepferum in Duodeno Infanticidæ jam olim insignes Glandulas plurimas dispersas notasse, quæ detracta tunica fibrosa apparuerint conglomeratæ, singulis dimidiati seminis cannabini figuram, & magnitudinem præ se ferentibus, & quæ aqua maceratæ etiam octavo post illatam mortem die mucum copiose stillarint; nisi tamen Brunnerus, cujus auctoritas semper apud nos plurimum potuit, novum istum librum edidisset, rationemque earundem observandarum tradidisset; eas tot animantibus, cunctisque præsertim hominibus esse communes, fortasse adhuc ignoraremus. Nunc autem ipsius, quem illarum propterea Inventorem merito agnoscimus, vestigiis insistentes, quamquam proposita ab eodem seu villosæ, seu fibrosæ tunicæ exacta separatio non ita facilis est; attamen (interdum etiam fervente aqua non adhibita) picta sab ipso corpuscula; nisi quod tot, ita magna, rotunda, Morgagni *Adversaria Anat. III.*

conferta, & orificio instructa vidisse nondum videmur; satis & ipsi vidimus, & aliis ostendenda curavimus. Quod autem idem Brunnerus, ubi „ villos intestinum percolationis chyli organa „ esse, adstruit, villos in ventriculo, crassisque intestinis esse, negat; molliendum id esse aliqua explicatione, censeo. Nam certe in suilli, itemque in canini, sed clarius tamen in suilli ventriculi incisa hic illic interna tunica, imprimisque ad fundum atque ad pylorum confertissimas quasi lineas ab nervea basi ad perpendiculum ascendentes, affuso præsertim deterfoque atramento cujus pars restitans in intervallis illas magis indicabat, me satis memini ostendisse. Hoc unum distinguendi magis quam contradicendi causa in præclaro hoc Scripto observasse sufficiat.

Jam enim valde aveo istam alteram Dissertationem inspicere cui multo plus hederæ suspendis, & quam in ea ferme unica quam Brunnero apponis, notula inculcas. Ubi enim Vir Experimentissimus superiora intestina ab inferioribus *in-signi* ait *valvula* determinari, tu continuo Lectores ad istam proximam Dissertationem remittis, cujus Auctor hanc nimirum „ Observationem „ Novam, -- seu novum hoc, & nuperrimum, „ inter alia plurima, inventum suum „ proponit quod insignis illa „ supposita hucusque intestinum „ rum Valvula „ nulla sit; sed ejus locum vicisque obtineat quidam musculus annularis. Ego vero, Mangete, etsi quod gravissimi quique Anatomici tandiu docuere, ac quod ipse sæpenumero & vidi, & contrectavi, non facile nullum esse, crediderim; tamen quando tu credere sic videris „ Accuratissimum -- & Egregium Anatomicum „ Amicum hunc tuum pronunciando; age videamus, num paulo melius in hac quam in ea quæ alias excussa est, de Aneurysmate Dissertatione, se gesserit.

## ANIMADVERSI O IX.

**P**incipio eos omnes qui Dissertationem hanc legent, suo illo *Polypo dociliores* supponit, dum Anatomicos qui & Bauhini ætate, & ab illa ad hanc usque nostram vixere, omnes præ se uno delicatissimos fuisse homines, diserte pronunciat, ut cum fœtorem fordesque intestinum ferre non potuerint, mirum esse non debeat „ si omnes, ut partis factique inspectioni „ non obligarentur, lubenter & protinus Bauhini subscripserint sententiæ. „ Quis tam docilis sit, ut hæc credat, cum posteriorum Anatomicorum in Crassis etiam Intestinis Inventæ neminem fugiant; imo quis adeo sit obliviosus, ut se ipsum refutare hunc Scriptorem, non advertat, quando paulo post, atque adeo in hac ipsa pagina „ Pavium, Hildanum, Falcomburgium, & „ alios „ Bauhini Valvulam non invenisse, & illam propterea negasse, memorat? Et hic, Mangete, ille Censor est qui eas quæ nusquam sunt, *contradictiones* aliis objecit, cum haud sentiat ipse, conciliari inter se non posse quæ nunc retulimus, & quod supra inculcaverat: Bauhinum in ea re „ cunctos Anatomicos assecclas habuisse. „ Sed liceat ipsi secum pugnare, modo alios ita non impugnet ut Eximios Viros ceu præcipientes, & leves traducat, velut hic supra cæteros omnes ipsum Bauhinum, quem super Ilei & Coli concursu, impune dixisse, ait, quod „ cumque sibi primo oberravit in mentem, leviter nimirum dicendo, quod ibidem magna legitimi generis valvula affideret. „ Quanto aliter Pavius, qui etsi eam quam ex Bauhini descriptione & delineatione animo præceperat Valvulam oculis cernere non posset; in quibus tamen Epistolis hoc ad Hildanum scribebat, in iisdem „ Magnum, & Celeberrimum „ Bauhinum vocabat, & rationem ipsius inveniendæ enixe optans atque postulans: quod non videret, non Bauhini, sed sui ipsis defectum existimabat.

275.  
De Intestini-  
norum  
Glandulis  
Solitariis.

276  
De Valvula Intestini-  
norum,  
Bauhini  
dicta.

300.

Advers.  
II. Anim.  
30. & seq.

301

301.

275.  
& seq.  
De Glandulis Duo-  
deni.

c. 9.

Apud  
Hildan.  
in Cent.  
Epist. 87.  
89.



De Iliacæ  
Passione.

Philon.  
Pharm. l.  
4. c. 24.  
Prax. Me-  
dic. l. 10.  
c. 2.

De cu-  
rand. hu-  
man. cor.  
Aff. l. 3.  
c. 27.

De loc.  
aff. l. 6.  
c. 2.  
Confil.  
l. 2. Obs.  
Med.  
Sect. 1.  
c. 4.  
l. 21. Obs.  
21. 22.

Ego vero etsi non omnia quæ scripsit pinxitque Bauhinus, defendo; facile tamen huic tanto Viro, & de re paucissimis tunc nota, atque adeo sibi nova scribenti condonandum esse, censeo, si omnia primo videre non potuit. Quod autem rei caput est, & quo nomine hic reprehenditur, quod Valvulam videlicet ad finem Ileï docuerit esse præfixam, in ea re Bauhinum, vel potius verum non tueri non possum: cui vide, quæso, quibus argumentis vis afferatur. „ In variis, inquit, „ iliacis, colicis, aliisque affectionibus & fæces „ remeant ex inferiori intestinali fistula in supe- „ riorē, -- & injecta ad rectum clismata -- us- „ que ad fauces ascendunt, & intrusa interdum „ suppositoria solidiora non minus superne ra- „ piuntur, & usque per vomitum rejiciuntur; ut „ ferunt per practicas observationes probatæ fidei „ scriptores. Cum autem restituta in consequens „ ægrotis horum variis sanitate, nullæ amplius „ retroeant materiæ ex colo in ileon, sed -- eandem „ recuperent, & teneant arctissimam ad ileon re- „ trocessionis resistentiam, ut de facto optimæ, „ & consuetæ in eisdem per intestina distributio- „ nes servantur; jam patet, nullam unquam fuis- „ se ad ileon illius generis valvulam, quam aut „ depingunt, aut describunt; prout dato -- stra- „ to hoc valvuloso transversaliter connexo, nec ex „ colo in ileon corpora præcipue solida remeare „ potuissent absque ejusdem laceratione, nec inde „ perfracta valvula, rursus -- introitum ex colo „ in ileon ut antea prohiberi. „ Hæc, quæ alii „ ut objici, sic & refelli posse, viderunt, longum „ quidem examen deposcerent; sed nos rem in pau- „ ca contrahemus. Et primum animadvertendum est, „ eorum qui vomere stercus creduntur, non dicam „ nullos cum Valesco de Taranta, sed cum Rive- „ rio rarissimos videri verum stercus, sive fæces ex „ Colo remeantes, evomere, plerosque autem mate- „ riam potius stercorei similem, corruptam nempe ac „ fœtidam, qualem in iis quibus Ileum est intra „ hernias arctissime compressum, atque adeo prorsus „ occlusum, supra occlusionis locum observare con- „ suevimus. Deinde illud est attendendum, eo- „ rum qui stercus vomunt, tam paucos; si cum iis „ qui intereunt, conferantur; servari, ut Mercuria- „ lis Municeps meus, „ deterrimum omnium senten- „ tia Ileï gradum esse, docuerit, in quo stercora „ evomuntur, ita ut neminem sit videre ex his „ servari qui stercora vomunt: „ quem quidem „ locum ideo produco, ut appareat quam rarum id „ visum sit doctissimo, & exercitatissimo Medico: „ non quod ignorem, multo verius Galenum scri- „ plisse: „ vix unquam eorum aliquem sanum eva- „ dere. „ Nam illud denique non est omitten- „ dum, observatum esse apud Ballonium: multa „ symptomata comitari illos solita esse qui a Vol- „ vulo liberati sunt; Sydenhamium autem attestari: „ hunc affectum „ præ omnibus aliis esse obnoxium „ recidivæ: „ quod cum aliorum, tum Foresti „ Observationes etiam indicant, de mulieribus illis „ duabus quæ sæpius intra tempus non ita longum „ fœdo hoc morbo correptæ, eodemque demum „ confectæ sunt. Hæc vero omnia eo pertinent, „ ut intelligatur, neque ita facile esse, ut post „ hunc morbum, „ optimæ, & consuetæ per inte- „ stina distributiones servantur, eademque recupe- „ retur, & teneatur arctissima ad ileon resisten- „ tia, ut nullæ amplius materiæ retroeant; „ neque in plerisque in quibus id contingere vide- „ retur, certum esse, materierum ex Colo in Ileon „ regressum præcessisse. Cæterum neque hæc „ urgeo, neque hic disputo, quot hallucinationes „ subesse interdum possint, cum injecta clysmata vo- „ mitu reddi existimantur, quando his omnibus mi- „ nus niti. Censor videtur „ corporum præcipue „ solidorum, regressum urgens; „ intrusa enim „ interdum suppositoria solidiora non „ minus su- „ perne rapi, & usque per vomitum rejici, ex „ probatæ fidei Scriptoribus, supra dixerat. „ Quos utinam nominasset, ut constare posset, non „ id modo num probatæ sint fidei, verum etiam

num ejusmodi ægrotantes perfecte convaluerint, „ qua crassitie, qua duritie suppositoria fuerint; „ cum subdita, qua, cum vomitu reddita sunt, & „ alia præterea de hoc genere hic minime omitten- „ da. Ego certe ex recentioribus Medicis qui cau- „ tiores scilicet esse solent, qui talia viderit exem- „ pla, quantum nunc memini, legi neminem. Sed „ & inter veteres, quorum bene multos magis cre- „ dulos fuisse, satis constat, duos fere produci, „ vidi, Jo. Matthæum de Gradibus, & Antonium „ Guainerium, quorum tamen neuter affuisse se, „ scribit, cum suppositoria vomitu redderentur. „ Quinimo Guainerius diserte confitetur, nisi id si- „ bi Magister suus enarrasset, „ vix fidem daturum „ fuisse; „ neque tamen memorat quid ægro illi „ postea eveniret, & verba facere videtur de sup- „ positorio „ quantitatem dactylorum nuclei non „ excedente, „ cum subditum est, & quod certe „ non nisi duobus post diebus vomitu rejectum „ fuit. Marcellus autem Donatus ut Mirabilis Hi- „ storici scriptor non semper cautissimus fuerit; „ priusquam tamen Jo. Matthæi de Grado ver- „ ba proferat; ipsa „ omnem fidem supera- „ re „ confitetur. Et revera suppositorium vali- „ dis filis quibus erat femori alligatum, quatuor „ disruptis, sursum raptum esse; suppositorium „ incontinenti quasi; „ suppositorium „ intra „ spatium temporis quo diceretur Pater noster „ cum Ave Maria, per intestina ascendisse ad sto- „ machum, & parum incurvatum vomitu fuisse „ eductum, „ novi ego qui non ita facile sint „ credituri. Sed ego ut crederem; non tamen inve- „ nio an suppositoria hæc solidiora fuerint, & cras- „ sa; illud tantum lego „ satis acuta, & longa „ fuisse. At fuerint & solida, & crassa; Highmo- „ rus tamen responderi etiam posse, credidit, in „ hoc casu Valvulam mucosam fuisse oblitam & Colo „ quasi agglutinatam, ut sæpius observasse dicit „ Spigelium; qui revera non id observavit, sed „ idem existimavit: a qua sane responsione non dis- „ sentit curatio tunc per juscula emollientia absolu- „ ta; qualia & aliis qui stercus vomuerant, saluta- „ ria fuisse, narrat Forestus. Quam responsio- „ nem ideo commemoravi, ut constaret, non omni- „ bus „ valvulæ lacerationem „ prorsus necessariam „ videri, iisque præsertim qui Valvulam quidem „ agnoscunt, sed certa tamen ratione dispositam; „ non enim omnes ejusdem generis Valvulam „ aut „ depingunt, aut describunt; „ sed ut ex dicen- „ dis intelligi poterit, multi sunt qui ejusmodi „ Valvulam ponunt, ut in his casibus cedere potius „ nonnunquam possit, quam abrumpi. Sed cede- „ re, inquit, facile non potest: qua in re proban- „ da auras diverberat; quis enim facile, dicat, „ cedere? Imo ita primum obstat, ut hinc Syde- „ nhamius eum interdum dolorem deducat qui tunc „ uni parti instar terebelli infigitur. „ Cedit igitur „ & raro, & sero, & magna multaque vi jam „ adhibita, vel impedimento aliquo ad tempus in- „ terjecto, ut rite occludi non possit; neque adeo „ necessario abrumpi debet, præsertim cum falsum „ sit: quæ Valvula non in fundo veri Cæci, sed in „ laterali pariete Coli posita est, „ contra ejus Val- „ vulæ faciem impetuose contenta omnia vibra- „ ri. „ At rumpetur aliquando. Dabo etiam, ut „ plurimum rumpi. Sed illud probandum est, in „ perpaucis iis qui sanantur, abruptam fuisse: eo- „ que probato, probandum etiam est, fieri nunquam „ posse ut rursus coalescat, quando Intestinatorum „ quidem, & præsertim Crassorum, vulnera coaluisse „ interdum, constat; & ne longior sim, hoc quo- „ que probato, probandum tamen restat, in rarissi- „ mis illis qui hic potissimum & urgentur, & a me „ attenduntur, casibus trajecti suppositorii, rarissi- „ mam quoque aliquam, eorumque subjectorum pe- „ culiarem structuram loco Valvulæ consuetæ, non „ fuisse.

In Traët.  
5. de Flux.  
c. 2.

l. 4. c. 3.

Corp. hu-  
man. Dis-  
quis. l. 1.  
p. 2. c. 5.  
De hum.  
Corp. fab.  
l. 8. c. 9.  
Obs. Med.  
l. 21. Sch.  
in Obs.  
21.

301.

Obs. Med.  
Sect. 1.  
c. 4.



## ANIMADVERSI O X.

301.

Nunc alias non rationes, sed *evidentia* (sic enim vocat) attendamus ad eandem Valvulam negandam. Anatomici, inquit, neque in numero, neque in figura & habitudine hujus Valvulae describenda conveniunt; ergo, nemo, sat bene eandem vidit. Sed ut omittam, pleraque harum diffensionum ex dicendis conciliari facile posse; cur, quaeso, hoc potius non intulit: ergo non omnes sat bene eandem viderunt? Nam si ex discordibus Partium descriptionibus, evidentiae fluere ad earundem denegandam, existentiamque, perpaucissima jam essent in tota Anatomie quae negare non deberemus. Et profecto neque Bartholinus, neque Blasius, neque Diemerbroeckius, neque alii qui istas ipsas Anatomicorum diffensiones commemorarunt, hanc propterea Valvulam negavere. Mittit ad ejus praesentiam ulterius, repudiandam, quod varii non infimae notae Pro-fessores eam prorsus negaverint. Sed ego hoc non mitto, imo iis quos nominat, illum quoque recentem Anatomicum addo quem Cl. Fantonus & memorat, & satis confutat; atque ex te quaero, Mangete, cur igitur haec Dissertatio: De Supposita hucusque Intestinatorum Valvula Ob-servatio Nova, inscribatur; si tot Anatomici hanc Valvulam non supposuerunt, sed negarunt? Quanquam, ut verum fatear, de tribus quos nominat, Pavio, Hildano, Falcomburgio, nescio quis eandem, prorsus negaverit. Nam Falcomburgium non vidi: Pavio, ut supra dictum est, cum rationem ejus inveniendae doceri se, cuperet, non prorsus negabat; Hildani autem locum mihi indicari pervelim in quo neget; nam certe in Annotatione ad Obs. 61. Cent. I. diserte admittit; in ea autem Epistola in qua dubitanti Pavio respondet, non admittit modo, sed & pluries, parvo cum negotio invenisse se, dicit.

Anatom.  
Dissert. 4.Centur.  
Epist. 88.

## ANIMADVERSI O XI.

Age nunc videamus, num meliorem Anatomicum quam disputatorem se praestet; jam enim missis rationibus ad totum veritatis factum depromendum, se confert. Principio docet, quo magis Ileum ad Colon appropinquat, eo densioribus fibris muscularibus investiri, idque facile animadverti per spatium quatuor aut quinque digitorum transversorum a Colo. Id autem ego in quatuor quae continenter disseui, cadaveribus non modo facile, sed ullo modo videre non potui, etiamsi ea de causa Ileum praeterea contra lumen attente inspexerim. Addit: intrat in, de ileum in colon ad angulum rectum, seu exacte ad ejus latus, illudque dexterum, quod ideo penetrat, & aperit. Hic vero errores sunt non ferendi. Ut enim mittam illum ingressum, ad angulum rectum, quem ingressum ego observare ita soleo, ut potius supra angulus sit obtusus, infra acutus; sic certe notum omnibus apertumque est, Ileum sinistrum Coli parietem, non dextrum subire, ut incuria quadam id excidisse homini, libens crederem, nisi & in proxima pagina, aperturam ilei in colon ad parietem lateralem dexterum, rursus poneret, & in ipsa Figura in eodem pariete dextero delinearet, ac denique in hujus Explicatione idem affirmaret. Pergit: *Introitus Ileii notabiliter contrahitur multo infra diametrum, quem (ne litterulam quidem mutò) per tractum suum longissimum totum aequaliter servaverat.* Quod attinet ad aequalem hanc totius Ileii diametrum, ne longius a postremo hoc tractu digitorum quatuor vel quinque recedam; in hoc ter quaesivi, & toties variam deprehendi; nam semel minorem comperi praecedente, semel evidenter majorem, semel denique parem. Quod vero attinet ad ipsum Ileii finem, num sit tanto angustior quanto hic indi-

De Ileii in  
Colon In-  
gressu.

catur, & infra pronunciatur, videbimus postea. Nunc enim praestat quod rei caput in tota hac Dissertatione statuitur, id diligenter attendere. Igitur in hoc ipso Ileii extremo, densus validusque musculus annularis esse dicitur, quem, duplex fibrarum species robustarum valde &c. componat. Ego vero qui saepius hanc Partem diligenter secui, fibras quidem carneas hic agnosco; peculiarem tamen istum Musculum non agnosco. Scilicet qua Ileum attingit Colon, non ibi cessat, sed propria substantia cum substantia Coli connexa, atque adeo connata intra Coli cavitatem producit, atque extat; ut omnes facile perspiciant qui Ileum hic secundum longitudinem usque ad finem, producta intra Colon sectione, dissecabunt; videbunt enim eam extantem intra Colon Ileii productionem ex propria utriusque intestini substantia, quae quo magis procedit, eo magis extenuatur, componi. Itaque fibrae carnae hic sunt quidem, sed utriusque intestini propriae, non autem superadditi cujusdam Musculi peculiare. Quae cum ita sint, intelligis, opinor, Mangete, quo abeat etiam ex hac parte, novum illud nuperrimum Auctoris inventum, peculiaris videlicet annuli musculosi, qui valvulae locum vicesque obtineat, eoque magis quod hunc ipsum anulum, a pluribus perspectum, jam esse, concedit. Sed, inquit, cum quidem anulum perspectum ab aliis esse, concedit; in propria autem sua functione, hoc est in sua actione, ne occlusiva, seu valvulari, hucusque ab Anatomicis non perpensum, esse, dicit. Nimirum igitur in ista contractione occlusiva totum hominis inventum consistit. Verum enimvero ne id quidem ipsius est. Nam primum Riolanus, circularem hanc valvulam, ita exitum facibus praebere, scripsit, ut vicissim remigraturas, clausa & contracta instar orbicularis sphincteris intrecipiat. Tulpius deinde, ille Tulpius cuius scripta aberrant a vero, dixit, hunc anulum animum instar orificii ventriculi urgente necessitate se se vel aperire, vel claudere. Et denique, ut Highmori verba praetermittam, hanc Valvulam, orbiculatam in modo, dum sphincteris, esse, tradentis; quis ignorat, Diemerbroeckium diserte docuisse: esse qui, judicent, illic nullam esse veram valvulam, sed circulum carnosum, intestino tenui crassum ingredienti circumjectum, idque instar musculi sphincteris contrahentem? Hoc erat igitur illud, novum & nuperrimum inventum, hucusque ab Anatomicis non perpensum! Atque utinam id ut novum non est, ita saltem verum foret. Sed ut aliquid tribuamus fibris carneis duorum intestinatorum in unum junctis; tantum tribuere tamen non possumus, ut totam actionem, occlusivam, seu valvularem, ab ipsarum contractionibus, unice dependere credamus; quando his contractionibus sublatis, ut in cadaveribus contingit, illa tamen occlusio ita viget, ut sive aqua, sive aer in Colon injiciatur, in Ileum transire non soleat. Colo etiam manibus compresso, ut vel olim Piccolhomini, Hildano, Spigelius, alique (nam in re nota plures addere nihil attinet) experti sunt. Neque enim huic experimento explicando naturalis annuli angustia satis est, etiamsi tanta esset quanta hic dicitur, scilicet ut minor digitus in ejus aream introduci vix possit; ea autem est, ut ego, manu alioqui non parva, in justae staturae viro, cum sanissimus esset, intersecto, pollicem sine ulla vi immittere potuerim; in aliis autem quatuor vel quinque cadaveribus in quibus id experiri libuit, & in his in parva muliere, pollicis apicem facillime indiderim.

302

Anthro-  
pogr. l. 2.  
c. 14.Obs. Med.  
l. 3. c. 21.Anatom.  
l. 1. c. 2.

302



## ANIMADVERSI O XII.

De Valvula Bauhini.

Anatom. quart. re- nov. l. 1. c. 10.

l. 1. c. 17.

302.

Anatom. l. 3. c. 3.

Corp. human. Disquis. l. 1. P. 2. c. 5. Anatom. l. 1. c. 8.

301.

De Intestinis.

locis cit.

Est ergo ibi omnino admittenda Valvula, præsertim cum ita occurrat manifesta, ut negatam esse, mirer, neque minus mirer, in tunica interna intestinali, ad annuli crepidinem, vi digitis trahendo, esse quæsitam, & tot atque adeo talibus verbis impugnata, ut, videri facta, dicatur, ut vetet transitum corporum ab ileo, in colon: quod etsi ita abnorme est; luce, tamen clarius observari, dicitur. Quænam igitur Valvula est? Res nempe ab iis omnibus qui Valvulam negarunt, maxime perspecta, & inculcata; sed non agnita. Quod quidem ex eo ipso Bartholini folio quod hic citatur, intelligi omnino debebat. Valvulam, inquit, non inveniunt, sed potius annulum, sive circulum, prominente limbo extantem. -- At circulus, iste præter valvulam nihil est. Sed Bauhinus, inquit, non sic descripsit. Inspiciant mihi ejus Theatrum Anatomicum secundo editum, & quo propterea standum est. Videbunt, hanc Valvulam ut, crassam, orbicularem, & circulem, non modo a Fabricio ab Aquapendente, ab Riolano, ab Highmore, a Bartholino, ab aliis, sed ab ipso etiam Bauhino esse propositam. At quanam, inquit, ratione annulus Valvulæ officio fungi potest? Jam dictum est supra, hunc annulum, idest hanc extremi Ilei productionem intra Coli cavitatem prominere: quod & in hac Dissertatione agnoscitur, atque adeo hujus prominentiæ, altitudo esse dicitur, transversum digiti ordinarii; quanquam ego in plerisque cadaveribus transversum pollicis, imo & aliquanto majorem invenerim. Cum igitur sic promineat, proclive est, intelligere, quomodo materia quæ aut a veri Cæci fundo sursum, ut par est, eat, aut forte etiam deorsum relabatur, dum vi præsertim qua abdomen ad deiciendum contrahitur, compulsa, aut proprio pondere retracta, in ejus productionis inferiorem, aut superiorem partem incurrit, eandem productionem, quæ nihil denique nisi molle intestinum est, reclinet, & claudat, ut Varolii verbis utar hujus Valvulæ Observatoris facile primi, qui propterea eandem Ilei operculum sane, apposite, & haud inconcinne, ut Riolanus, & Tulpus censuerunt, appellavit. Recteque etiam idem spectantes Highmorus, & Diemerbroeckius hanc Valvulam in structuræ modo, ususque ratione compararunt ille quidem, cum nassis ex viminibus textis, quæ facile ingressuros admittunt pisces, nullos vero egredi, permittunt; hic vero cum longis tubulis ex corio laxo confectis, qui a navium lateribus ita propendent, ut per eos, aqua defusa, per in naves incidens, facile effluat, sed a fluitibus extrinsecus in tubulos impingens, quia hi mox plicantur, non ingreditur. Hac ergo ratione Tulpii verba accipiendo, intelligemus, non reprehendendum ipsum fuisse quod hanc Valvulam dixerit, ante Ilei egressum pendere in, star cortinæ, vel veli alicujus laxioris. Nam Fabricius quoque ab Aquapendente optimus, si quis alius, harum rerum existimator, cum hanc Ilei productionem Valvulæ, sive ut ipse loquebatur, ostioli utrum præbere, agnovisset; id præstare docuit, quatenus, laxissima, & pendula, concidat; & ita foramen obturet. Eo autem facilius hoc præstat, quod, apertura ilei in colon, etsi immisso digito in annulum possit conformari, per se tamen, & naturaliter nequaquam patet in modum annuli; sed, ut nos in omnibus hucusque dissectis cadaveribus, sectione etiam in Colo a propria sede non dimoto instituta, observavimus, se habet instar, strigæ cujusdam transversæ, ut loquitur Highmorus, sive ut clarius tradidit Diemerbroeckius, instar recti foraminis ab uno ad alterum latus quasi cultello incisi, -- concidentibus utrisque aperturæ labiis; ut sic inspecta, constare ex

, duabus membranis sibi invicem oppositis, ut nonnulli docuerunt, videatur.

## ANIMADVERSI O XIII.

Accedunt duo Corpora a quibus & descriptam hanc Valvulæ concidentiam in rimæ fere horizontalis modum, & valvulam ipsam in sua sede servari, existimo; quapropter illa Valvula hujus Retinacula, sive Frena appellare consuevi. Hæc etsi ita sint conspicua, ut aperto, ex adverso Valvulæ, intestino Colo, statim sua magnitudine in oculos incurrant; eorum tamen descriptionem frustra adhuc apud Anatomicos perquisivi; quam propterea hic addam. Itaque oblongæ duæ quasi rugæ singulæ ab singulis descriptæ horizontalis rimæ extremis & ipsæ horizontales intra Colon assurgunt, ita magnæ ut qua Valvulam contingunt, ipsius æquent altitudinem; quæ deinceps, ut & crassities, eo magis decrescit, quo magis a Valvula receditur, ut novissime extenuatæ prorsus deficient, relicto inter utriusque extremum intervallo duorum fere digitorum. Sunt autem a cæteris quæ intra Colon, præsertim qua id contrahitur in cellulas, prominent, rugis omnino distinguendæ, non modo ob suam istam singularem magnitudinem, & constitutionem, verum etiam quia sublati Coli Ligamenti, atque adeo etiam manibus distrahendo, non facile magna ex parte oblitterantur. Quinimo non modo, extrinsecus inquirendo, præter vasa sanguifera, & adipem tenuis quidam fasciculus tendinosus secundum illarum ductum toti ipsarum tractui subesse visus est; sed intrinsecus inspicendo, singulas plerumque vidi qua rimæ extrema attingunt, evidenter bifurcas fieri, & sic in utrumque rimæ marginem produci; cultroque adhibito, comperi, fibras quibus intus constant, carneas secundum earum longitudinem positas, ad Valvulam protendi, & cum hujus fibris carneis commisceri. Ex quibus licet intelligere, etsi duæ hæ rugæ non sine intestinalium tunicarum replicatione fiunt, ut cæteræ; peculiaria tamen supra cæteras præstare posse, quatenus non modo ut magis extantes, magis fulcire, & promoveri ascendentes materias queunt, verum etiam ut hinc cum parietibus Coli, hinc cum Valvula ea qua docui, ratione commissæ, hanc in sede firmare sua, & diductam ab extrusis ex Ileo materiis rimam continuo possunt ad priorem angustiam reducere: quod eo mihi verisimilius videtur, quo sæpius expertus sum, his Frenis utrinque pariter tractis, rimam antea diductam constringi. Et hæc quidem corpora in cunctis cadaveribus observavi. Duas autem illas, exiles membranas, per quas Valvulam alligari Ileo, docuit Tulpus, necnon, ovalem nescio quem glomum, annulo subjacentem tanquam pulvinar, quem Dissertationis Auctor describit, etsi in octo continenter dissectis cadaveribus qua summa potui diligentia, oculis, digitis, cultro quæsi; tamen non ipsa modo, sed quidquam quod ipsorum simile esset, videre non potui. Quod autem glomus iste ovalis istic dicitur esse aptus, ad firmiter, propriisque limitibus superpositum sustinendum Ilei orificium; jam satis huic rei & per descripta duo Retinacula, & per Ilei substantiam cum substantia Coli ita ut diximus, connatam Natura consuluit; ut non ita facile, quemadmodum iste opinatur, per levem quamcunque duorum istorum intestinorum commotio, nem, & flexuras mutari possit. Itaque superfedere poterat labore huc trahendi illas quoque multiplices Coli intestini colligationes quæ jam a pluribus Anatomicis non modo satis explicatæ, sed cautius etiam descriptæ sunt. Quid enim est quod iste dicit: Colon immobiliter, sedibus quaquaversum suis detineri adeo ut nullum, limode a situ, & positione sua ne per latum, unguem dimoveri possit: -- situm ubique suum, constanter retinere: a quacunque positione sua, diffi-

Duo ejusdem Valvulæ Frena.

Obs. Med. l. 3. c. 21.

303.

302.



Anthro-  
pogr. l. 2.  
c. 14.

„difficillime commoveri; „ & quæ sunt ejusmo-  
di? Num ille etiam Coli postremus tractus quem  
Riolanus dixit, „ omni vinculo solutum errabun-  
„ do ductu vagari, „ num ille etiam ne per la-  
tum quidem unguem a situ dimoveri suo nullo  
modo potest? At nos certe haud raro vidimus vel  
ob solam flatuum copiam qua verum Cæcum, &  
pars Coli proxima distenta, interjecta intestina  
urgebant, ita illum omnem tractum ad sinistrum  
os ilium compulsam, ut continuati etiam Recti  
magna pars jam non recta esset, sed eisdem pelvis  
lateri sic appressa, ut quare clysmata, vexante  
flatuum copia, sæpe nequeant admitti, inde esset  
manifestum. Quid præterea est quod addit:  
„ Colon trajici, & assidere perenniter ante an-  
„ nulos musculorum abdominis, unde ad scrotum  
„ peritonæi elongationes procedunt; -- e conver-  
„ so ileon ab hisce locis longe distitum esse? „  
Suntne hæc ex suis illis „ plurimis inventa nova,  
„ & nuperrima? „ an potius errores qui ne Ti-  
roni quidem in re anatomica exciderent? At-  
tamen quasi re præclare absoluta, magnifice hic  
quoque concluditur: „ Hæc anatomica est con-  
„ cursus ilei descriptio: „ quæ quidem talis sit,  
necne, omnes facile cognoscent qui cum ipsa has  
nostras Animadversiones, & cum Anatome utras-  
que contulerint.

## ANIMADVERSI O XIV.

**P**ost hæc nimis longum esset, ac minime ne-  
cessarium quæ de usu descriptarum Partium  
addit, excutere, & indicare quot iterum falsa in-  
culcet, aut qualia & quomodo quæsitæ, ut loqui-  
tur, *eluat*, non trita modo, sed & falsa miscen-  
do, ut cum materias per tenuia intestina delaben-  
tes „ nullum cursibus suis reperire obstaculum „  
dicit, oblitus videlicet tot & rugarum, & flexio-  
num quæ in iis intestinis a Natura objiciuntur,  
ne „ tam libera celerque via „ sit, quam ipse pu-  
tat „ chimosæ substantiæ. „ Sed quoniam,  
ut ipse in calce Dissertationis constitetur „, infe-  
„ lix hic modus est suus, pro paululo inchoare,  
„ nec nisi ad exuberans desinere; „ hisce omni-  
bus non contentus, tribus aliis vix, ac ne vix  
quidem ad argumentum istud suum attinentibus se  
immiscet quæstionibus, ideoque & nos cogit quid  
in his, ac quomodo sentiat, considerare. In pri-  
ma ergo quæstione, „ si, inquit, de usibus inqui-  
„ rerer appendicis vermiformis, pendulæ a fundo  
„ cæci; pigeret communio, & vulgatum an-  
„ nuere. „ Cæterum „ magis genuinum, & pal-  
„ pabilem „ alias se allaturum, promittit. Pol-  
licitus etiam fuerat in quadam sua præliminari  
Exercitatione „ plurima hucusque invisæ „ circa  
insertionem tenuis intestini in crassum; hæc au-  
tem quo reciderint, jam vidimus. Si ex verbis  
quæ modo ipsi exciderunt, conjecturam facere li-  
cet; de isto *palpabili* usu meliora expectanda non  
videntur. Quæ ne sine causa dixisse credamur, sic  
habendum est: cum omnium Appendiculæ Vermi-  
formis qui adhuc allati sunt, usuum præcipui ad  
duo omnino capita contrahi possint: eam videli-  
cet factam esse vel ut quædam excipiat, vel ut  
quædam præbeat; nobis quidem non videri fa-  
ctam ut quidquam excipiat, non modo quia an-  
gusta est, & non facile dilatabilis, sed etiam, &  
præsertim quia interdum atque adeo nuper de qua-  
tuor hominibus qui dum viverent, nihil vitii in  
functionibus intestinorum ostenderant, in duobus  
quidem Appendiculæ orificium insigni quadam  
ruga in palpebræ superioris modum facta, & dis-  
posita ita obductum invenimus, ut nihil omnino  
sive flatus, sive eo delabentis materiæ subire Ap-  
pendiculam posset; in duobus autem reliquis cum  
Cæcum, & proxima Coli pars plurimo flatu di-  
stenta essent, nihil quidquam hujus in flaccida &  
contracta, ut solet, Appendicula observavimus.  
Non ignoro, imo fateor, in fœtu, atque adeo  
in adultis nonnunquam ea intra Appendiculam  
inveniri quæ ex Cæco necessario provenerint; sed

hoc contendo, si id Natura potissimum, & in  
adultis spectasset, non ita facile, ac sine noxa  
qualia modo attulimus, observari oportere. Quo  
etiam pertinere censeo Observationem Cl. Zam-  
beccarii, qui cum Appendiculæ portionem inje-  
cta ligatura catello abscidisset, tribus jam exactis  
mensibus & hanc solutam, & illius fundum om-  
nino apertum vidit, neque tamen ulla fæces in  
ventris caveam ex illo decidisse, comperit. Ve-  
rum hic longius ab nostra specie non abeamus.  
Relinquitur ergo, ut siquid Appendicula adultis  
hominibus præstat, non quidquam excipiendo,  
sed præbendo potius, præstare videatur: quod &  
ipsius positus quodammodo indicat, a nostro Cen-  
sore ignoratus. Non enim, ut ipse dicit, „ a  
„ fundo cæci pendula est: „ qua ratione exci-  
piendo facta videretur; sed ita est a superiore par-  
te ad Cæcum inclinata, ut aliquid in ipsum vi-  
deatur demittere. Quod, & alia præterea, ab  
eo qui genuinum hujus Particulæ usum tenere se,  
credat, minime ignoranda ut pateant; perpauca  
hic de eadem, & de eo cum quo communicat,  
intestino adjiciemus. Cæci igitur intestini magni-  
tudo ea est, ut non facile determinari possit,  
non tantum quia alia aliis natura obtrigit; sed et-  
iam quia non secus ac ventriculi, aliorumque in-  
testinorum amplitudo, pro varia nuper contentor-  
um copia producta, aut contracta reperitur.  
Quod ergo illud intestinum in hac Dissertatione  
dicitur „ ultra angulum coitus, „ hoc est infra  
Valvulam „ per 3. aut 4. digitos transversos in-  
„ ferius propendere „ etsi id in multis verum est;  
in aliis tamen & minus, & perexiguum invenit-  
tur. Quod autem ad locum attinet in quo Ap-  
pendicula intra ipsum hiat; de cadaveribus de-  
cem in quibus id diligentius observavimus, cum  
duo Appendiculæ orificium in fundo Cæci, imo  
in ipsius fundi centro haberent, octo reliqua non  
in fundo, sed in sinistro Cæci pariete, fundum  
inter & Valvulam, pleraque aliquanto antea,  
unum certe aliquanto posterius habuere. In nullo  
autem eorum cadaverum, aut certe in nullo (nam  
de his firmiter id memoriæ mandavi) sex eorum  
quæ novissime secui, Appendiculam aut a fundo  
Cæci, aut a Cæco pendulam vidi, sed contra  
superioribus ita connexam partibus, ut dum in  
sede sua esset, nihil subire ipsam nisi ascendendo,  
nihil ex ipsa egredi nisi descendendo posset. Ne-  
que solum oblique sursum porrectam vidi, sed in  
duobus ad perpendicularum elevatam, cum unius  
Colo secundum hujus longitudinem sine ulla cur-  
vatura sic satis arcte alligaretur, alterius autem  
ipsi Cæco ea in rerum constitutione quæ hic est  
minime prætermittenda. Nam in illa ipsa mulie-  
re cujus rarum Aneurysma in Adversariis II. me-  
moravi, ea Coli pars quæ in latere ventris dex-  
tro sedem habet, non in rectum, ut solet, tu-  
bum extendebatur, sed ita erat inflexa, ut Cæci  
intestini fundum, sursum conversum, eam alteram  
Coli partem attingeret quæ sub hepate transversim  
ducitur. Erant autem hæc omnia intus forisque  
sic constituta, ut neque mihi, neque cæteris qui  
aderant, dubitandum videretur, quin ita se res  
a primordiis habuissent; & nihil tamen noxæ  
quod percontando scire potuerimus, in harum  
Partium functionibus mulier, dum viveret, per-  
pessa erat. Quod ut est ab illis qui earundem usus  
genuinos velint cognoscere, attendendum; ita ab  
iis ipsis sciendum est, Appendiculam tamen Ver-  
miformem, quæ si proximæ, ut solet, Coli par-  
ti connexa fuisset, deorsum pendula hic fuisset,  
superiori hic Cæco recta secundum totam sui lon-  
gitudinem fuisse alligatam, ut in tanta rerum in-  
versione, ejus unius consuetus situs non inverte-  
retur. Cæterum Appendicula sic, ut diximus,  
colligari atque suspendi per pingues membranas  
solet, quas esse portiones non Mesocoli tantum,  
sed etiam Mesaræi, quod postquam ultimum  
Ileum fulserat, in contiguam quoque Coli par-  
tem extendebatur, interdum notavi. Sed aliæ  
etiam sunt Appendiculæ connexiones iis qui illius  
usum

De eadem  
Appendi-  
cula, &  
Cæco.

304

303.

304.  
De Usu  
Appendi-  
culæ Ver-  
miformis.

Animad.  
39.



Ligamen-  
ta, ut vo-  
cant, Co-  
li, & eo-  
rum usus,  
ac termi-  
ni.

Anatom.  
of. hum.  
Bodies.

Anthro-  
pogr. l. 2.  
c. 14.  
Anatom.  
quart. re-  
nov. l. 1.  
c. 10.  
Anatom.  
Diffr. 4.

Ligamen-  
tum Coli  
Tertium,  
sive Late-  
rale.

usum inquirunt, magis fortasse attendendæ: quæ ut penitus intelligantur, operæ pretium est rem aliquanto altius repetere. Igitur fasciolæ duæ quarum alteram antèrius, alteram posterius Ligamentum Coli vocamus, non sunt illæ quidem vera Ligamenta, sed fasciculi sunt carnearum fibrarum qui cum ab illis usque carneis fibris propagentur quæ pariter secundum longitudinem dispositæ extrinsecus Rectum intestinum obducunt, suis contractionibus opitulari posse videntur ad recrementa alvi ex Coli cellulis Rectum versus compellenda, ut probe a Cowpero etiam indicatum est: quod fortasse diu ante ipsum Eustachius noverat, qui hæc omnia in Tabula tibi II. Fig. 3. 5. & 6. delineavit. Duos igitur istos fasciculos in Recto quidem intestino principium habere, satis constat; finem vero ubi habeant, non æque omnibus est manifestum. Habent autem non in Colo, non in Cæco, sed in ipsa Appendicula Vermiformi ita ut quando hæc non a Cæci fundo, sed a pariete hujus sinistro originem habet, quod quidem multo crebrius a me visum esse, supra docui, ambo illi fasciculi, ut in octo cadaveribus observavi, sic ad Appendiculæ initium inclinentur, & tendant, ut reliqua inferior Cæci pars, his Ligamentis prorsus carens, a dextris turgeat, atque propendeat. Hunc horum Ligamentorum terminum cum jam observassem, animadverti, Riolanum certe ante me vidisse, cum Appendiculam ex coalitu horum duorum Ligamentorum contextam esse, dicat, & esse, „veluti nodosum coitum, „eorundem, „& ex parte etiam Bartholinum, ut qui antèrius Ligamentum „a cæco (id est ab „Appendicula Vermiformi) ortum, ad rectum „terminari, „scribit. Sed eorum neuter, neque alius præterea; quod legerim; id quod addam, observavit. Nam cum apud Cl. Fantonum legissem: præter illa duo Ligamenta interjectum his Mesocolon, & ipsum secundum Coli longitudinem alligatum, huic „tertii vinculi officium „quodammodo præstare, „sectionem aggressus, comperi, non tam ipsum Mesocolon, quam obductum hujus pinguedine, & propterea hæcenus ignotum, Laterale tertium Ligamentum revera adesse, quod Colo tum id officii, tum quod supra diximus, præstaret. Scilicet fasciolam vidi, nisi quod angustior erat, prioribus similem, pariter ex fibris carneis parallelis, & secundum Coli longitudinem dispositis compactam, pariterque ex iis Recti fibris productam: quam (ne quis forte suspicetur, nihil aliud nisi connexi Mesocoli reliquias esse) frustra in tenuibus intestinis qua Mesaræo connectuntur, perquisivi. Quod quoniam Ligamentum illud idem esse, non dubito quod Cl. Valsalvam in Academia Bononiensi jam proposuisse, inaudivi; idcirco ejus ulteriorem descriptionem Experientissimo Inventori relinquam, & illud unice quod a me de superiore ejus termino observatum est, addam. Nimirum hoc Ligamentum ubi ad eum pervenit locum quo se Colo Ileon immittit, utriusque confinia a tergo complexum, ad Appendiculæ principium inter duo reliqua Ligamenta, quemadmodum pluries observavi, descendit. Qua digitis tracta cum Ligamenta trahantur; credibile est, ipsorum vicissim contractionibus Appendiculam succuti, & sic facilius quidquid illud est quod ab eadem in Cæcum demitti verisimile est, exprimi. Nam quid illud demum sit, eo difficilius, ac longius esset statuere, quo magis constat, non eadem ratione constitutam Appendiculam in cunctis animalibus inveniri, atque adeo non modo in nonnullis brutorum speciebus, sed & aliquando in hominibus desiderari: quod a pluribus scriptum, & a Cl. etiam Santorino, dum nos Venetiis essemus, in repente mortuo Sartore observatum esse, meminimus.

## ANIMADVERSIO XV.

Quapropter ea re nunc quidem seposita, quid in reliquis duabus Quæstionibus Censor loquatur, videamus. Altera est de „ossium „pubis, sacri, & coxendicis in partu dilatatione. „Hanc igitur „omni quidem jure declarasse Antiquos, perperam autem negavisse Modernos, „pronunciat. Hic primum quæro, Guilielmus Harveus, Isbrandus Diemerbroeckius, Daniel Ludovici, alique ejuscemodi *Antiqui* fuerint, an *Moderni*? Hi tamen id non modo non negarunt, sed & propriis observationibus confirmarunt. Deinde quæro, Andreas Laurentius, Joannes Valverduus, Archangelus Piccolhominus, Ludovicus Mercatus, alique tales *Moderni* fuerint, an *Antiqui*? Hi tamen ossa pubis in partu diduci, negabant, primusque adeo multis propriis observationibus sententiam confirmavit suam.

Quid ergo dicendum est? Primum quidem neutra sententia aut Veterum, aut Recentiorum propria censenda est, cum in hac re, ut verissime Blasius affirmat, „varie omni ævo Anatomici senserint. „Deinde non ob unam diductorum ossium observationem, qua & nos alioqui non caremus, continuo, absoluteque reprehendendi ita sunt qui negarunt. Media potius via, qua cautissimi Viri Spigelius, Sennertus, Veslingius, alique Veterum, & Walæus, Bartholinus, Blasius, Verheyenius, ac versatissimus in arte obstetricandi Deventrius, alique Recentiorum incessere, tenenda est sic, ut alias, & præsertim in partu difficiliore, id contingere, alias vero non idem prorsus accidere, existimemus. Cæterum cum id evenit, „sensim per cursum gravidationis disponi, non solo maturi partus momento „produci, „alii, & nominatim Pinæus, jam crediderant; ut hinc appareat quid existimandum sit tum de ejus qui scribit, tum de quinquaginta eorum Auditorum eruditione, quorum „plaudibus cunctorum votis „id se judicasse, homo minime magnificus narrat. Restaret ultima Quæstio de vesiculis videlicet uterinæ cervicis, sintne similes a me descriptis, ac delineatis, & sintne „a prima genesi positæ. „Sed quoniam hac de re fusius loquitur in suis illis Animadversionibus quas in me, non jam ut *amicissimum*, sed magnificum, si Diis placet, hominem, & quæ sunt aliæ ipsius ineptiæ, te, Mange, edente, conscripsit; idcirco cum eo pervenire, hunc quoque locum examinabo.

## ANIMADVERSIO XVI.

Nunc ut in antecessum intelligere omnes queant, decuisse hunc hominem magis in Figuris propriis emendandis, quam in alienis carpendis desudare, hanc Dissertationi adjecimus ejus Figuram, hujusque Explicationem inspiciamus. Et primum Ileon „horizontaliter ad Colon excurrere, „rursus nego. Deinde „intimas „ejusdem plicas, quæ hic aliquantulum apparere „dicuntur, vel magis quam opus sit, apparere „affirmo; nam hic aliquando nullas, sæpius fere nullas vidimus, certe ita confertas neque ego, neque Glissonius videre consuevimus. Dicit hic aliquis: at in eo cadavere ex quo hæc est Figura deformata, sic esse potuerunt. Fateor; sed hujus sibi excusationis effugium Censor ademit in iis quas in Figuras nostras scripsit, Animadversionibus: quod cum in ipsis Lector cognoscet, tum ne id sæpius sit a nobis inculcandum, satis sit hic semel indicasse. Denotatorem vero istum Ileum „muscularem apparatus „non modo rursus nego, sed insuper addo, discretos illos crassosque quos pingit, circellos per Ileum superficiem non tantum non apparere, sed eam inspectantibus, longe magis fibras longitudinales, quam annulares esse conspicuas. Sed hæc levius ferenda sunt; illa, ut supra etiam innuimus, graviora,

304  
De Ossium  
Pelvis di-  
ductione  
in Partu.

Hist. A-  
nat. l. 8.  
qu. 33.

Com-  
ment. in  
Vesl. c. 2.

V. apud  
Laurent.  
loc. cit. &  
Pinæum  
ipsum de  
Virgin.  
not. & c.  
l. 2. c. 5.

305.  
De Ingres-  
su Ileum in  
Colon.



De Valvula Bauhini.

ad l. 8. Spiegel. Tab. 5. Fig. 8.

302

Ia Expl. Fig. 2. Tab. 6. Vid. & Heist. in Præfat. Compend. Anatom.

ra, quod, introitus Ilei in Coli parietem dextrum esse, & pictura, & verbis tradatur, quem omnibus luce meridiana clarius sit esse in sinistrum: & quod ille idem introitus sic effingatur, ut quicumque verum viderit, ab hoc alienissimum esse, vel primo aspectu cognoscat, ac nullam fere aliam adhuc ab Anatomicis exhibitam ejus esse Figuram quæ huic non sit jure ac merito anteposenda. Nam ut mittam antiquam illam Casserii Figuram, ab Riolano laudatam, quæ diffusam, explicatamque hanc Ilei intra Colon productionem, hoc est Valvulam, egregie repræsentat, & recentiores tantum Figuras, atque adeo minus a Censore ignorandas, cum hac ejus delineatione conferam; ex illis ipsis duabus Tulpii Figuris quas supra, a vero aberrare, dixit, minor certe extantem intra Colon Ilei productionem longe verius exhibet quam ista sua. Idem quoque longe verius exhibet Figura Verheyenii quæ a te, Mangete, in Tab. LVI. num. 7. producta est. In eo, fateor, Verheyenius deficit, quod non monet, illam productionem per se, & secundum naturam non sic explicatam atque hiantem in annuli modum inveniri; sed Censor quoque in hoc peccat, eoque gravius peccat, quod nulla id ratione emendat, cum Verheyenius quidem in altera Figura quæ tibi est Tabula LVIII. 8. illam eandem productionem, non arte diductam, sed in horizontalem rimam sic satis concidentem fere ut solet inveniri, repræsentet: quod & ante ipsum Kerckringius fecerat in eo iconismo qui in Tab. LIX. num. 6. a te proponitur, & Bidlous in suæ Tab. XXXIX. Fig. 5. Neque a Verheyenio in eadem Figura omittitur (quod & Bidlous ex parte fecit) adumbratio aliqua earum quas supra descripsi, rugarum; in quibus etsi tantum desideretur, ut ego postquam jam sæpius illas in cadaveribus observaveram, imo hic descriperam, vix denique, silente de ipsis Auctore, in hac ejus Figura animadverterim, neque minus tum hæc, tum alia in ceteris quas hic memoravi, Figuris desiderantur; omnes tamen aliquas veri ideas spectantibus afferunt; ista autem Censoris propemodum nullam. Nam præter omnia quæ hæcenus in ipsa notavi, neque ista vero respondet, angustia ilei. Et pellicea ista productio -- digitis tracta, -- glomusque, iste quem neque in cadaveribus vidisse, neque in Figura hac intelligere me, fateor, rem magis confundunt, non illustrant; ut ea demum quæ supra monui de Cæci longitudine non semper tanta, de Appendicula Vermiformi longe sæpius aliunde orta, & cætera de hoc genere prætermittam.

## ANIMADVERSIO XVII.

Multa quæ in ista Dissertatione fuerunt necessario notanda, brevior me esse cogunt in his Capitibus duobus proximis quæ tu ipse, Mangete, addidisti. Perpaucis ergo, quæro primum, quid causæ fuerit quare cum in multis eorum quæ in primo Capite scribis, ita Verheyenium sequaris, ut sæpe etiam ejus verba non mutes: quare, inquam, in certis quibusdam rebus in quibus sane recedendum ab eo non erat, recedere volueris. Nam cum ipse non venas modo, sed etiam arterias mesentericas crebro inter se communicare, & verbis, & iconismo docuerit, qui tibi est in LVIII. Tabula 16. quo quidem iconismo elegantiores vidi, sed ad mesenterica hominis vasa vere demonstranda aptiores non vidi; tu id quidem de venis doces; de arteriis autem retices, quasi vero hæc per humanum mesenterium inter se minime communicarent. Sed hoc levius est; illud majoris momenti, quod cum ipse, addita etiam observatione, & ratione censeat, eadem vasa esse in Mesenterio Lymphatica, & Lactea; tu diversa vasa esse, non dubites, hac una, si bene assequor, fretus ratione, quod cum Lacteis, nihil arteriæ habeant commercii, hæ-

bituræ, si Lactea eadem essent atque Lymphatica. Verum enimvero istam tibi dubitationem evellere ex animo debebat Cowperus, qui mercurium in mesaraicas arterias injectum cito vidit in vasa Lactea transiisse. Sed tu in eo ipso Virum alioqui accuratissimum, hallucinatum esse, non dubitas, quod intestinorum vasa lymphatica a lacteis non satis distinxerit. Quod etsi de tanto Anatomico minus est credibile; ego tamen hic tibi gratificabor, & quæ in vasa tunc mercurius tranliverit, dubium relinquam. Sed tu vicissim id mihi edissere, quæ factum sit, ut quando in Mesenterio alia esse vasa Lactea, alia Lymphatica, non dubitas; ab nemine tamen; quod adhuc legerim; in una eademque Mesenterii parte & Lactea, & Lymphatica simul, eodemque tempore conspecta sint; cum eodem quidem tempore, sed in diversis Mesenterii partibus, utraque conspiciantur ita similia inter se, ut colore contenti humoris dumtaxat differant. Et ipse quidem cum vivum canem ad quoddam habendum circa respirationem experimentum, dissecares, id imprimis clarissime vidi. Cum enim cibus ex ventriculo in prima quidem tenuia intestina descendisset, ileon adhuc vacuum esset; pulcherrima ex illis Lactea vasa, at nulla Lymphatica, ex ileo autem æque pulchra Lymphatica, at nulla Lactea, emergebant, ac per respondentes quæque Mesenterii partes reptabant. Illud quoque in eodem cane adnotavi, quod Lacteorum illorum primum, maximeque conspicuum statim infra pylorum e duodeni principio veniebat. An vero ut ex primo intestino, ita etiam ex ultimis, nempe Crassis, vasa Lactea proveniant, hoc est, ut nos quidem intelligimus, an Crassorum saltem aliqua Lymphatica radículas habeant sic in ipsorum interiore tunica hiantes, ut Lymphatica Tenuium; recte quidem in ea re a Verheyenio dissens; qui dum minus id verisimile credit, videtur ignorare, Needhamium ex Recto canum intestino vasculum non limido humore, sed chylo turgidum, atque adeo albissimum, ad cisternam contendens sæpenumero vidisse. Quo tu exemplo excitatus, quærere profecto in canibus poteris, eo magis quia in ipsis ligamenta quidem, & cellulæ Coli defunt, ipsum vero Colon verbo, non re prorsus deficit, imo ne verbo quidem, si judicium rationesque Blasii sequamur. Sed adversus Verheyenii sententiam nonnihil etiam facere possunt observationes clysmatum vel nunquam redditum, vel longo tempore nutrientium, quo in genere maxime admiranda illa est quam cautiissimus Observator, nobisque, dum viveret, amicissimus Ramazzinus & sæpe mihi narravit, & hortante me, suis demum Constitutionibus Epidemicis interjecit. Porro in eo etiam lapsus est Verheyenius, quod cum in homine vasa Lactea nunquam satis, Ductum autem Thoracicum, & multo magis chyli Receptaculum nunquam vidisset, illi sibi usitatissimo, sed fallacissimo sæpe argumento: *par* in brutis, & homine eorum, necessitas apparet; ergo quin in homine æque ac in brutis existant, non est dubium; illi, inquam, argumento tantum tribuerit, ut minime advertens quod alii, & nominatim Peyerus, scripserant: pisces, & aves multas lacteis careant, neque nos plerasque istiusmodi rerum causas satis intelligere; de cisternæ chyli, ejusque notabilis quidem cavitatis, existentia in homine ne nequaquam dubitaverit. Et tamen, ut tu recte ex Cowpero doces, quanquam Lumbares illæ Glandulæ Bartholini (quas ego sæpe tribus plures, imo etiam multo plures inveni) Receptaculi vices non gerant; non tamen in homine ejusmodi cisterna est, qualem Verheyenius animo videtur præcepisse, sed tale est Receptaculum, quale vel Cowperus, vel Henningerus proposuit. Ex hoc enim Cl. Viro, hac in parte, & in subjecto quidem humano quod curiosi Lectoris oculis subiceretur, haberemus, etiam si, Cowperus suppetias non venisset, quinimo sunt quæ-

Quibus ex Intestinis Vasa Lactea oriuntur.

I. 1. tr. 2. c. 13.

Disquis. de form. Fœt. Vid. Heister. confirm. in quo Eph. N. C. Cent. 6. Obs. 26. Anat. Animal. P. 1. c. 6.

A. 1691. num. 22.

I. 1. tr. 2. c. 13.

Exercit. II. de Gland. Intest.

308.

Append. ad Eph. N. C. Cent. III. & IV.

I. 1. tr. 2. c. 12.

306.

Utrum in Mesenterio Vasa Lymphatica, & Lactea eadem sint.

307



quædam in descriptione, & Figura Henningeri quæ frustra in iis quæ tu ex Cowpero unice producis, perquirentur. In duas autem Tabulas huic, & sequenti Capiti interjectas multa quidem notanda essent, nisi ea possent ex superioribus Animadversionibus facile colligi. Satis ergo sit ea de re Lectores monuisse, & præterea addere, ne omnes earum Tabularum Explicationes ita prorsus ab earum Auctoribus scriptas credant quemadmodum a te exhibentur. Nam ut in Figuris Verheyenii litteras quasdam omittis, ex. gr. in Tabulæ LVIII. 8. litteras ff; sic in Explicationibus 6. & 7. verba, ut libet, & immutas, & addis. Ad Peyerii Figuram quæ Tabulæ LIX. est 2, explicationem Plexus B prætermittis. In Explicatione autem Figuræ 6. quæ Kerckringii est, cum quædam, ut soles, verba interjicias, non animadvertis, inter id quod ille scripserat: „valvulas conniventes cum cellulis proponens: „& id quod tu exhibes: „Valvulas Coli Conniventes, cum Cellulis per eas efformatis, proponit: „non, inquam, animadvertis, tantum inter hæc discriminis intercedere, ut qui eam Auctoris Observationem cui ista est subjuncta Figura, imo qui istius ipsius quam tu affers, Explicationis eam partem quæ ad litteras F. F. F. pertinet, legerint, Kerckringium sibi non constare, sint credituri, ut qui modo ajat, „Coli „Cellulas per Valvulas conniventes, „modo vero dicat, easdem „per externum ligamentum „efformari. Sed & Figurarum Cowperi Explicationes quas te ex Actis Eruditorum Lipsiensibus sumplisse, video, quicumque cum eorum Diligentissimorum sane Collectorum verbis contendunt, intelligent facile, te quædam mutasse, nonnulla omisisse. Idem quoque mirabuntur, a te illam Cowperi Figuram esse prætermisissam quæ allatas antecedit, quæ videlicet „Receptaculum chyli in situ naturali cum partibus „adjacentibus relictum „demonstrat; ego vero minus miror, cum in tua priore Tabula, qua „de Mesenterio agere „profiteris, vel Mesocoli ipsius iconismum videam prætermitti.

## ANIMADVERSIO XVIII.

Sed & in iis quæ in proximo Capite ex Valisnerio nostro vertis, te paulo magis diligentem fuisse, decebat. Non enim inquit Vir Clarissimus, se ante officia glandularum primi in Struthiocamelo ventriculi membranulam observasse, „quæ illa officia ita clauderet, ac cooperiret, ut liberum ac continuum fluxum succi in glandulis contenti -- permitteret, „sed ut „earum succi reditum in ipsas impediret. „Neque, ut alia modo prætermittam; idem ambigue dixit, „in multis piscibus adnotari canalem „biliferum ad ventriculi cavum transmissum, „sed „unum canalem biliferum. „Cæterum dixit ille quidem; humorem ex memoratis modo glandulis exstillantem „prorsus esse insipidum; „tu vero quomodo id concilies cum subacido illo „tuo fermento cum particulis sulphureis volatilibus, „unito, etiam quantum tibi libet, immutato, „non satis dicis. Præterea etsi libens fateor, multa, & valida a Doctissimo hoc Viro pro fermenti vi dissolvente adversus ventriculi exterentem, seu triturantem motum producta esse argumenta; decussisset tamen, te cum multum, & jure quidem meritoque his tribuisses, aliquid vicissim eorum quæ e contrario dici possent, considerationi tribuere. Nam (quod Viro, si quis alius, veri studiosissimo, cuique meus erga ipsum perspectus est animus, non modo non ægre ferente, sed etiam sinente, non quidquam definienti, sed exempli adducendi causa hic licet memorare) si avium ventriculus musculis ita firmis, & lacertosis instructus est, ut eosdem in gallo indico Borellus non dubitaverit cum potentia librarum 1350. comparare, atque adeo si in Stru-

thiocamelo ii tam fortes, ac densi sunt, ut „aliquibus in locis tres circiter uncias crassitudine „sua æquent; „quomodo eosdem datos esse, judicabimus ad „motum leniter compressivum commiscendis ciborum particulis, iisque ad invicem allidendis „dumtaxat idoneum, cui quidem motui non multa fibrarum strata sufficerent; ad motum autem iisdem valide exterendis aptum datos esse, non judicabimus, præsertim cum aliquid in avibus agnoscamus necesse sit quod actionem suppleat deficientis in ipsis masticationis? Atenim in Struthiocameli ventriculo clavus ita inventus est transversim infixus, „ut impossibile esset; ut ejus parietes satis ad invicem accederent, ut vi sua compressiva corpora dura inibi contenta frangerent; „quæ tamen inerant „corrofa & consumpta. „Ego quidem Viri, cujus fides mihi inprimis est spectatissima, magis credam verbis, quam adjectæ Figuræ, quæ sic satis videtur ostendere, si non in parte ulteriore, at saltem in priore eos parietes ad se invicem accedere potuisse; facile tamen fieri potuit, ut interjectum illud *magnum vacuum* dura ipsa corpora complerent, & sic actioni se contrahentium parietum satis subjicerentur. Atque utinam Peyerus paulo fusius scripsisset quid ipse observaverit cum „in ventriculis vaccinis vidit aliquando „hærentes ac infixas casu clavorum particulas, „aculasque plurimas ventrium motu fere consumptas, atque detritas. „Sed quando id ipse non fecit, prætermittendum non est Thomæ Corneli experimentum, qui cum „gallo Calicutano „complura ærea, atque argentea numismata in „canalis formam convoluta ingessisset, ea post „decem dies in ejusdem ventriculo inventa esse, „dicit, singula duodena fere ponderis parte diminuta: fuisse autem exteriorem, seu convexam illorum numismatum superficiem insignite attritam, at interiorem tamen; seu concavam „omnino integram permanisse. Unde, inquit, „palam est, istiusmodi corpora in Alitum ventriculis non liquefcere, aut dissolvi; sed collisu „potius exteri, atque comminui. „Porro Auctor Epistolæ, Cl. Pitcarnii Opusculis subjunctæ monet, „in ventriculo etiam humano ejusmodi „deprehensam fuisse in unius nummi latere concavæ abrasionem, cum lateri concavo nihil detritum appareret. „Harum te, Mangete, observationum vim fortasse credes posse declinare, si dicas: ut lacertæ illæ e viperarum ventriculo eductæ, ea tantum parte quæ „proxime hujus fundi dum contingebat, erant etosæ, „sic illis etiam in nummis evenisse, ut interiore superficie qua fundum videlicet ventriculi contingere non poterant, minime erodi potuerint; quasi vero alterum quod continuo subjicis, Cl. Vercelloni experimentum *multoties* repetitum tibi istam responsionem de manibus non extorqueret, Vicissim namque cum ipso admittis, ea ingestorum parte quæ canini ventriculi parietibus inhærebat, omnino intacta, istam quæ in illius centro, sive medio erat, eodem esse tempore colliquefactam. Neque vero adductam ex Ingeniosissimo Pitcarnio difficultatem satis dissolvis, dum „non omnes „succos in omnia corpora ipsis objecta eadem vi „agere, „respondes, & exempla profers aut eorum humorum qui „solidissima etiam metalla „dissolvere possunt, mollioribus corporibus intactis, „aut fermenti pistorii „manus eorum qui pastam subigunt, „non affligentis; aut multi ferrum prompte satis consumentis, sed „pedes, ac totum corpus ad usque caput immersum vel minime corruptentis. „Non enim id potissimum quærit Pitcarnius, cur „liquidum „ventriculi, solvens, coquensque cibos, „non etiam coqueret, solveretque ea quæ non sunt „solidiora cibus illis; „sed addit „& quæ si „ex simili animali alio eximantur, ventriculoque „ingerantur, statim coquantur in eo „id est cur succus ventriculi ex. gr. canis ingestum alterius cujuscunque canis ventriculum statim coquens, illius

Spicil. Anatom. Obs. 39.

A. 1699. M. Febr.

309

319.

320.

317.

Num Ventriculus ingesta succo dissolvente, an motu potius exterente conficiat.

De Motu Animal. P. 2. Prop. 121.

320  
321

321.

Merycol.

Progy-nasim. 6.

323.

318.

323

317.



illius ipsius in quo est; canis ventriculum nunquam solveret; hoc vero est quod potissimum quaerit; urgetque Pitcairius. Sed hæc alii viderint. Nobis enim qui multa admodum super Ventriculo; Intestinis; Viisque Chyli adnotavimus; non modo est ad ulteriora pergendum; sed ut eo breviores iam simus; videndum est, quo hactenus fuimus prolixiores.

## ANIMADVERSI O XIX.

**E**T commodum accidit, ut in ea quæ de Pancreate vel ex Graafio exhibes, vel ex tuo jam in Bibliotheca Anatomica in eadem edito Argumento hic rursus adducis, perpauca adnotare satis sit. Quod igitur attinet ad bilem intra Ductum Pancreaticum interdum deprehensam; quod alioqui aut ea qua a Graafio ratione, aut alia non absimili est explicandum; & nos meminimus, dum herinaceum dissecavimus, intra eum ductum bilem vidisse, aut certe humorem ex viridi flavescens. Quod autem spectat ad Pancreatici Succii saporem, recte illud quidem tu admones: eum a pluribus Anatomicis minime acidum inventum esse, quod & nos non legendo modo, sed & Spectatissimos Viros qui id in pluribus canibus experti erant, alloquendo, comperimus. Cæterum an, totum serum, totusque adeo, ut tu affirmas, sanguis particulas acidas in se contineat, aliis discutiendum relinquod. Illud autem Lectores moneo, cum in Tabula LX. in Graafii Figuris nonnulla omissa, tum vero in Graafii, atque Bidloi, ejusdem Tabulae Explicationibus plura, ut in cæteris, verba addita, vel mutata fuisse. Perpaucis hic quidem etiam de Liene adnotabimus, præsertim cum tu ne unum quidem verbum hic addas ad ea quæ vel Argumenti, vel Adnotationum loco in Bibliotheca Anatomica jam edideras. Quod ergo attinet ad illa quæ in tertia Adnotatione ex Kerckringio scribis; nobis quidem contigit, ut semel in homine, bis in canibus plures Lienes observaremus, nunquam, ut nullum; quamvis id semper optaverimus, quo videlicet simul animadvertere possemus, quam ejusmodi animalia usi essent valitudine. Quinimo cum eo tempore quo eramus Bononiæ, in Concionatore quodam, itenque in Virgine post longas gravesque agrotationes mortuis, Lien tam parva inventus esset magnitudine, ut in hac castaneam, in illo nummum argenteum majorem vix æquaret; nihil inde tamen colligere licuit propterea quia nonnulla etiam alia viscera in utroque vitiosa erant. Illud vero a Cl. Valsalva accepimus, quod in eo canem quem sine Liene a se inventum esse docuit, nihil vitii est, dum viveret, animadvertum. Huc pertinet Cl. Littrii observatio de homine sexagenario, & ex casu quidem mortuo, cujus Lien omnino erat petrificatus. Non vacat eorum omnium historias inquirere quos sine Liene inventos esse, apud Schenckium indicatur; quæ tamen ab ipso afferuntur, celebris videlicet illa Ortelii, non satis certam existimo, cum quod Malpighius in eodem viro de hepate, idem ego de Liene etiam suspicer, sub illa fortasse carnosa substantiæ qua intestina ambiebantur, larva latere potuisse. Cæterum quod attinet ad illud Experimentum a quo istius adscribendæ Adnotationis occasionem habuisti; quæ in suo cane observavit Malpighius, eadem in aliis quibus pariter splenica vasa obligata, aut exsectus etiam Splen fuerat, a plerisque observata esse, scio, imprimisque a Cl. Brunhero (quæ quidem, atque alia præterea nonnulla ingeniose, & ex ipsa Anatome explicata esse, video in elaboratis Cl. Boerhaavii Institutionibus) ut mirer fuisse qui dicerent, ejusmodi canes neque cibum appetere, neque dormire. Nonnulli etiam affirmaverunt, canes Liene exsecto infœcundas fieri, cum tamen quam ego ante hos decem annos cum Experimentissimo Vallisnerio hic secui, ea fecundissima fuerit. Quod vero in eadem, cæteris recte se habentibus;

unicum vitium observavimus, bilis videlicet cysticæ colorem non illum quidem flavum, sed ex subrubro ita obscurum, ut si aquæ in qua caro recens lota esset, multus nicotianæ pulvis misceretur, id nempe cum Virorum Cl. Bohnii, atque Ortelii observationibus conjunctum, favet conjecturæ Sagacissimi Malpighii, a Liene bilis secretionem juvari, opinantis. Cum hæc scripsissem, in calce demum hujus Capituli præter expectationem illud unum inveni quod tuis olim editis Adnotationibus addidisti, verba ista videlicet: in quibus pro Summo Anatomico Malpighio adversus Nobilissimum Profectorem Ruyschium commemoras, ab Exercitatissimo Meryo in muliebri Liene Glandulas fuisse observatas. Sed quando Ruyschius in humano Liene non Glandulas modo, verum ipsas etiam Cellulas esse, negavit; addere etiam poterat, ab Diligentissimo Cowpero ostensum esse, qua ratione in humano Splene eadem Cellulæ conspici possint. Cæterum in Tabula LXI. Figura 2. litteræ E. E. E. & Nervus G, qui istic vas potius quoddam esse videtur, num recte fuerint ex Bidloi Archetypo descripta cum hoc in præsentia caream, ignoro; illud scio, plerasque reliquarum ejus Figurarum quas hic exhibes, Explicationes, non iisdem prorsus verbis in ipsius Autographo esse perscriptas.

## ANIMADVERSI O XX.

**C**um ejus Scriptoris cujus de Aneurysmate, & de Intestinatorum Valvula Dissertationes excussimus, turgescens jam super sorores alias, (ipsius enim verbis loquar) ejus petulca studiorum filia -- prurigne exaltaret -- fruendi jam libere primogenituræ insigniis, hoc est cum ejus, Historia Hepataria prelis jam esset nascentia; nonnulli quidem, Medicinæ Studiosi dentes cecinebant. Ergo suos victus deponat Willis honores, Malpighiusque suos, Glissoniusque suos. At vero illa eadem Historia jam edita, te potissimum, Mangere, non dubitasse, quin relictis accuratissimis, Hepatis Scrutatoribus Celebratissimis Viris Francisco Glissonio, & Marcello Malpighio, in describenda hac Parte, ac ipsius Usibus, Historia potius Anatomici istius perquam eximii uteris; minus quidem mirandum esset, si verè, ut tu dicis, illa omnia ab ipso summa exactè confecta nobis occurrerent; nec esset quod aliquid pro Hepatis plena descriptione, post Peregrinij hujus Viri in id adhibitam sedulitatem desideraretur. Verum num res quidem ita se habeat, mecum pro communi veritatis studio recognosce. Et primum multa quæ pertinent ad organicam hepatis constitutionem extrinsecam, eorumque imprimis causas, & habitudines, iste ipse Scriptor se fatetur omittere. Igitur in prima statim pagina quædam pro hepatis plena descriptione desiderantur. Sed in iis ipsis quæ non omittit, haud raro quiddam præ cæteris necessarium desideratur, nempe ut quid dicat, Lectores intelligant, velut in hac ipsa prima pagina, cum scribit; explorata tandem hepatis servili prosapia, proscriptoque roris chylosi commercio, eum e corporis principatu deturbent, quemnam, obsecro, Mangere? rorèmmè chylosum, ut vult grammatica, an-hepar, ut res ipsa videtur poscere? & paucis versiculis interjectis, cum de Nuckio dicit; vasa prope ligamentum suspensorium unita percipit, eumque decem, vel duodecim ramificationibus perreptantia; quid, malum, est istud eum? Alia autem habet quæ Lectores quidem satis intelligant; sed an probare satis possit, dubitent, ut cum dicit; patere de facto, non in omnibus animalibus; immo nec in omnibus ejusdem speciei individuis ad hepatis concavum glandulas semper in sterni conglobatas; non apparere omnibus; fortas-

Circ. Anatomic. Prog. 18. Hist. Par. Diss. 16.

360  
364.

363.  
Anatom. of. hum. Bodies.

Vid. Præfat. Hist. Hepat. & Carmina ante Præfat.

365.

366

366.

367

330  
De Succo Pancreatico.

340.

357  
De Liene, ejusque Usu.

In Theat. Tom. II. 391.  
Hist. de l'Acad. R. des Scienc. 1700.  
Observ. Med. I. 3.  
Ibid. Exercit. de Hepate.

Vid. sup. 342.  
num. 327.

Vid. in Ephem. N. C. Cent. III. Obs. 30.



fortasse credent, non esse, dubitabunt. Quod autem subjicitur, cum tamen in omnibus animalibus, presentia sint hepatis lymphatica; de hac in omnibus presentia magis dubitabunt. Eo denique addente: In quibus autem observabiles sunt, hæ glandulæ, easdem solum supercandi a lymphaticis, non intime penetrari, manifeste adnotavimus; hic vero non cæteros modo, sed te, te, inquam, ipsum dubitaturum esse, credo, huicne potius uni, quam Nuckii, quam Malpighii, quam Reverhorstii; at quorum hominum! experimentis, & observationibus credas, quando horum vel verba, vel Figuras contrarium probantes sine ulla addita dubitatione & supra exhibuisti, & infra es exhibiturus. Cæterum, nulum vas lymphaticum nasci a glandula in partibus animalis omnibus: vasa hujusmodi omnia ab hepatis cava illa parte prodire, in qua aperitur capsula ad portæ ingressum; contra atque ostendit Reverhorstii Figura: quæ autem super convexam hepatis partem ferunt, iter habere, per suspensorium ligamentum usque ad glandulas lumbares; quando idem Reverhorstius in altera Figura aliud ostendit, & docet: denique, lymphæ ductus cystis felæ huic etiam categoriæ adnumerandos venire; quos aliud iter habere, vel illud significat, quod injecto trunco venæ portæ circumjectisque membranarum vinculo, illi turgescant: atque alia de hoc genere vereor ut multi sint credituri antequam hic Scriptor, demonstret, & ger-manos hepatis lymphaticorum, aliarumque partium icones exponat, in eo Opere in quo etiam, de usu nervorum hepatis, non minus ac partium animalis aliarum omnium fufius, & rectius quam hucusque decantatum fuit, forsitan disset. Quæ & alia quæ subinde ipse minatur, tu autem, Mangete, studiose omittis, quæ, inquam, antequam præstet, monendus profecto multa esset, inprimisque ut loqui ante disceret; deinde ut Auctores attentius legeret; nam ex. gr. Viri Exercitissimi Willisius, & Vieussænius de nervis hepaticis neque ista eadem prorsus, neque ista eadem ambo unanimiter tradidere quæ hic ab ipso tradidisse narrantur, novissime ut de aliis, ac præsertim undequaque majoribus ipso Viris non ea diceret quæ si de ipso dicerentur, ferre graviter deberet, velut hic cum: Alii, inquit, Glissonius scilicet, Malpighius, & Kerckringius ad suæ quoque venatum gloriolæ, &c., & alibi generatim in iis quæ tu, Mangete, sapienter omisisti: per inanes postulatorum, & theorematum geometricarum abstractiones, frivolas linearum, & angulorum potestates, aut ampullosas authorum citationes, &c. Tortores hi veritatis, & fuci cavillationes seminant in foliis; confusiones in lectore; difficultates altioribus in tenebris recondunt; & principem in authoris cerebro vanitatem revelant. Sed hæc ipse videt; nos enim & hæc, & alia multa prætermittimus; ut cum dicit: portam per capillamenta sua sanguinem totum viscerum naturalium residuum haurire; non quærimus, num etiam renum, & vesicæ? cum addit: resonasse apud Antiquos venam portæ ejusque propagines pro plaustrum sanguinis ab Hepate ad viscera cætera in eorum alimoniam delati; non rogamus, num etiam ad modo nominata, & ad omnia superiora? & denique (nam quis possit illiusmodi omnia vel numerando percensere?) cum dicit: arteriæ ramum, pergrandem satis, & notabilem, jecur subire; hoc quoque prætermittimus. Verum cum subjicit: ejusdem arteriosi rami, diramationes universas in (vasorum hepatis) involucria unice impendi, ibidemque terminari, idque se pluries ostendisse, se pluries (sic enim loquitur) observatum esse; etiam si nos minime contra dicamus, asserentes, injecta in eam arteriam liquata, & colorata cæra, nos ipsius ramusculos per membranam hepar investientem eleganter ductos vidisse; tu ipse ta-

men contradicis, id ipsum ex Cl. Ruyschii observatione in Tab. LXIII. Fig. 11. confirmando, quinimo in proxima statim, atque altera pagina Præstantissimorum Virorum Malpighii, & Littrii testimonium proferendo, quorum alter ejusdem arteriæ propagines in hepatis glandulis terminari, vidit, alter in Regia Scient. Academia Parisiensi; nullo etiam microscopio adhibito, ostendit. In iis autem quæ sequuntur, etsi pleraque abnormia sunt; nobis tamen vel magis licet connivere, quando non tu, aut alius aliquis, sed ipse sibi contradicit. Scribit enim ex. gr. sanguinem asportari e ramis, in truncum cavæ, trajicientis, per hepatis foveam, ad hoc ideo optis in regione ejus ima, & postica, expresse excavatam. At non multis interpositis verbis, in troitum in hepar ramorum cavæ ad posticam, & superiorem ejusdem visceris faciem conspici, fatetur. Hic nervos hepatis vasa appellat nervosa. At in II. Historiæ Parte, ea se vocare, dicit, hepatis vasa, quæ liquido palpabili devehendo apta nata sunt, eoque jure nervos ab hepatis vasis libenter proscribere.

Hic vasa hepatis lymphatica, & quæ dixit nervosa, pari passu cum Poro Bilario, & Porta, paribusque diramationibus excurrere, strictaque invicem contiguitatis adhaerentia perfrui per totum ramorum, & ramusculorum tractum, usque ad ultima stamina, sine ulla dubitatione, quasi vidisset, historica asseveratione affirmat. Attamen eadem lymphatica, supra factus erat, se intra hepar, per quinque, aut sex digitos, nec ulterius, insequi potuisse, cultri scilicet & visus aciem iis inde omnino effugientibus. Hic denique ipsa etiam lymphatica, communi capsulæ tegmine, tanquam vagina, quaquaversum involuta, esse, dicit. At supra eodem in loco ista ipsa lymphatica, non in capsula communi, sed supra ejus dorsum repere, & extremam solum ejusdem capsulæ superficiem perambulare, contendit. Novissime unquam, Mangete, hominem qui magis Adversario contradiceret, quam hic sibi? & in uno quidem eodemque libello; imo in eadem propemodum pagina; adde in uno eodemque versiculo. Ingressum enim venæ portæ esse, dicit, ad hepatis sinistrum latus, seu concavæ regionis centrum.

## ANIMADVERSIO XXI.

Incipit tamen incipit ejus rei fundamenta jacere qua nihil magis in Historia hac tota inculcat. Cum enim, inquit, Vena Portæ ejusque propagines ad posticam hepatis regionis centrum ingrediantur; rami autem Cavæ ad superiorem ejusdem regionis partem introeant, eademque inde directionem proportionem in minutissima per totum organon diramationum stamina sobolescant hæc vasa; sequitur necessario quod cavæ radices in quacumque hepatici, parenchymatis portione cum ramis portæ ea habitudine concurrere debeant, ut se se invicem transversim, seu ad rectos angulos, aut saltem in decussim quandam interfecent. Sequitur id certe necessario; sed ex eo sequitur, quod supponit: quæ directionum proportio inter majores utriusque venæ est ramos, eandem inter minores, atque adeo minimos, ultimosque earum ramusculos servari. Quid vero, si hoc ipsum ejusmodi est, ut non mihi modo, sed neque Summo Viro Lancisio, ullo pacto probari possit? Atenim id, inquit, pluries in deglubatis exacte hujus visceris canalibus observavimus. Observavit nimirum (nisi potius deceptus est, ut infra patebit, & discors, maxime circa extremitates, Verheyenii descriptio indicat) observavit, inquam, ita se habere eas, diramationes a grandiori statu usque ad ultimam sensibilitatem, ut in responsione ad Amplissimum Lancisium constet; hic autem quæ-

A. 310  
11. 20  
11. 20  
11. 20

Tabul.  
Theatr.  
LXII.  
Fig. 3.  
Fig. 2.  
389  
367.

Hist. Hep.  
P. I. c. 7.  
S. 4. 5. 6.

Ibid. in  
Præf.

368

368.  
Arteria  
Hepatica  
rami quo  
perriant.

368

369

c. 3. S. 1.

367

Directio-  
num qui-  
bus Venæ  
Cavæ, &  
Portæ ra-  
mi in he-  
pate dispo-  
nuntur,  
commenti-  
tia quæ-  
dam pro-  
portio, con-  
vincitur.

infra 386.

l. 1. tr. 2.  
c. 17.

infra 388.



Ibid. quæritur, ut ex dicendis patebit, de vere ultimis, atque ideo insensibilibus. At, non incongruum, inquit, videtur exemplar naturæ hujusmodi illis & surculis conferre, qui, per gracilitatem suam, jam sensus eludunt qualem, cumque solertiam. Verum id quod sequitur ex eo quod non incongruum dumtaxat, videtur; non sequitur certe necessario, ut supra fuerat pronunciatum. Nam eadem tantum spectata ratione neque incongruum videri posset, minores quosque Arteriæ Magnæ, & Venæ Cavæ inferiores ramos ad idem exemplar esse dispositos ad quod earum inferiores trunci, majoresque rami disponuntur; & tamen non modo id necessario non sequitur, sed contrariam omnino rationem in cruribus, pedibusque servatam videmus, nempe ut rami, non quidem venosi arteriosis, sed arteriosi venosis obducantur. Quid? quod ipsam ramorum sensibilibus directionem haud eam esse quam contendit, vel ex ejus confessione probari potest. Nam quod observavit ipse, id, luculenter etiam haberi, confitetur, in Glissonii paginis, & præcipue in ejusdem iconibus, atque adeo ad eandem demonstrationem collimare, Figuras Kerckringii. Verum Glissonius, ubi, de venæ portæ, & cavæ in hepate connexionibus, verba fecit, earum propagines non tantum ad decussis formam, non tantum ad angulum rectum inter se dirigi, sed etiam lateribus conjunctis parallelas pergere, & verbis, & interjecto verbis iconismo luculentissime docuit. In iis vero Iconibus quas Historiæ Scriptor innuit, ramos quidem earum venarum majusculos decussatim positos exhibuit; minimorum autem, qui huc magis pertinent, bene multos fere parallelas, nonnullos etiam prorsus parallelas delineavit. Kerckringii demum Figuræ cum singulæ singulas eas Venas ostendant, neque ad rem faciunt, & si quis alteram alteri superimpositam animo concipiat, plerosque non modo minimos, sed majores ramos inter se parallelas commonstrant. Quæ cum ita sint, cumque in his paginis, & Iconibus luculenter haberi confessus sit quod ipse observavit; illud quidem necessario ex hac ejus confessione sequitur, ramorum etiam sensibilibus utriusque Venæ directiones in quacunque parte hepatis easdem non esse. Hoc autem convulso fundamento, quot una commenta convulserimus, infra apparebit.

## ANIMADVERSI O XXII.

Pergit porro, ad propriam hepatis, & principalem substantiam. Ab hac, inquit, ejusque functionis modo exponendis se se suaviter exemit, Glissonius. Quid vero Famigeratissimus ille apud Nationes omnes Doctor Bononiensis, Malpighius? quid de ejus in hepate laudatissimis inventis, quid, quæso, videtur? In hunc, inquit, scopulum allidens, nec melius expeditit se se, nec ab alio prætermissa prædicta majoris elucidationis face donavit. Dicet aliquis: At Glissonius propriam illam hepatis substantiam nihil aliud, nisi sanguinem cum bile coagulatum, esse docuit; hujusque separationem per attractionem explicandam esse, censuit; Malpighius vero illam substantiam esse glandulam, ostendit, bilis autem separationem, ut eam quæ sit in cæteris glandulis, per congruos in ea substantia insculptos poros explicare consuevit. Verum noster de istiusmodi explicatione quid sentiat, satis superque in iis Capitibus ostendit quæ contra non *Fermentistas* modo, sed & *Poristas* præmisit, & quæ tu, Mangete, ut pervulgatis contritisque argumentis plena, bene ac sapienter tota omisit. Ibi igitur istam hypothesim etsi, simpliciore, naturalique ideo rerum ordinis, ni conformiorem esse, falsus erat; quod quidem satis est, ut majorem lucem afferre, intelligamus quam ignotas, & non intelligendas Facultates; eandem tamen, falsitatis ream -- absque refugio, pronunciavit. Ad detectam vero naturam

Morgagni *Adversaria Anat.* III.

ram glandulosam quod attinet, jure omnino, judicandum hic censet, Malpighium nil in hepate innovasse præter novi vocabuli introductionem, glandulam scilicet appellando quod, hætenus sub parenchymatis nomine accesserat; quasi vero Malpighius ita Hepar *Glandulam*, ut ipse Ductus Lacrymales *Novos*, nuncupasset, quia sic visum esset, non quia substantiam hepatis revera esse glandulosam, primus ostendisset. Adde certam inventam glandulæ structuram, certasque partes, lobulos videlicet illos suos, atque acinos, quos hic nescio contemptim magis, an imperite commemoret; Lobulis, inquit, licet suis in medium adductis, totumque hepatis corpus complentibus, qui in acinos inde dispertiantur, exagonos, conflatos tandem ex subovalibus glandulis, quas intrent omnis generis capillamenta vasorum. Non dixeram ego, monendum esse hominem, ut Auctores attentius legat? Ecquando Malpighius acinos a glandulis hepaticis distinxit? Ecquando acinos ex subovalibus glandulis conflari, dixit? Ecquando omnis generis capillamenta vasorum, hoc est etiam lymphaticorum pervenire istuc, docuit? Et hic nobis de Malpighio, quem ne intelligere quidem valuit, tam libera judicia feret! Et quod magis mirandum est, inveniet tamen qui ipso potius quam Malpighio se, uti posse, arbitretur! Et cum accuratissima Malpighiana hepatis anatome in hac Historia quatuor istis, non amplius, verbis non sine tribus intolerandis erroribus exhibetur; invenietur, Mangete, qui hic, illa omnia a perquam eximio isto Anatomico summa *ἀκριβεία* confecta esse, dicat, nec esse quod aliquid pro hepatis plena descriptione post Peregregii hujus Viri in id adhibitam sedulitatem desideretur! Vidimus quid de aliorum Inventis censuerit; nunc quid ipse invenerit, videamus. Cum nulla, inquit, corporis animalis assignari possit pars solida, quæ ex tenuissimis vasculis aggregata non sit; sequitur, hepatis parenchyma glandulæ conglomeratæ nomine donatum nuper, non nisi ex vasorum capillamentis glomeramen esse. Hætenus nihil novi; hætenus nihil contra Malpighium. Non enim quia membranæ glandulosos hepatis acinos componentes, ex tubulis totæ, & canaliculis (quales ii cunque sint) constant: hinc sequitur, aut eos acinos nullos esse, aut inter extrema venarum Portæ & Cavæ interjectos non esse; Adnotationes autem quas adscribis, magisne acinis, ut a Malpighio concipiebantur, faveant, quam istorum quos tu dicis, tuamque sententiam, pro virili confirmet, candidi Lectoris judicium esto. Illa autem; sic pergit dicere; vasorum capillamenta quorum glomeramen hepatis parenchyma esse, posuimus, a cava solum, porta, & ductu excretorio possunt propagari. Attende quomodo id probet. Nam, lymphatica, inquit, in hepate non a glandularum substantia, sed ab earum interstitiis enasci, superius exhibuimus: Si exhibere est quidquid lubet dicere; id supra exhibuit; si vero est vel leviter probare, non exhibuit. Nervi autem nullam, inquit, trahunt, proprie canalicularem structuram. Vide novam *contradictionem*; nam paulo ante nullam assignari posse, dixit partem solidam, quæ ex vasculis aggregata non sit. Arteriæ autem, soboles solas vasorum tunicas lambunt in organo. Quod quidem supra ex nostra aliorumque observatione falsum esse, ostendimus. Nec ulteriora in hepate vasorum genera. Sensibilem, concedo; insensibilem autem ex quibus parietes acinorum, cæterasque hepatis membranas compingi, verisimile est, quis audeat concedere? Ipse tamen, quasi hæc omnia probata, & manifesta essent, deventa (sic loquitur) jam mens ad compositionem glandulæ, in qua dicta terminantur, vasa, invenit principii cavæ apertionem lateraliter concurrere ad finem ultimæ propaginis portæ. Novum, Dii boni! Anatomes genus, in quo

Hepatis  
commentaria  
structura  
confutatur.



non oculis, sed mente ad quæstam Partium structuram devenitur! facile præterea, & valde securum! Nam mens ideo sic invenit, quia quodcunque in mentem venit, pro vero statim arripitur. Nunc demum intelligo, cur Malpighius, qui anxie & scrupulose omnia quæ poneret; pensaret, & qui nisi quod videret, in re anatomica nihil crederet; tam parvos, si hunc audiamus, imò nullos in hepatis structura revelanda progressus fecerit. Nimirum hujus novæ methodi prorsus erat ignarus. Verum, credo, rem exaggero, atque amplifico. Cur quæso, Mangete,

370: principium cavæ lateraliter concurrat ad finem portæ? quoniam, ut vidimus superius, utriusque venæ rami vel *minimi* sic inter se, in quacunque hepatis parte ultimo assignabili, diriguntur. At hoc est illud ipsum fundamentum quod supra nullo negotio convulsimus; illud ipsum est quod Sapientissimus Vir Lancisius sibi nullo pacto probari posse, testatus est. Quomodo præterea glandulosæ hujus novæ structuræ pars illa altera in qua inventum est, primam ductus excretorii hepatici radicem di-

371: recte concurrere in glandula cum sine furculi portæ; quomodo, inquam, ea mihi potest patere? Percipies, inquit, facile, si supponis, ramum quemcumque excretorium non cum socia sua portæ propagine hoc ritu inosculari, sed cum alia directionis ex diametro oppositæ. Concipe hæc per totum hepar, & patet jam tibi quid sit hepatis parenchima, seu quid ejus glandula, & quid intima ejusdem compositionis. Et hanc, Mangete, Historiam Hepaticam, non Divinationem appellabimus? Historiam autem? imò Demonstrationem; hæc enim ipsa postea dicet, se in hoc loco demonstrasse. Præclarum vero & inauditum genus Demonstrationis! *Suppone*, inquit, *hoc ritu* rem se habere. *Concipe* id quod mihi probandum est, verum esse; Verum est igitur. Dices: lex contrariorum asserere id cogit. Nam si capillamenta cavæ quæ ad decussim veniunt cum vena portæ, lateraliter cum hujus fine concurrunt; capillamenta ductus hepatici quæ parallela pergunt cum vena portæ, directe cum hujus fine debent concurrere. Ego vero primum eam decussationem, eumque concursum cavæ, & portæ negavi. Deinde fac, me non negasse. Cur non negassem? Quia verisimile esse, concessissem, quod contingere diceretur inter omnes ramos sensibiles, id quoque inter insensibiles contingere. At si id verisimile esse, vultis; cur verisimile non erit, cum rami omnes sensibiles venæ portæ, & ductus paralleli sint, insensibiles quoque atque adeo extremos eorundem fines esse parallelos, non autem, ut concipitis, sejungi, ut ad alios, directionis ex diametro oppositæ, utrinque inclinentur. Et hic mihi legem contrariorum narratis; quæ si hic attendenda est, cum per vos cava ad angulum rectum cum vena portæ concurrat, ductum ad angulum acutissimum cum vena portæ concurrere, satis est: quod & Amplissimo Lancisio placet qui rectum illum quidem concursum, sibi nullo pacto probari posse, disertè affirmat. Cui operæ pretium est hic attendere quid noster ad extremum respondeat. Videlicet affirmat, posito etiam eo concursu ad angulos acutissimos, separationem bilis haberi posse. Addit: Nihilque mutat de hypothesi, concipere glandulosum concursum, seu folliculum, ut vas idem cum porta, & ductu bilario; aut ut ab utrisque distinctum. Concludit: o quantum sat est, in summa demonstrationis penuria, frustulum conceptus emere, ratiocinii pretio, qui si non saturet, pascat saltem esurientem (non enim audeo, ut tu, Mangete, ejus verba mutare) pascat saltem esurientem ingenium. Quinimo oh

-- quantum mortalia pectora cæcæ

Nos habent!

Hæc ergo illa historia erat! hæc illa erat demonstratio! Quid? quod ne conjectura quidem est ejus

quod fieri possit. Nam si concipere debemus rem sic esse, ut, quæ currit ad latus hepatis dexteræ, propago portæ, concurrat cum ramo excretorio per latus sinistrum protenso; sequitur illud necessario, ut si hepar in altero tantum latere penitus sit obstructum, aut simili gravissima affectione vitiatum, nulla in toto hepate bilis secretio fieri possit. Sic enim sinistro ex. gr. latere vitiatum, non modo obstructi sint hujus lateris ductus excretorii, sed rami etiam venæ portæ qui dextro lateri prospiciunt, sint obstructi, necesse est. Verum jam me pudet in hujusmodi commentis refutandis diutius versari, quæ tu historicæ Malpighii descriptioni antepone non dubitasti.

#### ANIMADVERSIO XXIII.

Sed ecce, adest jam modum expositurus fecretionis animalis in genere, & biliosæ in specie. Attendamus, quæso, quid proferat. Nam in iis quæ tu omisisti, Capitibus; ob-

371: soletis jam inanibus Veterum commentis, & penitus exutis Recentiorum præjudiciis, hoc est duobus illis sententiis generalibus, in quas circa causam secretionis dirimitur hodie Moderniorum popellus, (sic enim homo minime magnificus de omnibus qui fuerunt, & qui sunt, reverenter loquitur), ipse secretionis principium evidens, mirabile, & simplex nobis statim sub oculis objiciendum sponponderat. Quid quæris? spe statim excidimus. Sic enim incipit: Cognita glandulæ hepaticæ structura: ut intelligamus (quod etiam modo dicebat) se illam suam commentitiam structuram supponere, non modo in hepate veram esse, sed esse, applicandam proportionaliter cæteris glandulis conglomeratis. Itaque cum ejusmodi fundamento se uti velle, significet, & revera utatur; satis constat, non esse cur in cæteris figillatim preprendendis tempus conteramus. Præstabit igitur pleraque obiter perstringere. Cum ad præparandas ad extricationem ab reliquo sanguine particulas in glandulis secernendas, conica, & ramosa arteriarum figura necessaria dicatur, quatenus sanguis ad concurrentes harum parietes, & ad angulos ex ramorum partitione resultantes alliditur, & sic discerpitur; cumque ad bilis particulas ut pote magis implicatas, extricandas, extraordinariorum, & ulterius hujusmodi artificium necessarium esse, asseratur; permirum est, magnam hujus artificii partem in eo poni, quod sanguis ex quo bilis secernenda est, per totam, & longosque meandros usque ad ejus truncum & rursus ab ejus trunco per novas, & longas in ipso hepate ramorum divaricationes feratur. Nam a venæ portæ radicibus ad truncum inversa illa figura est quæ in arteriis ad allidendum ita opportuna dicebatur; a trunco autem ad ultimos in hepate ramos etsi illa figura restituitur, maxime tamen, ut in tota vena portæ, debilis est ea vis a qua sanguis allidatur. Prætereo admissam in sanguine sine ulla dubitatione fermentationem; prætereo admissam observationem notabilis in sanguine venæ portæ præ alio venoso amaritudinis, quam alii, ut Verheyenius, non admittunt, & eorum qui admittunt, nonnulli malunt, inde reductum bilis ex intestinis, quam extricationem biliosarum particularum comprobari. Hæc, inquam, aliaque prætereo; non enim ego illi contradicere magis possum, quam ipse sibi in II. Historiæ hujus Parte contradicat, cum hunc ipsum venæ portæ sanguinem quem hic adeo solutum esse, contendit, ibi contendat, multo minus solutum esse in partibus suis quam cruorem celiacæ, & illas venæ portæ proprietates quas hic ad solvendum sanguinem adeo utiles deprædicat, easdem ibi inculcet, liquidi derivati lentoribus multum contribuere, & juvare ad sanguinem, non magis attenuandum, sed magis implicandum. Verum ea quæ supra de artificio dixit ad bilis particulas adeo implicitas extrican-

Commenta  
quædam  
de Secretione  
Animali, &  
Speciatim  
Bilis, confutantur.  
Hist. Hepat. c. 3.  
§. 1.  
Ibid. c. 5.  
§. 8.

371

371

l. 2. tr. I.  
c. 18.

c. 5. §. 2.



das comparato, confirmari a contrario, existimat, per artificium ad urinæ particulas adeo liberar e-  
volvendas adhibitum. Contrarium enim hoc arti-  
ficio esse, dicitur, primum quia „ brevissima  
„ omnium via est a corde ad renales glandu-  
„ las; „ quasi non esset brevior ad cellulas cor-  
dis adiposas, ad glandulas pericardii, asperæ ar-  
teriae, aliasque hujuscemodi; Deinde quia „ nul-  
„ lis pene est flexuositatibus, angulisve præter  
„ majusculum unum, emulgenti, & aortæ inter-  
„ positum, externe divaricata; „ quasi hic angu-  
lus non esset fere ex maximis, aut in Disserta-  
tione de Aneurysmate ipse non agnosceret: „ re-  
„ sistentiam eo notabilem esse in trunco Aortæ  
„ super aliam quamcumque arteriae partem, quo  
„ arcus ejusdem canal. non longe a corde no-  
„ tabiliter acutus fluentum sanguinem subito,  
„ & violenter inflectit; „ Tum quia „ interne,  
„ seu in renis corpore compendiosa est, & dire-  
„ cta via usque ad secretionis locum; „ quasi ve-  
ro, ut tu infra ex Malpighio ostendes, arteriae  
intra renes in arcum non curvarentur, deinde in  
rete quoddam non implicarentur, tandem ad la-  
tera non reflecterentur. Itaque perinde ac si res  
satis esset comprobata, ad ulteriora strenue pergit,  
dictitans: „ Ex ratione hac biliosæ, & urinosa  
„ secretionis contraria, inferre hinc possumus re-  
„ spectu ad alias omnes animalis secretiones inter  
„ eas mediantes, ex varia emunctorii distantia  
„ a corde, -- indeque & varia mediantium du-  
„ ctuum sanguinem devehentium angulositate,  
„ divaricatione, & cavitare, præcipue autem ex  
„ majori inde, aut minori in sanguine depurati-  
„ vae fermentationis libertate, varias hinc solutio-  
„ nes fieri in sanguine, ut diversorum hinc gene-  
„ rum liquida aut tenuiora, aut crassiora sejun-  
„ gantur in itinere a tota massa, antequam sci-  
„ licet idem cruor ad colatorium appellat. „  
Quæ quidem verba difficilior mihi fuit exscribere  
quam sit cuilibet confutare. Quis enim est  
qui non videat, neque viam a corde ad jecur esse  
omnium longissimam, neque viam a corde ad re-  
nes esse omnium brevissimam, neque ut quisque  
secernendus humor tenuior, aut crassior est, ita  
ad ejus secretorias glandulas brevior, aut lon-  
gior a corde esse viam; quinimo eodem fere  
a corde intervallo & tenuiora, & crassiora secer-  
ni, velut pericardii humorem, & circumjectum  
cordi adipem, velut urinam, & circumjectam  
renibus pinguedinem, velut denique (nam ad sa-  
livam ipse provocat) in eodem ore & crassiorem,  
& tenuiorem salivam. Neque effugium variorum  
angulorum, & flexuum, aut variae (quam tamen  
Viri bene multi doctissimi, & experientissimi nul-  
lam agnoscunt) in sanguine fermentationis usque  
adeo prodesse potest; quando is sanguis qui a  
corde ad meatum auditorium fertur, non modo  
non ita longa, sed neque ita flexuosa, neque  
ita ad remorandum apta fertur via ut is qui ad  
jecur deducitur, & tamen ex utroque materia len-  
ta, flava, amara separatur; imo velut infra ag-  
noscit, ex illo magis *spissescens* bilis separatur  
quam ex isto, contra atque fieri de ejus senten-  
tia oporteret. Sed „ totum, inquit, com-  
„ probat placitum analogia ex plantis deducta: „  
quo in loco ejus in Plantarum Anatome peritiam  
singularem cum multa demonstrant quæ necesse non  
est hic attingere, tum vero in re ipsa Botanica  
quantum habeat usum, illud unum quo hic po-  
tissimum nititur, satis ostendit; „ Diversa, inquit,  
„ ramorum habitudo in arboribus diversæ speciei,  
„ essentialis est adeo, ut dum in ejusdem speciei ar-  
„ boribus eandem semper perlustras diramatio-  
„ nem, duas non invenias disparis fruticationis plan-  
„ tas, quæ ordinem distributionis ramosæ eun-  
„ dem præ se ferant. „ Hujusmodi funda-  
mentis, atque aliis quæ partim supra convul-  
simus, partim infra quam parum firma sint indi-  
cavimus, ejus est hypothesis innixa. „ Quam  
ut „ luculenter firmet exemplis, „ assumit:  
„ lactea vascula transverse ad angulos rectos, aut  
Morgagni *Adversaria Anat. III.*

„ rectis parum dissonos cum fistula intestinali con-  
„ currere, „ nihil dubitans, ut opinor, ea vascula a  
mesenterio intra intestinum recta pergere, non ve-  
ro per ejus superficiem totam varie inflecti, atque  
diduci, ut in II. Adversariis ostensum est. Animad.  
Sed & Capsulam Glissonianam, quam supra in de- 30.  
scriptione „ ex tunica hepatis a peritonæo oriun-  
„ da prognatam „ statuerat, vix addens: „ rete 369  
„ musculari compositam volunt Moderniores ali-  
„ qui; „ hic, velut ipsi commodum est „ se-  
„ cundum Accuratiores indagines verum esse  
„ musculus „ pronunciat; quasi vero Cowperus, Anatom.  
qui eam pro peritonæi productione habet, nec of. hum.  
ubique hepaticis vasis advolutam credit, inter Bodies.  
Accuratiores non esset habendus; aut illud revera,  
ut tu, Mangete, adnotas; Bellinus *demonstrasset*;  
quod, ut de me fileam, certe Doctissimo Fanto-  
no non videtur. Quid attinet singula notare? Anatom.  
ut cum vix sentit: Diff. 6.

Nil agere exemplum litem quod lite resolvit:  
five obscurum per obscurum dilucidare non lice-  
re, modum videlicet quo fit bilis secretio, per  
modum quo fit nutritio: Ut cum a sensibilibus  
vasorum renalium directione insensibilium dire-  
ctionem infert, quod & fallax esse argumentandi  
genus, supra ubi de vasis hepaticis agebatur,  
ostendimus, & multo hic fallacius ostendere pos-  
semus, cum illam vasorum directionem, ut re-  
num propriam supponat quam horum anatome ex  
parte fallam, ex parte aliarum glandularum inspec-  
tio plerisque communem esse, convincit: Ut 373  
cum „ bilem hepatica subtiliorem -- in renibus  
„ ordinario secerni, statuit, unde inquit croceus  
„ naturaliter urinæ color; „ ejus quidem colo-  
rem naturaliter croceum non esse, sed dilute fla-  
vum, etiam si Medicus non esset, ignorare tamen  
non deberet; a bile autem non esse, ex Bellinia-  
na urinæ evaporatione didicisse poterat; Ut cum  
„ bilem declinato hepate -- per intestinales glan-  
„ dulas in cholera morbo effundi, „ pronunciat:  
quod vel me silente; ipse, ut solet, sibi pa-  
rum constans, impugnat in II. hujus Historiæ c. 6. §. 3.  
Parte, multis verbis affirmans, „ succos lym-  
„ phaticos hoc in morbo foras e latibulis suis  
„ per exprimens stimulum elicitos, eo pingi co-  
„ lore, quem bilis ab eadem expressione eructa-  
„ ta, eisque confusa adducet ex hepate ejusque  
„ folliculo in duodenum, ita ut mere biliosa ap-  
„ pareant hæc liquida. „ Atque hætenus in-  
dicata, „ cordatis, solidæque rei anatomicæ Cul-  
„ toribus, „ ostendere satis arbitror, num me-  
lius fecerit, quod hoc Caput ita concluderet: 374.  
„ Et ecce simpliciter exposita secretoria, & ex-  
„ cretoria glandulæ hepaticæ, ejusdemque secre-  
„ tionis modus, quoad circumstantias omnes,  
„ probatus; an vero quod proximum Caput sic  
inceperit: „ Bilis igitur, in cujus secretionem ex-  
„ plicanda, tantus profuit strepitus in Capite  
„ antecedenti, &c. „

## ANIMADVERSI O XXIV.

Nobis quidem ea quæ hætenus notavimus,  
esse ejusmodi videntur, ut quamvis alia non  
adderemus, vel tibi ipsi tamen, Mangete, tandem  
aliquando constare posset, quæ *explicata* hæc Hi-  
storia conscripta sit. Quapropter de multis jam  
pauca notabimus, & pleraque quam paucissimis.  
Quod ergo attinet ad bilis „ supra totam cruoris  
„ substantiam toties decantatam crassitiem „  
satis mihi erit, Amplissimum Lancisium quid si-  
bi ea de re videretur, ostendisse, cum scripsit,  
„ profecto imposuisse tibi videtur crassities bilis;  
„ jam a sanguine secretæ. „ Quod vero  
attinet ad usum bilis; postquam eam opinio-  
nem in qua Vir Summus Franciscus de le Boe  
Sylvius aliquid humani passus est, *deliramenta*  
(infra etiam *vaniloquia*, & *fabellas* vocat) hu-  
manissime nuncupavit, de propria autem sic  
demisse locutus est: „ Nos simpliciora ample-  
„ ctimur; usumque bilis imus exposituri  
„ tam



„ tam clarum, tam patulum, tam simplicem, ut  
 „ idem futurum sit ingenuo, & sapienti legere,  
 „ & comprobare; „ post hæc, inquam, de sali-  
 va, quasi de hujus usu se esse acturum, promissi-  
 fet, bene longum sermonem instituit. In quo ni-  
 hil fere est nisi tritum atque vulgatum præter non-  
 nulla quæ ipsius, ut opinor, peculiaris sunt, ut  
 illa non obscura *contradictio*, cum scilicet fateri  
 primum videtur, „ principiorum salivæ pansper-  
 „ miam, seu multiplicationem variam -- ob  
 „ tantorum generum alimenta ab hoc latice, tan-  
 „ quam a menstruo universali, soluta; „ deinde  
 solutionem istam haberi agnoscit *per humidum* sa-  
 livæ, instructum dumtaxat; „ salino alcalico vo-  
 „ latili principio: „ Vel dum Ingeniosissimi Pit-  
 carnii illi supra memoratæ quæstioni, cur a succo  
*digestivo* vel devoratos brutorum ventriculos solven-  
 te, ventriculus ipse in quo assidue est ille succus,  
 non solvatur, dnm, inquam, illi quæstioni satis-  
 facere se, credit, respondendo, devorata „ jam  
 „ attrita fuisse in oris molendino, & a corticibus  
 „ suis, seu tunicis cingentibus discerpta, sicque  
 „ penetrabilia reddita ad actionem in ventriculo  
 „ solutivam; „ quasi vero eorum quæ non sic di-  
 scerpta devorantur, nihil solutum, sed omnia *inal-*  
*terata* excernerentur, quando in piscium ventricu-  
 lis aliorum qui integri devorati sint, piscium non  
 aliæ tantum partes, sed ossicula, & squamæ, &  
 is ipse, „ qui vivus eludit solventis efficaciam, „  
 ventriculus colliquatus consumptusque invenitur;  
 ejus rei accuratam inprimis observationem atten-  
 di eam velim quæ a te, Mangete, ex Cl. Brunne-  
 ro est allata; vel quasi, si forte ventriculus ab  
 ingestorum asperitate, aut alia ratione nonnunquam  
 intus aliqua ex parte excorietur, tunc nihil am-  
 plius causæ sit quominus ipse, vivens adhuc,  
 solvatur, & concoquatur. Adde alia, ut cum  
 „ primum, & ultimum chylicationis instrumen-  
 „ tum in ore, ventriculo, & intestinis salivam,  
 pronunciat, oblitus videlicet, ut nunc alia præ-  
 termittam, virium aeris quem deglutimus una  
 cum cibis; atque adeo cum saliva ipsa, fortasse ad  
 ejus particulas implicandas, & ad ventriculum  
 secum rapiendas visciditate quadam donata.  
 Sed leviora hæc sunt; illa vero nullo pacto feren-  
 da, quod salivæ idem humor, & pancreaticus  
 „ per lacteorum officia introducti, & imbibiti  
 „ totam percurrant, & saturent galaxiam per la-  
 „ teas duplicis generis, glandulas lumbares, du-  
 „ ctumque thoracicum; -- ideoque in chyli ab-  
 „ sentia viæ hæc omnes lacteæ limpido solum li-  
 „ quore hujusmodi, videlicet salivari subtiliori,  
 „ turgidulæ se se offerant visui, -- liquidum solum  
 „ salivale vascula hæc lactifera perenniter adim-  
 „ pleat. „ Quibus in verbis non multis quam  
 multi, & quam graves errores sint, vide. Primum  
 in partium *galaxiæ* enumeratione glandulas lumba-  
 res pro chyli receptaculo se habere, non obscure  
 ostendit. Deinde dum omnes vias istas lacteas,  
 absente chylo, *solis* istis duobus succis turgere,  
 dicit, non modo succi qui a ventriculi, & inte-  
 stinorum tubulis, & glandulis destillans, tenuio-  
 rem sui partem immittere in lactea vasa potest,  
 obliviscitur; sed tot lymphatica vasa quæ in chyli  
 receptaculum, ductumque thoracicum lympham in-  
 vehunt, ignorare prorsus videtur. Novissime dum  
 iisdem succis lactifera vascula *perenniter adimple-*  
*ri*, affirmat, omnes omnium Anatomicorum ob-  
 servationes refragantur, ex quibus nemini non con-  
 stat, eadem vascula perenniter, jam non dico, non  
 adimpleri, verum sæpius ne tantum quidem humo-  
 ris continere (etsi aliquo semper humectari, ne-  
 mo inficiatur) quantum satis sit, ut oculatissimi  
 & exercitatissimi homines, ubi ea sint, digno-  
 scant. Quibus in omnibus erroribus eo minus  
 est connivendum, quod hunc longum de saliva  
 sermonem locus hic minime requirebat, ut vel ipse  
 confitetur, dum sic illum tandem aliquando con-  
 cludit: „ Sed indignantem nimis salivam. (imo  
 „ vero bilem) movet exuberans hic rerum sali-  
 „ valium sermo. Veniamus jam ad rem nostram;

„ ad bilis negotium. Ecquid jam igitur bilis in  
 „ intestinum descendit? Hic cadentem expecta-  
 „ bam. Attende. „ Attendere nos jubet suum il-  
 lum bilis usum „ tam clarum, tam patulum,  
 „ tam simplicem, ut idem futurum sit ingenuo,  
 „ & sapienti legere, & comprobare. „ Ego ve-  
 ro qui ut candore nemini, ita sapientia libens o-  
 mnibus concedo, affirmare non dubitabo, me le-  
 gisse quidem, sed non probasse. Nam ideo bilem  
 in intestina immitti, ne horum parietibus  
 chymus facile agglutinetur, Sapientes fortasse pro-  
 bare poterunt; ego qui eundem chymum aut ven-  
 triculi, aut superioribus duodeni parietibus, etsi  
 nulla bilis intercedat, ita agglutinari tamen, non  
 video, probare facile non possum. Et sane harum  
 Partium omnium parietes assidue de se destillante  
 humore sic madent, ut naturaliter constitutus  
 chymus, accedente præsertim peristaltico earun-  
 dem motu, non facile ipsis agglutinari posse vi-  
 deatur. Neque vero quæ ad comprobandum  
 hunc usum profert, ejusmodi sunt, ut ab aliis  
 ad longe alios usus potius comprobandos adhibe-  
 ri non possint; imo quædam ejusmodi sunt, ut  
 jure meritoque possint redargui. Quid enim est  
 scribere: „ in struthiocamelo, in quo bilis exo-  
 „ neratur immediate in ventriculo, vis insidet ce-  
 „ leriter adeo digestiva, ut tolerata quadam hy-  
 „ perbole dicatur ferrum devorare, & digerere; „  
 quid, inquam, hoc est, nisi in tota hac re ita  
 hospitem ac peregrinum se ostendere, ut tu ipse,  
 Mangete, qui in Theatro hoc tuo eas tibi par-  
 tes sumpseras, ut illius dicta „ pro virili confir-  
 „ mares, „ in adscripta Notula dissentias, Cl.  
 Vallisnerii nostri objiciens anatonem accuratissime  
 iteratam. Atenim sic „ forsan, addis, non mi-  
 „ nus commode liquor biliaris in animalis ven-  
 „ triculum devenit. „ Primum quando hoc ad-  
 dis; cur non & illud commode explicare conaris  
 quod vel pueri atque mulierculæ falsum esse, non  
 ignorant, videlicet struthiocamelum non revera  
 ferrum devorare, sed tantum „ tolerata quadam  
 „ hyperbole dici ferrum devorare. „

*Dic aliquem fodes, dic, Quintiliane, colorem.*  
 Deinde etsi potest bilis in ejus ventriculum deve-  
 nire; non tamen devenit, ut ille dixerat, *imme-*  
*diate*. Denique, ut deveniat, illud tamen quæ-  
 rendum restat, num tanta illa *vis digestiva* bili  
 in ventriculum admissæ accepta sit referenda. Nam  
 & in Comite a Cabrollo dissecto porus choledo-  
 chus ita prope pylorum egrediebatur, ut non  
 minus ventriculo, quam intestinis bilem trans-  
 mitteret; sed hæc causa illi fuit non cur melius,  
 citiusve digerere, verum, ut inquit Cabrolus,  
 „ cur sæpius nausearet, vomeretque. „ At vero,  
 inquit noster, „ ex choledochi insertionem in Re-  
 „ migis ventriculi fundo apud Celebrem Ana-  
 „ tomicum Vesalium, summa in hoc viro ade-  
 „ rat voracitas, & chiloideos promptitudo. „  
 Quid? si de illius Remigis voracitate, & chy-  
 losi apud Vesalium ne verbum quidem; agnosces-  
 ne tum demum, Mangete, quam „ Peregregius  
 „ hic Vir in hac conscribenda Historia seduli-  
 „ tatem adhibuerit „? Nimirum ex quibus mul-  
 ta, in hoc præsertim Capite, desumpsit, ex iis-  
 dem hanc quoque summam illius Remigis vo-  
 racitatem, Vesalio minime consulto, descri-  
 psit. Eorundem tamen Cl. Virorum contrariis  
 rationibus, ut par erat, non satisfacit, ante-  
 quam pronunciet, bilem „ sensiles intestinorum  
 „ tunicas proritare ad defectionem acore suo; „  
 sic enim quasi bilis acida esset, contra non Lati-  
 norum modo, sed & Medicorum consuetudinem ejus  
 acrimoniam vocare solet. Sed quid iste aliorum  
 rationibus satisfaciendum sibi esse, ducat, qui J.  
 A. Borelli, A. Nuckii, M. Reverhorstii, &  
 aliorum sententiam (non quæro hic an tenendam;  
 etsi post editam hanc Historiam Vir quidam  
 Ingeniosissimus eandem tamen secutus est) qui  
 summorum, inquam, eorum Hominum senten-  
 tiam „ modernorum aliquorum insomnia „ nuncupa-  
 re non dubitaverit; neque id verbo negare quod tu su-  
 pra

Ufus qui-  
dam bilis  
impugna-  
tur.

377

Supr. 366.

Obser. 6.

De hum.  
corp. fab.  
l. 5. c. 3.

377.



327. pra in medio reliquisti; Vir autem Cl. Brunne-  
 284. rus experimento plane demonstratum censuit, vi-  
 „delicet, in intestinorum cavitatem hiare mesera-  
 „cas. „

## ANIMADVERSIO XXV.

378. **V**erum enimvero repente me hinc abstrahit,  
 „ & ad sui commiserationem transducit bilis,  
 „ quam meatus cysticus, tanquam vorago viam oc-  
 „ cupans, trajicientem ibidem placide, hujusque  
 „ veluti præcipitii nesciam, deglutit, & per pro-  
 „ priam cavitatem raptat. „ Relinquebatur ut  
 pro sua in *stylo historico* peritia, quo quidem  
 „ hæc omnia se explicare, „ in Præfatione edi-  
 xit, bilis calamitatem hanc tantam deploraret,  
 aut ipsam deplorantem induceret; quid enim  
 posset in eo genere, satis superque in II. Histo-  
 378. riæ hujus Parte ostendit, ubi de Flexu Hepatico  
 scribens, repente se vertit ad Antiquorum Codic-  
 um infelicitatem deplorandam, ipsosque adeo  
 suam causam agentes produxit. „ Miseri, inquit,  
 „ Antiquorum Codices! Ecquid tanta vestrum  
 „ sedulitas in signis veridicis hujusce morbi,  
 „ pleneque distinctivis exarandis; ebuccinantes  
 „ scilicet, dejectionem esse fætidam, &c. ? Ec-  
 „ quid; Dum Recentiores nostri turpissima po-  
 „ tius ignorantia obcæcari malunt, morbum pal-  
 „ pabilem negando; quam vestros lectione dignari  
 „ sudores? Eja: Dicite illis, quod, siquidem  
 „ audire nequeunt, audiant saltem Sodales suos,  
 „ &c. „ Recentiores vero nostri non sunt tanta,  
 ut ipse putat, ignorantia obcæcati, ut bilem ab  
 hepate ad intestinum descendentem *pene totam* di-  
 vertere in cystim, ita *indubitabile*, ut ipse postea  
 dicit, existiment; ut cystim, „ dividant commu-  
 „ niter in collum, cervicem, & fundum; „ cum  
 ejus cervicem, & collum idem esse, communiter  
 doceant; ut de canali cystico, „ a cervicis apice ad  
 „ ductus fellei insertionem verticaliter producto,  
 „ & ascenso, „ hoc est ascendente, facile con-  
 cedant, cum Bellinus non verticaliter eo produ-  
 ci, sed oblique, tradat, & ita quidem oblique,  
 ut angulum cum illo ductu contineat acutum ad  
 partes jecoris, obtusum ad partes intestinorum,  
 390. Cl. autem Ruyschius, ut infra tu ipse refers, in  
*plurimis* vesiculis felleis humanis observari doceat,  
 colli ipsarum, ut & ductus cystici, „ reptatum esse  
 „ serpentinum. „ Cætera, & multo quidem gra-  
 viora, quæ Recentiores nostri non facile admit-  
 tant, infra videbimus. Est enim hic ali-  
 quid de quo, Mangete, inter me, & te conveni-  
 re non potest. Nam multa sunt quæ de cystis  
 anatome tradi possent quorum hic nonnulla vix  
 memorata, pleraque non determinata, nonnulla  
 etiam prorsus omissa comperio. Ea de re ipsum  
 quidem non ita reprehendo; ut qui profitetur,  
 se „ de hisce omnibus aliisque cystim spectanti-  
 „ bus ulteriora non asferre, prout largissime ab  
 „ Anatomes Historicis venditata; ideoque hic su-  
 „ pervacanea. „ Te vero quomodo excusam,  
 qui a principio pronuntiasti, te ipsius opera uti  
 366. propterea quia „ non est quod aliquid pro He-  
 „ patis plena descriptione, post Peregregii hujus  
 „ Viri in id adhibitam sedulitatem desiderere-  
 „ tur? „ Sed jam ad ipsum redeamus, qui præter  
 ea quæ ad vesiculam pertinent, cur structuram  
 quoque ductuum bilis, de qua alio in loco dice-  
 mus, & hanc quidem sine ulla excusatione,  
 prætermiserit, non video, nisi forte quod totus  
 esset in quibusdam *observationibus*, ut ipse dicit,  
*nervosissimis*, quæ tamen revera non sunt magis  
 nervosæ, quam novæ. Prima est, „ obliqua du-  
 „ ctus biliferi in intestinum insertio, firmæ caruncu-  
 „ læ circulo armata, „ quam censet, „ liberæ  
 „ in intestinum bilis percolationi, „ usque adeo  
*obluetari*, ut *facile* bilis retroacta, *ad subeundum*  
 cystis meatum *compelli possit*; oblitus videlicet  
 381. 382. præter cætera, se infra agnoscere, ductus *hepati-*  
*cysticos*, obliqua licet insertione, & tuberculo  
 „ adinstar prædictæ fibrosæ annularis carunculæ,  
 Morgagni *Adversaria Anat. III.*

donatos, bilem nihilominus „ semper in follicu-  
 „ lum devehere. „ Altera observatio neque  
 est, neque adeo esse perpetua potest; & præterea  
 animadvertendum est, in intestino quidem esse  
 jugiter succos qui diluant, & motus qui promo-  
 veant bilem; non autem in vesicula. De  
 tertia nondum constat, utrum in homine, de quo  
 potissimum quærimus, locum habeat; & si e-  
 tiam haberet, aliud tamen probaret atque id  
 quod in prima quæstione positum erat.  
 Quartam ut ex Doctissimo Bohnio facile exscri-  
 ptis, ita animadvertere poterat, judicio Gravissi-  
 mi ejus Viri nihil aliud probare, nisi a ductu  
 hepatico *aliquid* bilis folliculo infundi.  
 Restat observatio quinta: in Viperis scilicet ve-  
 siculam ab hepate prorsus disjunctam, ac solo me-  
 atus sui cystici interventu cum poro bilario commu-  
 nicantem, „ judicandum relinquere, non tantum bile  
 „ impleri ductum hepaticum rigante, sed insuper to-  
 „ tam pene ejusdem ductus sarcinam ad eandem vesi-  
 „ culam devehere. „ Cui quidem observationi satis  
 esset opponere, in aliis vero animantibus, &  
 nominantim in multis avibus ductus cysticum,  
 & hepaticum seorsum pergere, & seorsum inte-  
 stinum pertundere, ut in iis bilem ab hepatico  
 in cysticum ire non posse, manifestum sit. Ve-  
 runtamen de ipsis Viperis hoc quoque addam:  
 me nunc quidem descriptionem, aut iconismum,  
 quibus istæ earum Partes magis ad vivum exhi-  
 beantur, non habere, quam quæ Blasius in suæ  
 Anatomes Animalium Parte V. quæ est de Ser-  
 pente, edidit: nisi quod in Viperis non observa-  
 vi, ductum hepaticum, & cysticum communi-  
 care per ramum *i*; sed manifesto vidi (qua de  
 re in serpente ipse dubius hæret) in communem  
 ductum coire, interdum postquam corpusculum  
 e, quod & ipse Pancreas judico, jam attingere,  
 alias vero paulo ante quam ipsum attingant, sci-  
 licet ad *i*. Quæ cum ita sint, ex ipsa Blasii Fi-  
 gura intelligi potest, quam difficile sit, *totam*  
*pene* bilem quæ per hepaticum ductum descendit,  
 per cysticum ad vesiculam ferri; non enim ea  
 via est, ut in homine, brevis, & declivis; sed  
 proportionem observata valde longa, & maxime  
 retroversa. Huc adde, me nonnunquam in Vi-  
 peris id observasse quod ante etiam in Cuniculo  
 videram, & non raro Canibus Malpighius adno-  
 taverat, plures videlicet ductus hepaticos, vel ut  
 exactius in Vipera loquar, ex hepatico profici-  
 scentes, infra cystici concursum in communem  
 ductum confluere. Alia prætermittimus cum  
 ex iis quæ hætenus cursim adnotavimus, co-  
 gnosci satis possit, num ex istis *nervosissimis* Ob-  
 servationibus conficiatur, totam pene bilem ex  
 ductu hepatico in cysticum digredi; quamvis hic  
 magnifice concludatur: „ Quod erat proban-  
 „ dum. „

## ANIMADVERSIO XXVI.

**P**orro ut bilem, quam pene totam in vesicu-  
 lam detrudit, inde extrudat: huic operi con-  
 gruam potentiam dicit se *invenisse*, pervulgatam  
 scilicet in hanc rem ventriculi per vices turgentis  
 compressionem, quam non modo ab ingestorum  
 mole, sed sine ulla dubitatione etiam „ a fer-  
 „ mentativa rarefcentia quadam, deducit. Et hic  
 pariter „ circa ventriculi actionem ad bilis bursu-  
 „ lam, faventes habet tres observationes conspi-  
 „ cuas. „ Prima est, „ quod in animalibus  
 „ post longam inedia m evisceratis, cum flaccido,  
 „ & concidente ventriculo, exuperanti semper  
 „ bilis copia turgescens, & plena cystis offendi-  
 „ tur; in aliis autem „ contra. Non hic dicam  
 non videri ipsum id observasse in canibus ex ine-  
 dia denatis ut in quibus infra scribit, se „ vesi-  
 „ culam fellei „ (non quidem bile plenam) sed tan-  
 tum „ bilem adhuc continentem „ vidisse. Il-  
 lud potius dicam, supra ipsum scripsisse: „ in a-  
 „ nimalibus fame extinctis intestina copiosa bi-  
 „ le referta adnotari; „ Cum ejusmodi autem ob-  
 serva-

379

Circul.  
Anatom.  
Prog. 17.De viis  
bilis in  
Vipera.Blasii  
Tab. 60.  
Fig. 9.Exercit.  
de Hepa-  
te.

380

380

383

377



servatione non sane ita *conspicuum* est quomodo ista altera consentiat, in iisdem semper turgentem, & plenam bile vesiculam inveniri, aut quomodo cum eadem consentiat, non dico id potissimum quod supra statutum ab ipso est: obliquam ductus communis insertionem, adjectamque carunculam, biliosæ quantitatis in intestina influ-  
 379. xum, nullo alio naturaliter præterquam chylo-  
 380. seos, (quæ hic quidem nulla est), tempore  
 380. permittit, sed dico id in primis quod statuere nunc intendit: nisi accedat ventriculi (qui hic quidem *flaccidus* est) turgentis compressio, nullam vel in distenta vesicula esse vim, qua possit bilem extrudere, & objectis omnibus obstaculis victis, in intestina compellere. Secunda observatio est, quod, cervus, equus, aliaque  
 380. bruta, quæ -- pene continuo devorant, si eis  
 381. finitur, -- fellis vesicula carent, prout per-  
 381. petua stomachi turgescencia eam receptionis bil-  
 381. liaris impare, ideoque inutilem redderet; dum  
 381. cæterum ob ejus defectum profluit indefinen-  
 381. ter per ductum hepaticum absque diverticuli in-  
 381. terruptione bilis ad intestinum, ibidem ad con-  
 381. tinuam pene functionem necessaria. At si  
 381. bilis, profluit indefinenter; num bruta de  
 381. quibus hic loquitur, obliqua illa ductus inser-  
 381. tione, & caruncula etiam carent; an vero usus  
 381. huic insertioni, & carunculae supra adscriptus est  
 381. nullus? Præterea si in istis brutis bilis, profluit  
 381. indefinenter; quomodo infra scribit: de facto  
 381. in animalibus cysti destitutis, ut columbis, equis,  
 381. mulis, cervis &c. canales bilarii suppleant hanc  
 381. vicem receptaculi; non secus ac in avibus cloa-  
 381. ca supplet vices vesicæ urinariæ; nam  
 381. ex avium quidem cloaca, renum excrementum in-  
 381. definenter non profluit. Non ergo ita *conspicua* est  
 381. hæc secunda observatio, sed ne id quidem, quid  
 381. sibi velit. Nam cum statuatur, columbas etiam cy-  
 381. sti carere; num id quoque *conspicuum* esse dicet,  
 381. in his, perpetuam esse stomachi turgescenciam;  
 381. in tot autem aliis avibus quæ cysti non carent, non  
 381. esse? Verum enimvero quibus tandem animalibus  
 381. turgentia ista major, aut diuturnior contingit,  
 381. quam ruminantibus? His tamen cystim datam esse,  
 381. non negat. Sed addit, ob id ipsum quod rumi-  
 381. nant, non assiduam, sed, interpolatam in iis  
 381. esse biliosi affluxus necessitatem. Fateor; sed  
 381. illud tamen contendo, aut non minorem, aut etiam  
 381. majorem esse a nondum ruminatis, ut pote plus  
 381. spatii occupantibus, quam a ruminatis cibis tur-  
 381. gentiam ventriculi. Igitur ante tempus cystim com-  
 381. primeret, & bilem in intestinum extruderet. Post-  
 381. remo quæ bruta sunt cane, aut lupo voraciora?  
 381. Columba tamen cysti caret; ipsa non caret; imo  
 381. (idque in tertia observatione ponitur) lupo, at-  
 381. que ursus illam habent, proportionaliter gran-  
 381. diorem, & attiguam magis ventriculo. Non  
 381. quæram hic, utrum id verum sit; quanquam in  
 381. urso a Parisiensibus observatum sciam, vesiculam  
 381. fellis longe esse quam in leone minorem, in quo  
 381. Borrichius observavit esse mediocrem; dabo, esse  
 381. grandiolem; sed illud quæram, num hæc anima-  
 381. lia quæ agnoscit esse, voraciora, & vegetius chy-  
 381. lificantia, minus sæpe voratura sint quam  
 381. cervus, quam equus, in quibus tamen ob id ipsum  
 381. nullam vesiculam esse vult; quam in urso, &  
 381. lupo contendit esse grandiolem. Nimirum ita  
 381. *nervosis*, ita *conspicuis*, ita inter se consentien-  
 381. tibus observationibus utitur; qui etiam dum com-  
 381. parationem illam addit: sicuti valida extensio  
 381. aortæ, per alternas diafoles ad glandulas lum-  
 381. bares facta, impetit adeo cisternæ vicinæ parie-  
 381. tes, ut liquida contenta per perpendiculares vias  
 381. thoracicas -- propellat; sic etiam robusta sto-  
 381. machi per vices expansio &c. nonne pergit  
 381. nervosa, conspicua, & sibi constantia proponere?  
 381. Nam quid nervosius, quam ab arteria magna ad  
 381. ventriculum in re hac transilire? quid magis  
 381. conspicuum, quam per extensionem aortæ ad  
 381. glandulas lumbares factam, cisternam vicinam  
 381. comprimi; quasi vero chyli receptaculum ipsum

per se aorta non contingeret? quid denique ma-  
 376. gis constans, quam supra in enumeratione viarum  
 379. chyli a glandulis lumbaribus ad ductum thora-  
 380. cicum transire; hic autem præter lumbares glan-  
 380. dulas cisternam addere? Eiusdem constantiæ est  
 380. *annulum* cystis *fibrosus* supra censuisse vix ac ne  
 380. vix quidem esse attendendum; hic autem eundem  
 380. potens ex se satis retinaculum esse, dicere:  
 380. hic agnoscere, perfici quiescentem bilem, & ad  
 380. chyloseos operam præparari, evectis, explicatis,  
 380. ac nobilioris fermentatis activioribus elementis  
 380. suis; supra autem, in cervo, equo, aliis-  
 380. que brutis, ad continuam pene eandem functio-  
 380. nem, indefinenter absque diverticuli interrup-  
 380. tione bilem ad intestinum profluere.

## ANIMADVERSIO XXVII.

Am vero transeamus ad Ductus Cyst-hepati-  
 381. cos, sive mavis Hepati-cysticos, quos, pa-  
 381. tientis curiositate, & exactissimo flatu, cultri,  
 381. oculi ministerio, perscrutatū se esse, dicit.  
 381. Sed ut melius æstimare possimus, quantum denique  
 381. in his profecerit, animadvertenda sunt duo, al-  
 381. terum: etsi ipse distinet: horum omnium ca-  
 381. nalium usum ad unicam bilis in recipiens suum  
 381. deportationem decantatum fuisse; re tamen  
 381. vera plures ante annos conclusum esse a Verheyen-  
 381. io: ejusmodi, ductum se se nonnunquam exo-  
 381. nerare in ductum hepaticum; quando nimirum  
 381. vesicula per meatum cysticum non tempestive  
 381. deponit suam sarcinam; alterum: quod hic  
 381. dicitur: in grandiorum animalium jecinore reperta  
 381. primo fuisse hæc vasa, ad humanum inde & he-  
 381. par appropriata; id etiam post *improbos* hu-  
 381. jus labores verum esse; ut qui bruta, in quibus  
 381. se se exercuit, memorat; humanum autem jecur  
 381. ne in tota horum ductuum descriptione memo-  
 381. ret, diligenter cavet. Itaque sic habendum est:  
 381. quamvis in humana etiam vesicula certa quædam  
 381. oscula, aliquam styli portionem admittentia in-  
 381. terdum saltem videamus; gravissimos tamen Ana-  
 381. tomicos, & in his Cowperum, dubios hæere an  
 381. semper occurrant, multoque magis an cum hepa-  
 381. tico ductu communicent; nam neque ea quæ in  
 381. brutis, in homine ad id ostendendum valent ar-  
 381. tificia, & familiare illud Verheyenio argumen-  
 381. tum: ita in brutis; ergo & in homine: quam  
 381. sæpenumero fallax sit, liquet. Igitur etsi fieri  
 381. potest, ut hæc omnia in cæteris etiam animanti-  
 381. bus, ipsoque adeo homine retegantur; interea  
 381. tamen tota hæc commentatio in perpauca tantum  
 381. brutis locum habet. Et in his quidem de-  
 381. prehendiisse se fatetur, minutos etiam illos ductus  
 381. ad ipsam hepatis substantiam desinere creditos,  
 381. non minus ac reliquos, ex ipsismet pori bilarii  
 381. ramis exoriri. At quid affert quo id credere  
 381. possimus? In hepate, inquit, suillo, quod  
 381. erat ultimo præ manibus, -- duos solum ad  
 381. pori propagines -- insequi poteram. Quot  
 381. autem revera sunt? Numerosissimi, inquit,  
 381. sed ob exilitatem inquirentium anatomicorum  
 381. operam facile eludentes. Is ergo mihi se  
 381. invenisse absolute confirmabit, minutos etiam  
 381. istos ductus cum ductu hepatico communicare,  
 381. cum in ea quam unicam affert, observatione  
 381. de tanto ductuum numero duorum, non am-  
 381. plius, communicationem se vidisse, fateatur?  
 381. Age nunc aliud videamus quod *precipue*, atque  
 381. *attentius* observasse se, dicit. Minuti, inquit,  
 381. isti ductus, ramositates habent suas, ad ductum  
 381. hepaticum, & ad minus duobus principiis ex  
 381. eo pullulant: quæ inde ramositates ante vesicæ  
 381. contactum in cespitem coalitæ, eo inde unico  
 381. in eam aperiuntur. Cæteri ductus, contra  
 381. truncum habent suum ad ductum (hepaticum)  
 381. diramationes autem qua parte communicant  
 381. cum vesicula; in quam non unico trunco, sed  
 381. intrant principiis ad minus duobus. Insuper so-  
 381. lum primi illi ductus, oblique in cystis tunicas  
 381. inse-

De Ducti-  
bus Cyst-  
hepaticis,  
sive Hepa-  
ti-cysti-  
cis.  
381.

I. r. tr. 2.  
c. 17. quod  
in I. Edit.  
est c. 15.

Anatom.  
of. hum.  
Bodies.

loc. nuper  
citat.

382

Apud  
Blas. Anat.  
Anim. P. I.  
c. 40.  
Ibid. c.  
23.



„ inferuntur , ac tuberculo ad eorum hiatum do-  
 „ nantur ; non autem cæteri . „ Primos illos in-  
 fra appellat *Hepati-cysticos* , cæteros *Cyst-hepati-*  
*cos* . Hisce observationibus innituntur quæ dein-  
 de proponit , ea scilicet ex quibus „ maximam  
 „ in animali machina utilitatem animadvertere se „  
 dicit . Mittamus quæ supra diximus , hæc con-  
 trahenda esse ad bruta illa perpauca , & priorem  
 observationem non satis esse probatam . Has tan-  
 tum ultimas cum Observationibus comparemus Vi-  
 ri in his persequendis ductibus exercitati , & cu-  
 jus peritia , ac diligentia nobis aliquanto magis  
 spectata sit quam istius Scriptoris . Verheyenius  
 igitur , quemadmodum exhibet in ea Figura quæ  
 tibi 16. est in Tabula LXIII , sic observavit ,  
 atque descripsit . Ductum illum D , quem iste  
 appellaret *Cyst-hepaticum* propterea quia truncum  
 habet c ad ductum hepaticum , ramos autem ad  
 vesiculam , in quam non unico trunco , sed intrat  
 principiis duobus 1. & 2. , ductum , inquam ,  
 illum ad duos illos suos hiatus in vesicula sin-  
 gulis ad singulos *tuberculis* donari , vidit : quod  
 non nisi primo ductum generi , hoc est Hepa-  
 ti-cysticis convenire , iste dicitur . Contra , du-  
 ctum istum alterum D , cuius id omnino pro-  
 prium esse , contendit , quoniam ex eorum ge-  
 nere est qui uno orificio in vesicula aperiuntur ,  
 scilicet ex Hepati-cysticis ; Verheyenius vidit  
 maximo quidem orificio 3. hiantem , sed minus  
 conspicuo , quia non , ut duo illa orificia priora ,  
*tuberculo prominebat* . Et si nulla videantur pro-  
 ferri posse quæ isti magis adversentur ; unum ta-  
 men adhuc observavit Verheyenius , atque ex par-  
 te descriptione , ex parte Figura eadem lucu-  
 lenter ostendit , quod istius cogitata omnia  
 funditus evertit : rivulorum videlicet qui in u-  
 trumvis genus istorum canalium plurimi confluent ,  
 illos quidem qui ductui hepatico sunt viciniore ,  
 eo modo in istos canales tendere , ut transitus  
 ab his in illum facilius appareat ; eos autem  
 qui circa alterum canalium extremum influunt ,  
 sua insertionem magis ipsam vesiculam respicere .  
 Provocet jam iste ad Doctissimum Bellinum ,  
 atque ajat , esse ab hoc in Dissertatione de  
 Motu Bilis demonstratum : bilis cursum „ in-  
 „ fallibiliter a cavitatibus minoribus in ma-  
 jores dirigi , seu a ramis in truncum , non  
 „ autem e contra . „ Nos quoque ad eundem  
 provocabimus , atque admonebimus esse ab ipso  
 in eodem loco demonstratum : bilis cursum dirigi  
 per truncum *versus obtusum* influentium rivulo-  
 rum *angulum* , non autem contra , id est eam ver-  
 sus plagam quam ramusculorum in ductus hosce  
 convenientium insertio magis respicit , non e con-  
 trario . Itaque judicandum videtur : intra hujus-  
 modi truncos bilem ex una quidem parte in ve-  
 siculam , ex altera in ductum hepaticum fluere ,  
 nisi tamen causa quæpiam nova interdum totam  
 cogat in alterutram partem fluere : cuius rei gra-  
 tia credibile est , truncos ita esse factos ut hinc  
 in vesiculam , inde in ductum hepaticum desi-  
 nant . Non est igitur „ hoc curiosum ( sic  
 „ enim vocat ) vesicæ felleæ , ductuumque bilia-  
 „ riorum commercium ita duplicatum „ & con-  
 stitutum , ut existimat .

## ANIMADVERSI O XXVIII.

**H**ic juvat me ab istiusmodi Hepatica Historia  
 defessum , quasi in aliquod peropportunitum  
 divertorium , ad subjectam a te Notulam pau-  
 lisper digredi . Bidloum in suis Vindiciis ob-  
 servare , scribis , Cystis felleæ Calculos aquis in-  
 natate , atque igne totos comburi . Eos *aquæ*  
*innatate* , jam olim Fernelius ( cuius deinde ipsa  
 fere verba , quamvis nomen omiserit , exscripsit  
 in Anthropographia Riolanus ) in Pathologia ad-  
 notaverat : quod & nos aliquoties experti sumus .  
 Igne vero totos comburi cum multo sæpius exper-  
 ti sumus ; nonnunquam tamen aliquanto aliter rem  
 se habere deprehendimus . Qua de re , & de calculo-  
 rum eorundem structura non injucundum est pau-  
 Morgagni *Adversaria Anat. III.*

ca scribere , fortasse etiam non prorsus inutile .  
 Cum enim hujus naturæ calculos interdum per al-  
 vum exturbari , observatum sit a Medicis , & no-  
 minatim ab eodem Fernelio , cumque adeo ipse annis  
 superioribus apud V. Cl. Vallisnerium nostrum  
 unum ejusmodi viderim , qui ut , præcedentibus  
 ventris cruciatibus acerbissimis , dejectus fuerat ,  
 ita quid esset , & unde esset , non omnes faci-  
 le intellexerant ; idcirco non frustra hic ea at-  
 tingentur unde facilius , cum excreti fuerint ,  
 dignoscantur . Quod ergo aquæ immersi , non  
 ut ii qui de urinaria vesica extrahuntur , in imo  
 subsideant , sed innatent , supra dictum est .  
 Quod vero non utcumque comburantur , sed flam-  
 mam alant , sic olim Bononiæ deprehendi . Ex-  
 traxeram de fellea mulieris cujusdam vesica cen-  
 tum & viginti fere calculos superficie omnes sic  
 satis firma , & lævigata , sed varia magnitudine ,  
 atque etiam figura , quanquam omnes , uti ferme  
 solent , a cuboidæa longissime non aberant .  
 Mecum erant , ut plerumque , pro communi re-  
 rum naturalium studio , & singulari inter nos  
 amore Jacobus Bartholomæus Beccarius Professor  
 Bononiensis Eruditissimus , & Heraclitus Manfre-  
 dius Clarissimorum Virorum Eustachii , & Ga-  
 brielis Frater , ætate minor , non ingenio . Hi  
 ex illis calculis unum cum lucernæ forte admo-  
 vissent , turgere , & ebullire primo calculus , &  
 nihil ingratum olere , tum flammam concipere ,  
 atque servare , in guttas colliquatus decidere , &  
 subinde inter ardendum cum levi crepitu scintil-  
 lare , denique ad extremum usque flammam alere ,  
 ut neque ita perstantem , neque ita claram ea  
 alat cera quæ ad epistolas obsignandas ex usu  
 est . Alios flammæ admovimus ; & omnes ea-  
 dem præstiterunt . Exinde ego observationis  
 confirmandæ percupidus , quos primos in alia ve-  
 fica fellea comperi calculos , eos statim lucernæ  
 admovi ; sed leves quidem crepitus edidere , flam-  
 mam autem non servavere . Quod quidem peculiari  
 vitio ejus in qua concreverant , bilis accidisse , arbi-  
 tror , cum hi calculi non modo in flamma non li-  
 quefierent ; & quod capilli olent combusti redo-  
 lerent , ac longe friabiles essent , sed præterea in-  
 tus , forisque ita nigricarent , potius ut carbo-  
 nes quam calculi esse viderentur ; quando illi pri-  
 mi tum omnia quæ ante docuimus , post annos  
 duodecim adhuc præstant , tum intra plura fla-  
 vescentia plerumque strata , & tot quasi lineolis  
 ad centrum tendentibus distincta , flavam bilem  
 ( primis diebus mollem , post in nucleum ex ob-  
 scuro croceum concretam ) manifesto , atque ele-  
 ganter concludunt . Quinimo cum paulo post mi-  
 hi ad manum rediissent subvirides quidam calculi  
 quos duorum & septuaginta numero in alia cysti  
 fellea tribus ante mensibus inveneram , nucleum  
 ejusdemmodi biliosum continentes ; hi flammam  
 aluerunt , & cætera omnia quæ primi illi , ob-  
 servanda nobis præbuerunt . Aliud quoque ,  
 discindendo primos illos , & hosce ultimos calcu-  
 los , & discissos conferendo , animadverti , vide-  
 licet secundum calculorum primorum stratum vi-  
 ride esse , primum vero ex albo flavum , quod cum  
 nondum hisce ultimis calculis superinductum per-  
 fecte esset , hinc subvirides apparebant . In non-  
 nullis autem ex primis illud etiam observavi : ea  
 strata se se alternatim excipere , videlicet ut pri-  
 mum ex albo flavum , & secundum viride erat ,  
 sic tertium ex albo flavum , quartum autem viri-  
 de esse . Ex eo tempore de omnibus quos in  
 vesicula inveni , calculis ( tot autem , & toties in-  
 veni , ut ego quidem . Mangere , non dubitem , quin  
 si omnes qui inveniuntur , ab Anatomicis asserva-  
 rentur , *pro usu Medico* possent *sufficere* ) qui sub-  
 flavis illis , aut subviridibus fuerunt similes , ii  
 flammam servavere ; qui autem nigris illis ; quo  
 ex genere invenisse unum memini qui nigredine ,  
 granosa superficie , ac magnitudine morum repræ-  
 sentaret ; hi flammam non servavere .  
 Calculos autem nigros in bile ex atro flava , cæ-  
 teros illos magis obvios in pallida sæpius memini  
 depre-

Ib id.

Ibid.

Prop. 30.

De cystis  
felleæ  
Calculis .1. 2. c. 22.  
1. 6. c. 5.



deprehendisse. Et mihi quidem forte contigit, ut ex neutris ullam unquam peculiarem noxam, sed ne ictericum quidem colorem iis in quibus comperi, inductum esse, observaverim.

## ANIMADVERSIO XXIX.

**S**ed redeamus ad Historiam Hepaticam, in qua posthac, ne infiniti simus, ex pluribus quæ notanda essent, quædam indicabimus potius quam notabimus. Et primum inter causas motum sanguinis per venam cavam urgentes, valis amplitudo, & brevis a motus impulsu distantia, ponitur. Ad ductus biliarios in hepatis concavo nullæ occurrere dicuntur musculares, potentia; quasi proximi diaphragmatis alternus motus nihil valeret, nihil posset. Modus quo Boyleus, & Papinius ossa in liquidam substantiam solvunt, familiare exemplum, esse dicitur. Affirmatur: ventriculum digestivæ elixationis tempore, jam in inferiori orificio a sphinctere, & mechanica tortuositate occlusum, in altero insuper, seu superiori orificio ab adjacentibus visceribus, sinistrorsum a lienis corpore, dextrorsum, & præcipue a glandiori, & magis accumbente Hepatis mole premiti adeo, & constringi, ut tanquam operculis, stricte appositis occlusus transpirare non sinat, activiores menstrui salivaris particulas a digestivo conflictu exaltatas, ac extricatos jam ipsiusmet massæ cibariæ spiritus. Quæ si ita traduntur perinde ac si ab his visceribus superius orificium tam occludi posset, quam inferius est occlusum; animadvertendum est, inferius ipsum orificium non ita esse occlusum, ut non modo spiritus, sed & satis elaborata ac tenuior chymi portio subinde illac non egrediatur; lienem vero præsertim, ad orificium superius non sic pertinere: si vero hæc ita traduntur, quasi ea viscera ventriculi parietes sic obducerent, ut eos spiritus non sinerent egredi; profecto neque eosdem parietes totos obducunt, & per eos parietes per quos ipse paulo post docet ingredi, halitus illos calidos, humidosque ex calido humidoque hepate expirantes, qui inde in ventriculi cavum penetrati, ad ciborum solidiorum eliquationem una cum saliva facessant, per eosdem, inquam, quare spiritus non egrediantur? In vipera scribitur & summe energeticum esse stomachi munus, & hepar non tantum supra, & circa ventriculum, sed usque ad duodenum protendi. Sed primum non probatur; imo per mirum est, inter voraciora animalia viperam recenseri, quæ, Redio teste, ad decimum usque mensem inedia toleret; alterum num ita sit, dubito. Negatur, quidquam, clarius illustrare posse partium fistulæ intestinali adjacentium munus ad digestorium opus humido earum calore fovendum, quam omenti v. g. disjunctionem a dicti canalis incubatu in variis morbosis casibus succedentem, quam inde notabilis excipit indigestionis habitus. Et tamen ipse olim Riolanus adversus ejusmodi omenti usum insurgere non dubitaverat propterea quia, multoties in vulneribus, & herniis viderat magnam omenti portionem abscissam sine ullo depravata coctione, in incommodo, & apud Forestum legerat, juvenem, ablato omento, absque ullo ventriculi detrimento vixisse. Denique, Celiaca primum aortæ emissarium, esse dicitur; quod evidentissime falsum est. In Portæ autem trunco, & diramationibus tertiam circiter partem totius sanguinis in homine existentis continuo residere, sine ulla dubitatione pronunciatur; quod saltem maxime incertum est. Hæc tamen duo ex iis sunt unde illud eruitur: usum esse hepatis secundarium, ut sanguinis diverticulum, sit, ideo nominatim necessarium, quia ob exercitia fortiora, aut irregularia animi pathemata sanguis turgescit; quasi vero hepatis substantia prompte, ac pro re nata ad modum laxiorum membranarum valde cedere atque extendi possit. Ne id tamen in dubium revocare quis audeat, ejus subicitur, non demonstratio tantum, sed plena demonstratio, scilicet ubi scribitur: Usus hujusmodi Hepaticum plene demonstrant, hemorrhagiæ narium in levibus etiam hepatis, & lienis obstructionibus ordinario accedentes. Quæ quidem num ita ordinario tunc accedant, omnium, quicumque medicinam faciunt, judicium esto. Eorundem quoque erit judicare, num, facilius quam hæcenus fuerit, iste morbos hepatis omnes internoscat, inter se se, & desque suas, differentias, & causas discriminet, quemadmodum inter initia II. hujus Historiæ Partis non obscure pollicetur. Certe cum toties hallucinatus sit in iis, quæ ad hepatis theoriam spectant, in hæcenus examinata Parte I; non est difficile arguere quo I. ejusdem Partis *manuductione* perducere potuerit in II. com-  
plectente ea quæ ad hepatis morbos pertinent; in quorum tamen, signis nihil immoratur, hac videlicet addita admiranda ratione, quod, stylo utitur historico. Sed quoniam tu istam totam II. Partem sapienter omisisti, & nos multa quæ in eadem notanda essent, omitemus. Quæ tamen ne qualiæ sint, quæras; de multis quam paucissima sic per transennam indicabimus; Ut, os, sa quædam duriora ad tantam redigi molliem possit, se, ut instar ceræ versari facillime possint in omentum sensum in sano quo ad cætera homine, hoc est sine ullo *vicio fluidi* universalis: Ut, De sensum, sive Prolapsum hepatis, ligamentorum, ejus omnium relaxationi deberi; quasi vero ipse venam umbilicalem inter hepatis ligamenta non posuisset; aut hujus umbilicalis ligamenti relaxatio ad prolapsum hepatis pertineret: Ut, vesiculæ fellæ perruptionem sæpe in cadaveribus occurrere: Ut, suspectam jure esse dicere, apertionem ad exteriora hypochondrii ad abscessum Hepatis eo tramite foras elutriandum; & per paucis paginis interjectis, ubi de cadavere agitur in quo ingentem hepatis *meliceridem* compererant, intempestivam increpare Chirurgi formidinem a se in tumoris invalescentia sæpius ad apertionem stimulatam: Ut non ferenda non modo etymologiæ, verum etiam medicorum vocabulorum ignorance docere: Atheroma dici, ci a Medicis a materia sua sevo simili; Schea, toma autem ab humore lento, & glutinoso pul-  
tem, aut cremorem referente: Ut, in generalibus viscerum abdominis obstructionibus, quemvis legitime affirmare posse, primogenitam, fuisse obstructionem Hepatis: Ut, præcipuam ad vitam animalis facientem secretionem, biliosam esse: Ut denique (ne cum perpau-  
cissima hic promiserim, plura proferam), flatus, eo frui in animalibus imperio, ut libere per universi corporis ambages, non secus ac vermium semina, celerissimeque expatiari possint. Itaque ut sapienter fecisti, quod hæc prætermiseris, ita sapientius fecisti quod iis quæ attuleras, Amplissimi Lancisii Epistolam subjeceris. Ex hac enim, quamvis incredibili, ut is solet, humanitate scripta, Lectores tamen attenti facile intelligent, Virum Gravissimum, Historia Hepatica perlecta, nihilominus diserte ea ipsa affirmare quæ in illa negantur. Non enim credit, nihil in hepate Malpighium nisi nomen glandulæ innovasse, sed veras *glandulas*, veros *glandularum folliculos* adhuc agnoscit. Non credit lymphatica vascula, in extima, solum superficie capsulæ, subsistere, sed censet, lympham quæ antea bilis particulis intermixta erat, absorbere. Non credit in primis id quod in Historia maxime inculcatur, ea ratione bilem fecer-  
ni qua Auctor proposuerat; sed ipsius *diligentiam* non obscure desiderat, imo apertissime, duo illa, in quibus totam explicandæ rei rationem posuit, sibi nullo pacto probari posse, dicit, ac minime de-  
cere diligentem, solertemque Anatomicum, in rebus *hæere* istiusmodi. Quid multa? hominem cogit non modo, velut supra dictum est, ut quæ  
demon-

rum membranarum valde cedere atque extendi possit. Ne id tamen in dubium revocare quis audeat, ejus subicitur, non demonstratio tantum, sed plena demonstratio, scilicet ubi scribitur: Usus hujusmodi Hepaticum plene demonstrant, hemorrhagiæ narium in levibus etiam hepatis, & lienis obstructionibus ordinario accedentes. Quæ quidem num ita ordinario tunc accedant, omnium, quicumque medicinam faciunt, judicium esto. Eorundem quoque erit judicare, num, facilius quam hæcenus fuerit, iste morbos hepatis omnes internoscat, inter se se, & desque suas, differentias, & causas discriminet, quemadmodum inter initia II. hujus Historiæ Partis non obscure pollicetur. Certe cum toties hallucinatus sit in iis, quæ ad hepatis theoriam spectant, in hæcenus examinata Parte I; non est difficile arguere quo I. ejusdem Partis *manuductione* perducere potuerit in II. com-  
plectente ea quæ ad hepatis morbos pertinent; in quorum tamen, signis nihil immoratur, hac videlicet addita admiranda ratione, quod, stylo utitur historico. Sed quoniam tu istam totam II. Partem sapienter omisisti, & nos multa quæ in eadem notanda essent, omitemus. Quæ tamen ne qualiæ sint, quæras; de multis quam paucissima sic per transennam indicabimus; Ut, os, sa quædam duriora ad tantam redigi molliem possit, se, ut instar ceræ versari facillime possint in omentum sensum in sano quo ad cætera homine, hoc est sine ullo *vicio fluidi* universalis: Ut, De sensum, sive Prolapsum hepatis, ligamentorum, ejus omnium relaxationi deberi; quasi vero ipse venam umbilicalem inter hepatis ligamenta non posuisset; aut hujus umbilicalis ligamenti relaxatio ad prolapsum hepatis pertineret: Ut, vesiculæ fellæ perruptionem sæpe in cadaveribus occurrere: Ut, suspectam jure esse dicere, apertionem ad exteriora hypochondrii ad abscessum Hepatis eo tramite foras elutriandum; & per paucis paginis interjectis, ubi de cadavere agitur in quo ingentem hepatis *meliceridem* compererant, intempestivam increpare Chirurgi formidinem a se in tumoris invalescentia sæpius ad apertionem stimulatam: Ut non ferenda non modo etymologiæ, verum etiam medicorum vocabulorum ignorance docere: Atheroma dici, ci a Medicis a materia sua sevo simili; Schea, toma autem ab humore lento, & glutinoso pul-  
tem, aut cremorem referente: Ut, in generalibus viscerum abdominis obstructionibus, quemvis legitime affirmare posse, primogenitam, fuisse obstructionem Hepatis: Ut, præcipuam ad vitam animalis facientem secretionem, biliosam esse: Ut denique (ne cum perpau-  
cissima hic promiserim, plura proferam), flatus, eo frui in animalibus imperio, ut libere per universi corporis ambages, non secus ac vermium semina, celerissimeque expatiari possint. Itaque ut sapienter fecisti, quod hæc prætermiseris, ita sapientius fecisti quod iis quæ attuleras, Amplissimi Lancisii Epistolam subjeceris. Ex hac enim, quamvis incredibili, ut is solet, humanitate scripta, Lectores tamen attenti facile intelligent, Virum Gravissimum, Historia Hepatica perlecta, nihilominus diserte ea ipsa affirmare quæ in illa negantur. Non enim credit, nihil in hepate Malpighium nisi nomen glandulæ innovasse, sed veras *glandulas*, veros *glandularum folliculos* adhuc agnoscit. Non credit lymphatica vascula, in extima, solum superficie capsulæ, subsistere, sed censet, lympham quæ antea bilis particulis intermixta erat, absorbere. Non credit in primis id quod in Historia maxime inculcatur, ea ratione bilem fecer-  
ni qua Auctor proposuerat; sed ipsius *diligentiam* non obscure desiderat, imo apertissime, duo illa, in quibus totam explicandæ rei rationem posuit, sibi nullo pacto probari posse, dicit, ac minime de-  
cere diligentem, solertemque Anatomicum, in rebus *hæere* istiusmodi. Quid multa? hominem cogit non modo, velut supra dictum est, ut quæ  
demon-

c. 1. §. 1.

in. Præf.

c. 1. §. 3.

c. 2. §. 4.  
supr. 366

c. 3. §. 3.

c. 5. §. 6.

Ibid. §. 18.

Ibid. §. 10.

Ibid. §. 14.

c. 6. §. 14.

c. 11. §. 4.

386.

387.

386.

372.

384

384.

385

Degli  
Animali  
Viventi,  
& Osserv.  
int. alle  
Vipere.Anthrop.  
l. 2. c. 13.



388

„ demonstrata a se esse , jactaverat , „ vix pusilla  
 „ conjecturæ face evadere , agnoscat ; sed ut post-  
 „ quam significavit , velle se „ invios quaterre ul-  
 „ terius recessus „ „ incipiat ab iis ipsis quæ incassum  
 scripserat in Historia , iterandis . Cætera autem  
 quæ addit , quam nihil sint , hic ostenderemus ,  
 nisi ex his quæ scripsimus supra , id colligi satis  
 posset . Ex quibus eo facilius spero te quoque ,  
 Mangere , collecturum , esse quæ „ pro Hepatis ple-  
 „ na descriptione post Peregregii hujus Viri in id  
 „ adhibitam sedulitatem desideretur ; „ quo aper-  
 388. tius id fateri in hoc demum loco te , video ; nam  
 quæ „ ex elaboratissima Historia Hepatica exscri-  
 „ psisti , ita sufficere dicis pro visceris structura ,  
 „ & muniis intelligendis , „ ut tamen „ alia ad  
 „ eandem explicationem ulterius facientia „ in  
 duabus proximis Tabulis continuo subicias . De  
 quibus jam nonnulla dicemus .

## ANIMADVERSI O XXX.

**E**T primum Tabulæ LXII. Figuram 1. ut apud  
 Bidloun , ita apud te esse inversam , ajo .  
 Quo de Bidloi errato si Scalptores tuos monuisses ,  
 longe ipsis facilius fuisset in ea Figura describen-  
 da illud vitare , quam sequi . At quando Scalpto-  
 res non monuisti , utinam Lectores saltem mo-  
 nuisses , & Tirones præsertim , qui haud satis  
 scient , magisne huic , an tertiæ quæ est ex Re-  
 verhorstio , Figuræ , imo an quartæ quæ ex eo-  
 dem est Bidloo , credendum sit . Iisdem quar-  
 ta hæc ipsa Figura aliquid negotii facesset propter  
 errores alios quosdam Bidloi , a te diligentius ,  
 quam ejus verba servatos ; nam littera C , & S  
 non simplices , & uno in loco , sed duplices , duo-  
 busque in locis exhibes ; pro Canali autem Venoso  
 de quo ad litteram S , cum ut ego cenfeo , &  
 Glissonii , ac Kerckringii Tabulæ satis confirmant ,  
 id quod est inter G , & H , ostendendum esset , id  
 quod est inter H , & F ostendis . Illud tamen  
 vel Tirones ipsi in hac Figura animadvertent , quam  
 parum ramusculorum Venarum Cavæ , & Portæ  
 inter se directiones cum iis consentiant quæ ab Au-  
 ctore Historiæ Hepaticæ proponuntur ; nec mirum ,  
 cum ipsa quoque Bidloi verba adversentur , quæ in  
 Explicatione Figuræ 1. ad litteras K. K a te profe-  
 runtur . In iis autem Figuris quas in proxima Tab.  
 LXIII. ex eodem Bidloo exhibes , etsi est ubi tuam  
 diligentiam desiderem ; nam neque 3. est satis ac-  
 curate descripta , & in 4. frustra id perquiritur  
 quod ab ipso ad E litteram monstratur ; contra  
 atque in 17. , quæ ex Verheyenio est , in qua ,  
 perperam geminata littera C , Ductus etiam Com-  
 munis pro Ductu Hepatico ostenditur ; tamen hæc  
 missa faciam , & ad nonnulla quæ ex Solertissimo  
 Ruyschio exhibentur , descendam . Ex Figura igitur  
 7. ejusque Explicatione intelligere omnes po-  
 terunt de iis Glandulis quas olim Malpighius in  
 suilla , & ovilla vesicula observaverat , quid Ruy-  
 schio videatur . Nimirum ab Summis duobus hisce  
 Anatomicis vel aliud agentibus , eæ Glandulæ jam  
 olim fuerant luculenter propositæ de quibus Historiæ  
 Hepaticæ Auctor in prolixo , & ea inscriptione or-  
 nato Opere vix obiter fecit mentionem , & iis qui-  
 dem verbis , ut cum , utrum ipse admittat , igno-  
 res , tum illud certe satis intelligas quod addit :  
 378. „ Bilem per hæc glandulas fecerni , ridicula est ali-  
 „ quorum confabulatio . „ Qui humanissimus lo-  
 quendi modus quam gratus sit futurus , haud scio ,  
 non modo Sylvii Sectatoribus , de quo fortasse il-  
 le intellexit , verum etiam æquis æstimatoribus Mal-  
 pighii , & Ruyschii quibus illa eadem verba non  
 satis cavent , ut qui licet a Sylvii opinione lon-  
 gissime abierint , portionem tamen aliquam ejus  
 bilis quæ in vesicula continetur , ab iis Glandu-  
 lis prodire , existimarunt , ut ex Adnotatione a  
 te supra exhibita , & Malpighiana de Liene Dis-  
 sertatione satis constat . Structuram autem intimæ  
 superficiei Vesiculæ , imo & Meatus Cystici ,  
 Ductuumque Hepatici , & Communis ne memo-  
 ravit quidem ; de qua tamen non modo hic Ruy-

schius , sed & Malpighius in eadem Dissertatione  
 verba fecit , illam in bove , sue , equo , piscibus , &  
 homine ipso parum ab ea differre docens quæ in  
 ventriculo , & intestinis piscium , & boum obser-  
 vatur , in quibus scilicet cellulæ quædam , seu  
 inæquales areæ ex parum assurgentibus , & se se  
 interfecantibus parietibus spectantur . Et sane ele-  
 gantissimum illud rete , quo etiam in homine me-  
 moratorum Ductuum , & Vesiculæ nominatim  
 superficies instruitur , non ex simplicibus fibris ,  
 sed ex membranulis tenuissimis constructum ,  
 describi aptius non potest , quam cum Ruminan-  
 tium Reticulo comparando . Aliæ hujus Tabu-  
 læ Figuræ quam discrepent ab Historiæ Hepati-  
 cæ commentis , supra indicatum est . Itaque ad  
 alia transeamus .

## ANIMADVERSI O XXXI.

**T**Ua sequitur Renalium Glandularum Historia  
 non modo nullis , quod in ejusmodi Thea-  
 tro mirandum est , subnexis earum Figuris , sed  
 iis ipsis quas eidem Historiæ , in Bibliotheca  
 Anatomica ex Whartono ( quamvis parum accura-  
 te descriptas ) interferueras , detractis . In de-  
 scribenda etiam earum structura deficiis . Nonnul-  
 la enim post Whartonum in iisdem observavit  
 Malpighius , nonnulla etiam Fantonus ; quorum  
 Solertissimorum Hominum ne nomen quidem hic  
 reperio . Nec vero , quod dicis , „ in earum de-  
 „ scriptione præcipuam non consistere difficul-  
 „ tatem , „ ita verum fortasse est , & quando es-  
 set , non tamen propterea ad „ totius Anatomix  
 „ ideam non parum accuratam , „ qualem qui-  
 dem in Præfatione vel per ipsas Tabulas pollici-  
 tus eras , exhibendam , quidquam de structura  
 Partium decebat omittere . Nec prætereundus  
 facile erat Verheyenii dissensus , qui diserte „ er-  
 „ rare eos dicit qui scribunt , humorem earum  
 „ Glandularum absorberi a venis , & sanguini mi-  
 „ sceri in vena emulgente , cum venæ non hient  
 „ in illarum cavitatem ; „ quapropter se alienum  
 non esse ab eorum sententia , ostendit , qui pecu-  
 liares earum ductus adhuc incognitos esse , existi-  
 mant . Ac quamvis nihil hic ego dicturus sim  
 quod ita accipere velim quasi inter ejus , & alio-  
 rum , atque adeo tuam sententiam judicarem ;  
 dissimulare tamen non possum , si istæ Glandulæ  
 „ inserviant sanguini a renis post lotii serosi se-  
 „ parationem redeunti , ideoque minus fluido , a  
 „ coagulatione , & coitu servando , „ ut tu cum  
 Sylvio existimas ; satis non intelligi , cur ita in sæ-  
 tu magnæ sint , quando ab hujus sanguine plus  
 feri per renes separari , non est verisimile , neque  
 cur earum humor ibi sanguini non addatur , ubi  
 hic subsistere , & coire facilius potest , videlicet  
 intra renes , sed demum intra emulgentis venæ  
 ramum , imo intra ipsum ( nam eo sæpe istarum  
 Glandularum venæ influunt ) Cavæ truncum , in  
 quo ab reliqui sanguinis copia satis diluitur .  
 Atenim Natura Glandulas hæc prope renes per-  
 petuo collocavit ; quasi vero easdem prope alias  
 ulla Partes præterea non collocasset , ac nomina-  
 tim prope Chyli Receptaculum , Ductusque Tho-  
 racici initium . In quæ si eas conjicerem per vasa  
 lymphatica continenter lympham immittere aut  
 ad chylum diluendum , aut ad vias patulas , lubri-  
 casque servandas ; non ita fortasse mihi officeret  
 memorata earum in fœtibus magnitudo , cum in  
 his aut nullas sit chylus , & sic majori lymphæ  
 copia ad eas vias apertas servandas opus sit , aut  
 sit quidem chylus , sed perpauca , sed sub o-  
 tiante diaphragmate , & sic ad eum promo-  
 vendum multo plus lymphæ requiratur . Verum  
 id qualiscunque exempli potius , quam conjecturæ  
 proponendæ gratia dictum sit .

369.

Epist. de  
 Gland. su-  
 pra 227.  
 Anatom.  
 Diss. 7.

392.

De Renum  
 Succentru-  
 riorum  
 Usu.  
 l. 1. tr. 2.  
 c. 19.

395.

Vid. &  
 Heist. in  
 Eph. N. C.  
 Cent. VI.  
 Tab. V.  
 Fig. 2.

390

Exercit.  
 de Lien.  
 supr. 360

378.

379 360



## ANIMADVERSI O XXXII.

**J**Am vero de Renibus dicendum est; de quorum *generali descriptione* quidquid præmittis, id fere omne ita ex Verheyenio exscriptum est, ut plerumque ne verba quidem ipsa mutaveris. Per pauca interferis, sed ne hæc quidem tua, Renum videlicet Etymologiam in libris Anatomicorum vulgatam, & alia ejusdemmodi, qualia sunt exempla Renum numeri interdum vel imminuti, vel aucti, quæ fere omnia, atque alia præterea jam olim collegerat, atque ediderat Blasius: quo in loco admirandum est, te de „uni-“, co tantum reperto „Rene dicentem, eas minime observationes memorare, in quibus is non in medio, sed ab altero latere inventus est; cum tamen hæc ita sint præ illis frequentiores, ut quo nos tempore Bononiæ fuimus, non modo a Cl. Valsalva acceperimus, id sibi & in Monacho, & in cuniculo visum, verum etiam is quem supra laudavimus, Manfredius in Adolescente, & nos ipsi in catella observaverimus, ita omnes quidem, ut manifestissime constaret, alterum renem non morbo absumptum fuisse, sed a primordiis defuisse. Mallem, aliquid Verheyenio addidisses ex quo ejus sententia eluceret, ubi dicit, *inæqualem* ut plurimum in homine renum „situm eo-“, rum muneri convenire; „tu autem hanc non modo non illustriorem, sed & obscuriorem reddis, dum ita exscribis, ut num de hepatis munere, an de renis dicatur, incertum sit. De Renum figuræ, superficiei, ac magnitudinis varietate quædam nemini (non dico Anatomico aliquantum exercitato, sed lectori) non obvia interferis; illud autem facile tuum, quod Renum „longi-“, tudo super quatuor prope vertebra extendatur: „illud quoque tuum, quod interior Renum tunica „sine adhærentis substantiæ laceratione avellatur; „nam Verheyenius quidem scripserat, „absque notabili substantiæ adhærentis laceratione. „Protrita sunt quæ de connexionem addis; quod autem de nomine arteriarum & venarum emulgentium; videlicet sic „ab officio „vocari, id vero ad venas præsertim quod attinet, inter Recentiores est inauditum.

397 Tandem aliquando Verheyenium nominas, quasi istic solum ab eo sumeres, a quo quæcunque supra, atque infra habes, fere omnia sumpsisse, omnes deprehendent qui utriusque verba conferre voluerint. Atque ut reliqua prætermittam, num magis ipsius peculiaris est observatio, in qua ipsum nominas, de emulgentium numero, an vero altera, in qua haud nominas, de isto eorundem vasorum ramo qui ab rene ipso egressus cum vasis spermaticis videtur communicare? Nam quem Eustachius in Tabula tibi I. Fig. 4. ad litteram „ & Fig. 5. ad litt. *b* delineaverat, ad Tunicæ Adiposæ vasa pertinet, quæ quam ad Renem ipsum non attineant, illa etiam catella in qua nos alterum deesse renem, vidimus, confirmare poterat; nam cum ipse quidem ren suis cum vasis deesset, ejus tamen exterior membrana quæ plerisque in canibus vix dici potest adiposa, tanta adipis copia redundabat, ut primo aspectu subesse renem, crediderimus. Cæterum num ille ramus reapse ita, & semper se habeat, tu quidem videris; quemadmodum num facilius sit ea ratio ostendendi vasa Renum lymphatica quam pro Verheyenii ratione substituis. Nam de nervis quod addis, ne ipse quidem ignorabat, ut alibi luculenter ostendit; quod autem de aucto interdum Ureterum numero a te observato, id vero, neque illi, ut ipse nosti, neque cæteris inauditum, nobis etiam ipsis aliquando observatum est. Cum autem ajo, quæ tu addis, vulgata esse, haud sane propterea improbo atque contemno; hoc dumtaxat volo, non esse tanti, ut ob hujusmodi pauca interjecta additamenta descriptionem istam, non ut Verheyenii, sed ut tuam proponere debueris. Nam ista dempta observatione, quid demum de

ipsis quoque Ureteribus hic affers quod ex Verheyenio non exscripseris, nisi illud forte quod cum is ita scripserit: Ureteres qua Pelvim constituunt, „facile ad amplitudinem pollicis expandi; „tu ita scribis: „in amplitudinem pollicis ad minimum capacem extendi. „Re autem vera quod ille scripsit, tanto minus a vero abesse, crediderim, quanto certius memini, de sex Pelvibus, a me nuper in variis cadaveribus examinatis, unam pollicis capiendo parem, cæteras autem prorsus impares fuisse. Erat tamen aliquid quod hic melius Verheyenio posses tum, ut alibi dicemus, addere, tum etiam in ejus dictis mutare. Non enim ita verum est, Ureteres in Pelvim expandi *in renibus*, five, ut tu loqueris, „antequam ex „renibus egrediantur, -- & Pelvim esse cavitatem reni intrinsecam; „Siquidem Ureteres jam antequam Renem attingant, incipere solent sensim in Pelvim dilatari. Hujus autem divisio in duos primum, interdum & tres majores ramos etsi plerumque intra eum oblongum sinum, seu quandam quasi fissuram quæ in concava Renum parte ad vasa etiam excipienda secundum longitudinem insculpta est, delitescit, parietibus cum Renum substantia non cohærentibus, sed interjecto adipi ab eadem disjunctis; tamen id, quod etiam Eustachium vidisse, video, tum Cl. Santorinus, tum ego non ita raro observavimus, ut illa quoque ipsa Pelvis divisio extra eum sinum extaret, ramis non amplius in unam caveam (nam Malpighius id aliquando videtur vidisse) intra Renem coeuntibus. In his autem omnibus rebus ita frequens varietas est, ut sæpe in uno eodemque cadavere neque initium Pelvis, neque amplitudo, neque ramorum numerus, neque ipsius divisionis locus in utroque Rene, quamvis secundum naturam constituto, ad eundem modum se habeant.

## ANIMADVERSI O XXXIII.

**Q**Uæ sequuntur, jam in Bellinianæ Dissertationis Argumento in Bibliotheca Anatomica edideras, in qua ea quoque omnia video quæ ad Malpighii Dissertationem hic adnotasti, excepto uno vel altero verbo quod de celebratissima illa Cl. Littrii Observatione addidisti „qua „nulla hæcenus, inquit Eruditissimus Fantonus, „indagandæ renum structuræ majorem lucem videtur attulisse, „& de qua ego memini cum alios bene doctos Malpighii Sectatores, tum nominatim Ingeniosissimum Virum Dominicum Gulielminum, ita loquentes audivisse, ut quicumque eam observationem perpendissent, eos ad Malpighianæ Renum structuræ comprobationem nihil præterea desiderare posse, judicarent. Verum neque Gulielminus, neque Fantonus, neque alii qui ad hunc modum censuere, satis esse existimarunt de ista observatione ea tantum novisse quæ tu profers. Vis enim ipsius potissimum est non in istis quas exhibes, sed in aliis quas omittis ejusdem Littrianæ Tabulæ Figuris, vel potius in exacta illa intimæ vesicularum structuræ, ac canaliculorum in ipsas influentium, & ab iisdem discedentium descriptione quam Littrius quidem proposuit; tu vero ne uno quidem verbo attingis, aut indicas. Ex illo enim structuræ modo non obscuro, non abnormi, non dissimili, sed perspicuo, sed summo artificio atque elegantia perfectio, sed in ambobus renibus uniformi & constanti, ac denique observato jam in sanis corporibus a Malpighio satis consentaneo, ex eo, inquam, colligendum illi existimarunt, non fallacem, & quæ vi morbi fortuito contigerit, phasim eam fuisse, sed certam, naturalemque structuram ab retento intra molles adhuc, atque ideo cedentes particulas lotio amplificatam solum, atque detectam. Hæc igitur ea sunt per quæ Malpighii Affectu apparere satis, credunt inter arteriarum capillamenta, & eos canaliculos ex quorum fasciculis renales papillæ compinguntur, Glandulas, hoc est vesiculas inter-

De Renum  
Pelvi.  
Ibidem.

Tab. ad  
Theatr. I.  
Fig. 9.  
lit. n.  
Exerc. d  
Ren. in-  
fra 404.

402  
Anatom.  
Diff. 7.

De Renum  
Structura.



370

De quibus-  
dam mor-  
bos Re-  
num Cel-  
lulis.

Ad Re-  
num, alia-  
rumque  
Glandula-  
rum stru-  
cturam  
manife-  
standam  
Cogitatum.

405

Aliud ad  
examinan-  
dam sen-  
sentiam  
quorundam  
de Renum  
in semine  
præparan-  
do utilita-  
te.

intercedere, non autem istas solum vasorum contorsiones; „ quorum dilatationi, aut etiam per-  
ruptioni „ istiusmodi structuras cum tu deberi  
dixisti, satis putas omnia conciliasse: quod ut non-  
nulli fortasse credant qui eam Littrii observatio-  
nem apud te legerint; illos certe qui apud ipsum  
Littrium legent, non facile esse arbitror creditu-  
ros. Nam ut de me ipso fatear; si forte illas  
grandiores Cellulas quas aliquoties vidi sub pro-  
pria membrana Renum alte intra hos conditas,  
irregulâri figura, nullo manifesto orificio pervias,  
& urina, aut certe humore urinæ simillimo plen-  
as, si illas, inquam, Cellulas ex obstructis, &  
sic dilatatis, aut etiam disruptis excretoriis cana-  
liculis deduceres, non valde repugnarem; de ista  
vero tam elaborata structura quam Littrius vidit,  
non facile adduci possum ut assentiar. Cæterum  
ex ista Littrii observatione aliquando mihi venit  
in mentem: si in canibus, aut aliis animalibus  
recens natis, & in quibus ideo facilius cedere  
Partes queunt, ureter, aut alius etiam Glandulæ  
ductus excretorius ligaretur, & deinde animal  
quo diutius liceret, vivum servaretur, majorem  
fortasse ab hoc experimento fructum ad Glandu-  
larum structuram cognoscendam capi posse, quam  
ex ligatura venarum, aut etiam eorundem du-  
ctuum in adultis instituta capiatur. Sed & ea  
quæ Malpighius in istius suæ de Renibus Dissert-  
ationis calce attingit, nunquam legi, quin ani-  
madverterim, siqui forte sint qui ad feminis præ-  
parationem tantum Renibus tribuendum putent  
quantum olim Viri plures Doctissimi tribuerunt  
quorum nomina, atque argumenta Bartholinus  
commemorat, & tueri conatur; in eorum senten-  
tiæ examine prætermittendum non esse illud alte-  
rum experimentum in quo, rene altero exempto,  
animal, ut Experimentissimus Zambeccarius osten-  
dit, in vivis servatur. Justo enim spatio tempo-  
ris interjecto, quid in subjecto teste, aut ovario,  
horumque contentis accidisset; siquid tamen acci-  
disset; observari posset, dummodo (quod inter-  
dum facile, & præsertim in sinistro rene eximen-  
do, posset contingere) nullum de vasis spermaticis  
læsum esse, constaret.

## ANIMADVERSI O XXXIV.

Tab. 110.  
F. 34.  
De Pelvis,  
& Ureteris  
Vasis  
sanguife-  
ris.

De Renum  
superficie,  
huiusque  
Vasis.  
l. 1. tr. 2.  
c. 18. Tab.  
12. Fig. 1.  
litt. B.

398.

Quod reliquum est; in adjecta Tabula LXIV.  
primum lætor, Figuram I. jam non hic,  
ut in Bibliotheca Anatomica, inversam exhi-  
beri. Deinde vasa sanguifera qualia secundum  
Pelvis, & Ureteris longitudinem tum in hac,  
tum in proxima, aliisque Cl. Ruyschii Figuris  
pinguntur, talia nullo calculo in Uretere subsi-  
stente, nulla injecta cera, vidisse me, memini in  
nonnullorum cadaveribus qui sine ulla sanguinis  
effusione repentinam mortem obierant, in quibus  
etiam, dum Renem comprimerem, sanguis per  
ea vasa deorsum ruebat, eademque magis ex-  
pandebat. Quod autem Ruyschius (cujus tu  
Figuras duas num. 3. notatas exhibes, sed  
unam tantum explicas, oblitus videlicet alterius  
in qua papillam ex tribus papillis compositam  
pingit) quod, inquam, Vir iste Oculatissimus  
pluribus Figuris in Renum superficie vascula san-  
guifera ostendit in modum vermiculorum contor-  
ta, id multo magis dubia ea reddit quæ a Verhe-  
yenio & descriptione, & iconismo traduntur de  
iisdem vasculis ibidem quasi stellulas repræsentan-  
tibus. Et Malpighius quidem „ miros vaso-  
rum ramos sub extrema renum superficie lati-  
„ tantes quandoque conspici, „ supra docuit eo  
ipso in loco, ubi „ rotunda quædam, & brevissi-  
„ ma corpora ad instar exigüorum vermium cir-  
„ cumvoluta „ in eadem Renum superficie appare-  
re, dixit. Sed hæc omnia ille quidem oculis mi-  
croscopio instructis observavit. Ego autem iner-  
mibus oculis in terrestri, & marina testudine Re-  
num superficiem quasi ex tot contortis intestinulis  
cerebri anfractus imitantibus compactam obser-  
vasse, memini, eandemque structuram, quæ in ter-

restri certe testudine interius etiam spectabatur;  
in viperarum quoque renibus vidisse. Humano-  
rum autem Renum superficiem quotiescunque iner-  
mibus oculis inspexi, eorum quidem substantiam  
in confertos & compressos quasi globulos minu-  
tissimos distinctam videre visus sum, quos singu-  
los circumvoluta ad ipsorum basim sanguifera vasa-  
cula ambirent. Quorum vasculorum ut pleraque  
ad hunc modum vidi plerumque disposita, sic eo-  
rum nonnulla semel tantum atque iterum aut uno  
dumtaxat in loco, aut certe in perpaucis inveni  
stellulas imitantia, non tamen exacte, sed ea  
prorsus ratione qua non modo in facie interna  
urinariæ vesicæ interdum vidi, verum etiam in  
superiorum Tabularum LI. Figura II. circa me-  
dium, & LIX. Fig. 7. ad supremam litteram C,  
ac LIII. Fig. II. ad litt. D; ut alias omittam;  
spectantur. Ex quibus intelligere omnes pote-  
runt, istam Verheyenii; qualis ea cunque est; ob-  
servationem nec esse perpetuam, & multis etiam  
aliis Partibus esse communem.

## ANIMADVERSI O XXXV.

Quid attinebat in superiore Capite Ureteres  
describere, quos hic eras iterum descriptu-  
rus? At de ipsis ibi, inquis „ egimus  
„ uno verbo; hic autem specialius. „ Uno qui-  
dem, vel altero tuo verbo (nam pleraque Verhe-  
yenii fuerunt) descripsisti; verum id ipsum cum  
supervacaneum fuit, tum etiam admirandum est,  
quod eorundem canalium bis data descriptione,  
ipsum tamen neque recte, neque plene, neque con-  
stanter describeris. Non enim recte describis,  
cum „ a renibus proficisci, & egredi, „ utrobi-  
que dicis, quasi vero ipsa infima cui continuantur,  
pars Pelvis extra Renes esse, atque extare  
non soleret. Non plene describis; ut enim mit-  
tam eorum in ipso extremo, quo in vesicam  
hiant, orificio coarctationem, & carnea duo cor-  
pora in quæ ipsos produci, in I. Adversariis ad-  
monui; utrobique omittis ab aliis etiam propo-  
sita, ut eam diametri inæqualitatem de qua dictum  
est in Adversariis II. quæ videlicet causa est cur  
sæpe inter descendendum ad vesicam, in ipsis Ure-  
teribus subsistant calculi: ut eam pro cavitatis ra-  
tione parietum crassitudinem, qua etiam, opi-  
nor, efficitur ut hi aliquanto facilius obsistere di-  
stentis intestinis, atque utero possint, ne uri-  
næ viam premendo intercludant: ut demum  
Glandulas lentum quendam ac lubricantem humo-  
rem secernentes quo Ureteres adversus urinæ in-  
jurias muniantur; quæ quidem Glandulæ in dila-  
tatis Ureteribus interdum a me quoque observatæ  
sunt. Non denique constanter describis; supra  
enim dixeras, „ nervos accipere a trunco interco-  
„ stali, ac lumborum medulla; „ hic autem  
„ nervos ais admittere a sexto pari, & a lum-  
bis: „ quo in loco ut inconstantia in re ipsa re-  
prehensionem effugere fortasse possis; in vocabulis  
quidem rerum satis effugere non potes; qua ex  
una inconstantia summa apud Lectorum multos  
obscuritas hic existat, necesse est. Ex iis au-  
tem quæ subijcis de Vesica, quot demum sunt  
quæ ex Bartholini Anatome quartum renovata non  
sumperis? Quod dum cupis aut res transponen-  
do quasdam, aut verba hic illic mutando dissimu-  
lare, non semel laboris. Ita enim intentus es ad  
ea quæ ex Borrichio duobus in locis ille addu-  
cit, in unum jungenda, ut quæ de Vesicæ vasis  
interjicit, prorsus excidant, atque ita in tota  
Vesicæ Historia nihil de ejus nervis, de ejus vasis  
sanguiferis nihil dicas. Num autem quod ille  
scripserat: „ De fibris sphincteris accuratius quæ  
„ observavit Borrichius noster merentur expen-  
„ di; „ num, inquam, tu recte sic mutaveris:  
„ De fibris sphincteris accuratius hæc observavit  
„ Borrichius; „ si quidem Bartholini sententiam  
sequi voluisti; judicent Grammatici; si vero ab  
eadem recedere; judicent Anatomici. Hæc  
te, Manete, ex quo hanc ipsam Ureterum, &  
Vesi-

397  
407

De Ureteribus.

num. 9.

Animad. 47.

397  
407.

l. 1. c. 20.

408.



Vesicæ Historiam in Bibliotheca Anatomica edideras, intra tot annos haud animadvertisse, eo magis mirandum est quod hanc eandem Historiam te nuper recensuisse, constat ex duobus potissimum locis in quibus Bartholini verba non dispari felicitate mutavisti. Cum enim ille scripsisset: „ adeo ut quæ pulmonem non habent animalia, „ vesicam quoque non habeant, „ cumque tu olim hæc ipsa verba descripsisses, nunc eadem sic rescribis: „ adeo ut quæ pulmonem non habent animalia, si quæ talia dentur, vesicam „ quoque non habeant; „ quasi vero constare tibi possit, an Vesica non sit in iis animalibus, quæ ipsa an sint, non constet. Ille etiam scripserat: „ cervix carnosæ est, quæ vulnerata „ propterea coalescit, cum cætera vesicæ vulnera sint lethalia ut plurimum ex Hippocrate. „ Hæc tu olim his verbis exscripseras: cervicis „ substantia cum præcipue carnosæ sit, incisa „ facile coalescit, ut id quotidie qui cystotomiam passi sunt, experiuntur, secus quam in „ vesicæ vulneribus, quæ ut plurimum lethalia „ sunt, accidit. „ Nunc istud *ut plurimum* in aliquando mutavisti, non animadvertens scilicet, cervicis etiam vulnera aliquando esse lethalia, atque ita omnem istius comparationis vim concidere, atque evanescere. Sed alia alias fortasse notabimus. Nunc ad tuæ istius finem Historiæ properemus.

## ANIMADVERSIO XXXVI.

De acubus  
intra Vesicam  
reptis.

Qui acus, & olera, atque alia istiusmodi ab ore in vesicam descendisse, tradiderunt, iis „ fraudem factam suspicaris, cum hæc per „ aliam forsan semitam, ipsam nimirum urethram „ in vesicam clanculum seu in viventibus, seu in „ mortuis intrudi potuerint. „ Ego vero, Mangete, etsi in plerisque ejusmodi narrationibus subesse fraudem, facile suspicer, ut qui res istas nonnunquam in matulis præfuisse, alias etiam a libidinosis mulierculis in vesicam ea ipsa qua tu credis via intrusas esse, deprehenderim; nimis tamen durum existimo de narrationibus iis omnibus idem judicare, imprimisque de illis ex quibus constat intra viventium virorum vesicam non ita parvas acus fuisse. Non est enim virilis urethra *nonnihil* tantum, ut tu supra de ejus parte hic potissimum attendenda scribis, *contorta*, sed adeo inflexa est, ut iis qui ipsam in sua inspexerint sede, non ita proclive sit intelligere qua ratione illac ad vesicam pervenire acus potuerint.

Vid. in  
Ephem.  
N.G.Cent.  
V. Obs.  
26.

Num peculiare  
via pro  
urina, ut  
vocant, potius  
ad Vesicam  
sint admittenda.

Quæ tamen dum scribo, cave credas, me ex eorum esse numero qui pro urina, ut vocant, potius prompte ad vesicam deducenda, ductus quosdam a ventriculo, & intestinis ad vesicam tendentes comminiscuntur. Hos enim ductus qui ponunt, eos nunquam credo quid contingat illis animadvertisse qui ob suppressam vitio renum urinam decedunt. Cum enim his tot potiones a multis sæpe Medicis ingerantur; quæro quid causæ sit cur nihil earum per hos ductus in vesicam descendat? Hærent enim calculi, aut aliæ ejusmodi causæ in renibus quare nihil quidem urinæ, ut vocant, sanguinis haberi possit. At in ventriculo, at in intestinis quid causæ tum hæret quare per eos saltem ductus ita, ut putant, crebros, ita patentes nihil urinæ potius delabatur? Attamen ejusmodi ægri nihil mingunt, & postquam demum obiere, omne (si quidem cadit sub sensus) in renibus vitium, nullum in ventriculo, nullum in intestinis, & nihil urinæ in vesica observatur. Quid ergo est? Eas acus aut per vias quas ex intestinis ut alio etiam interdum, quemadmodum observatum est, ita in proximam vesicam sibi sensim faciant, aut per alias quas cum tot præterea rebus homines ignorare, non est mirum, eo pervenire, libentius crediderim, quam aut per virilem urethram, aut per eos ductus, quos commentitios esse, satis, ut opinor, ex iis quæ sunt dicta, intelligi potest. Quod reli-

quum est, non mirari nequeo, te qui in naturali Vesicæ constitutione, quæ ad tuum institutum unice pertinebat, describenda vix unam paginam impleveris, ejus morbis quinque, aut sex paginas tribuere. Atenim vesicæ Casauboni historiam proferre placuit, cujus fabrica, ut a communi discreparet, non tamen tota credita est morbo, sed primævæ etiam constitutioni deberi. Ego quidem eo potius adducor ut totam morbo deberi credam, cum in strenuo quodam Potatore in quo ad summam vesicæ partem duas a dextris subrotundas cellulas inveni, singulas cerasi majoris capaces, singulis orificiis lupini diametro cum vesica, cui parietum structura consimiles erant, communicantes; aliarum ejusmodi cellularum initia in reliquo etiam fundo observaverim; nam in quibusdam quasi areis quæ a majoribus vesicæ laceratis ambiebantur, tunica jam extrorsum cedere incipiebant. Ejusdemmodi quoque cellulam cum fellea mulieris cujusdam vesicula communicantem vidisse, memini, & certis ex notis morbosam judicasse. Itaque a laxiore quibusdam in locis parietum structura, & ab nimia interdum retenti humoris copia ejusmodi Vesicarum Dilatationes, atque, ut ita vocem, Hernias deduco. Sed quando alii aliter maluerunt, fac, cellam istam Casauboni vesicæ adnatam a primordiis præextitisse; nonne poterat, ut Bartholinus, eam totam fabricam perpaucis verbis proponere? Cur ergo tot alia, curque duas præterea Epistolas „ de Calculis, & Caruncularum Vesicæ extractione „ quas cum priore in Bibliotheca Anatomica edideras, hic iterum addidisti? Nimirum Librorum moles nullo labore sic crescit; cui rei magis quam susceptæ spartæ pro tua virili portione ornandæ nisi tu, Mangete, studuisses, non his profecto istam quoque „ Mechanismi in Vesicæ Collo „ ab Historiæ Hepaticæ Auctore *deteſti* non minus fabulosam quam prolixam *Explicationem*, quamvis tibi „ honorificentissime interscriptam „ superaddere voluisses. Num enim ista „ sit appropinquata, me utilis, num apprimè demonstrat id quod Diligentissimus, ac Curiosissimus ille Anatomicus intendit, haud scio an proclivius tibi fuerit pro tua facilitate verbo affirmare, quam mihi sit pro veri studio prolatis rationibus, atque observationibus contrarium ostendere.

De Dilatationibus  
quibusdam,  
& quasi  
Herniis  
utrinque  
Vesicæ.

Anatom.  
quart. re-  
nov. l. 1.  
c. 20.

414.

## ANIMADVERSIO XXXVII.

Principio „ fundi vesicæ, cervicis, colli, & „ urethræ „ pro sua auctoritate *confinia legitima* statuit; pronunciatque ideo, „ in foeminis „ urethram non adesse. „ Si id sibi concedi postulasset, ut in hac Explicatione uti divisione illa, & nominibus ita posset, non erat facile concedendum propterea quia istiusmodi appellationes tam imperite selegit, ut earum usu *confusionem* non *declinet*, sed augeat; quis enim assuescere possit longe alii rei intelligendæ, cum *vesicæ colum* legerit, ac cum legerit *cervicem vesicæ*? At non id postulat; sed, ut dixi, secure statuit, atque pronunciat; quasi vero qui vim vocum non intelligit, eum cæteris præscribere verum esset qua ratione loquerentur. Sed cum tu ipse, Mangete, in tua superiore Vesicæ descriptione ne verbum quidem mutaveris, ut ad hujus præscriptum loquerere; tanto minus cæteros id existimo esse facturos; itaque ad ulteriora veniamus. „ Rum- „ punt, inquit, in scopulum cuncti Anatomici: „ describunt vesicæ sphincterem, & non reperiunt. „ Quid ergo? Num Falloppius, num Cowperus, num Fantonus quod non viderunt, describere? num quod se vidisse, testantur, non videre? Nolo quidquam gravius dicere, præsertim cum manifestum sit, tantis Viris mea defensione, meæ observationis confirmatione opus non esse; quis enim de ejusmodi Hominibus id possit existimare? Illud tantum dicam quod longe credibilis est, quodque adeo de isto musculo scripsit Falloppius: „ inexercitatis dissectoribus non adesse potius,

415.  
De Vesicæ  
Sphincte-  
re.

Observ.  
Anatom.



„tius, quam adesse videtur. „Atenim Falloppius, & cæteri quod non est, viderunt; quod autem est, non viderunt, „non advertentes sci- „licet movere prostatas, & abradere, ut statim „oblatum sibi, panumque subter -- notabilem „musculum videre possent; -- faciem internam; „& totam prostatarum corpore lambentem suo, „-- in quo fibrarum ordines -- distincte circula- „res, fasciales, seu annulares observantur, „quem hic *verum, seu legitimum sphincterem* nuncupat. Ego vero qui vel olim prima statim perquisitione illum Falloppii Sphincterem & vidi ipse, & aliis ostendi; in tribus cadaveribus continenter dissectis, quorum vel minimæ quæque fibræ carneæ longe erant conspicuæ, frustra prostatas movi, frustra quanta maxima potui diligentia abradi, frustra & ipse oculorum aciem intendi, & eos qui aderant, Auditores meos, quorum nomine duos potissimum intelligi in his cunctis Adversariis volo, a me plurimum in secando, observandoque exercitatos, Jo. Baptistam Vulpium, cujus opera in publicis utor dissectionibus, ac Julium Pontederam Philosophiæ, & Medicinæ Doctores, ut ipsi quoque intenderent monui; non modo enim non *musculum notabilem*, sed ne unam quidem muscularem fibræ in toto eo tractu videre potuimus.

## ANIMADVERSI O XXXVIII.

De Vesicæ  
Tunicis.408  
416

**D**E Pseudosphinctere infra; de glandulis autem illis omnibus de quibus hic sermonem interjicit, in illa ipsius Animadversione videbimus in qua & de iisdem glandulis, & de nobis longe aliter verba facit. Nunc quid de Vesicæ Tunicis scriptitet, videamus. Externam ea „solertia „quam tu ut plurimum satis inutilem „esse, „jam agnovisti, „in duplicem manifeste portio- „nem dispesci posse, affirmat, propaginem sci- „licet peritonæi, & planum quo hæc ulterius „obtegitur, musculare: -- quod quidem plexibus „adiposis abradis, non secus ac musculares aliæ „omnes partes rubescat intense. „Sed dispesci posse, dicat quantum libet; modo is qui *confusionis declinandæ* gratia usque adeo laborare se ostendit, ipse quid dicat, intelligamus. Atenim, eam portionem hujus tunicæ quæ a peritonæo est, „obtegi plano muscolari. „Utrum vult, hoc *planum* exterius esse, illam vero alteram portionem esse interiorem; an contra? Si primum, cur hoc discrimen non inculcat quod inter extimam tunicam vesicæ, & tot aliorum viscerum intercedit, in quibus peritonæum ipsum extimum est? Si alterum, cur dicit, *obtegi*? Et mihi quidem has tunicas sæpius in cadaveribus examinanti in quibus muscoli valde rubebant, *planum musculare* live in externa, five in interna facie exterioris vesicæ tunicæ, adiposis etiam cellulis quantumvis abradis, oblatum est nunquam. Vidi quidem ipsam tunicam, antequam cultrum admoverem, subrubentem; sed accurata adhibita perquisitione etiam vidi, eum ruborem a subiectis, innexive sanguiferis vasculis, non a fibris muscularibus, provenire, ut valde suspicer, eum ruborem quem a mora, & sanguinolentæ alius Partis diuturno contactu membranæ contrahunt, huic homini imposuisse. Omnino enim in fibris carneis statuendis nimium tribuere rubori videtur. Itaque cum in tunica externa adstruxerit musculum; in media, quam plures Summi Anatomici Musculum vocant, ne unam quidem fibræ carneam agnoscit. „Media, inquit, tunica alba, & tendinea est, ex glomis „fibrarum tendineis robustis, torosis. „Hæc vero illa ipsa tunica est de qua vel olim Falloppius sic admonuit: „dum carnosam dico, non „ita rubicundam carnem videre expectes, qualem in musculis, sed subalbidam, qualem in „ventriculi, ac intestinorum tunicis videre potes. „Et reapse tot illi *robusti*, ac *torosi* qui in ipsa spectantur, fibrarum fascies, non albi, non

Observ.  
Anatom.

duri, videlicet non tendinei sunt; sed, ut conferendo perspexi, & colore qui ex cinereo albicat, & consistentiæ modo illas carneas fibras æmulantur quas, tenuiores licet; in tribus muscularibus Coli fasciis observamus. Quid multa? Neque Fabricius ab Aquapendente, neque Spigelius, neque Cowperus qui hanc tunicam Musculum esse, censuerunt, neque adeo; ut alios innumeros prætermittam; tu ipse, Mangete, quin eæ fibræ carneæ essent, dubitasti non modo in hoc, verum etiam in quarto Capite Libri I. quo in loco etiam illum de quo supra dictum est, Falloppianum Sphincterem agnovisti, quanquam quod ad hunc attinet, nonnulla verba Cowperi, quem ibi innominatum vertis, de Sphincteris loco perperam omittis; quod vero ad istas fibras, non nisi eas quæ „per vesicæ longitudinem exporri- „guntur, „commemoras. In tunica demum interna *curiosissimum rete* subindicat; sed „dege- „re glandulas ad ipsam „negat, contendens multis verbis; per hanc earum dumtaxat tubulos transmitti, ipsas autem glandulas per areas mediæ tunicæ „de facto assidere, „& quidem „pa- „tenter obvias. „Quod ultimum si verum est, tu potissimum videris, Mangete, cur supra in Vesicæ descriptione res *patenter obvias* prætermiseris; nam quicumque illas „ad tunicam intimam „degere, hucusque putarunt, „non se reprehensos, sed collaudatos existimabunt, si *patenter obvium* sit, eas immediate eandem tunicam contingere, quod videlicet idem est atque *ad ipsam degere*. Quod autem ad *rete* illud *curiosissimum* attinet; ego quidem antequam Adversaria I. edderem, in una tantum, atque altera vesicæ muliebri, nulla adhibita præparatione, in extrema cer- vice, & prima urethræ parte fere circumcirca, sed præcipue posterius corpus quoddam reticulare minutissimis areis, sive mavis rete elegantissimum vidi; *curiosissimum* non vidi. Sed ad gravia, atque ad institutum pertinentia redeamus.

Vide su-  
pra Ani-  
madv. 14.supra 408  
45.

## ANIMADVERSI O XXXIX.

**C**Um supra in Vesica Sphincterem negavit, non obscurum fuit quid ageret, nimirum ut ipsi vesicæ vim retinendi ad tempus lotii abjudicaret. Cum vero alterum ejus Musculum, ut multi vocant, Detrusorem urinæ in tendinem commutavit, quoniam pro hoc musculum nescio quem *cutaneum* in externa tunica substituere videbatur, non ita apertum erat quid moliretur, hoc est ut ipsi eidem vesicæ vim expellendi lotii adimeret. Id vero jam tandem patescit. „Quoniam, „inquit, tunicæ musculares, seu cutanei muscu- „li „(hoc enim vocabulum dici non potest quam ipsi placeat; num aliis placitum sit Anatomicis, & quibus, dehinc libenter attendemus) „quo- „niam igitur cutanei musculi functionibus so- „lum -- involuntariis inserviunt; probabile ideo „non est, urinæ excretionem a contractione tu- „nicæ vesicæ muscularis celebrari, aut saltem ab „ea principaliter, -- sed per musculos non pla- „nos, non cutaneos, sed veros, solidos, circum- „scriptos, & densos. „Non iterum hic dicam, tunicam vesicæ muscularem nequaquam illum esse nescio quem ipsius musculum *cutaneum*, sed tot illos fibrarum fascies, quos ut carneos esse, dissimulaverit, *robustos* tamen esse, ac *torosos*, negare non potuit. Illud tantum quæram, an forte Quadratus Colli Musculus; aut Musculi Frontis non *plani*, non *cutanei* sint Musculi, quorum ille quidem ab ipso Galeno est *μυὸς πλατύς* nuncupatus, omnes autem meliori jure cutanei, aut potius subcutanei musculi dici possunt? hos tamen voluntariis motibus inservire, adhuc non vidi qui dubitaret. Neque tamen si præter muscularem vesicæ tunicam, musculos alios „solidos, cir- „cumscriptos, & densos „expellendæ e vesica urinæ inservire, confitear; novis & inauditis quibusdam musculis opus esse, concedam, cum præsto esse ex illo genere Abdominis Musculos, & id omni

Vis expel-  
lendæ uri-  
næ Vesicæ  
& Muscu-  
lis Abdo-  
minis ven-  
dicatur.

416.

De Musc.  
Dist. c. 1.



omni ævo inter Anatomicos convenisse, nemo ignoret. Itaque non miror, „ quendam olim „ juratum scriptorum testualem „ serio id „ No- „ stro asservisse; „ illud miror, Nostrum dissen- „ sisse ob eas præsertim rationes quas tibi „ vadit „ enarrandum. „ Principio ponit: „ musculos „ abdominis inservire primario expirationis servi- „ tio, costisque ideo deprimendis destinari: id- „ que patere ex puncto inhæfionis fixiori ad pu- „ bem & ilia, ubi scilicet eorundem principium „ est, &c. „ Hic de ambiguo, & permutabili „ plurium musculorum, etiam Abdominis, fixiore „ termino, atque adeo principio non disputabo. Ne- „ que dicam, oblivisci hic hominem Transversorum „ Abdominis musculorum, quorum principium ma- „ gnæ certe partem ad ilia, & pubem minime per- „ tinet. Mittam quoque id excutere quod subdit: „ in ascite, tympanite, &c. „ ventris viscera a „ musculis abdominis non comprimunt: illudque item „ quod non obscure supponit: illam respirationem, „ sine cuius usu „ nullimode vivere possumus, „ a „ musculorum abdominis actione pendere: ne mul- „ tis, illud etiam dissimulabo quod potissimum in- „ tendit: hos ipsos musculos „ primario expiratio- „ ni, secundo compressioni ventralium visce- „ rum famulari. „ Sed cum ex his colligit: „ „ quomobrem operatio hæc musculorum abdomi- „ nis superiora respiciens prohibere debet eorun- „ dem actionem ad inferiora, vesicæ nempe pres- „ suram tanquam functionem oppositam, aut sal- „ tem pressuræ vigorem distrahere; „ quisque „ atque adeo ipse videt, ab illa actione, vesicæ com- „ pressionem non prohiberi: adderem, nec „ distra- „ hi pressuræ vigorem, „ quoniam costarum de- „ pressio non est per se functio *opposita*, sed con- „ veniens cum vesicæ compressionem, quatenus in utra- „ que vis musculorum deorsum urget. „ Sed ipse- „ met illud concedit; at vero negat, „ per hoc „ multum venire adjumenti ad pressuram vesicæ; „ quærit enim, „ cur in forti illa musculorum ab- „ dominis contractione, quâ utimur ad solida fe- „ calia foras ex intestinis trudenda, urinam or- „ dinario non ejicimus, quam tamen post defi- „ nientiam contractionis ejicimus? „ At recte fa- „ cit, quod hanc etiam *instantiam* dimittit, non „ modo quia; ut subjicitur; non res semper ita se „ habet, sed & quia dura recrementa, vi ad pro- „ statam appressa agere id possunt quod ab Recti „ intestini tumore, imo quod ab „ impedimento „ aliquo etiam levi „ posse agi, infra agnoscitur. Verum hujus *instantiæ* quam ipse dimittit, „ ego illam partem arripio in qua id posuit quod „ alioqui negare non potest: musculorum abdomi- „ nis contractionem recrementa intestinorum extrudi.

Quæro enim: quorum musculorum compres- „ sio ad Rectum usque intestinum pertingit, eorun- „ dem compressio cur ad propinquiorem vesicam „ pertingere nequaquam possit? Atque id ita quæ- „ ro, ut hac una *instantia* tres quas addere se, di- „ cit, demonstrationes refelli, contendam. „ Da- „ mus enim, inquit, etiam primariam, etiam di- „ rectam, etiam vividissimam tendentiam muscu- „ lorum abdominis ad pressuram vesicæ. Hinc „ per hoc totum ineundam vesicæ pressuram non „ fore, triplici evidentiâ demonstramus. Primo „ quia hi musculi tendinei sunt ad pubem, non „ carnei, sicque pars carnea unde emanare pressu- „ ra debet, -- nullimode appropinquari poterit „ ad contactum vesicæ. -- Secundo quod -- me- „ diatio ossis pubis impedit immediatum musculo- „ rum, & vesicæ contactum. -- Tertio, & præ- „ cipue assertum comprobatur situatio vesicæ inac- „ cessibilis prementi musculorum conatui. „ Vi- „ de, quænam triplicis evidentiæ, triplicisve demon- „ strationis nomine obtrudantur; quasi vero nihil „ nisi per contactum immediatum agi posset, vel „ illi ipsi musculi cum ex Recto intestino fæces ex- „ trudunt, illud intestinum immediate contingerent, „ neque satis esset, ut proxima comprimerent cor- „ pora, hæc vero alia, & hæc demum Rectum, „ quæve in Recto continentur. Id, quod ita ob-

vium est, si vel obiter attendisset; cum suas istas „ præclaras demonstrationes, tum alia omisset quæ „ data ab ipsis occasione nos docuit: ut musculos „ abdominis „ tendineos esse ad pubem, non car- „ neos, „ Pyramidalium videlicet oblitus: Ut „ vesicam sustentari a duplicatura peritonæi, an- „ trum pelvis a cavitate abdominis *non minus* „ sejungente, quam sejungat ab abdomine tho- „ racem diaphragma: „ Ut „ sæpissime in cada- „ veribus turgidam *penitus* vesicam lotio -- tu- „ morem suum ad cavum abdominis non eleva- „ re: „ Ut „ ampliationem recipientis sphaerici „ in quocumque sit sensu, tendere ad conum, „ & alia hujus generis, quæ prætermitto, territus „ videlicet a *clava herculeæ*, quam post triplicem „ istam evidentiâ corripit. Sed ecce, inquit, „ *clava herculeæ*. „ Aperto cadavere, detecta vesi- „ ca, eaque vel plenissima inventa, licet imme- „ diata pressura manus, adjacentis in vivente „ musculi cujuscumque vices præstemus, nec gut- „ tula urinæ per urethram profuit. Hisce, in- „ quit, auditis Dominus noster (ille videlicet de „ quo hic triumphum agit, *testualis*) non am- „ plius de imaginariis hisce excretionis urinariæ „ instrumentis loquebatur. „ Miseret me hominis „ minime mali a *clava* ista *herculeæ* subacti atque „ confecti; Sed Anatomicorum famuli eundem ri- „ debunt ignorantem, nihil ipsis facilius esse quam „ compressa manu vesicæ, urinam, quotiescunque ju- „ bentur, extrudere. Chirurgorum quoque famuli „ vix supra risum tenuissent, si obtrudi homini, au- „ divissent: per compressionem musculorum abdo- „ minis „ non multum venire adjumenti ad pressu- „ ram vesicæ; „ quando nimirum sæpius viderunt „ quod & tu, Mangete, in hoc ipso Capite com- „ memorasti, vel extrinsecus adnotæ manus adju- „ mento *hypogastrio compresso*, musculosarum vesicæ „ fibrarum contractionem in earum paralyfi *suppleri*. „ Sed quid Anatomicorum, quid Chirurgorum fa- „ mulos dico? truncus atque stipes, non homo in- „ ductus est, cui; cum supra disputari, audivisset: „ nisi musculi vesicam immediate contingant, „ non posse ipsam comprimere; ne illud quidem in „ mentem venit, rogare: quid ergo fiat, ut spiritu „ cohibito, & facilius, & longius, & majore cum „ impetu urina emittatur, & quasi ejaculetur? num „ quod retentus in pulmonibus aer, aut ulla pars „ thoracis vesicam contingat? an vero quod depres- „ sum vi diaphragma subjecta viscera urgeat, & hæc „ denique vesicam?

## ANIMADVERSIO XL.

Proponit deinde *Tentamina*, quæ vel ipse vo- „ cat *puerilia*. Sed unum tamen eorum est op- „ pido rarum, & admiratione dignissimum. „ Ae- „ rem, inquit, in vesica jacentem exhaurio, „ quum, stylo per factam aperturam in cervicis „ osculum introducto, eum notabiliter dilato. „ Eum videlicet, Mangete, aerem stylo tantum in- „ troducto *notabiliter* dilatare hic potest? Non, in- „ quis, *eum aerem*, sed *eum osculum* (sic enim lo- „ qui hic Scriptor solet) stylo dilatare se, dicit, „ atque ita aerem exhaurire. Oh locutionem di- „ gnâ tentamine! oh tentamen vere *puerile*! Quis „ enim vel sine tentamine id nesciat, viarum an- „ gultis dilatatis, vel earum concidentia ad tempus „ sublata, aerem e vesica exiturum? Quis pariter „ nesciat (quod tamen post paulo tentamen addi- „ tur) illam eandem viam intruso stylo „ nervose „ expandendo, derivari celeriter a vesica infusum „ laticem? „ Illud vero quod continuo additur, „ tentamen: in aliis cadaveribus vesica „ in fundi „ sui summitate manu deprehensa, & tracta non- „ nihil elevabatur, & penitus statim ex ea per „ urethram elutriabatur contenta lotii substan- „ tia; „ hoc, inquam, tentamen ego ignora- „ bam: sed post tentatum experimentum adhuc igno- „ ro, certe enim mihi nondum successit. Hæc „ autem, & cætera tentamina quorum nonnulla „ sunt incerta, nonnulla nimis certa, omnia aliter „ atque



atque ipse existimat, explicabilia; „ in seriem „ hic ponere se, dicit, ut apta firmandæ in to- „ tum assertioni quod „ ejus sphincter; & pseu- dosphincter „ parum ad vesicam aut retentioni „ urinariæ, aut expulsionis opitulentur; „ quasi ve- ro plerisque, & quidem Doctissimis, Anatomicis aut sic verba dari possent, ut *Domino illi nostro testuali*, aut placeret, sphincterem urinæ expulsionis inservire, aut iidem pseudosphincterem „ non minus ac verum ad tenendam in vesica uri- „ nam advocarent, „ aut denique de utilitatibus ejus sphincteris quem ipse vocat *verum seu legitimum*, alii autem vel iteratis diligenter perquisitionibus videre nondum possunt, multum essent laboraturi. Cujus tamen sphincteris, & pseudosphincteris utilitates hic ipse prolixo, ut consuevit, sermone quærere instituit: in quo si omnia excutere vellemus, prolixi nos quoque essemus. Attamen quis non miretur, Prostata, etiam respectu habito ad vesicularum seminalium involu- crum, *circumvallatam* dici musculari embolo den- siori equidem, & ingentiori? Mox quoniam hæc „ musculares vires multum edentulæ ad postula- „ tum impulsu (pro feminis videlicet ejacula- „ tione) agnoscuntur in frontem legis mechani- „ cæ, -- nec minus squallentes in faciem hydrau- „ licæ: hinc in genuinum usum illorum sphin- „ cterum necessario deferri „ dicimur, & in hanc rem multa etiam atque etiam adjiciuntur. Quanto melius Viri Doctissimi, & nominatim Boerhaavius, atque Fantonus, qui „ novas istas „ efficaces potentias musculares „ assignaturi, ne- que ad invisibilem aliis musculus confugiunt, & perpaucis verbis sive musculos Acceleratores, si- ve ipsum Pseudosphincterem assignant. Non enim id ut faciant, illud sibi negotii datum credunt, ut disputent, quot modis possit „ ex tubo egre- „ di cum impetu, & saltu contentus liquor, „ multoque minus ut obtrudant: huc pertinere *li- quidum chilosum*, quasi vero hoc *cum impetu*, & saltu a ventriculo, tanquam „ ab embolo per tu- „ bum intestinale, vel (ne litterulam quidem mutem) *intestinale* extruderetur: „ in curvo quo- „ cumque canali -- nec embolum validissime ap- „ plicatum, & trusum, impulsu in exitu, & „ saltu contento fluori conferre posse: „ aut denique; ut alia omittam; assignatos musculos „ ad „ quemcumque trajectum expandentium corporum „ sub se se cæce, & indifferenter agere: „ nam etsi Præstantissimi illi Viri existiment, non mo- do feminis, sed & urinæ egressum ab iis muscu- lis adjuvari; certa tamen, ac longe alia ratione in hoc, atque in illo egressu eisdem agere, arbi- trantur, & jure quidem meritoque. Nam si in utrobique assidue, & continenter agerent, non du- bito quin urethram occluderent, atque ita egres- sum prohiberent; si vero in egressu urinæ, ut in fe- minis egressu, per vices agerent, ac remitterentur, urina quoque, ut semen, non continenti cursu, sed subsultim exsiliret. Itaque sapienter censuere, in urinæ egressu tunc solum agere, cum hoc jam desinente, lotii reliquæ ultimæque guttæ in quas ob contractum jam vesicæ sphincterem eæ vires quæ lotium extrudere, amplius agere non possunt, sunt ex urethra depellendæ. Cum autem ii muscoli sive tunc, sive in feminis ejaculatione agunt; probabile est, eo temporis intervallo quo ipsorum contractio remittitur, veros urethrae Di- latatores confestim agere, & vicissim.

## ANIMADVERSI O XLI.

Nunc cum ipso in viam redeamus. Igitur Tentaminibus illis suis innixus, secundum ea, novos musculos, & novam vesicæ habitudinem quam esset inventurus, mente præcepisse; & „ fa- „ cile quam quærerat rem totam assequutum es- „ se se, „ dicit. Quæ tu, quæso, omnia mecum recognosce; intelliges enim quam proclive sit ho- minibus ea videre quæ non sint, quando ea quæ- runt quæ ut sibi animo confinxere, ita cupiunt

invenire. Primum igitur vidisse se, dicit, vesi- cæ „ collum statim in ejus discessu a cervice in „ notabilem flexuram agi, hinc produci in ure- „ thram, eique tandem horizontaliter continuari, „ eademque insuper directione tramitis ipsam & „ urethram excurrere usque ad terminum suum „ per glandis apicem. „ Ego vero semper vidi Prostata, quæ glandula videlicet eam partem Urethrae ambit quam „ vesicæ collum statim in „ ejus discessu a cervice „ hic appellat, Prostata, inquam, vidi Recto intestino parallelam; quæ autem urethrae pars inter Prostata, & ini- tia spongiosi Urethrae corporis intercedit (hic vo- cāret reliquam colli partem) eam vero in nota- bilem flexuram curvari, vidi; ibi enim Urethra; quæ primum descenderat, sic inflectitur, ut ab antica ani parte ad corporum penis nervosorum concursum ascendat, donec rursus cum ipso cui subnectitur, pene deorsum incurvetur, atque propendeat; tantum abest primum, ut extremum col- lum *horizontaliter* Urethrae continueretur, deinde ut *eadem directione tramitis* tota reliqua Urethra excurrat. Vidisse dicit, „ secundo, vesicam „ contiguis partibus stricte & per vim alligatam „ non esse; „ at continuo id ipsum negat, hoc sub- dens: „ ideoque nec in tensionis statu naturaliter „ non degere; „ tum vero hoc ipsum iterum ne- gat, sic pergens dicere, „ sed laxæ, & libere in „ pelvi supra ossis sacri finem, & coccigem insi- „ dere. „ Utrum, tandem, Mangere, facilius est credere id quod alibi ostendi, hominem qui omnes docere instituerit, ipsum nondum loqui di- dicisse, an vero *nec* in tensionis statu naturaliter *non* degentem, hoc est tensam naturaliter, & naturaliter *laxam* eandem vesicam esse, vidisse?

Nos ergo tum hoc, tum illud alterum, quod vesica „ supra ossis sacri finem, & coccigem in- „ sideat, „ non ut ille dixit, sed ut dicere de- buit, intelligamus, scilicet vesicam sic satis laxæ iis Partibus quæ imo ossi sacro, & coccygi insi- dent, insidere, atque ita verum esse quod olim Eustachius in Tabulæ quæ tibi III. est, Figura II. ostendit, & omnibus qui non vacuæ vesicæ fundum amputabunt, obvium erit, „ imam par- „ tem cavitatis vesicæ tanquam planam „ esse, & in ejus *plani* medio cervicis orificium esse exca- vatum. Quod autem tertio, dicit secundum *irremissibilem* quam ipse præviderat, *necessitatem* ob substratam Prostata, protuberantiam vidisse, illud idem „ orificium sat alte coronantem, „ ideoque & in cavum vesicæ valde erigentem se „ se; „ ego quidem crediderim, ipsum in vesi- cas hominum incidisse quorum Prostata sive a na- tura, sive a morbo æquo esset major, qualem ego in lethali urinæ suppressione vidi, aut qualem in Casaubono fuisse, supra legimus, in quo cum quadruplo quam soleat, Prostata major esset, il- lud quoque morbo si notatum est, vesicæ „ col- „ lum interius, quod declive levi canaliculo sine „ ulla protuberantia naturaliter in urethram desi- „ nit, introrsum tumens, elatum instar podicis „ gallinæ, vel colli interioris uteri; ita ut in „ ambitu esset veluti sulcus, seu cavitas, per „ quam circumduci poterat digitus. „ Nam nisi in ejusmodi subjecta incidisset; neque infra scri- psisset, inter hanc Prostata protuberantiam, & vesicæ latera „ profundam quaquaversum, & tan- „ quam angulosam concavitatem comprehendi: „ quæ quidem non ita cum eo consentiunt quod paulo ante positum est, vesicam hic *tanquam pla- nam* esse. Ego sane in idoneis subjectis istam protuberantiam nondum nisi prorsus levem ac hu- milem vidi, atque adeo longe aliam rem atque hic describit, ac putat. Minime enim dubitat, quin „ ex hac mechanica -- jam statim elucescat „ sibi germana urinariæ retentionis causa in ve- „ fica. „ Nam protuberantiam hanc tam altam supponit, ut urina ex ureteribus in vesicam de- stillans, superare ipsam non possit, „ nisi agge- „ ratur in copia. „ Sed fac, ita esse; quid tum postea? „ Dum, inquit, latiori semper copia accu-

Institut.  
Medic. n.  
367. 657.  
Anatom.  
Dissert. 7.  
418.

De actio-  
ne Accele-  
ratorum,  
& Pseudo-  
sphincteris  
in ejacu-  
latione se-  
minis, &  
in fine mi-  
ctionis.

419.

De Vesica

410.

428



„accumulatur, -- majus etiam momentum ac-  
 „quirit, obviam ei eminentiam expositam cir-  
 „cumquaque premendi. Sic plus magisque con-  
 „stricta colli apertura in eadem comprehensa,  
 „nullum sibi effluxus aditum permittet, licet --  
 „supra eminentiæ libellam jam fluctuans. „Hic  
 „quis non videt, duo maxime obstare: Alterum,  
 „situm vesicæ in nobis decumbentibus, sæpe, &  
 „diu, in quadrupedibus autem semper talem, ut  
 „prominentia illa cujus necessitas deducta est ex  
 „collocatione vesicæ, substratæ Prostatae insidentis,  
 „vel nulla esse debeat, vel siqua sit, a lotii sensim  
 „aggesti pondere aut non premi, aut certe non *circumquaque*  
 „premi debeat etiam cum lotii altitudo  
 „jam ad orificium excretorium pervenerit: Alte-  
 „rum, renitentem Prostatae consistentiam quæ vel  
 „a superincumbente lotio circum pressa, non ita  
 „facile cedere possit. „Hæc, inquam, duo quis  
 „non videt? ipse tamen primum in toto hoc Scri-  
 „pto non vidit; alterum, vix demum vidit, sed ea  
 „ratione tollere conatus est quæ quam nulla sit,  
 „vel ex modo dictis, vel ex rei ipsius natura, vel  
 „ex anatome intelligi potest. Nam „alia, inquit,  
 „desuper ad erigendum hunc verticem, eaque  
 „pars libera, & pressilis notabiliter assidet; --  
 „scilicet tunica ex laxa vesicæ assidentia corru-  
 „gata ad dorsum prominentiæ glandularis, cu-  
 „jus portio superiorem constituunt: & non  
 „secus ac sæpe ad colla uterorum flaccescentium  
 „faciunt interiores membranae, in altam crepi-  
 „dinem circumflexæ, sat præsumt libertati cervi-  
 „cis, ut a circumfluo liquore compressæ, & ad  
 „se se ut supra competenter adductæ, crassitie  
 „qua pollent, & conniventia cedendi, parem in  
 „protuberantiæ favorem cacumine producto suo  
 „occlusionem procurent. „Quid, si ex modo  
 „dictis planum est, in brutis, nobisque decumben-  
 „tibus circumflexas istas rugas a *circumflua* urina pre-  
 „mi non possit? Quid, si ex rei ipsius natura pa-  
 „ter, quo magis urina vesicam distendit, eo magis  
 „istas rugas explicari, atque obliterari oportere sic  
 „ut demum invito homine urina excideret, si eæ  
 „vesicæ occlusioni præessent? Quid denique, si  
 „quoties quæsimus; quæsimus autem pluries;  
 „toties Anatome nos docuit, non modo circumfle-  
 „xas istas in altam crepidinem rugas nullas esse,  
 „sed in vesicis non exinanitis, in quibus tamen ut  
 „magis opus est, ita magis patentes istæ adductæ,  
 „& conniventes rugæ extare deberent, ne unam  
 „quidem exilem rugam in tota ima vesicæ parte  
 „apparere? Et tamen „ex coincidentia, & laxita-  
 „te vesicæ post mortem notabili, ejusdemmodi  
 „angustiam aperturæ cervicis majorem fieri, „  
 „vel ipse ponit, dum paulo post, sua illa *puerilia*  
 „*Tentamina*, longe aliter, ut supra innuimus, ex-  
 „plicanda, huc trahere conatur. Quid si addam,  
 „in ejusmodi coincidentibus & laxis vesicis, & eo  
 „magis laxis quod magna pars fundi amputata erat,  
 „ne digitum quidem orificium versus deducendo,  
 „atque apprimendo, me ullas eo rugas adducere,  
 „aut excitare potuisse, nisi forte tenuissimas, & quæ  
 „amota vi prementis digiti illico obliterarentur?  
 „Pergetne dicere, „disparitatis dracmam non ha-  
 „bere curiosum hoc suum artificium -- cum il-  
 „lo „quod ipsa Natura ad ureterum finem ex-  
 „truxit, ne per eos urina, regrediatur?

## ANIMADVERSIO XLII.

Hæc autem omnia cum in virilibus, tum ve-  
 ro etiam magis in muliebribus cadaveribus  
 observavi, in quibus eam Protuberantiam, non  
 dico levem, aut humilem, sed propemodum nul-  
 lam vidi. Quam hic quidem distat, in iisdem  
 „apparentem mediocriter esse, & retentionis uri-  
 „nariæ ministerio non imparem. „Nam etsi  
 „negare non potest, muliebre prostaticam „levi-  
 „ter, & tanquam umbratilem, ad vesicam desi-  
 „nere; „duo tamen addit, alterum: „vesicæ

„corpus in convexitatem vaginæ ad angulum re-  
 „ctum concidens, & firmiter cum ea connexum,  
 „in imo nexionis, seu osculo cervicis, figuram  
 „suscipere etiam debere convexitatis, interne re-  
 „spicientis; „alterum: eandem figuram „faci-  
 „lius insuper a pinguedineis acervulis eidem cervi-  
 „ci, & vaginæ intertextis procurari: -- & sic cir-  
 „cum cervicem parem laudato muneri prominen-  
 „tiæ habitudinem fieri. „Sed hæc duo quam  
 „nihil sint; vide. Quod de ibi positis adiposis  
 „acervulis comminiscitur; primum in plurimum mu-  
 „lierum, & in his paulo etiam habitioris cujus-  
 „dam anatome nihil adipis, aut certe nihil nota-  
 „bile, & ad rem faciens inter vesicæ imam cervi-  
 „cem, & vaginam videre potui, ac multo minus  
 „illas „adiposas vaginæ membranas, & illum pin-  
 „guiferum ibidem præcipue glomum, „in quem  
 „pinguedinei isti acervuli in additarum Figurarum  
 „Explicatione commutantur. Sed tamen quod non  
 „est, id fac esse; num emaciatae mulieres (quod  
 „tamen necessario consequeretur) minus quam an-  
 „tea urinam continent? Accedit, requiri hic non  
 „tantum qua parte vesica vaginam contingit, sed  
 „circumquaque, ea corpora quorum tumore „cir-  
 „cum cervicem ea prominentiæ habitudo fiat. „

Hinc quoque intelligitur, quam parum ad rem  
 „faciat convexitas illa vaginæ, quæ tantum a ter-  
 „go connexa est: quanquam quid est convexitas  
 „ista, cum vagina fere semper in modum flaccidi,  
 „atque inanis intestini in se concidat? Quod etsi  
 „non esset; haud tamen satis intelligerem, quomo-  
 „do in eam convexitatem concidere vesica dicatur  
 „ad angulum rectum. „Nam infra quidem ait,  
 „huc spectans: „cadere collo suo vesicam super  
 „memorata notabilem curvaturam vaginæ prius  
 „usque ad ima pelvis descensæ, hinc rursus ad  
 „vulvæ terminationem ascendentis, aut saltem  
 „horizontalis. „Verum; si præclara hæc ver-  
 „ba satis intelligo; aliud Anatomicis vagina, aliud  
 „ipsum pudendum est; aliud quoque ipsi est vesicæ  
 „collum, aliud cervix, „cujus osculum esse imum  
 „nexionis „vesicæ scilicet cum convexitate va-  
 „ginæ, supra dixerat. Utcunque est; illud quod  
 „principio dixi, certum est, eam prominentiam  
 „cui ad urinam retinendam in maribus tantum tri-  
 „buit, in foeminis vix ullam esse: quod & ipse sa-  
 „tis confitetur, dum *multo minorem* esse, conclu-  
 „dit. Id vero cum adscripto eidem prominentiæ  
 „usui tam necessario evidentissime adversari, intel-  
 „ligeret; attende, quæso, quidnam, ut effugium  
 „quæreret, affirmare coactus sit: inde videlicet fie-  
 „ri, ut urina foeminis „ad levem quemcumque co-  
 „natum, aut concussionem etiam involuntarie  
 „profluat; „perinde quasi de nova quadam &  
 „omnibus incognita animalium specie loqueretur,  
 „aut verisimile videri cuiquam posset, Naturam po-  
 „tius in tam absoluta muliebris corporis fabrica,  
 „quam ipsum in assignandis organis urinam reti-  
 „nentibus defecisse. At quem hominem? qui nem-  
 „pe postquam foeminis universe quidem, & natu-  
 „raliter „ad levem quamcumque concussionem in-  
 „voluntarie urinam profluere, „affirmavit, ita  
 „sibi constat, ut quinque, non amplius, interjectis  
 „versiculis *demonstratum* asserat: „cervicem vesicæ  
 „in foeminis eadem quoque ac in maribus, an-  
 „gustia orificii naturaliter cieri. „Verunta-  
 „men attendamus quid dicat; fortasse enim suum  
 „in iis organis assignandis errorem senserit. Sen-  
 „serit autem? Imo vero adhuc pro iisdem pugnat.  
 „Nam primum ut „incontinentiam urinæ, quæ  
 „in variis mulieribus post partum laboriosum  
 „accedit, a divulsis, explanatis, seu tanquam  
 „luxatis suæ istius protuberantiæ fulcimentis,  
 „deducit; ita illam suæ unice sententiæ favere,  
 „non dubitat; quasi vero nihil aliud in difficili  
 „partu aut divellendo, aut lacerando, aut etiam  
 „comprimendo vitari posset. Quid? quod me  
 „quoque ipsum trahere in suas partes conatur,  
 „ignarus, me quorundam hominum non magis  
 „laudibus quam reprehensionibus moveri; quan-  
 „quam haud scio, quam mihi gratum esse debeat  
 „quod

420.

430.

420



De duobus  
Carneis  
Vesicæ Cor-  
poribus de-  
scriptis in  
Adversa-  
riis I. n. 9.

quod quæ ego Vesicæ Corpora & ante hos un-  
decim annos descripseram, & ante duos quasi an-  
nos quam hanc Epistolam ad te daret, ipsi rur-  
sus indicaveram, quæ, inquam, Corpora se non  
nisi ultimo observasse, ipse hic confitetur, Figu-  
ræ autem ejus, in quibus omnibus sunt omissa,  
vel ipso tacente, significant; de iis tamen ita  
scribat, ut credi velit, sibi prius observata esse  
quam de nostra descriptione quidquam audiverit.  
Quod ut credam; illud certe non credo, esse hæc  
421 Corpora, notabiliora in scæminis, & solidio-  
ra, quam in maribus, multoque minus, ve-  
420. sicæ orificium in scæminis, exquisitè per eadem  
obturari. Constat enim mihi per quam plu-  
rimas vesicæ, in sua etiam sede observatæ, in-  
spectiones, nihil æque ac horum Corporum lon-  
gitudinem, & præsertim crassitudinem, ac pro-  
minentiam indiscriminatim sive in maribus, sive  
in scæminis variare. Itaque ut in utrisque plu-  
ries vix eorum vestigia vidi, ita in his sæpe mul-  
to quam in illis majora, sæpe æqualia, sæpe mul-  
to etiam minora, habita magnitudinis vesicarum  
ratione, deprehendi. Cum autem in pluribus mu-  
lieribus vesicæ, e pelvi nondum exemptæ, ampu-  
tato fundo diligenter quæsiverim, num illi quæ  
sæpe non pauca continebatur, urinæ, strata ante  
orificium ea Corpora obstarent; non modo hoc  
nunquam vidi, sed vidi ea semper, ut in distenta  
vesica par erat, ab illo orificio quod, exquisitè  
obturare, dicuntur, valde remota. Quæ  
omnia etsi ita sunt, si tamen poneris, non ita  
esse; num prominentiæ quæ non circumquaque,  
sed ut ex nostra descriptione, atque adeo ex ipsa  
anatomie luculenter constat, tantum, ad partem  
posteriorem vesicæ, occurrunt, hujus orifi-  
cium circumquaque, sive exquisitè obturare pos-  
sent?

## ANIMADVERSI O XLIII.

Age nunc cætera videamus quæ ut sibi in  
animo confinxerat, ita oculis credit perspe-  
xisse, Musculos videlicet novos, elevantes vesi-  
cam, & deprimentes, Musculos, inquam,  
tantum ad hanc rem necessarios, quantum vera  
esse ostendimus quæ ab ipso hætenus proposita  
sunt. Quos antequam describit, quoniam  
nil ordine synthetico opportunius invenit ad  
nitidius exarandam descriptionem musculorum,  
qui in animali immediatam cum ossibus conne-  
xionem ducunt, (quasi vero non & eorum  
qui cum cartilaginibus, quales ad Laryngem per-  
tinent musculi) idcirco ossium a quibus sui isti  
musculi exoriuntur, descriptionem præmittit, lau-  
dando sane consilio, si hæc minus Anatomicis ef-  
fet nota, aut saltem si recte ipse proponere ean-  
dem sciret. Quod ne injuria dictum suspiceris,  
primum quæro, cur in Partium intra pelvim con-  
tentarum enumeratione nervos, præsertim ita ma-  
gnos, omittat? nam se quidem nervos *vasorum*  
nomine non comprehendere, in Historiæ Hepaticæ  
II. Parte indicavit. Deinde cur os innominatum  
esse absolute dicat, utrinque apparenter unum?  
cum revera in adultis unum prorsus sit, non ex  
tribus coagmentetur, ut in septimum annum  
non transcendentibus. Præterea cur tria illa  
ossa ad efformandum acetabulum concurrere *æqua-*  
*liter*, affirmet? quando ex Falloppio, qui hæc  
diligentissime observavit, scire omnes con-  
trarium possunt. Postremo, idque potissimum,  
quæro, quosnam femoris musculos significet, cum  
medium inter os pubis & ischion, magnum  
utrinque linqui foramen, scribit; pro aliquo-  
rum femoris musculorum trajectu? Nego  
enim, per istud foramen non modo aliquos fe-  
moris musculos, sed vel unum aliquem, quicun-  
que is sit, exilem musculum trajici: atque id  
quod dico, ita certum, ita manifestum, ita omni-  
bus notum est, ut valde mirer, qui in pervul-  
gata Musculorum historia usque adeo peregrinus &  
hospes sit, eundem tantum sibi sumpsisse, ut de  
Morgagni-Adversaria Anat. III.

Observ.  
Anatom.

novis Vesicæ Musculis se posse scribere, non du-  
bitaverit. Sed de his tamen quid scripserit,  
videamus. Principio, inquit, est quidam Muscu-  
lus, vesicæ levator proprius. Originem sumit  
in pelvi ad tergum cavitatis acetabuli, sed  
aliquantulum altius, & posterius. Descendit  
inde notabiliter latus, validus, & teres, obli-  
que ad protuberantias prostaticarum. Eisdem-  
que inseritur. In scæminis minor est hic  
musculus, quam in maribus &c. Hic,  
inquit, musculus nunquam est adhuc descri-  
ptus. Sed nec unquam, opinor, posthac de-  
scribetur, si quidem omnia corpora ita sunt fa-  
cta, ut tria, bina scilicet muliebria, & unum vi-  
rile, in quibus quanta maxima potui diligentia  
perquisivi. Quid enim quæris? Musculi istius  
notabiliter lati, validi, & teretis, nec vola,  
nec vestigium. At, credo, cadaveribus non sum  
usus idoneis? imo vel minimi quique musculi  
egregie in his tribus rubebant. Aut præscriptam  
ab ipso methodum non servavi? imo, ut ex po-  
stea dicendis apparebit, multo etiam accuratius  
servavi. Aut aliquid neglexi? qui vel singulas  
membranulas, ne dicam fibras, lenta manu scru-  
tatus sum. Aut denique mei me oculi decepe-  
runt? qui, ne mihi uni crederem, non modo ad  
has potissimum dissectiones meos Auditores advo-  
cavi, sed quos ex ipsis in musculis vel minimis,  
& difficillimis perquirendis felicissime alias exer-  
cueram, eos semel atque iterum coegi, ut ab al-  
tero, adhuc integro a me data opera relicto,  
pelvis latere hanc ipsam perquisitionem, me in-  
spectante, diligentissime instituerent. Coegi, in-  
quam; nam qui creberrimas hominis non modo  
in iis quæ adversus me scriptitavit, sed & in cæ-  
teris scriptis hallucinationes ex ipsa anatomie per  
me primum, deinde & per se ipsos perspectas ha-  
berent, quin hic quoque, aut infectas sanguine  
membranas, aut partem musculi alicujus proximi,  
aut quidpiam ejusmodi pro novis Musculis habendo,  
prolapsus esset, non multum sane dubitabant.

Et hæc de Musculo Levatore quem ut sui,  
& Vesicæ Proprium descripsit.

## ANIMADVERSI O XLIV.

Nunc quid potissimum dicat de Comuni  
Vesicæ, ut vocat, Levatore, sub nomi-  
ne Levatoris Ani, jam noto omnibus, videa-  
mus. Hic, inquit, ortum trahit ad medietatem  
faciei internæ corporis ossis ischii, ut ideo  
principium hujus musculi correspondeat poste-  
rius ad partem infimam, & anteriorem cavitatis  
acetabuli. Eadem ac Levator Proprius, so-  
liditate compositionis, densitate, validitate, &  
latitudine donatur. Ample decurrit inferius.  
Ante insertionis loca in duas distinctas nota-  
biles expansiones dividitur: primam, eamque  
majorem infra prostaticarum corpus circumfun-  
dit; quam pseudosphincterem superius voca-  
vimus. In scæminis prima hæc productio al-  
tius ad vesicæ collum inseritur, quam in maribus,  
seu super ipsas prostaticas ob multo brevior elon-  
gationem ejusdem colli. Altera tandem produ-  
ctio inferior, & minor ad rectum intestinum  
elongatur, ubi cum ani sphinctere immiscetur:  
ob quam non male hic musculus Levator ani  
vocatus fuit &c. Ego vero in tribus de qui-  
bus dictum est, cadaveribus sic observavi. A su-  
periore, sive majori horizontali parte ossis pubis,  
qua facie pelvim spectat, atque item a membrana  
proximi, quem Obturatorem Internum appellant,  
musculi lata Expansio oriebatur, quæ superius  
semel tendineo-membranosa, alias magis carnea  
apparuit, inferius certe ex muscularibus fibris obli-  
que descendentibus constructa erat. Hujus expan-  
sionis posteriori limbo contigua, nisi potius con-  
tinuata, erat Expansio altera pariter ex carneis fi-  
bris composita, quæ, tendineo aliquando princi-  
pio, ab ista ipsa ossis ischii interiore prominen-  
tia, e qua paulo post nescio quem Vesicæ De-  
pres-

Novus  
quidam Ve-  
sicæ Mus-  
culus frus-  
tra per-  
quisitus.

Musculi  
Ani Le-  
vatores.



De Magna  
quodam  
Ani  
Sphinctere  
communi  
etiam Va-  
ginae.  
Anatom.  
l. 4. c. 4.

pressorem Musculum oriri, legemus, tanquam a latiore centro ad circumferentiam, ex parte ad infima latera intestini Recti, ex parte vero in os coccygis, & imam etiam partem sacri ossis demittebantur. Et hæ quidem hisce ossibus se se inferebant. Reliquæ autem fibræ si ab lateribus intestini, quo nempe, ut diximus, immittebantur, levi cultri opera aliquantum diducerentur, nova rerum facies offerebatur. Neque enim harum fibrarum directio ita perspicue, ut superius, apparebat; sed transversæ potissimum apparebant fibræ in sphincterem ingentem dispositæ. Hic autem Sphincter cum posterius, & ab lateribus Rectum intestinum ambiret, per Vaginæ etiam infima latera ad hanc amplectendam extendebatur.

Quæ postquam vidi, in mentem venit loci illius Constantii Varolii: quem an alii animadverterint, haud satis scio: „Musculus quidam notabilis car- „nosus, circulariter, inquit, fertur secundum „totum ambitum infimæ partis ventris ita ut am- „plexetur cervicem vesicæ, & omnia vasa consti- „tuentia radicem penis, & extremitatem intesti- „norum. -- Hujus musculi exiguam partem qui- „dam homines observarunt, & crediderunt sua „actione comprimere cervicem vesicæ: „Nam etsi Varolius eundem in fœminis musculum inve- „niri, non dixerit; apparet tamen ex iis quæ mo- „do dicebamus, & in ipsis inveniri, & ejus par- „tem illum musculum esse quem Vaginæ Constri- „ctorium, seu Sphincterem nominant. Cum hoc autem communi Vaginæ, atque Ani Sphinctere commisceri etiam fibras observavi Anterioris ejus Expansionis quam ab osse pubis, & Obturatoris membrana oriri, proposui. Hujus enim Expan- „sionis fibras postquam in latera Vaginæ sic de- „mitti, videram, ut etiam in latera Prostatae, seu glandosi Urethræ corporis infingerentur; tum eas- „dem omnes fibras, velut supra dictum est, didu- „cendo, ut qua habitudine essent ab interiore, & ima facie, cognoscerem; non has amplius, sed magnum illum Sphincterem videre cœpi. Ad quem, in viro etiam, pertinere pariter observavi tum fibras quas descripta Posterior Expansio ab ischio osse ad intestinum Rectum demittit, tum fibras hujus ipsius Expansionis Anterioris, ut quæ Prostatae lateribus annexa quidem, sed non infi- „xa, in eundem denique Sphincterem immitteba- „tur. Si me ergo meis hisce observationibus quidquam tribuere, par est; primum quod ad Levatores Ani pertinet, hoc est ad Anteriorem, & Posterio- rem Expansionem, amplissimum, & multiplex principium, ab osse videlicet pubis, a membrana Obturatoris, & ab illa ischii promi- „nentia ipsis videtur assignandum; non autem ad eum ischii locum qui „correspondeat posterius ad „partem infimam, & anteriorem cavitati aceta- „buli „contrahendum: & sane vel olim, cum aliud quærerem, sæpe memini animadvertisse Le- „vatores Ani magna ex parte multo anterieus quam plerique crediderint, esse collocatos. Deinde Ex- „pansiones musculares non videntur cum Levatore Proprio Vesicæ, qui quidquid est, teres certe mus- „culus dictus est, recte posse comparari. Deni- „que cum hæc omnes Expansiones perspicue vi- „derim cum magno illo Sphinctere commisceri, non facile adduci possum, ut credam, ullius earum majorem partem, a reliqua distinctam, ad Pseudosphincterem efformandum pergere, eamque ipsam esse quæ in maribus „infra prostaticum „corpus circumfundatur, „in fœminis autem „super ipsas prostaticas inferatur, „præsertim cum vel olim observasse, meminim, ipsum Pseudosphincterem nihil aliud esse, nisi fibrarum in sphincteris modum Rectum intestinum am- „bientium manifestam continuationem: quod & il- „lud confirmat, quod ad postremas lotii guttas ex urethra depellendas contrahere Pseudosphincterem non possumus, quin extremum quoque intesti- „num una contrahi circumquaque, sentiamus. Por- „ro cum haud tantum in eo loco quem nunc excu- „timus, „multo brevior elongatio colli „vesicæ

De Vesicæ  
Pseudo-  
sphinctere.

De Mulie-  
bri Ure-  
thra, hu-  
jusque  
Musculis.

muliebris; sed & alibi „major longe ejusdem col- „li brevitatis supra collum virile „esse dictetur; ne quis forte ita magnum discrimen esse, existimet; scire licet, nos qui in magnæ staturæ viro id collum, hoc est quidquid Urethræ inter orificium vesicæ, & bulbum interest, tres fere digi- „gitos transversos longum invenimus, idem (hoc est totam Urethram) in mulieribus aliquando plus duobus digitis, nunquam totidem fere, minus longum comperisse. Quam cum glandosum corpus ambiat, huic bis meminimus a parte sal- „tem anteriore carneas fibras secundum longitudi- „nem superimpositas vidisse, quas cæteræ transver- „sim ductæ cingebant. Harum vero transversarum fibrarum etsi in I. Adversariis eam esse actionem censuimus, ut glandosum corpus virili geni- „tali arctius apprimant, quo sic ab eodem corpo- „re humor quo scatet, large, opportuneque expri- „matur; non tamen de reliquis earum actionibus idem quod Scriptor iste, sentimus, qui postquam supra, easdem inquit „for- „san salaci per la- „cunas scaturigini, superadditis ad vices subful- „tibus suis exufflandæ destinari, „non dubitat omne sphincteris munus iisdem pernegare. Nos enim, si quis id forte contenderet, non pertinaci- „ter repugnaremus propterea quia primum quæ causæ coegerunt Falloppium, ut consimilibus in viro fibris id officii denegaret, eadem in mulie- „re non occurrunt, deinde quia etsi inter has fibras, & Urethram Prostata intercedat; hæc tamen, isto ipso Scriptore confitente, „multo „minoris duritiei est „quam in viro, & cer- „te compressa cedit, atque connivet. Siquis igitur ita censeat: in muliere vim Falloppiani vesicæ sphincteris addita sive ob latiore urethram, sive ob alias causas earum fibrarum assidua con- „tractione adjuvari, & ab harum facili in laborio- „so partu distractione eam urinæ incontinentiam quæ hunc haud raro consequitur, potissimum esse repetendam; ego quidem ejusmodi opinioni non sum magnopere adversaturus. Cæterum etsi meas super Ani Levatoribus, aliisque de quibus hac oblata occasione dictum est, Musculis obser- „vationes non adhuc omnes in plurimis cadaveri- „bus habuerim; tamen in plerisque rebus in quibus ab istius Scriptoris observationibus hæc meæ discrepant, eo magis ad verum accessisse me, pu- „to, quo magis nunc demum animadverto, me in iisdem rebus cum pluribus aliis Anatomicis con- „sentire. Non enim Verheyenius tantum, quem hic eo nomine reprehendit, Levatores Ani dixit „ab osse pubis quandoque „enasci; sed Exercitatus etiam Cowperus, qui & in nonnullis aliis rebus hic mecum facit, absolute ab interna parte ossis pubis, & ab osse ischio, cui & sacrum addit, oriri, docet, ac utroque; siquid ego judico; etiam melius Archangelus Piccolhominus, qui „ex partibus lateralibus, & inter- „nis ossis pubis, & ischii ortos „dicit; quan- „quam ego ab ipsa quoque media ossium pubis parte, hoc est prope utriusque commissuram nasci, viderim. Quam quidem istorum Musculorum portionem si Reprehensor hic novisset, non sane Bartholinum redarguisset, quod „latum esse, & „tenuem hunc musculum sub vesica, „docuerit; non enim quod ipse, idem intelligit Bartholi- „nus, aut Bauhinus etiam, ac Spigelius, qui ea- „dem tradidere. Sed præter hosce Auctores, eosdem Musculos „latos, & tenues „etiam dixit Piccolhominus, & „ne plures addam, ipse Galenus, qui „membranosos, latosque „esse, docuit: quæ hic volui commemorare, ut omnes existiment, num verisimilius sit, eum propius ad verum accessisse qui hos Musculos universe cum suo illo terete comparavit, & „eadem soliditate „compositionis, densitate, validitate, & latitu- „dine donari, „dixit, an nos qui Expansiones Musculares esse, observavimus. Hæc tamen omnia errores vocat, qui „hucusque duraverint „per commentaria Anatomica, & in sua illa „sententia conquiescit, quod -- forsan propter tædio-

416

num. 13.

420

420.

l. i. tr. 2.

c. 11.

423

Myotom.  
c. 5.Anatom.  
Prælect.  
12.Anatom.  
quart. re-  
nov. l. 1.  
c. 11.  
loco cit.  
De Anat.  
Admin.  
l. 6. c. 14.

422.



„tædiosum nimium harum partium fœtorem, &  
 „sordem, vel laboriosam intense dissectionem of-  
 „fium, -- descriptiones originis horum muscu-  
 „lorum, quæcumque fuerint, alii ex aliis retu-  
 „lerint; „perinde quasi tot Anatomicidelicatu-  
 „li homines fuissent, & usque adeo fœtorem, at-  
 „que laborem timentes, ut non esset „ideo (quod  
 „ipse dicit) demirandum, quod hæc sua omnia  
 „eorum visum effugerint, non minus ac Muscu-  
 „lus Vesicæ Depressor, quem describendum jam  
 „vadit. „

## ANIMADVERSI O XLV.

Depressor  
 quidam Ve-  
 sicæ Mus-  
 culus re-  
 futatus.

**M**Usculus Vesicæ Depressor „nascitur „in-  
 „quit, a tuberculo, quod eminet ad mar-  
 „ginem anteriorem minoris, posterioris, altio-  
 „risque processus ossis ischii. Distat in hac ejus  
 „origine ab origine levatoris communis mox de-  
 „scripti per digitum circiter transversum, obli-  
 „que versus posteriora. -- Excurrit inde hori-  
 „zontaliter, imo aliquatenus ascendens, per duos  
 „& amplius digitos transversos ad quintam ver-  
 „tebram ossis sacri, & principium ossis coccygis,  
 „ubi se connectit; hinc denuo utrinque eleva-  
 „tur, & ad rectum intestinum accedens, super  
 „eum tandem, & adnexæ urethræ latera, & pe-  
 „nis corpus, imo & ulterius versus vesicæ col-  
 „lum expanditur, & insensibiliter terminat. „  
 „Qua in descriptione elegantissima etsi plura sunt  
 „quæ non possum probare; tamen antequam ego  
 „impugnem; attendas velim quantum ipse eidem  
 „repugnet. „Musculus, inquit, hujusmodi con-  
 „tractione sua partes quibus inseritur, & ad  
 „quas expanditur, deprimere ad inferiora necessario  
 „debet. „Te ipsum, appello, Manete; Mus-  
 „culus quem dixit *horizontaliter excurrere*, quo-  
 „modo „necessario debet deprimere? „Sed *ali-*  
 „*quatenus*, inquires, etiam *ascendit*. Id vero ut ven-  
 „ditato a se Mechanismo inserviat, quam precario  
 „addat, docet ipsa ad quam provocat, Figura ad  
 „litteras q q, in qua ita hi Musculi *in situ* exhi-  
 „bentur, ut apertissime descendant, non vero *hori-*  
 „*zontaliter* (quod unum in Explicatione dicit)  
 „*extendantur*; docentque adeo ipsi quos proposui,  
 „termini; non enim potest ab eo ischii tuberculo  
 „ad os coccygis ejusmodi musculus ita deduci, ut  
 „ascendat. At saltem, inquires, ea pars aliquate-  
 „nus ascendet quæ ad os sacrum deducitur. Ve-  
 „rum si hoc dices, illud consequetur, os coccy-  
 „gis, quod est mobile, ab hoc Musculo non de-  
 „primi; os autem sacrum, quod immobile est,  
 „deprimi. Si autem non dices, descriptioni repu-  
 „gnabis. Cui quidem ipse manifesto repugnat,  
 „dum allatis verbis hæc subjicit: „Partes autem  
 „hujusmodi (idest quibus is Musculus inseritur)  
 „sunt primo intestinum rectum &c. „Non mo-  
 „do enim in descriptione hoc non posuerat, sed  
 „diserte tradiderat, „excurrere illum ad quintam  
 „vertebram ossis sacri, & principium ossis coc-  
 „cygis, ubi se connectit; hinc -- ad rectum in-  
 „testinum accedere: „quod & paulo post con-  
 „firmat: „ut validius, inquit, muneri hujusmodi  
 „depressivo vacaret hic musculus, eum in suo  
 „progressu ad ossis sacri, & coccygis adhæren-  
 „tiam tanquam ad novum punctum nisus, ful-  
 „cium existimo: „quo in judicio tamen aper-  
 „te fallitur; neque enim usquam fit, neque adeo  
 „fieri potest, ut musculus alio inferendus, in me-  
 „dio progressu parti alicui immobili connectatur,  
 „atque adhæreat; non enim hic de transmissione per  
 „trochleam agitur, sed de *connexione*, atque *adhæ-*  
 „*sione*. Quamobrem ex parte, eorum judicium  
 „magis probo quorum „se opinioni refragari, di-  
 „cit, qui musculos hujusmodi, ut pote ab inte-  
 „stini vicinia lividiuseculos, non carnea substan-  
 „tia, sed simpliciter ligamentosa donatos asserue-  
 „re; ut scilicet ischio cum osse sacro simplici-  
 „ter alligando, rectoque intestino, ejusque mu-  
 „sculis melius sustinendis tantummodo inser-  
 „virent. „Hic vero illud attendas, velim, Man-  
 „Morgagni *Adversaria Anat.* III.

gete, hos Musculos jam antea fuisse Anatomicis  
 notos; non enim id de ipsis asseruissent, nisi exi-  
 stere, cognovissent. Quod si respondeas, no-  
 tos quidem fuisse, sed non ut musculos; tibi ex  
 iis ipsis quæ tuo Theatro addidisti, probare po-  
 tero, vel ut musculos notos fuisse. Inspice enim,  
 quæso, Eustachii Tabulæ XV. Figuram 2. in qua  
 etsi Scalptor tuus (atque utinam in hac tantum)  
 ab archetypi nitore, & perspicuitate non parum  
 deflexit; tamen si non ita clare, ut in archety-  
 po, certe non prorsus obscure inter dextrum os  
 ischium, & sacrum primum id de quo paulo an-  
 te indicatum est, ligamentum conspicitur, cum  
 quo videlicet quidam Anatomici istum Musculum,  
 ut unum idemque conjunxerunt propterea, ut opi-  
 nor, quia partem hujus musculi qua ligamentum  
 intrinsecus instratum est, eodem fere atque ipsum  
 ligamentum ductu fibrarum, & arctius præterea  
 eidem nexam (sic enim solet) viderunt; quamvis  
 reapse ita alia res sit, ut ego in grandævo quo-  
 dam homine cum id ligamentum jam ossifac-  
 tum observaverim, Musculum tamen nihil mutatum  
 invenerim. Hoc igitur ligamentum in ea Figura  
 primum inspicias, deinde sub eo statim hunc  
 ipsum de quo loquimur, Musculum. Quem si  
 forte quæras, cur Amplissimus igitur Lancisius,  
 aut ipse in ea quam in Eustachianas Tabulas scri-  
 psi, Epistola non indicaverim; sic habeto: ex ul-  
 lius silentio confici non posse, non esse eum Mu-  
 sculum in ea Figura satis perspicue delineatum;  
 præsertim cum Summus, & Incomparabilis ille  
 Vir tot, tantisque distineatur occupationibus, ut  
 longe magis & nobis, & posteris mirandum sit,  
 quod affecta ætate, ac valetudine tam multa, &  
 graviora conscribat, quam si uspiam minorem ali-  
 quam rem sciens, ut puto, volensque prætermi-  
 tat. Ego vero non omnia, & præsertim quæ ad  
 musculos pertinent, ut diserte testatus sum,  
 aut volui, aut intra eas quibus Tabulas & tot,  
 & nudas inspexi, & Epistolam dedi, octo, non  
 amplius, dierum angustias potui attingere, mul-  
 toque minus si qua in re ab Eustachii delinea-  
 tionibus forte dissentirem, ea quoque expedire,  
 quod omnino mihi faciendum erat, si in ullum  
 de hoc videlicet minus cognito Musculo sermo-  
 nem ingrederer. Sic enim mihi & alias, & non  
 ita pridem de hoc Musculo observatum est. Pri-  
 mum, Expansionem hunc esse Muscularem, imo  
 postremam partem esse illius ipsius Posterioris  
 Expansionis quam in superiore Animadversione  
 descripsi. Quas enim Expansionis illius fibras in  
 os Coccygis, & imam etiam partem Sacri ossis  
 infigi, docui, ex nimirum fibræ hunc Musculum  
 faciunt; si quidem pro distincto Musculo, ac  
 non potius pro Musculi parte sunt accipiendæ.  
 Tantum enim abest ut harum originem ab ea  
 origine Levatoris Ani quæ in ischio osse est,  
*digitum transversum* distare invenerim; nunquam  
 nisi ita proximas vidi, ut in earum separatione,  
 vel potius; ut verum dicam; laceratione qua cul-  
 trum adigerem, nullum certum discrimen, nul-  
 lum intervallum, vestigium nullum sive in ipso  
 initio, sive in magna parte progressus earum  
 fibrarum videre licuerit. Itaque illud unum di-  
 scrimen est, quod anteriores in eum magnum  
 de quo dixi, Sphincterem; posteriores hæc in  
 imam partem ossis Sacri, & in os Coccygis  
 plerumque totum (quod etiam Eustachium vi-  
 disse, video) demittantur. Demittantur, inquam;  
 nam etsi Eustachius (id quod in archetypo in-  
 spiciendum est) supremas fibras ascendentes, me-  
 dias horizontales, imas descendentes proponit; id-  
 que ad usum a me assignandum est satis; ego ta-  
 men omnes semper descendentes observavi, sive  
 mares, sive fœminas; de quibus istic contra  
 atque in priorum Musculorum descriptione, nul-  
 la in descriptione hujus Musculi fit mentio; dis-  
 secuerim. Illud vero nunquam vidi, ut hæc fibræ  
 postquam Sacro, aut Coccygis ossi se se valenter  
 inseruerunt; „hinc denuo eleventur, & ad rectum  
 „intestinum, „ab hoc autem ad *urethram* us-  
 que,

Tab. Eu-  
 stach. 36.

Musculus  
 Levator  
 Coccygis.

431  
 431.

423.



que, & „ ulterius versus vesicæ collum expandan-  
 „ tur. „ Sed neque aliud quidpiam vidi quod  
 ab iis ossibus ed extremum intestinum mitteretur,  
 nisi membranas, & fibras per quas ipsum, & ma-  
 gnus ille Sphincter, cujus fibræ prope Coccygem  
 videbantur quasi invicem decussari, cum iis ossi-  
 bus colligarentur. Quæ cum in omnibus in  
 quibus adhuc perquisivi, si non plurimis, certe  
 non omnino paucis cadaveribus ita se habuerint;  
 profecto nihil est cur credam, ab iis Musculis  
 eam fieri „ intestini recti, & podicis depressio-  
 „ nem quæ recrementorum excretionem præce-  
 „ dit „ ( quam quidem depressionem negari  
 miror ab ullo alio principio fieri posse ) aut id  
 quod consequitur : ab iisdem, adnexum intesti-  
 no vesicæ collum „ ob excretionem urinariam, „  
 deorsum trahi. Quem ergo iis Musculis u-  
 sum assignabimus? eum nimirum quem descenden-  
 tes ipsorum fibræ, & in os Coccygis insertio,  
 & tanta cum Ani Levatoribus conjunctio satis  
 indicant : ut videlicet quo tempore ab his in  
 pristinam sedem anus retrahitur, eodem ab iis os  
 Coccygis a duris præsertim & difficile extrusis  
 recrementis depressum, in priorem locum una  
 reducat. Itaque siquod illi Muscularis Expan-  
 sionis parti peculiari nomen est tribuendum; non  
 eam quidem Musculum Vesicæ Depressorem, sed  
 Musculum Coccygis Levatorem appellabimus.  
 Et revera vel in grandævo illo de quo supra di-  
 ctum est, homine expertus sum, ea parte Ex-  
 pansionis suam versus originem tracta, os Coc-  
 cygis elevari. Non tamen dubito, quin et-  
 iam prohibeat, ne idem os nimis extra suam  
 sedem ita facile compellatur, aut quin præstet,  
 ut illud interstitium quod Ischium inter, & os  
 Coccygis, ac Sacrum intercedit, magis firmis  
 parietibus obstruatur : quæ munera etsi ligamen-  
 ta implere poterant, & ex parte implent; cum  
 additis tamen fibris carneis adversus crebras ma-  
 gnasque quibus imum pelvis urgetur, compres-  
 siones peculiari vi, musculari scilicet, firmitus  
 repugnant. Quod nisi ita esset; iis fibris carneis  
 quæ inter Ischium, & Sacri imam partem, hoc  
 est inter duos immobiles terminos ducuntur, nul-  
 lus (aut ego fallor) adscribi usus, atque utilitas  
 posset.

## ANIMADVERSIO XLVI.

Quo prolixiores hactenus fuimus in iis quæ  
 instar fundamenti erant, convellendis, eo  
 brevioribus esse nobis licet in reliquis quæ  
 videlicet quasi superstructa iis sunt, oppugnandis;  
 aut enim nihil hucusque a nobis actum sit, aut  
 hæc quoque reliqua jam considerint, necesse est.  
 Itaque ne cætera non legisse videamur; nonnulla  
 hic illic notabimus. Et primum ubi anatomicam  
 administrationem docet per quam Musculi, &  
 reliqua de quibus supra dictum est, inveniantur;  
 operæ pretium est primum illud præceptum at-  
 tendere : „ Petitur, inquit, dumtaxat, ut ossa  
 „ pubis, post ablata integre integumenta, alias-  
 „ que obtegentes partes, non ad symphysim suam,  
 „ sed magis lateraliter, seu utrinque versus ischion  
 „ superius, & inferius rumpantur, & avellantur,  
 „ ut ideo totæ sus deque pateant internæ pelvis  
 „ facies. „ Nunc demum intelligo, cur eam to-  
 tam partem Ani Levatorum quæ ab ossibus pubis  
 pronascitur, & post ipsa statim latet, non vi-  
 derit; hanc enim eorum partem una cum iis  
 ossibus „ rumpit, atque avellit. „ Illudque  
 etiam intelligo, cur supra tradiderit, „ eadem di-  
 „ rectione tramitis „ totam Urethram excurrere;  
 siquidem postquam ossa pubis avulsit, atque a-  
 deo Ligamentum Penis Suspensorium dirupit,  
 tum demum „ partium vicinarum situationem „  
 observat. Igitur qui hæc omnia recte atque  
 ordine observare voluerit, sublatis jam musculis  
 abdominis, & omnibus præter Rectum intelti-  
 nis, imo quo commodius quærere atque inspicere  
 possit, hinc supra ultimam lumborum vertebam

reliquo trunco amputato, hinc femoribus ita a-  
 vulsis, ut nihil tamen quod ad anum, perinaeum,  
 & genitale pertineat, vitietur, tota dumtaxat  
 intus forisque integra magna pelvi, & quæ in  
 hac continentur, servatis, primum eam partem  
 Ani Levatorum de qua modo dicebamus, perqui-  
 rat. Deinde hac ab altero tantum latere ab sua  
 origine separata, scroto autem, & cæteris quæ  
 huc non pertinent, ablatis, ferram ab illo eodem  
 tantummodo latere prope ossium pubis commis-  
 suram ita ducat, ut eorum tamen media illa  
 pars cui per Ligamentum Suspensorium annexus  
 est penis, atque adeo hic ipse in naturali sede  
 relinquatur. Tum serra quo potius licet acetabu-  
 lum, & infimum processum ossis ischii ejusdem  
 lateris translata, & ducta, os illud pubis caute  
 & suspensa manu auferat, atque ita sibi ad to-  
 tius Urethræ positionem quam in XLI. Animad-  
 versione descripsimus, observandam eodem tempo-  
 re quo cætera inquirat, aditum aperiat. Quem  
 quidem Urethræ & Vesicæ positum sic inspexisse  
 non modo ad hanc disquisitionem, sed etiam at-  
 que adeo inprimis ad catheterem peritius immitten-  
 dum, ad Lithotomiam feliciter instituendam,  
 ad ea demum quæ de hujus ipsius varia metho-  
 do annis superioribus disputata sunt, melius di-  
 judicanda plurimum proderit. Quæ cum omnia  
 ab hoc latere inspecta satis fuerint, tum licebit,  
 nexu penis dissoluto, & alterius lateris Levatore  
 pariter observato, atque deposito, tantum reliqui  
 ossis pubis auferre, quantum ad omnia quæ su-  
 persunt, commodius investiganda necesse est.

## ANIMADVERSIO XLVII.

Cæterum Ingenium hominis libenter agnosco  
 ( quod utinam in veris potius quam in istis  
 commentitiis meditationibus exercuisset ) dum  
 pleraque ad mictionem sive secundum, sive præ-  
 ter naturam pertinentia quæ per jam notos, &  
 veros Musculos, ut Diaphragma, Musculosve Ab-  
 dominis, Vesicæ, Urethræ, Ani, aliosve ejus-  
 cernodi explicari satis possunt, ea per ignotos,  
 & fictitios aut Musculos, aut Musculorum u-  
 sus exponere, & declarare conatur. Conatur,  
 inquam, atque adeo interdum laborat non minus  
 quam sui illi Ani, & Vesicæ Depressores. Quos cum  
 & duos tantum, & graciles, & Levatoribus „ lon-  
 „ ge minores, brevioresque „ Levatores contra &  
 quatuor, & „ densos notabiliter, & latos,  
 torosos insuper & firmos „ esse, fallus sit;  
 contendit tamen, Depressorum actionem illam esse  
 qua „ in mictionis sine -- interdum -- per itera-  
 „ tas vices „ anus, & annexæ partes deprimun-  
 tur, nihil dubitans, quin tunc a duobus illis  
 gracilibus, infirmisque Musculis quatuor isti to-  
 rosi, & firmi antagonistæ alternis vicibus supe-  
 rentur. Qua in re nimirum haud satis animad-  
 vertit, ea quæ supra sibi comparaverat, effugia,  
 utilia esse non posse. Dixerat enim, „ depres-  
 „ sioni, tanquam a ponderis propensione secun-  
 „ data, parvam sat esse potentiam. „ Nunc au-  
 tem „ in fine mictionis „ exonerata jam vesica,  
 frustra ad lotii pondus confugiet. Atenim, in-  
 quies, confugiet ad innatam Partium gravitatem;  
 quasi vero illa eadem alterna depressio a stantibus  
 dumtaxat, non autem etiam a decumbentibus ob-  
 servaretur. Noli expectare, ut experimentum  
 quoque illud perpendam, quod nescio, cur  
 non potius inter sua illa Tentamina supra collo-  
 caverit; est enim ejusdem ponderis, ut quod a cau-  
 sis esse potest non minus fallacibus, hoc est am-  
 biguis. Nam comparationes quidem quas sub-  
 jicit, rerum sunt ita dissimilium, ut ejus opi-  
 nationem parum illustrent, nihil confirmant.  
 Nec vero multum eidem favet singularis cujusdam  
 symptomatis explicatio, in qua cum Sphincteris vesi-  
 cæ convulsionem rejecerit, ut qua Sphincteris ejusdem  
 resistentia, idest vis contractionis, duplicari debet,  
 „ imo & ulterius multiplicari; „ ipse in medium cogi-  
 tur adducere suorum Musculorum convulsionem;  
 qua

Hujus Ad-  
 ministrati-  
 onis U-  
 tilitas.

425  
 & seq.

423.

Ibid.

425.

424.  
 De Admini-  
 stratione  
 Anatom.  
 ad ea de  
 quibus in  
 superiorib.  
 Animad-  
 versionib.  
 dictum est,  
 observan-  
 da.

419



qua mirum est, non vidisse eorundem vim contractionis debere pariter multiplicari. Quid? quod phaenomenorum quæ per memoratas paulo ante causas satis superque explicantur, alterum  
 426 „nubilum hucusque „dictitat; in altero autem difficultatem ridet qua nemo qui Falloppium legerit, implicari jam potest. Quid? quod  
 426 „mictionis, naturæ leges ex vitio partis genuino „transgredientis „omnes casus (quorum tamen „aliquem minus miror prætermitti, quam inter casus incontinentiæ urinæ ipsum urinæ egressum per catheterem reponi) quid? inquam, quod hos omnes casus partim ait, „nonnisi ad suam hy- „pothesim explicari posse, „ita ut homo non magnificus minime dubitet, quin res quoque quarum causæ, ut omnibus notum est, sunt explicatissimæ atque clarissimæ, „absque detectionis suæ, „hincque elucidationis subsidio in densis hucusque tenebris jacerent: „partim vero asserit, causas quas habent „apud Authores decantatas, sine eodem subsidio *impares* habere: Quibus tandem Lectoribus se putat scribere? rerumne omnium ignaris, an ita prorsus, ut ipse est, erga ejus hypothesim affectis, ut non modo quæ non sunt, si opus sit, videant, sed ea etiam quæ sunt, nequaquam videant? Sed nimirum major a me tibi honor habebitur, Mangete, cui, quasi homini rerum omnium imperito, non hic ostendere aggrediar, quam commode ista omnia queant secundum vulgatam Vesicæ anatomen explicari.

Itaque hisce prætermisissis, duo potius ex te quæram; alterum, cur is qui sæpius inculcavit: quotiescunque urina redditur, toties illam Prostata in vesica prominentiam complanari, auferri, deleri; nunc quasi eadem, cum vesica exoneratur, persisteret, fidenter asserat: „calculum facile cogi ad  
 428 „remorandum in vesica ex ipsamet prominentia „cervicis, „cujus propterea homo, ut alibi etiam vidimus, & misericors, & styli anatomici peritissimus, paulo post verbis ut transcribantur undequaque dignissimis calamitatem deplorat:  
 428 „Lubet hic, inquit, miserescere feralem promi- „nentia cervicis sortem; quæ scilicet obstructu- „ram suam altrix persæpe monstruosi calculorum „generis; non tarde in consequens saginati ho- „spitis, ingratiq; pænas luit. „Alterum quod ex te quæro, gravius est, scilicet cum & inter initia, & in calce hujus Epistolæ orasset te, atque obsecrasset, ut hanc „expolires, atque perfi-  
 415 „ceres, ejusque defectibus (sic enim inquit) pe-  
 429 „ritia tua suppleres: „quæro ex te, correxeris, an non? nam non perfecisse, satis video. Si correxisti; quot ergo, quantisque erroribus scatebat, cum tot adhuc, tantique supersint? Si non correxisti; cur igitur probavisti, edidisti, laudavisti?

Sed hæc tu videris; ego ad duas huc adjectas Figurarum Tabulas transeo.

## ANIMADVERSI O XLVIII.

Cum *Mechanismus* quem in his Figuris exhibere se, dicit, Prominentia notabili Prostata intra Vesicam, Musculis Levatoribus Propriis, & Depressorum insertionem in Urethram potissimum contineatur, cumque id fere omne non modo non *visibillimum*, ut ipse promiserat, sed nullo modo visibile nobis in cadaveribus fuisse, ostenderimus, tempus hic non teremus, idem in singulas Figuras inculcando; sed hoc dumtaxat univ-  
 415erse commemorato, ad alia notanda veniemus.

Et primum recte fecit & perprudenter, cum id quod in singulis tribus Figuris prioribus appo-  
 415sita notula \* monstravit, in Explicatione esse „Orificium cervicis, „testatus est; plerique enim pro extante potius tuberculo, quam pro cavo meatus initio facile accepissent. Neque illud minus probo quod in iisdem Figuris, ac potissimum in I. per litteras C. C. indicari Prostata, declaraverit; siquidem, ut etiam supra dictum est, in Prostata videtur æquo majores incidisse; vel quod per litteram D. in eadem Figura  
 Morgagni *Adversaria Anat. III.*

intelligendum sit „collum vesicæ a muscularibus, „& glandulosis tegminibus aliquantulum denuda- „tum, „nam vel proxima Figura, aliqua potius esse addita, quam detracta, suadere potuisset. Illud vero, quod quamnam per litteras E. E. & I. I. significari vellet, in Explicatione exposuit, necessarium omnino fuit; cui enim unquam venire in mentem ex ista delineatione potuisset, musculos significari? Mitto cætera, & in his urethræ „bulbum, ut se se prodeat (velut ait) „conspicui „ad P, ac vestigia ligamenti penis suspensorii, „quæ egomet qui primus inter Italos ejus Ligamenti memoriam restitui, in eo præsertim loco ad *b*, nunquam eram sine Explicatione agniturus; omnia, inquam, exceptis Ureteribus, mitto. Quorum in hac Figura, & in proxima, & in quarta operæ pretium est tenuitatem parietum ad sectiones M. M. I. I. E. E., amplitudinem vero cavitatis in omnibus fere harum Tabularum Figuris ad insertionem, seu orificia in vesica spectare. Neque hæc jam dico in Figura 2. tubercula potius quam orificia videri; illud dico, existimasse me prius, incidisse hunc hominem in magnas plerumque Prostatas, nunc autem agnoscere, etiam in maximos plerumque Ureteres incidisse. Pluries ego totos pene Ureteres a sanie atque ichore vidi dilatatos, atque ita aliquando ut arteriæ magnæ truncum æquarent; nunquam tamen memini ipsos eorum in vesica hiatus ita amplos vidisse, ut in prima hac Figura delineantur. Ureterum autem secundum naturam se habentium ita proprium esse, observavi in ipso extremo orificio contrahi, ut in bobus etiam, aliisque in quibus perquirere id placuit, brutis, eodem in loco contrahi viderim: quam etiam ob rem urinæ in ureteres reductum fieri difficiliorem, non dubito. Quid vero de ista dicam qua in plerisque ex his Iconismis pinguntur, figura orificiorum circulari? cum potius, ab inferiore parte, qua videlicet in illa Corpora a me descripta, in his autem omnibus Figuris ommissa, producuntur, nunc quasi in ellyplim, alias in acutum angulum ut ventriculus cerebri quartus, videri soleant, ut ita dicam, degenerare. Num autem prominentia illa Prostata tanta sit, ut quemadmodum primæ in utraque Tabula Figuræ ostendunt, infimæ eorum orificiorum partis prohibere conspectum debeat, & de plicis istis *e. e.* ac demum de cavitate notabili ista *f. f.* „ubi, inquit, decidunt „calculi, „de his nimirum cunctis supra satis dictum est. Jam vero paucioribus licet verbis proximas Figuras notare; non enim opus est, ut de Ureteribus, aut de orificio cervicis; quod dicit „ad inferiora descensum, & dilatatum; „aut de aliis ejusdemmodi rursus loquar. Satis ergo fuerit in Figura 2. Musculi Levatoris proprii sectionem B inspicere ita egregie pictam, ut non musculi, sed vasis sectio esse videatur, itemque Urethram F, cujus nimiam latitudinem vel tres quæ consequuntur, Figuræ, & duæ præsertim muliebrem Urethram, quæ latior esse deberet, hac ipsa angustiore exhibentes, satis redarguunt, & denique Musculos Depressores M. M. de quibus quod dicit, quis intelligere satis possit? „In suo, inquit, progressu rescissi, ad recti posteriora satis retro urethram terminantes; „nam si ad Recti posteriora desinunt; quomodo in Epistola scripsit, eosdem „super rectum intesti- „num, & adnexæ urethræ latera, & penis corpus, imo & ulterius versus vesicæ collum expandi, & insensibiliter terminare? „Age nunc inspiciamus Figuram 3. quam supra „ad di- „luenda vetera, recentiaque Anatomicorum du- „bia, & errata, licet non instituto connexa, „pro sua videlicet liberalitate, additurum se, dixit. Verum in hac ipsa præter ea de quibus ante diximus, errata, hæc quoque sunt, primum quod pars illa *indumenti*, ut vocat, *muscularis* *b. b.* potius quam sphincter canali clauso superinductus, apertus canalis videtur. Deinde quod iste idem sphincter quem hic ostendit, frustra  
 G 3

De Ureterum fine.

430

423

429



in idoneis cadaveribus perquiritur. Præterea cum intra prostatam nihil nisi suum hunc ignotum sphincterem proponat; quomodo in Explicatione potest dicere, se prostatam hic abrafisse; „ ut clare compareant muscoli, sphincteres communiter dicti? „ Postremo quoniam jure hanc notam viventibus Anatomicis inurare conatur, quasi Pseudosphincterem *F communiter* a vero; quem ipse tamen non exhibet; Vesicæ Sphinctere haud satis distinguerent? nam illum, inquit, „ communiter sphincterem etiam nuncupant. „ Restat Figura 4. in qua mitto illud, quodcunque est, quod pro sinistri Ureteris orificio exhibetur; ac Depressores tantum Musculos hic ad litteras D. D. delineatos cum iis comparo quos in utriusque Tabulæ Figura 2. delineavit. In proximæ Tabulæ Figura 2. descendentes exhibet; in 2. autem hujus Tabulæ ascendentes quidem, sed tamen vix ascendentes; hic autem contra & duas illas Figuras, & descriptionem in qua „ excurre-  
423 „ re horizontaliter, & aliquatenus ascendere „ affirmavit, mirum quantum ascendentes eosdem pingat. Huc adde, in Figura huic superposita longiores quam hic exhiberi, cum tamen illic, ut pote non integros, sed ut monet, in progressu rescissos, breviores; hic autem ut in muliere, cujus antequam urethram attingant, vaginam quoque emetiri debent, longiores apparere, conveniat. Denique utrum, quæso, his duabus Figuris, an Epistolæ majorem fidem tribuamus? Hæc  
423 „ *gracilitatem* Depressorum testatur; illæ autem ambæ in sectionibus notabilem eorundem crassitiem ostentant. At nostræ sane observationes, in vera horum Musculorum parte habitæ, nos luculenter docuere, tantum falsæ crassitie in hisce omnibus Figuris Depressoribus addi, quantum veræ latitudinis ipsis demitur.

## ANIMADVERSIO XLIX.

429 **S**ed prorsus jam ad Tabulam proximam transferamus, cujus 1. Figura vel sua cum *naturali archetypo*, ex quo omnes hæ delineatæ dicuntur, exactissima *convenientia*, vel singulari elegantia, cæterisque ornamentis suis ad se nimirum oculos pertrahit. „ Plura enim huic ad complementum „ potius, & ornatum, quam ad rem suam facientia addidisse se, dixit, uterum videlicet, „ ejusque appendices: „ quod ego quidem non *magnifice*, ut ipse de me, sed liberaliter factum dicerem, atque adeo etiam atque etiam laudarem, si modo aut dum hæ adderet, nihil eorum quæ ad rem suam faciebant, omisisset, aut saltem ea quæ addidit, recte, periteque addidisset. Verum cum se his duabus Tabulis „ mechanismum „ omnem exhibere professus esset, marium, & „ sceminarum vesicæ urinariæ, ad urinæ retentionem, & excretionem facientem, „ cumque ad istum (mitto illa subnexa orificiis Ureterum Corpora) Musculos Levatores Communes pertinere, jam posuisset; hos ipsos quod ad sceminas  
430 „ attinet, prætermisit. Nam quod ait, eos ideo in hac Figura non ostendi, quod in Figuris superioribus sint expositi; in iis quidem quæ ad mares pertinent, expositi sunt: quod si promisso satis faceret; nihil profecto erat causæ cur muliebrem ullam vesicam, ullosve alios huic inservientes musculos cum eadem exhiberet. Quid? quod cum Prominentiam insignem A, & in hac vestigia plicatum m, & prospectum orificiorum ureterum ab eadem Prominentia ex parte sublatum hic pingat (quarum quidem rerum nos in vesicis imprimis muliebribus, in hoc „ statu retentionis urinæ „ observatis, videre nullam potuimus) rem postea, eandem Prominentiam, ut ipse posuit, ex parte efficientem, eandemque indubiam, & sine manifesto errore in ista transversa sectione muliebris urethræ delineanda nullo modo prætermittendam, Prostatam videlicet inter eandem, & musculos circumpositæ crassitudinem ad C prætermisit. Ut enim muliebris Prosta-

ta cum virili comparata gracillior sit, non tamen propterea nihil est; idque sane, vel me tacente, ex Graafii Figuris 3. & 4. in Tabula LXXII. Lector postea satis colliget. Hæc, atque alia ad rem suam facientia omisit in ea Figura in qua tot aliena addidit. At hæc, credo, quæ addere „ ad complementum, & ornatum „ voluit, ea saltem recte periteque addita sunt. Scilicet id satis ostendit tubus ille campaniformis, quem, nisi litteram F inscriptam, & in Explicatione declaratam haberet, pro Vagina Uteri nemo acciperet. Satis quoque probant Ligamenta Uteri Rotunda K. K. quorum summam partem ut neque tam altam unquam comperi, ut naturaliter inde proficisci videretur, unde in Tabulæ, hujus Theatri LXXI. Figura Graafii prima, & in Tabularum Verheyenii XVI. & XVII. Figuris pariter primis; ita vicissim nunquam adeo humilem observavi, & multo minus in eam transversam protuberantiam vidi productam, uti in hac Figura, a sinistra præsertim parte, monstratur. Quid de Ligamentorum Testium *i. i.* seu longitudine, seu crassitie dicemus? Longitudinem certe uno transverso pollice non valde majorem in cadaveribus observo; hic autem vel duobus majorem video.

Crassitudinem vero, vel me silente, quis a dextris enormem esse, non cognoscat? a sinistris autem istud ipsum Ligamentum in Tubam abire, non miretur? Nam Tubarum quidem tantam jam prope Uterum crassitiem notare quid attinet? De Tuba autem dextera nominatim, quæ *melius in situ* esse dicitur, quid habendum sit, tunc satis intelligetur, cum Præclari hujus Figurarum Auctoris ineptissimam censuram a nostra Tubarum delineatione repellemus. Nunc illud tantum dicimus: tunc Anatomicos esse fortassis credituros, & istam Tubam, & cætera quæ in hac Figura ostenduntur, ex ipso naturæ exemplari in sua sede esse descripta, cum inter summi fundi uterini medium, & huic respondentes laterales pelvis parietes tantum intervalli esse, invenient, quantum hic inter litteram H, & S S intercedere, nunc mirantur.

## ANIMADVERSIO L.

**A**tque ut tandem aliquando hunc hominem cum suo isto Vesicæ Mechanismo relinquamus; ultima ejus Figura inspicenda est. In qua etsi affirmat, ut cæteros, ita nominatim Depressores musculos „ in sua insertionem appare- „ re; „ hanc tamen præsertim qualem ante descripsit, incassum hic quæres. Ad litteram autem d cum eam partem *colli vesicæ* esse, conceperis, quæ *infra prostatas* est; non poteris non mirari, Levatores Communes o. o. quorum in Epistola dixit „ primam eamque majorem expansionem „ nem ad collum vesicæ infra prostatarum corpus „ sat late distribui, & circumfundi; & amplum „ hoc pacto densumque progigni musculum pro „ statis, & tuberculo spongioso interjacentem; „ non poteris, inquam, non mirari, eosdem musculos vix demum paulo supra e, ubi *penis productio* esse dicitur, insertos ostendi, præsertim si cum hac Figura; „ in qua partes omnes multum infra „ ordinariam magnitudinem diminutæ sunt, „ & propterea intervalla quoque multum sint immi-  
422 „ nuta, necesse est, superioris Tabulæ Figuras duas priores contuleris, & locum insertionis Levatorum Communium in hac Figura cum loco insertionis eorundem in iis duabus Figuris contenderis, monitum in earum primæ Explicatione positum attendendo, eos Musculos „ sua super collum „ insertionem aliquanto inferius esse in ea Fi-  
420 „ gura delineatos. „ Cætera sciens volensque prætermittam, illudque unum addam: qua omnes hujus hominis Figuræ, eadem hanc quoque esse negligentia ex archetypo naturali descriptam. Quod vel obiter intuentibus satis superque significant summum os Sacrum adeo ab lateribus introrsum exstans, summum os Ilium sinistrum

De Teretibus Uteri Ligamentis.

431

422.

431.

420.



Ligamen-  
ta, Verte-  
brarum  
Corporibus  
interjecta.

Ad Sceleti  
conficienda  
Monitum.

nistrum adeo acuminatum, ea quoque transversorum processuum Vertebrarum lumborum (ut de ista eorum figura, & gracilitate nihil dicam) ea, inquam, ipsorum origo non a superiore, sed a parte prorsus media Corporum vertebrarum, ac denique interjectum vertebræ, & vertebræ aut nullum, aut certe sic tenue Ligamentum, ut vehementer dubitem, num ex naturæ exemplari hæc Figura descripta sit. Quod ne sine causa dixisse videar, scire licet, ejusmodi Ligamenta quibus Corpora vertebrarum copulantur, ex substantia inter cartilaginem, & ligamentum fere media constare, quam si transverlim totam feces, ex crassis quasi fibris, & ad modum semicircularum concentricorum elegantissime dispositis compactam invenies, nisi quod in posteriore eademque media parte, ut ipsa substantia magis durescit, sic ex fibræ non apparent. Hujusmodi igitur Ligamenta quanto nos magis ætate crescimus, tanto ipsa magis crassitudine decrescunt, iis scilicet fibrarum illarum stratis quæ vertebris propiora sunt, ossificatis, & in earundem vertebrarum naturam abeuntibus, ut quo plus ipsis Ligamentis crassitudinis decedit, eo plus vertebris accedat. Itaque hac etiam de causa ut altioris staturæ Sceleti parentur; seniorum quam juniorum ossibus

uti præstat. Hæc autem omnia ita sunt accipienda, ut tamen constet, non nisi perraro, idque in summa senectute, contingere, ut ex ejusmodi Ligamentis quædam, & nominatim vertebrarum dorsæ, tota ossescant atque oblitterentur. Certe illud ipsum Ligamentum cujus causa in hunc ingressi sermonem sumus, duabus ultimis lumborum vertebris interpositum, in variis ætatibus, sive in mulieribus, sive in viris inspiciendo, & cum dimidiata Corporis superpositæ vertebræ crassitudine comparando, sæpe observavimus, cum florente adhuc juventute crassius, & aliquando etiam multo illa crassius esset, in consistente autem ætate eidem æquale; in senioribus ea ipsa quidem tenuius, non ita tamen multo fuisse. Quæ cum ita sint, & cum quod cæteris præcepit, id eo magis ipse fecisse credendus esset, ut ad hanc demonstrationem *juvenile cadaver* selegisset; non levi profecto etiam summa istius Ligamenti tenuitas esse videtur indicio, hanc Figuram non ex cadaveribus, sed altunde, aut ex ejus memoria, ne dicam imaginatione descriptam esse. Sed jam nobis ad alteram Libri hujus tui II. Partem, atque adeo ad alterius tui Voluminis initium, est transeundum.

424

### Adversariorum Anatomicorum III. Finis.





# FIGURARUM EXPLICATIO.

FIGURA I. pertinens ad Animadversionem VI.



Intestini Recti aperti, atque explicati infimam internamque partem, & in hac Ani Columnas, & Valvulas, quemadmodum sæpe observantur, ostendit.

a. a. a. a. a. a. Ani Columnæ.

b. b. b. b. b. b. Interjectæ iisdem Valvulae Semilunares.

FIGURA II. spectans ad Animadversiones XII. XIII. XIV.

Intestini Coli partem cum Cæco, & Bauhini Valvulam, huiusque Frena, atque alia prætereare præsentat.

- A. A. A. Colon Intestinum a suo principio sursum in pariete dextero secundum longitudinem apertum, & explicatum.
- B. Veri, hoc est Veterum, Cæci Intestini pars externa.
- C. Intestinum Ileum haud longe a sua insertione in Colon, amputatum.
- D. Appendicula Vermiformis, quam huc ad latus protraximus tantummodo ut appareret; neque enim in hac, aut proxima Figura, id nobis proposuimus, ut huius Appendiculæ, aut Ileici frequentiore situm ostenderemus.
- e. Cæci Veterum Intestini pars interna.
- f. Intestini Ileici extremum orificium in rimamodum naturaliter occurrens: quod intra Coli initium sursum retraximus, ut quantum promineret intra intestini cavum ab \* videlicet usque ad f. si non satis ob concidentem nimirum mollis istiusmodi Partis substantiam, at certe quadantenus posset intelligi. Istud autem orificium, atque hæc prominentia Valvulam Bauhini dictam constituunt.
- g. g. Frena, seu Retinacula ejusdem Valvulae.
- h. Appendiculæ Vermiformis orificium, in quod specillum immissum est.

FIGURA III. ad Animadversionem pertinens XIV.

Eadem Intestina, quæ modo exposita Figura, ostendit, sed ab externa facie spectata, præsertim vero partem ultimam trium Coli Ligamentorum, atque horum finem in Appendicula Vermiformi.

- A. A. A. B. C. D. Eadem quæ in II. Figura, Intestina commonstrant.
- E. Appendiculæ Vermiformis initium cum tota Appendicula sursum retractum, ut in hac desinere tria mox indicanda Ligamenta, perspicue appareat.
- F. Ligamentum Coli Anterius.
- G. Posterius.
- H. Laterale. Quod quidem Ligamentum in hoc saltem, itemque in altero quod nuper secui, cadavere neque aliis duobus esse angustius, neque ut ipsa, pertingere totum vidi ad Appendiculam Vermiformem, sed ejus quoque partem per proximum Ileum produci.

Illud insuper huc addam, Riolanum tria quidem Coli Ligamenta aliquando memorasse; attamen cum in Monito quod in postrema suæ Anthropographiæ editione, post Præfationem subjunxit, quæ ante ediderat, excepto Encheiridio, abrogaverit, revocaverit, atque improbaverit; cumque in Encheiridio quo utimur, emendato

non nisi duo Ligamenta Coli agnoscat, in ea autem postrema Anthropographiæ editione loca omnia in quibus illa tria Ligamenta memoraverat, sedulo mutaverit, & pro tribus duo rescripserit; cum hæc, inquam, ita sint, satis nimirum hinc intelligi, cur neque illa scripta quæ ipse improbavit, unquam antea, & ne nunc quidem, nisi fortuito inspexerim, & si vel antea inspexissem, non tamen debuerim illud Riolo adscribere, quod ipse (nescio qua de causa) abrogavit, ac revocavit. Quod autem Summus Anatomicus Ruyschius, ut me nuper monuit Vir Cl. Laurentius Heisterus, tertium ipsi Ligamentum Coli ante annos duodecim demonstraverit, id vero si tempestive novissem, illius quoque nomen in memorata Animadversione XIV. haud illibenter adscripsissem.

Cum autem hæc typis jam jamque describenda essent, ut Adversariis III. adderentur; reddita est mihi cum ejusdem Præcl. Heisteri elaboratissimo de Re Chirurgica Volumine, aliisque mecum liberaliter communicatis Dissertationibus illa etiam quam de Valvula Coli inscripsit, Anatomica Dissertatio: quam inter, & pleraque eorum quæ in IX. & quatuor proximis, nec non in XVI. eorundem Adversariorum Animadversionibus de iisdem rebus edita fuerant, ut summum apparere consensum, gaudeo; ita haud ægre fero quod in perpaucis, inprimisque in Frenis, & compositione ejusdem Valvulae; si quis forte attentius utriusque scripta conferat; discrepare inveniamur. Quinimo ut omnes intelligant, esse mihi non modo non molestum, sed ob veri studium etiam pergratum, si quis ea qua Humanissimus Vir ratione a me dissentiat, & quantum judicio, ac candori Celeberrimi illius Professoris deferam; iis de rebus ita censeo. Quod Frena illa a me descripta, eadem ipse credit ac Vincula a Tulpio memorata; etsi in promptu esset respondere: duas, ut Tulpius inquit, exiles membranulas (non duas crassas rugas) subtus (non a lateribus) firmantes, vel potius detinentes valide; quod tamen non patebit nisi sagaci investigatori (non res statim in oculos incurrentes) detinentes, inquam, valide, - & alligantes. Ileo (non Colo) superiorem (non vero etiam inferiorem Valvulae partem; hæc quippe quantum a Tulpio subjicitur; fluctuat libere) nexum, inquam, Valvulae cum Ileo, qui; ut Tulpii ostendit minor Figura; ad eum locum est quem Cl. Heisterus in Tab. II. Fig. 3. per litteram B. commonstrat, alia omnia potius videri quam Frena a me descripta; etsi, inquam, hæc in promptu esset respondere: Et quod rursus Experientissimus Vir ita statuit, ut multis paradoxum videri posse, agnoscat, non e Crassi, & Tenuis Intestini, sed e Crassi tunicis Valvulam componi; etsi pariter eam perfacilem rationem hic iterare possemus, quam in XI. Animadversione proposuimus, ut videre omnibus perspicue liceret, non in exciccatis quidem, sed in recentibus, atque ideo integrioribus Intestinis Valvulam ex propria utriusque Intestini substantia componi: etsi, inquam, hæc, atque alia regeri a me possent; malo tamen hæc omnia Eruditorum, atque Experientium Anatomicorum, ipsiusque inprimis Spectatissimi, Humanissimique Heisteri judicio arbitrioque permittere.

Obs. Medic. lib. 3. cap. 21.



JO. BAPTISTÆ  
MORGAGNI  
ADVERSARIA  
ANATOMICA QUARTA.  
OBSERVATIONES COMPLECTUNTUR  
DISTRIBUTAS

IN L. ANIMADVERSIONES

*AD PARTEM II. LIBRI II.*

THEATRI ANATOMICI  
CL. V. JO. JACOBI MANGETI

SERENISS. REGIS PRUSSIÆ ARCHIATRI.



VENETIIS,


MDCCLXII.

~~~~~

EX TYPOGRAPHIA REMONDINIANA.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

IO BAPTISTE
MORGANI
ADVERSARIA
ANATOMICA QUARTA
OBSERVATIONES COMPLECTUNTUR
DICTIS
IN L. ANIMADVERSIONES
AD PARSIVM L. ANIMADVERSIONES
THEATRI ANATOMICI
CL. N. IO. JACOBI MANGETI
SERVATIUM REGII SOCIETATIS ACADEMICAE



VENETIS
MDCCLII
PUBLISHED BY J. B. ROBERTSON, NEW YORK
THE TYPESETTER'S RECORDS

ILLUSTRISSIMIS ATQUE EXCELLENTISSIMIS VIRIS

PATAVINI GYMNASII MODERATORIBUS

ALOYSSIO PISANO

EQUITI, AC ÆDIS D. MARCI PROCURATORI,

JOANNI PASCHALICO,

MICHAELI MAUROCENO,

OMNIQUE TRIUMVIRUM LITTERARIORUM ORDINI AMPLISSIMO.

Joannes Baptista Morgagnus S. P. D.

T si cum sæpe alias, tum præsertim superioribus diebus cum in hoc Thea-
 tro, post hominum memoriam frequentissimo, coram Senatoribus, & Equi-
 tibus Amplissimis DANIELE DELPHINO III., & FRANCISCO MAUROCENO hu-
 jus Inclytæ Civitatis Integerrimis ac Sapientissimis Moderatoribus *de Fæ-*
tus conformationis initio, progressu, & complemento verba facerem, dedi operam inter ipsa
 orationis initia, ut omnes qui aderant, intelligerent quantam AUGUSTISSIMO Vestro SE-
 NATUI, quantam Vobis, AMPLISSIMI VIRI, pro Vestris novissimis in me Beneficiis gratiam
 haberem; vix tamen ulla ex parte satis mihi fecisse videor, nisi enitar, ut iidem grāti
 devinctique animi sensus illuc etiam quo vox illa pervenire non potuit, per litteras pro-
 pagentur. E quatuor namque intra hos paucos annos SENATUS CONSULTIS perhonorifice de
 me factis, postremum certe non tantum ob singularem atque adeo inusitatam munificentiam
 longe fuit omnium honorificentissimum, sed propterea etiam quia de hoc faciendo eo con-
 sensu, eo tempore, eo loco ad SENATUM retulistis ut id ego non sperare modo, sed ne
 cogitare quidem auderem. Eodemque illud accessit ut paucissimis post diebus hæc fierent,
 quam mea Adversaria Anatomica Altera, & tertia prodiissent, non obscuro videlicet in-
 dicio; meam Vobis AMPLISSIMI VIRI, si minus doctrinam, & facultatem quæ sentio
 quam sint exiguæ, at diligentiam certe, & promptam semper ac supra vires paratissimam
 commendatis a Vobis Adolescentibus inserviendi voluntatem probari; Quæ res ut mihi
 animos addidit ad hæc porro perficienda, Vestrisque Nominibus Auspicatissimis inscri-
 benda Adversaria Quarta, in quibus pariter inter meas quas propono, aut tueor obser-
 vationes, eorundem Adolescentum causa ad ea etiam loca indicanda me demitto, a qui-
 bus in Theatro Anatomico, Genevæ nuper splendide quidem, sed negligenter edito, per-
 legendo facile ipsi in errores gravissimos trahi possent; sic ista eadem res & quas dixi,
 cæteræ omnes postulant atque adeo flagitant, ut quoniam AUGUSTISSIMO Vestro SENATUI,
 ac Vobis, AMPLISSIMI VIRI, dignas tantis in me beneficiis non modo referre, sed ne a-
 gere quidem gratias valeo, habeam saltem quantas maximas capere meus animus potest,
 cui ut ad agendas pro dignitate, vis negata, sic ad habendas immensa quædam ac pro-
 pe infinita capacitas ab Deo O. M. tributa est. Quamobrem meam illam pristinam va-
 letudinem, quæ quantum a quibusdam in speciem innocuis, re autem vera perniciosis
 atque exitialibus cadaveribus jam ab annis superioribus fracta sit atque attrita, etsi Ado-
 lescentes nostri, quorum commodis assidue in meis Ædibus, in Nosocomio, in Theatro
 inservire nihilominus pergo, vix adhuc ac ne vix quidem intellexerunt, ego tamen in
 dies magis magisque sentio; illam inquam pristinam valetudinem, nullam (ita me Deus
 amet, eandemque restituat) nullam æque ob causam desidero, atque ut longius spatium
 habeam ad Vestrorum erga me Meritorum magnitudinem cum recordatione gratissima, mi-
 hique semper jucundissima recolendam, tum omni devincti obstrictique animi significatione
 testandam. Interea autem dum aliæ ad hanc rem occasiones se se offerant, illam certe
 non amittam, ut Deum O. M. venerer, ut Vestram e qua publica pendet, Incolumita-
 tem quam diutissime conservet.

LECTORI BENEVOLO

JOANNES BAPTISTA VULPIUS


PHILOS. ET MEDIC. DOCTOR,

ET IN GYMNASII PATAVINI THEATRO ANATOMICO PUBLICUS INCISOR

S. P. D.



UR Quarta hæc, & duo item quæ proxime sequuntur Adversaria quamvis essent paullo post duorum priorum editionem absoluta, non tamen ante hoc tempus typis describi potuerint; illud porissimum in causa fuit, quod Cel. Auctori non tantum honestissima, verum etiam ob singularem ejus humanitatem suavissimosque mores gratissima occasio ab Amplissimo Lancisio oblata est tria hæc posteriora Adversaria qua minori posset severitate, innumeris in locis rescribendi. Quod postquam se facturum recepit, perincommode fane accidit ut ejus valetudo non ita multo post tempore gravior fieret. Itaque res in longum protracta est tum ob hanc causam, tum quia Auctor, ut est in servandis promissis mira quadam fide, & religione, hæc Adversaria novum hunc in modum rescripta, a Cel. etiam Viro, cujus ut nomen, & doctrina, ita integritas, ac prudentia omnibus, in primis autem Auctori, eidemque Illustrissimo Lancisio probe cognita est ac spectata, diligentissime expendi voluit, ne sibi forte, agro præsertim, aliquid contra ac recepisset, atque omnino vellet, elaboretur. Quenam autem illa quam modo commemoravimus, occasio fuerit, quod quidem ad Cl. Blancum attinet, ex his quas subjicimus Epistolis cognosces. Quod autem spectat ad Præcl. Mangetum, nolim quidem pro certo præstare qua porissimum de causa Auctori placuerit longe aliter in his Adversariis atque in prioribus se gerere. Vidi autem inter ejus manus autographum literarum Famigeratissimi, & Candidissimi Viri, in quo de Mangeto ipsi amicissimo hæc diserte scripta sunt: qu' ayant reçu de Mr Bianchi, à mesure que la presse rouloit, des Observations sur quelques endroits des Adversaria de Mons. Morgagni, il les a placées en leur lieu, d'abord qu'il les a reçues, sans s'être donné, comme il me l'a déclaré lui même, tout le temps qui auroit été nécessaire pour les lire avec exactitude: & paulo inferius, ubi ea quæ in Præfationis fine a Mangeto adjecta sunt, haudquaquam ledendi animo scripta fuisse, asseveratur, hæc adduntur: il m'a protesté par serment qu'il n'avoit jamais eu cette pensée, - pour choquer une personne dont il n'avoit aucun sujet de se plaindre, & pour qui il avoit, au contraire, une estime toute particuliere. Mibi itaque facile persuadeo, Auctorem multum his literis, multum aliis Cel. Fantoni, multum denique suo mitissimo ingenio naturæque tribuisse. Vale.



ADVERS. IV. TABULA.



Fig. I.




Fig. II.

Fig. IV.





Fig. III.



JO. BAPTISTÆ MORGAGNI ADVERSARIA ANATOMICA QUARTA

A D V. C L.

JO. JACOBUM MANGETUM

M. D. & Sereniss. Regis Prussie Archiatrum.

ANIMADVERSI O I.

TOM. II.
pag. I.



Quod Genitalium Anatomiam tradere, V. Cl. aggrediari Graafii potius verbis quam tuis, non improbo; quod ejus *Tractatibus tanquam tela uti velis, cui varia post Graafium detecta, & explicata in-*

texas, probo. Hoc autem num fatis in primo isto Capite præstitum sit, etsi magis tunc apparebit cum ad Tabulas ad ejus calcem rejectas venerimus; vel nunc tamen quicunque est Rei Anatomicae non ignarus, haud difficile intelliget, ubi animadverterit, Notulas pro recenti rerum copia, appositas esse omnino perpaucas, & ex his ipsis perpauca fere pleraque jam olim in Bibliotheca Anatomica fuisse editas, velut istam primam; quæ præterea ad Recentiorum Inventa nihil pertinet, ad Lectoris autem eruditionem haud multum. Neque enim istiusmodi observationes ita demum sunt raræ, ut pluries a me quoque Testes intra pelvim ad vesicæ latera non sint visi; illud profecto rarius est, duorum loco tres testiculos observari. Nam etsi Graafius ipse plures Auctores supra memorat qui id se aut novisse, aut vidisse, conscribunt, etsi alios insuper ex Schenckio, Rolfincio, Bartholino addere memoratis poterat; qui tamen per anatomen reapse id compererint, perpauca pro tanto numero fuisse, animadverto. Quam vero facile, & frequens sit, ut sive corpus epididymidis æquo majus, laxiorque nexu cum teste conjunctum, sive certo in loco vasa distenta, varicosa, conglobata, sive demum quodpiam præter naturam tuberculum, tertium in viventibus mentiri possit testiculum, cum anatome nos docuit, tum Professorum experientissimi Vesalius, ac Fallopius, deinde Bauhinus, & Rolfincius monuere. Quod quidem monitum neque a Graafio qui eas produceret observationes, omittendum, & certe a te, Vir Doctissime, qui Graafio adderes Adnotationes, subjiciendum esse videbatur. In Notula autem proxima, quæ & recens adjecta est, & ad Recentiorum Inventa pertinet, vereor ne multi hæc desiderent. Primum, ne tu eandem obscurasses. Ubi enim Graafius de Scroto ita loquitur ut eo nomine nihil aliud accipi tum velit, nisi testium tunicam communem externam, hoc est, ut ipse declaravit, *cutem cuticula testam*, ibi tu

interpellas, affirmasque: scrotum habere *Septum*, ut in nota adjecta apparet: quod quidem non nisi paulo post indicare licebat, videlicet ubi de altera communium tunica, & interna loqui Auctor incipit; ne illud septum quod ab interna fit, ad externam spectare videretur: Deinde quod ad ejus septi Inventores attinet (nam & ante Vesalium, & post Vesalium fuisse descriptum, in I. Adversariis ostendi) ut unum vel alterum verbum, ne Historiæ Anatomicae ullæ hinc tenebræ offunderentur, adjecisses; quod & infra desiderabunt, ubi Graafius, te silente, ita de minima testium structura loquitur, quasi nemo eorum quos ego, alique memoravimus, ante ipsum indicavisset: Postremo, idque maxime, ut si non de Septi Inventoribus, at certe quid de Septo ipso habendum esset, ex observationibus etiam Cl. Viro- rum Ravii, & Fantoni docuisses. Cæterum quod ad structuram attinet internæ Scroti membranæ, quam videlicet esse cellulosa, monstrat Summus Anatomicus Ruyschius, eandem immisso flatu distendendo, atque exsiccando; ego quidem memoria teneo, in cadaveris dissectione cujus cum internæ quædam partes, tum scrotum inprimis erat inflatum, vix huic ab altero latere cultri aciem fuisse impressam, cum repente, nulla sensibili re exeunte, universum scrotum subsedit, & eodem puncto temporis prorsus detumuit; ut ab istis inter se communicantibus cellulis conclusum flatum erupisse, ii qui aderant, judicaverint. Cum vero proprias quas appellant, Testium Tunicas paulo post Graafius describit, profecto poteras Notam aliquam subjicere in qua de structura naturaque Vaginalis Tunica quid Malpighius docuerit, commemorares, præsertim cum Graafius ipse non reticeat *aqueum illum humorem* quo & interna Vaginalis, & externa Albugineæ tunicae superficies perfusa cernitur, quemque adeo, ceu pericardii humorem, in aliis modica, in aliis paulo majore copia, non ea tamen ut antequam ægrotarent, de hydrocele inchoata quererentur, non interdum modo, ut Cl. Fantonus, sed haud ita raro collectum inveni, colore urinæ non dissimilem. Quod autem Graafius de quinta præterea testium tunica innuit, neque postea satis dilucide explicavit, num ita accipiendum est, quasi huc quadantenus spectare vellet membranas illas tenuissimas quas per rotam testiculorum substantiam excurrentes infra describit? an vero potius ita est intelligendum, quasi Albu-

num. 18.

9. 10
Advers. I.
num. 19.

Resp. ad
Ruysch.
Anatom.
Diss. 3.

De Gland.

5
De Vagi-
nalis tuni-
cæ Humo-
re.

Diss. cit.

5:

De Albuginea, & præsertim de Vaginalis divisione.

Albugineam dividendam crederet in duas? mihi enim haud semel contigit, ut ipsam facili, & æquabili divisione in duas membranas, seu mavis laminas distraherem, quarum intima tenuior erat. Nam quod sæpius quoque contigit, ut ab externa Vaginalis tunicae superficie alteram tunicam quam Musculi Cremasteris fibræ aut immediate complectuntur, aut fortasse etiam componunt, facillime & sine ulla vi ab summo ad imum dividerem, vel potius evolverem, haud sane censeo, id unquam Graafio contigisse, cum ne nomen quidem Erythrodis quo nempe a multis ista ipsa tunica significatur, admiserit. Equidem ex iis non sum qui conjunctas sibi fortiter tunicas dividendo, earum numerum conantur augere; sed neque tamen ex iis sum qui quæ hac ratione divisa cernuntur, ea quoque conjungenda esse, existimant.

ANIMADVERSIO II.

l. i. tr. 2. cap. 21. Adv. III. Anim. I.

DE Peritonæi Processibus, eorumque descriptione a Verheyenio proposita, quæ videlicet cum ista Graafii convenit, alibi a nobis dictum est. Itaque hic illud unum adnotabimus: si propter erectum hominis incessum a superiore peritonæi lamina processus isti clauderentur, quæ nempe causa ab utroque Auctore adducitur; futurum fuisse, ut non minus in muliere, quam in viro, clausi invenirentur. Hoc etiam quod tu declarare prætermisisti, minime a nobis omittetur: cum Graafius ullas in toto corpore visibiles anastomoses arteriarum, & venarum dari, negat, id nimirum de anastomosis, quæ inermi oculo visibiles sint, esse accipiendum, non quæ exquisitissimis microscopiis instructo. In ea autem Notula qua vasculorum ex quibus corpus ipsam testis compingitur, longitudinem majorem inventum iri, polliceris, quam sint trecentæ ulnæ florentinæ, id primum, Vir Cl. probare nequeo, te quasi Bellini verbis hoc promittere, quem certe quicumque vel apud te infra legerint, deprehendent quod ipse invenerit, narrasse, non quod alii inventuri sint, præstitisse; neque sane præstare poterat; non enim necesse est, omnes testes eadem revera esse magnitudine, & quod consequitur, eadem longitudine vasculorum. Præterea animadverto, in ista alioqui ingeniosa, & Bellino undequaque digna ratione minime attendi tot fibras, atque membranulas testium vasculis interjecta, vasa item sanguifera, & quidquid intra testem cum sit, illa vascula certe non est: quarum tamen omnium rerum pondere neglecto, satis accurata illa ratio esse non potest, cum quantum in nondum dissoluta, & ea quidem longe maxima, testis parte, rerum illarum pondus superest, tantum non veræ longitudinis ejusdem vasculis superaddat. Quod autem in proxima Adnotatione scribis, vidisse te epididymidis tubulum ab interclusi spermatis nimia copia disruptum, vide an non potius istud conjeceris, quam videris. Certe quæ narras, satis explicari sic possunt, ut abscessus ille sine seminis effusione contigerit, ruptura autem epididymidis non ab aggesto spermate, sed a distrahente, aut erodente materia abscessus sit consecuta. Verum ne me forte credas tibi libentius adversari, quam assentiri; quod in subjecta Adnotatione innuis ex Cel. Ruyschio, id ego in terrestri etiam testudine vidisse videor. Cum enim olim ab ejus testibus, qui mihi non, ut aliis, ex glandulis rotundis, sed ex minutissimis convolutis vasculis facti apparuere, epididymides leniter distraherem, vidi adversa luce minima & pellucida vascula a toto latere testiculi in latus epididymidis recta transeuntia sic ut ab eo tempore suspicatus sim, ex medio quoque teste tubulos egredi seminales. Cæterum hi tubuli qua ratione intra humanos quidem testiculos disponantur, ex Graafio colligi potest; Verheyenius autem cum a testium circumferentia versus medium excurrere eosdem, tradit, caninos potius

De eorundem tubulorum et testibus agressu.

loc. cit.

testes, certe non humanos describit. Ubi vero peculiaris illa structura penis assignanda est canum generi, utpote vesiculis seminalibus carenti, utilis adeo, ne dicam necessaria, ob quam videlicet quamvis

-- „ discedere aventes

„ Diverfi cupide summis ex viribu' tendunt, „ -- interea validis Veneris compagibus hærent; „ idem Verheyenius cum in finem illorum peni multas circumstare glandulas, dicit, quæ tunc scilicet intumescant, cum scire ex Graafio potuisset, non intumescantibus nescio quibus glandulis, sed ex crescentiæ spongiosæ, hoc est cellulis spongiosis eo tempore ab restitante sanguine tumefactis id esse tribuendum. Habet tamen Verheyenius nonnulla de sanguiferis humanorum testium vasis ad hypogastrica etiam, & pudenda pertinentibus, quæ superius a Graafio expositis addi poterant, aut saltem commemorari. Denique idem Verheyenius de vesicularum seminalium glandulis ne verbum quidem; recte, an secus, hic non judico; cum id videlicet ob eam dumtaxat causam indicem, quod in una ex tuis Adnotationibus positum videam: „ hodie apud omnes Anatomicos esse in confesso: „ in vesicularum seminalium membranis glandulas „ multas disseminatas reperiri, quæ succum in „ earundem cavum eructent &c. „

Ibid. c. 23.

16

Ibid. c. 21.

ANIMADVERSIO III.

Nunc ad ipsum Graafium revertamur: quem quidem prudenter fecisse, animadverto, cum ad pervulgatum illud argumentum ab iis brutis petitum quæ dicuntur demptis testiculis genuisse, non satis habuit illud unum respondere: a vesiculis, præsertim antequam testes exsecarentur, semine turgidis, hoc effluere potuisse. Hæc enim responsio eludi poterat ab iis qui id non modo de Arietibus, quos Graafius memorat, sed etiam de Canibus, de quibus silet, affirmassent; siquidem Thomas Cornelius sibi experientia compertum esse, scripsit; canem, cui testes fuerant abscissi, filios generasse. Vesiculas enim seminales in arietibus non ita semen potuisse a deferentibus vasis accipere, ut in multis aliis animantibus, propterea quia non ita sint cum iisdem vasis conjunctæ, etiam nos videmus observasse; in canibus vero certe non potuisse, cum ut paulo ante scriptum est, in his desint, satis superque intelligitur. Itaque aut alias addere responsiones, quod quidem fecit Graafius; aut observationes illas quibus argumentum nitebatur, in dubium trahere opus fuit: quod si Graafius fecisset, haud injuria fortasse fecisset; neque enim videor meminisse, ab iis qui ejusmodi observationes protulerent, quidquam, ut par erat, esse dictum unde constaret, eas foemellas ab aliis non exsecatis maribus, nemine, ut sit, animadvertente, iniri etiam non potuisse. Utcunque id est; antequam ad ulteriora progrediamur, mirari profecto subit, neque Graafium qui vesicularum, seu potius communium vesiculis, & deferentibus vasis ductuum in urethra finem plurimis in cadaveribus quæsit, neque dissentientem Swamerdamium, neque ex aliis Præstantissimis Anatomicis qui aliquid postea in urethra, aut ad urethram virilem invenire, quemquam, quod ego quidem sciam, prope illum ipsum finem, atque adeo in eadem Caruncula (caput gallinaceum vocant) in qua is finis est, id quod protinus describam, vidisse. Scilicet præter illa duo foraminula in quibus duo isti ductus finiuntur, & quorum singula in singulis ejus carunculae lateribus vulgo pingunt, atque describunt, esse inter utrumque tertium solet, sæpe quidem his paulo superius, aut inferius, & præterea aliquanto majus, ut quod parvæ instar fissuræ secundum carunculae longitudinem apertum est. Hoc ego vel ante novem, aut decem annos, cum aliud agerem, forte conspexeram, eique tenuis specilli tantam partem quanta apicis minimi digiti latitudinem ferme æquaret, in uno vel altero cadavere immiseram. Postea

18. De animantibus quæ exsecatis testibus genuisse dicuntur.

Progymn. 5.

Tertium Carunculae Seminalis Foramen, & Sinus peculiaris.

autem

autem cum, seminalibus compressis vesiculis, non ex lateralibus modo, sed ex hoc etiam medio foramine erumpens semen vidissem; specillo immisso, secundum hujus, & carunculæ longitudinem hac incisa, parvam oblongam caveam, seu mavis Sinum detexi, qui etsi in quibusdam minor est, sæpe tamen latitudine carunculæ respondet, longitudine autem summam hujus, quam versus protenditur, partem superat. Parietibus est lubricis, & mollibus; hosque humidos propriæ, ut opinor, servant exiguæ glandulæ, quas nonnunquam ibidem videre visus sum granulorum instar protuberantes. Nam quod aliquando conjece-ram, nonnullos subjectæ Prostatae canaliculos intra hunc Sinum influere, exprimendo confirmare nunquam potui. Ductus autem seminales etsi nonnunquam, ut ex paulo ante dictis intelligitur, cum Sinu communicant, hoc tamen fieri perraro, multis accurate inspectis, dissectisque carunculisprehendimus. Quo magis Sinus hujusce usus ita obscurus incertusque videtur, ut in præsentia quidem ipsum definire omittamus. Ejus tamen descriptionem prætermittere nolimus tum quod in ejusmodi Parte, tum quod frequentissime invenerimus. Nam de carunculis quindecimejus rei gratia nuper, & continenter inspectis certe duodecim Sinum quem descripsimus, exhibuere. Etsi enim ex his duodecim duæ non nisi duo foramina ostenderint; horum tamen alterum & majus erat, & in ejus- cemodi Sinum ducebat; in quo ductus seminalis ejusdem lateris finiebatur.

ANIMADVERSI O IV.

JAm vero ne tuas reliquas Adnotationes non legisse videar, de earum nonnullis unum vel alterum addendum est. In ea igitur in qua dicis, opportunam Prostatae *intus* & *extus* compressionem a Cl. auctore Mechanismi ad rejectionem, ac detentionem urinæ excogitati, *abunde explicatam fuisse*; crederem, si fibras istas *substantiam* prostatae *trajicientes*, atque ideo intus comprimentes aut tu non poneret, aut ille saltem memorasset, & si eam partem Musculorum Ani Levatorum cui ad prostatam exterius comprimendam e- gregius Anatomicus Cowperus plurimum tribuit, ille cognitam perspectamque habuisset. Ubi vero Graafius scire se, negat, utrum in aliis præter gallos gallinaceos animantibus duplex penis invenia- tur, cum addere tu quidem posses mares omnes quos- cunque notos habuit Experientissimus Reditus de genere lacertorum atque serpentum; mares tantum- modo memoras viperarum. Quorum dupli- cem penem cum „ in sua, inquis, extrema- „ te globosa, variis, dum erigitur, & evagi- „ natur quasi spinis rigidioribus - abundanter „ esse consitum; „ haud satis videris eosdem perspexisse. Nam si aliquanto validius ad eorum radices digitum apprimendo, eosdem penitus eva- ginasses; singulorum extremum, quod globosum visum est, in duos alios quasi penes partitum vi- disses, iisdem aculeis exasperatos. Quod cum sæpe olim Venetiis una cum Amicis, & in his Doctissimo Gulielmino observassem; is postea ad- monuit, jam antea ab Eduardo Tyfone in Vi- peræ Caudisonæ Anatomia indicatum, pictum- que esse. A quo tamen diligentissimo Prosector- re, quantum ex Actis Eruditorum Lipsiensibus intelligo, dissentire cogor cum in aliis quibus- dam, tum in vasis semen deferentibus. Neque enim per penes hæc vasa, sed sulcum dumtaxat quendam, vel, si mavis, *semicanalem* & ipsum cum penibus bipartitum, produci vidimus, qua- lem videlicet; nisi quod, ut penis magnitudo postulat, major est; in testudine saltem terre- stri observavimus; nam in eo quoque animali sulci illius extremum non, ut alii pinxere, sim- plex, sed duplex bifidumque esse, animadverti, nimirum ut unus penis semen possit ad duos ute- ros comportare. Cæterum an in certo quodam piscium genere duos revera penes viderimus, & cur duo, ut dixi, gallo quoque sint dati, cum gal-

linæ uterus unus sit, alias fortasse disquiremus: Nunc enim illud est potius ex te, Vir Cl. qua- rendum, cur de Ligamento Penis Suspensorio, de Cowperi Glandulis Mucosis, de alia Glandula Cl. Littrii, de nostris Urethræ Canaliculis, de Glandis ipsius five Glandulis, five Papillis, de Transver- sis, & Triangulari Penis Musculis, cur, in- quam, de his, aliisque ejuscemodi, ac de eorum usibus ne unum quidem verbum in his tuis Graa- fio subjectis Additamentis, five Adnotationibus reperiatur? Dices fortasse, te illa omnia in pro- ximas Tabulas, earumque Explicationes rejecis- se? Esto; sed quamvis ibi & de iis omnibus, & satis dixisses, quod num feceris, videbimus in loco; tamen hic poteras aut uno vel altero verbo de singulis ibidem perquirendis Lectori in- dicare, aut quod dumtaxat de cellulosa penis membrana indicas, id ipsum pariter omittere.

ANIMADVERSI O V.

PRæter hæc quæ cum essent omissa a Graafio, a te erant adjicienda, atque ut tuis verbis utar, ejus Tractatui, tanquam telæ, intexenda; alia erant in his quæ posuit, fortasse notanda, ut cum inter partes *internas, seu contentas Penis* præter duo Corpora nervosa Septum insuper con- numeravit; quod quidem septum, ut verum di- camus, non videtur pars ab iis Corporibus dis- tincta, sed tantum amborum qua se contingunt parietes in unum juncti, & magis magisque quo magis ad glandem accedunt, extenuati, & de- mum ferme deficientes: Ut cum *inflatis corpori- bus nervosis, spongiosam Urethræ partem statim etiam intumescere*, sine ulla dubitatione affirmat, & *contra*; quod experimentum si mihi uni haud respondisset, minus profecto mirarer; sed con- stat, Summo etiam, & cum in aliis, tum in e- jusmodi rebus exercitatissimo Anatomico Ruy- schio, nisi *perquam raro* non respondisse: Ut cum Glandem *substantiam quandam* esse, docet, *reliquis Penis partibus carnosiore apparentem*, quæ duobus corporibus nervosis, & urethræ ap- ponatur, minime videlicet agnoscens, id quod corporibus illis apponitur, nihil aliud nisi ipsius urethræ spongiosam substantiam esse, quæ nimi- rum non attenuata atque gracilior, in glande, velut supra dixit, obliteratur; sed quemadmo- dum Ruyschius idem admonuit, in fine expan- ditur, atque externam glandis substantiam totam constituit. Quæ hic tria potissimum adnotare voluimus, quoniam Verheyenium, Graafii au- thoritate facile permotum, fere eadem quæ ipse, docere, animadvertimus; cum tamen haud diffi- cile sit, verum sic satis deprehendere. Nam vel sine ulla præparatione, substantia urethræ spongio- sa secundum longitudinem aperta sic ut sectio in- tra ipsum quoque glandis corpus alte producat, conspicuum est, maximam glandis partem nihil esse aliud quam spongiosæ illius substantiæ ure- thræ productionem: quæ porro dissectio si secun- dum urethram ad alterum usque spongiosæ ejus- dem substantiæ extremum producat quod bul- bum vocamus; illud quoque Verheyenio haud sa- tis considerate excidisse, intelligetur, quod illius substantiæ cellulas *minus esse sanguine refertas*, in universum docuerit. Quod si quis illa paulo dili- gentius velit cognoscere; is antequam sectionem instituat, nervosa penis corpora, ut Graafius docuit, primum abluat, deinde per arteriam bulbum a late- re subeuntem sæpe aquam injiciendo, det operam ut ab iis reliquis cellulis cruorem auferat. Tum aqua leniter expressa, utrum volet per eandem ar- teriam aut aerem impellat, eoque incluso, Par- tem exsiccat, aut vini spiritus colore aliquo in- fecti pauxillum cum immiserit, misturam ad eun- dem modum coloratam ex liquata cera, aliisque in vulgus notis injiciat: atque hac ratione ad ea de quibus dictum est, accurate exploranda sibi aditum faciat. Et Cl. quidem Santorino, nobis- que hæc olim peragentibus, nihil aut aquæ, aut

De intima
Penis
structura.

23

Obs. Ana-
tom. 100.

I. I. tr. 2.
cap. 24.

Ibid.

17

Myot. c. 6.
Adv. III.
Anim. 44.

22

Degli A-
nim. Viv.
De Vipe-
rarum, &
Testudi-
num Ge-
nitulibus.

A. 1684.
M. Mart.

aut aeris, aut spiritus vini, aut mixturæ demum qua per eam arteriam injecta, universa urethræ substantia spongiosa distendebatur, nihil, inquam, prorsus intra nervosa penis corpora permeavit; aqua vero donec permisimus, per venam penis integumenta perrepentem referebatur. Postmodum pene dissecto, quo colore spongiosam urethræ substantiam, eodem totam glandis externam substantiam, quæ ita distenta erat, ut totum fere glandis corpus ex ea constare videretur, infectam deprehendimus, hoc uno discrimine quod glandis cellulas spiritus vini, spongiosam autem urethræ substantiam mixtura complebat, non, ut opinor, quod glandis cellulas earum parvitatem hæc subire non potuisset, sed quod vini spiritus eas omnes ante occupaverat.

Cum vero intra nervosa penis corpora frustra aliquid ejus vel aquæ, vel mixturæ quæsitum esset; illud observatione dignum fuit, ipsam nervosorum corporum substantiam eodem illo tinctam colore, hoc est viridi, apparuisse. Mitto cætera quæ notari in Graafio fortasse poterant; Mitto etiam quæ in adjectis ex Leuwenhoeckio, qui exempla *conceptionum* extra uterum pro *commentis* habet: qui in cuniculis nihil ad rem faciens post coitum eorundem videre potuit: qui gallinarum ova *per ligulam tantum* esse, docet, ovario alligata: qui; ne longus sim; a testium vesiculis ova non distinxit; qua in re utinam eum qui alioqui ipsi adversatur, Litterum, & plerosque alios, in quibus te quoque ipsum, Vir Cl. infra inveniemus, secum facientes non haberet. Tuas denique illas veteres, quasque adeo in Bibliotheca etiam Anatomica protuleras, dubitationes mitto de vermiculorum in semine, non usu quidem, sed existentia; quanquam peculiaris, & constans eorum figura, & illæ motus quo se se agitant, conditiones non multum sane polyposis moleculis fortuito con crescentibus, & fortuito motis videantur convenire. Verum hæc alii viderint; nos enim ne de his vermiculis perpauca quædam, certis quibusdam hominibus haud magnopere placitura, hoc fortasse in loco adderemus, scriptis suis pereruditus ultro præstitit Vir Nobilissimus, Doctissimusque Antonius de Comitibus Patricius Venetus. Itaque ad Tabulas jam transeamus.

ANIMADVERSIO VI.

30 **I**nitium ducis a Figura Terranei, quam frustra, ut postea videbimus, narras, jam anno 1701. tibi fuisse communicatam. Hæc tamen ad te missa sit oportet cum alia Explicatione atque ea est cum qua Cl. Fantonus A. 1709. ad me misit; nam illa pagella non modo præ se fert Annum quo est edita, 1702. sed in præfixo Explicationis argumento hæc habet: „ una cum „ Urethra virili, ablatis nervosis Corporibus, „ per longitudinem superiorem, a Glandis extremo ad usque Vesicam diffusa. „ Pro quibus verbis ista altera tecum communicata hæc videtur habuisse: *una cum Urethra Virili per longitudinem discissa, a Nervosis seu Cavernosis corporibus, a Glandis extremo ad usque ipsum Vesicæ corpus spoliata.* Hic non dico, longe aliud esse, ut infra apparebit, in hac anatome urethram utcunque *per longitudinem*, ac *per longitudinem superiorem* discindere; illud tantum dico, auferri quidem, idque nullo negotio, posse ab urethra corpora nervosa; ab iisdem autem *Nervosis corporibus* urethram a *Glandis extremo ad usque ipsum Vesicæ corpus* spoliari posse, id vero esse quod nemo dixerit, nisi eorum corporum initium, & finem prorsus ignoraverit. Tuum itaque erit, Mangete Ornatissime, cuinam hoc imputandum sit, indicare; nam si Terraneus ita scripsit, æquum est illi ignoscere qui postea emendavit; sin autem tuæ sic Operæ descripserunt, fatearis necesse est, ipsarum culpa ut tot aliis in locis, ita & istic Auctorum verba esse non mutata mo-

do, sed vehementer depravata. Cæterum istius Figuræ pars superior cum nihil aliud sit nisi una ex illis Graafii Figuris quas tu haud satis bene prætermisisti, ipsa primum quam perite a Terraneo descripta, atque explicata sit, videamus. Principio *omnia in magnitudine naturali* exhibere se, dicit. Mitto quærere, num id observaverit in vasis sanguiferis d. d. & Deferentibus DD. illud tantum peto, ut ingens quam isto in loco delineat, Vasorum Deferentium cavitas cum anatome conferatur. Quid vero de Explicatione ipsa dicam? In qua cum Vesiculas indicat seminales, id quod non erat omittendum, & Graafius certe non omiserat, *inflatas*, ostendi, reticet. Idem Graafius cum oscula ductuum Prostatae, & quidem pleraque omnia quam hic minora, indicaret, monendum sibi esse, credidit: *nisi inflentur, punctis quibusdam solummodo esse conspicua*; Noster autem non modo id non monet, sed et si litteris h. h. eadem in Figura notavit, de ipsis in universa Explicatione ne verbum quidem facit, oblitus videlicet totos septem vel octo annos, intra quod spatium istam ipsam Explicationem semel, atque iterum edidit, se eas litteras apposuisse. In eorum etiam ductuum numero exhibendo non diligentiorum fuisse, illud esse indicio potest, quod cum Graafius *non meminerit, se in homine pauciores decem invenisse*, & revera nunquam nisi plures delineaverit; hic novem, non amplius, pingat. Quæ omnia cum ita sint, hoc est cum quæ Graafius sive delineando, sive explicando proposuerat, ne ea quidem recte descripserit; frustra aliquis exspectasset, ut in hac superiore Figuræ, & Explicationis parte de suo aliquid interponeret aut declarando quid sit illud oblongum & teres corpus sub littera A. per internam & posteriorem vesicæ partem descendens, quidve item sit in cer vice ejus ima extans illud triangulum cui litteræ F, & B. inscriptæ sunt, aut si hæc ita ex anatome non constarent, utrumque prætermittendo.

ANIMADVERSIO VII.

JAm vero his, atque aliis omissis, reliquam Figuræ partem inspiciamus. Et de Musculis nil quidem; satis enim multa, ut de iis fileamus, supersunt. Ac primum quæro, utrum in Figura tecum A. 1701. communicata flocculi isti fuerint (quoniam alio nomine appellem, nescio) quos istic ad litteras K. K. & infra conspicio? & num quoque tot ista foraminula quæ ab litteris i. i. ad ductus usque Prostatae occurrunt? nam ut hæc omnia in ea etiam videam quæ cum Terranei libello edita est, certe in illa quæ A. 1709. missa ad me fuit, nihil erat ejusmodi. Quæro deinde, hæc omnia quid sibi velint? nam quod per litteras K. K. denotari lego *Tuberculum spongiosum urethræ appensum*, id quam abnorme sit, indicare potest singularis littera K. inferius posita, per quam id ipsum tuberculum significari, in editis a se Explicationibus Terraneus constanter docuit, & recte id quidem. Sed quoniam ejus negligentia factum est, ut quas & res, & litteras Figuræ adderet, earum explicationem prætermitteret; facile poteris ex ejus libello conjicere, quid sibi voluisset. In eo enim describit (quam recte, hic non judico) *quandam Prostatae productionem glandularem cum plurimis rivulis* in istam ipsam regionem emissis in qua memorata addidit foraminula. Sed permirum est primum, hominem Galliæ tam vicinum A. 1709. quo librum edidit suum, nondum Commentaria Reg. Scient. Academiæ Parisiensis Anni 1700. perlegisse, & sic istam *productionem* quam A. 1702. a se *primum observatam* esse, confitetur, nihil esse aliud nisi Glandulam a Cl. Littrio ante descriptam, non vidisse: deinde istos *rivulos*, quos Cl. Fantonus animadvertisse se, negat, & quorum ego in pluribus urethris nullum, in paucis unum vel alterum, in una tres, in alia demum, sed mor-

18

30.

De Gland.

obl. 3.

De Littrii
Glandula.
Anatom.
Diff. 2.

Philos.
Transact.
1660.
Glandul.
Descr.

A. 1700.
M. Jun.
A. 1702.
M. Nov.

morbosa, plures conspexi, ipsum & plurimos, & ita crebro vidisse, ut hunc in modum Figuræ addere non dubitaverit. Sequuntur Glandulæ MM. quas *Adstites Conglomeratas* appellat, cum antequam ipse primum videret, Cowperus Mucosas Glandulas appellasset, & tum descriptione, tum Figuris quas tu in LXVII. Tabula proponis, exhibuisset; hæc autem magis mirum est, Terraneo priusquam librum suum ederet, haud innotuisse, sive ex Cowperi multiplici scripto, illoque præsertim latino, sive ex Commentariis paulo ante commemoratis, sive ex Actis Eruditorum, sive ex Primis nostris Adversariis, sive ex Annotationibus Cl. Pauli ad Hornii Microcosmum, sive demum ex binis quas de re hac ad communem Amicum Cl. Fantonum dedimus, litteris. At saltem eas Glandulas, & ipsarum ductus recte pinxisset. Non aliter autem pinxit quam si in eo ipso loco ubi urethram discidit, locatæ in medio se se contingerent, atque inde suos ductus ad oppositum urethræ parietem mitterent. Et ne de horum amplificatis orificiis quidquam addam; perlibenter transeo ad ductus, parvaque orificia nescio quarum urethræ glandularum, quas ipse *Disgregatas* appellat.

ANIMADVERSIO VIII.

De duplici genere
Canaliculorum
Urethræ.

num. 10.

Giorn.
d' Ital.
T. 10.
Art. 7.

Quibus de rebus antequam dico, de huiusmodi inferiorum Urethræ Ductuum duplici genere, & de singulorum generum tum discriminibus, tum Inventoribus nonnulla præmittam, necesse est. Annus jam inceperat tertius ex quo Prima Adversaria emiseram, & in his Ductuum Urethræ utrumque genus *plures ante annos*, quod ibidem testatus sum, a me observatum, ita descriperam, ac delineaveram, ut proclive esset omnibus intelligere, me de *majorum*, eorundemque *peculiarium* genere longe magis quam de minimorum, & magis communium, quæ *Foraminula* appellavi; ut par erat, fuisse sollicitum; cum Vir Doctissimus Joannes Fantonus, ut summa est humanitate, ita ad me primus ipse atque ultro litteras dedit, in quibus, ut in primis fit epistolis, cum multa de me benigne, nonnulla de se modeste conscriberet, pauca de Cowperi Mucosis Glandulis interjiciebat, quærebatque, an cum his Terranei Tabula conveniret, quam nisi vidissem, se esse missurum, pollicebatur. Ego vero qui neque Bononiæ, neque Venetiis, neque Patavii, quanquam sæpe, atque adeo quotidie cum Eruditissimis Viris de Anatomie, & de Anatomicis sermones contuleram, in quenquam tamen ante eum diem incidissem qui Terraneum, aut ejus Tabulam memoraret, ita Cl. Viro respondi, ut de Cowpero quæ sciebam omnia significarem; istam autem Tabulam vidisse, negarem, ideoque ut ad me Venetias quamprimum mitteret, etiam atque etiam peterem. Misit, inspexi, contuli, & hæc statim rescripsi, quæ quoniam & valde huc pertinent, & jam a Cl. Viris qui *Diarium Eruditorum* Italiæ scribunt, probante id in litteris postea ad me datis, atque laudante Fantono, Terraneo autem silente, sunt edita; idcirco ex ipso litterarum nostrarum autographo quæ III. Kal. Apr. A. 1709. datæ sunt Venetiis, huc transcribentur. De Tabula quam ita diligenter misisti, gratias ago quas possum, cumulatissimas. Aliqua illa ex parte cum Cowperiana, ex aliqua cum mea convenit, ex omni parte cum neutra. Nam neque tertiam Cowperii Glandulam, neque Canaliculos exhibet meos, præcipuos illos dico, & quos præcipuo cum studio proposui, primum videlicet majores, tum elliptico, aut triangulari, non alio, hiantes orificio, ad hæc (quod ipsis magis est peculiare) in eadem omnes recta linea, & in eo loco constitutos quo in loco transmissæ Urethra Tabulæ dissecta est. Non dicam, Canaliculorum internam faciem, quæque in ea sunt, hac in Tabula non proponi, neque ad *Morgagni Adversaria Anat. IV.*

di, an semper, iisdemque semper figura, magnitudine, intervallo, ordine reperiantur, quem præterea humorem, & quo potissimum tempore, quibusque de causis, & in quos usus emit. tant, quæque ego cætera ea ratione sum excusus, ut sicuti æquis rerum æstimatoribus planum esse potest, me illos primum delineasse, ita omnino omnibus non planum esse non possit, me illos primum descripsisse. Reliquos vero canaliculos etsi ego quoque majores alios, alios minores delineavi, hos tamen uno omnes *Foraminulorum* nomine complexus sum: neque hos negaverim cum ductibus utriusque generis (*) istius Tabulæ convenire; quin gaudeo, in eadem me cum industrio ipsius Auctore incurrisse, ut eum credo gavisurum, quod & ipse in eadem cum tanto Anatomico, quantus est Cowperius, incurrerit. Quæ ego hic scripsi, ut meam super his rebus sententiam habeam, in qua si quid fallor, abs te libere moveri, cupio, non tanti unquam observatiunculas meas, quanti æquum, & verum facturus. Quod si ulla tibi cum Viro isto Præcl. (quem ut solertem esse, video, ita humanum, atque ingenuum esse, credo) intercederet amicitia, isque in mea forte Adversaria incidisset; pergratum faceres, si illius mihi sententiam, meum ipsi animum, atque institutum significares, tum quomodo illius Tabulam nunc primum viderim, edoceres, & plurimam denique meis verbis salutem diceres. Ex his plura breviter sunt colligenda. Illud primum: vehementer igitur (ne quid gravius dicam) hallucinatum esse Terraneum, cum Juveni cuidam Medico; ut ex hujus quæ apud me nunc servatur, Epistola apparet; A. 1710. affirmare non dubitavit, ejus Tabulam a Cl. Fantono ad me Bononiam jam ab A. 1703. missam esse: quod ne acrius refellam, tria faciunt, primum, in ea Tabula illos quos ego præcipue descripsi, & delineavi, Canaliculos deesse, ut sive eam vidissem, sive non, perinde sane fuisset futurum: alterum, in eadem Epistola exemplum etiam afferri litterarum Terranei in quibus ita de Cl. Vallisnerio loquitur, quasi hic jam ab A. 1701. eandem a se Tabulam accepisset; quam Vallisnerius sancte confirmat ante A. 1710. quo cum Terranei libro huc est allata, non vidisse: tertium, Fantonum ipsum in sua laudatissima Anatomia, A. 1711. valente, & vidente Terraneo, Augustæ Taurinorum edita, ultro testimonium pro me dixisse; Postquam enim scripserat: *Unus videtur Morgagnius hosce urethræ meatus nemine edoctus novisse, quos in eruditissimis Adversariis delineavit, atque descripsit*; diserte hæc addidit: *Neque vero Vir eximius Terranei Tabulam inventi inscius viderat, quam superiore anno Viro integerrimo misi.* Colligendum est deinde, quam in partem accipienda, & quemadmodum contrahenda sint ea quæ de nostra sententia nostris verbis eodem in loco Cl. Fantonus subjicit; videlicet cum duo sint genera istorum Ductuum, Majorum scilicet ac peculiarium, & Minimorum ac magis communium, non illorum, sed horum tantum Inventorem tunc a me fuisse Terraneum facile, prompteque existimatum, & candide, libenterque declaratum. Illud tamen judicium nunc idem revocare in dubium me cogit amor veritatis, ob Graasii videlicet locum ab eodem productum, & a Fantono etiam indicatum, a me vero, cum scripsi, vel quia circa alterum Ductuum genus potissimum versabar, vel quia omnes omnia videre non possumus, haud satis animadversum. Scribit enim Graasius: innumeras, biles vias, quæ per totum urethræ ductum, præsertim in vitulis, aliisque animalibus grandioribus conspiciuntur, ad humectandam urethram, satis multum liquoris posse adferre; quæ quidem viæ ut neque numero, neque loco, neque speciebus animalium quibus sunt communes, cum majoribus nostris, & peculiaribus Canaliculis ullo pacto conveniunt, sic contra iisdem ex rebus videntur cum

(*)
Vid. infra Anim.
10.

Diff. 8.

18.

cum minimis; ac communibus istis quos delineavit Terraneus, longe magis convenire.

30.
cap. 3.

Quæ cum ita sint, jam intelligis, opinor, Mangete Ornatissime, frustra illud supra narratum esse: hanc Terranei Figuram jam A. 1701. tibi fuisse communicatam. Pars enim ipsius superior Graafii est; inexplicati illi Flocculi ad Littrium, aliosve pertinent; Conglomerata Adstites, earumque ductus si non ad Meryum, quem Terraneus ipse indicavit demum, certe ad Cowperum; reliqui minimi ductus facile ad Graafium, qui quidem omnes ante A. 1701. ea proposuerant. Quod vero ad me attinet qui post eum annum scripsi; equidem ut parvulos istos ductus de quibus videlicet non multum unquam laboravi, ab aliis inventos esse, ultro, velut dictum est, ac facile agnovi; sic contra, Majores alios & peculiare mihi assero. Hos autem colligere ex iis quæ supra exposita sunt, & ex mea ipsa Figura satis potes, non modo a Terraneo non esse visos, sed dum urethram per superiorem, quod tu omisisti, longitudinem in medio, quæ nimirum sedes est eorum, discinderet, perperam esse laceratos.

ANIMADVERSIO IX.

De Canaliculis urethrae Majoribus, & prima virulenta Gonorrhæa sedes in his potissimum agnoscenda.

cap. 5.

DESunt igitur in hac Terranei Figura Ductus Urethrae non modo, ut sæpius dictum est, majores, & peculiare, verumetiam ad rem ejus longe magis, quam cæteri, pertinentes. Cum enim ad virulentæ Gonorrhææ sedem præcipuam, atque adeo primam statuendam urethrae ductus sibi quærendos sumpsisset: quis non videat, ob istas ipsas rationes ob quas eam sedem in minimis illis canaliculis, eorumve glandulis statuit, longe melius, atque facilius esse in Majoribus constituendam. Nam si vicinior pars facilius inficitur; sæpius quidem contingit; quantum ex nostris omnibus inter se collatis observationibus intelligimus; ut Major aliquis Canaliculus extremæ urethrae vicinior sit, quam isti alii: si puriformis liquor, qualis scilicet ante veram saniem primis potissimum ejus morbi diebus solet profluere, ex irritatis minimis istis canaliculis provenire potest; par liquor & facilius, & majore copia a Majoribus potest prodire. Sed quid ego ejus singulas rationes persequor? Ita nimirum omnes se habent, ut cum pleræque utrisque Canaliculis sint communes, nonnullæ, si bene res excutiat, Majoribus Canaliculis magis congruant, velut illa quod dolor urgeat ubi confertiores sunt glandulae, nimirum ad urethrae fossulam. Ibi enim neque confertiores, & perraro sunt ductus minimi, ut postea ostendetur; itaque is dolor tribuendus est cum plerisque aëri materiæ in ea fossula remoranti, eandemque adeo demum exco-rianti; Et sane; si quod diligenter sciscitando ex tribus, vel quatuor Gonorrhæa affectis cognovi, id plerisque commune est; eo dolore primis quidem diebus non cruciantur, sed alio potius eam urethrae partem obsidente cui primus, idemque haud raro maximus Canaliculus solet respondere, hoc est pollicem, vel digitos quasi duos transversos distantem ab extrema urethra. Ibi ardore quodam cum urinam redderent primis diebus; ibi subsequenter majore cruciatu, sive mingerent, sive arrigerent, torqueri se, fatebantur; ibi demum postrema mali vestigia aliquando sic hæ- re contumaciter, deprehendi; ut victis jam reliquis noxis ab Lue Venerea universo corpori illatis, eo uno in loco dolor quidam perstaret, quem in Mutinensi Juvene inprimis permolestum, & pluribus, diuturnisque internis, externisque auxiliis non cedentem, memini balsamis de Copai- be, & Peruviano cum stillatio Guajaci oleo permistis, & affecto urethrae loco rite adhibitis, præter spem, & expectationem facile vicisse. Postremo quicumque cum exiguis illis, & conciden- tibus minorum ductuum osculis ista Majorum quæ videlicet ampliora sunt, rebusque urethram extrinsecus subeuntibus obversa hiant, orificia

comparaverint, proclive his erit intelligere, quam opportuniora hæc sint ut virulentis halitibus, ita salutaribus injectionibus admittendis. Sed hæc obiter.

ANIMADVERSIO X.

NUnc quoniam Terraneus quos potissimum delineare par erat, Ductus non vidit; num cæteros, quos vidit, recte delineaverit, dispiciamus. Et primum, quod ad eorum figuram attinet quæ istic exhibetur ad modum coni, basim in orificio quod hiat in urethra, verticem in contraria parte habentis, nemo potest Terraneo magis adversari, quam ipse sibi. Ubi enim hosce ductus describit, „ utriculum, inquit, „ glandulosum, se se angustando guttulum suum „ efformare, & sensim exilescentem meatum pro- „ ducere, ac per nervosam urethrae tunicam trans- „ versum agere, figura conicum, cujus latæ ba- „ sis loco ipsa est glandula, apex in Urethrae „ cavitatem hiatus. „ Deinde quod spectat ad locum singulis suorum Ductuum, ut ita dicam, generibus in Figura assignatum (nam ut valde minores sint nostris, alii tamen ex ipsis, ut ego quoque delineavi, sunt minores, alii majores) de minoribus quidem ita mihi observatum est. In extrema parte urethrae, atque adeo in Cavernula S (quarum an illam nimis amplificet, & num hæc in omnibus urethris inveniatur, exercitati sat sciunt Anatomici) in ea igitur extrema urethrae parte non nisi raro contingit, ut minores ductus, parvaque orificia inveniuntur; cum vero inveniuntur, non cavernulam dumtaxat occupant, ut hic pingit, sed reliquis etiam extremæ urethrae lateribus communia sunt; usque adeo a vero alienum est quod in libello pluries inculcat: Urethram glandulis numerosius sobolescentibus ditari, inungique copiosius ad Cavernulam: & (quod superius etiam memoravimus) in gonorrhœa dolorem urgere, ubi confertiores sunt glandulae, nimirum ad urethrae fossulam. Majores autem reliqui istiusmodi ductus non illam tantum occupant ad quam hic exhibuit, urethrae partem, sed modo ibi, alias vero superius sunt, medium aliquando locum tenent, sæpius autem hic illic nullo habito discrimine observantur, quemadmodum in Figura a nobis edita licet ex adumbratis eorum osculis judicare. Verum ut tandem aliquando alio transeam; cæteris missis, duo tantum monebo quæ in Figuræ istius Explicatione haudquaquam erant omittenda, alterum ne qua ductus magnitudine pinxit Terraneus, ea Lector inveniri semper, credat; alterum, ut spongiosam urethrae substantiam pp. quæ istic alba adeo, æqualisque pingitur, non tantum superius produci existimet, quantum in Figura fallax ista lævitas, & albedo producta est.

ANIMADVERSIO XI.

SEQUitur Figura, primo a Verheyenio, nunc iterum a te, Vir Cl. ex meis Adversariis de- sumpta: quorum utrique majores gratias haberem, si ea diligentius esset descripta. In suprema enim illius parte non ego spongiosæ substantiæ urethrae sectionem sic exhibui, aut sectionem venæ in eo in quo Verheyenius, loco posui, aut quo ostenderem id latus suspensorii Penis Ligamenti quod ossi pubis innectebatur, E litteram anteriori lateri adscripti, aut Coronæ Glandis tubercula sic pinxi, aut denique Foraminula tam parva, & uno tantum in loco, majora autem Foramina, & Canaliculos sic ostendi; ut multum debeam Verheyenio, quod istam Figuram, omisso veri Auctoris nomine, ut suam exhibuerit. Eodem accedit, quod certe ego qui tot dissectis urethris, unum aliquem Majorum Canaliculorum non nisi perraro extra lineam vidi, neque sæpius lateralem eorum ductum observavi, hæc nunquam delineanda curassem; nam & lateralem eum ductum aliquando me vidisse, mea descriptio satis indicat; sed ille non totam attulit, & quod attulit, id Ty- pogra-

De minoribus urethrae canaliculis.

cap. 2.

Ibid.

cap. 5.

Tab. 13.
Fig. 1.

Vid. Verheyen. l. 1. tr. 2. c. 24.

pographi misere depravarunt. Nunc ad te redeo, Mangete Ornatissime; ac primum nego, pleraque ex Foraminibus nostris majoribus satis accurate in tua Tabula esse descripta. Alia loco, alia positu, alia figura, alia magnitudine ab Iconismo nostro discrepant: quæ ut leviora aliqui, contemnerem, nisi ista ipsa tuarum Operarum negligentia & superioris Figuræ, & consequentis Animadversionis erroribus aliquantum faveret, atque adeo me quoque ipsum quasi iidem faventem induceret. Quid? quod ea Foramina quæ ut conspici possent, Canaliculum D. apertum exhibui, ea prorsus omnia in tua Tabula sunt omissa; ut se deceptum Lector existimet, cum quæ Figuræ Explicatio in facie ejus Canaliculi interiore pollicetur, frustra illa, in ipsa Figura perquisiverit. Nec vero diligentius nostra Explicatio descripta est. Alia enim tuus mutavit Typographus vel in ipso statim principio, cum pro *interius* inferius edidit; alia tui, opinor, Amanuenses: quæ inter illud est non illepidum quod cum in Explicatione litteræ i. tu ipse loquaris, in proximæ litteræ K. explicatione me repente iterum loquentem induxerint.

31

ANIMADVERSI O XII.

VEntum est ad primam illarum. Animadversionum quas tibi, Vir Cl. placuit non modo adversus nos edere, verum non sine peculiari, ac nimis aperta, & ut vere dicam, theatriali quadam pompa singulas singulis Figuris nostris apponere. Etsi vero non me fugit, quicumque aut in dissectionibus assidue, & diligenter versantur, aut in II. & III. Adversariis Dissertationis illius de Aneurysmate, Observationis adversus Valvulam Bauhini, Historiæ Hepaticæ, ac Novi circa urinæ retentionem, & excretionem Mechanismi, in VI. Demonstrationis de Sinibus Basis Cerebri, & Dissertationis de Ductibus Lacrymalibus Novis examen perlegerint, his haud ita necessarium videri, ut istas porro Animadversiones expendam; faciam tamen; ut quænam mihi ad istum modum objectaveris, tandem aliquando recognoscas. Et principio quidem Cl. Auctor, „ Circa glandulas, inquit, sebaceas quas in penis „ corona distributas hic intueor, licet mihi primo Autoris Amplissimi sententiam augere. „ Videamus, obsecro, quomodo hanc augeat. „ Affirmando scilicet, in aliquibus virilibus membris tubercula illa minutula, seu granula, quæ „ glandulas sebaceas meritissimus Morgagnius ipse, „ *aliique ante eum anatomici nuncuparunt*, non „ tantum ad coronam vidisse instrata, sed & per „ totum ulterius glandem, nullo cæterum fonte „ vente morbo; ut ideo jam asserat, *nimis forsan „ stricte positam eorundem in figura locationem „ fuisse.* „ Nimirum ita meam sententiam augeat, ut primum vel istam eorum Tuberculorum appellationem aliis ante me Anatomicis tribuat, deinde meam Figuram quasi mancā reprehendat, ut non ea omnia quæ par erat, ejus generis tubercula exhibentem. Verum enimvero ut longè gratum fecisset, si ex iis Anatomicis qui illa tubercula *sebaceas glandulas* ante me nuncuparunt, unum aliquem nominasset, sic nihil certe quod ego quoque non vidissem, in medium attulit, cum tubercula non modo in corona, sed & per reliquam interdum glandem observasse se, scripsit. Hic dices: cur ergo quod videras, non pinxisti? Ego vero, Mangete Ornatissime, cum ad eam Figuræ partem conficiendam duodeviginti cadavera inspexissem, duo tantum inveni quorum unum in extrema dumtaxat glande, alterum per totam glandem, vel potius per totum glandis dorsum tubercula, neque tamen cæteris quæ erant in corona penis, similia, haberet; itaque vel ob raritatem, vel ob disparem facile naturam cum cæteris delineanda non putavi. Nec me facti pœnitet, postquam in glandibus viginti quas post editam eam Figuram diligenter inter secandum inspexi, nihil ejusmodi observavi; imo Ver-

Morgagni Adversaria Anat. IV.

heyenium vidi, qui postea utrumque tuberculorum genus in ea Figura quæ tibi octava est in proxima Tabula, delineavit (quam recte, hic non judico) ipsum, inquam, vidi Verheyenium tum in descriptione, tum in Explicatione non ejusdem omnia naturæ, sed quæ ego delineaveram, esse *glandulas*, reliqua papillas, existimasse. Sed & Cl. Fantonus cum ex Malpighianis, ac Ruy-schianis observationibus, glandis membranam *papillosam* esse, docuit, tum *plurimas sebaceas glandulas circa penis coronam* agnoscit, quas, addit, *oblongos folliculos in meatum excretorium desinentes representare, iisque compressis contentum humorem persæpe emungi.* Verum Noster haud amplius per speciem sententiam nostram *augendi* nos oppugnat, sed aperte in aciem prodit. „ Li- „ ceat, inquit, e contra effari, granula illa, sup- „ posita glandulosa, ex decem mentulis dissectioni „ ni expositis, vix in duabus occurrere, ut ideo „ tanquam res tuta, & ordinaria depingenda non „ sit. „ Quid vero, si ipse vel in nimium paucis, vel non satis diligenter quævisisset? Certe enim mihi, meisque etiam Auditoribus magna ex parte, constat, de octo illis & triginta cadaveribus quæ ejus rei gratia inspexi, in corona unius & triginta ea tubercula fuisse, plurima quidem in plerisque, & evidentissima, in aliis pauciora, & attentum oculum requirentia, sed tamen in his omnibus, ut dico, fuisse; de reliquis autem septem in duorum præputio eadem occurrisse, unum adhuc puerum fuisse, unum coronam cicatricosam, unum denique ejus materiæ de qua postmodum dicitur, & ejus quidem non consueta ratione constitutæ, parum habuisse. Ex quibus satis intelligitur, utrum ea res *tanquam tuta & ordinaria* depingenda fuerit; tamen (quod iste haud animadvertit) ob eam dumtaxat causam pinxisse poteram, ut quæ de his tuberculis in Adversariis monueram, facilius perciperentur; nam certe & in illis scripsi, quod iste mox confitetur: *glandes etiam me vidisse in quibus nullo modo conspici poterant, & in Figuræ Explicatione addidi: sicut in hujus penis corona disponebantur.* Quod autem subjicit: „ Imo in cadaveribus variis, ubi „ nulla prorsus oculo scalproque occurrebant „ corpora hujusmodi sebacea, meminisse se materiam illam inter coronam & præputium animadvertisse copiosam, quæ tanquam a dictarum „ glandularum scaturigine extillata pro majori „ eorundem corporum existentia comprobatione, „ ab Authore memoratur; „ neque satis queo mirari, quæ scribere potuerit, id a me ob eam causam esse memoratum, quando omnibus qui mea Adversaria inspiciant, rem longe aliter se habere, perspicuum est, & quamvis ob eam causam memorassem, nonne vel ex modo indicatis constat, quæ tubercula in corona deerant, ea in præputio esse potuisse? Quod si ne in hoc quidem ullo modo conspici licuisset; non propterea illud tuto confici poterat: ergo *nullo modo dabantur.* Neque enim in ejusmodi præsertim rebus tantum mihi sumo, quantum Vir Cl. isto in loco tribuit; „ sic, inquit, habet: *Glandes etiam vidi, „ in quibus nullo modo conspici poterant; quæ a „ tam accurato anatomico prolata sonare possent: „ in quibus nullo modo dabantur.* „ Satis namque intelligo, posse in nonnullis ea tubercula vel plurima esse, sic tamen, ut Natura quantum numero addit, tantum, ut solet, magnitudini detrahat, atque eadem propterea non meis dumtaxat, sed longe magis perspicacibus oculis inconspicua reddat. Porro quod tacere se, dicit; „ Taceo, inquit, nunquam in mentulis non morbidis animadverti posse plures illas superpositas „ series granulorum hujusmodi, ex supposito, „ sebaceorum; quales, ut & frequenter obvias „ solertissimus anatomicus noster describit; „ utinam revera tacuisset. Non modo enim e contrario mihi forte contigit, ut plures istas series nunquam nisi in sanissimis glandibus viderem; sed & illud contigit, ut cum viderem, ii Viri plerumque ad-

l. r. tr. 2. cap. 24.

Anatom. Diss. 8.

num. 11

De Tuberculis, seu majoribus Glandulis Coronæ Penis.

essent quibus, ut me maxime puderet, si persuaderi posset, id quod ego ceu *frequenter obvium descripsi*, in recte constitutis subjectis *animadverti nunquam posse*; sic plurimum lætor, quod vel in *minutis hujusmodi* nihil temere a me esse descriptum luculentissime demonstraverim. Nam ut alibi laudatos Amicos & Bononienses, & Venetos nunc omittam, quorum illi in suspensio necatorum, hi vero in forte occisorum corporibus ita undequaque sanis ut pulchriora non secuerim, eas mecum plures series viderunt quas iste ait in ejusmodi subjectis *animadverti nunquam posse*; etiam nuper Collegis meis Amicissimis Primariis, ac Celeberrimis Professoribus Antonio Vallisnerio, & Joanni Gratiano earum quatuor ostendi in viro quem nullo nisi capitis morbo laborasse, constabat. Superiore autem anno totidem series monstravi pluribus Medicinæ Doctoribus, & omnibus qui sane frequentissimi aderant, ex cunctis Studiosorum Nationibus meis humanissimis Auditoribus tum in quodam peracuta febre interempto, cætera sano, quem in Nosocomio dissecuimus, tum paulo post in Fabro ex Arteriæ Magnæ disrupto aneurysmate repente mortuo, cætera optime constituto, quam quidem ostensionem in hoc Celeberrimo Theatro habuimus cum pro sua incredibili erga optima Studia Benignitate adesset Vir Amplissimus, pluribus, magnisque tum Magistratibus, tum Legationibus præclare obitis, domi, forisque Spectatissimus, & de me, siquis alius, egregie meritis Laurentius Theopolus Eques, Ædis D. Marci Procurator, ac Triumvir Litterarius, unaque præter eum quem supra laudavi, Vallisnerium, Alexander de Burgos, & Joannes Polenus Professores longe Doctissimi, Clarissimique. Quo etiam tempore (ne forte tot Gravissimos Viros ob rem dumtaxat leviorē videamur nominasse) tum nova quædam, tum id quod sæpe alias ostenderamus, & ad superiores, ac consequentes Animadversiones plurimum pertinet, nostros quoque Urethræ Canaliculos & reliquis majores, & in eadem omnes recta linea, velut in Figura nostra, dispositos manifestissime demonstravimus: quod & sigillatim hoc anno ostendimus una cum iis de quibus hæcenus dictum est, pluribus in recte constituta glande tuberculorum seriebus Bartholomæo Lavagnolo Rei Medicæ Cl. ac Meritissimo Professore. Verum hoc ad alia istius Animadversionis loca pertinet. Nunc quid proxime Auctor subijciat, videamus.

ANIMADVERSIO XIII.

„Ultum, inquit, præmittatur, non
„tantum in gratiam Authoris meritissimi,
„sed Clariss. Litrii, & Anatomici alterius ex
„Academia Bononiensi, ab Authore, in expli-
„catione figuræ ad facti confirmationem, cita-
„torum. „ Verum ex his quæ objicit, qualia
sint quæ remittit, haud difficile cognoscitur. „
„Sic, inquit, instantiam omittam, quam ei me-
„hercle offerendam paraveram. „ Quam tandem?
„Cur scilicet glandulas illas suas ad cartilagi-
„num trachæ interstitium membranaceo-mu-
„sculare aggerime locatas (de quibus sermo ha-
„bitus fuit alibi) sebaceas etiam non vocitet. „
De illo quidem sermone in proximis Adversariis videbo. Nunc autem id unum scire aveo, cur eas quoque glandulas *sebaceas* appellare debuerim.
„Siquidem, inquit, viscida illa per trachæ ca-
„vitatem mucilago, quam ab illis extillatam
„supponit non inferiorem memoratis superius
„sebaceis sebacei liquoris characterem præ se
„fert, facile scilicet *in fila ductilis*. Cur eodem
„de titulo & prostatas ipsas, & testemet ipsos,
„& alia colatoria similia, quorum certe secreti
„latices duci facile in fila possunt, glandulas
„non appellet sebaceas? „ Si Præcl. Valsalvam attente legisset; hæc certe nunquam conscrip-
„sisset. Quid enim *sebaceæ* materiæ cum iis

humoribus qui ob visciditatem in *fila* sunt *ductiles*? aut ubi Vir ille Experientissimus, aut ego docuimus, hanc esse materiæ *sebaceæ* notam, & *characterem*, ut *in fila* utcumque sit *ductilis*? Quod si tu, Mangete Ornatissime, ut par quidem erat, Lectores tuos voluisses, quid ego de Sebaceis Glandulis, & nominatim de his tuberculis sentirem, non ex istius Objectionibus, sed ex me ipso cognoscere; meam Descriptionem ante istam Animadversionem collocasses. Sed factum bene quod ejus Descriptionis partem Cl. Anatomici Verheyenius, & Fantonus in suam Anatomem transtulerunt, & quod ipsa Adversaria nostra Summa Viri Hermannii Boerhaavii consilio, atque adhortatione, ut ex Anglis quibusdam, communibus utriusque Auditoribus accepi, superioribus annis iterum in lucem apud Batavos prodire. Sic enim ea Anatomicæ Historiæ pars quæ iis Glandulis continetur, & quæ in tuo Theatro, credo, ut istis Animadversionibus locus daretur, omissa est, nihilominus cognoscetur; unaque homines intelligent, me de alba illa crassaquæ materia esse locutum quæ dum e glandulis *exprimitur* suis, *egrediens*, *in fila formatur*, hoc est, si mavis cum Cl. Valsalva loqui, *sub forma vermiculorum erumpit*, ea denique ipsa quam ex propriis ductibus excretoriis in cute præsertim nasi passim prostantem videmus, maximeque in iis quibus ille rubicundus, & magnus contigit: qua quidem cum materia humores conferre ex testibus, ex prostata, ex asperæ arteriæ glandulis prodeuntes, nimirum tam alienum est; quam quod alienissimum. Verum insuper ex mea Descriptione res cognoscetur his qui istam tantummodo legerint Animadversionem; nova prorsus, atque incredibilis, videlicet materiam istam quæ circa glandis coronam congesta invenitur, non modo *pro majori eorundem tuberculorum existentie comprobatione*, velut supra dictum est, me quidem non memorasse; imo vero diserte negasse, potuisse me aut ex iis tuberculis aliquid ejus materiæ exprimere, aut excretorii eorum osculi, ab aliis, & nominatim, quod post edita Adversaria contigit, ab Oculatissimo Santorino in maximis quibusdam agniti, vestigium ullum in iisdem videre. Quæ cum scriplerim, atque iterum in Figuræ Explicatione admonuerim, me illa tubercula *glandulas sebaceas* appellare juxta observationem Cl. Litrii; nempe igitur manifestum, & evidens est, me nequaquam, ut ex ista Animadversione fecisse videor, quasi contendisse, ea tubercula glandulas esse, & quidem sebaceas; sed Cl. Litrii auctoritati, & observationibus id ita dedisse, ut manifesto tamen appareat, me quidem ipsum sentire, ea de re amplius esse quærendum.

ANIMADVERSIO XIV.

JAm vero ad gravius quodpiam circa Figuram eandem *genitalem* veniamus; quanquam eorum quæ a Cl. Animadversionis Auctore subijciuntur, pleraque nihil ad meam, sed potissimum ad Terranei Figuram pertinent; quasi ita inter vos convenisset, ut in eadem tu quidem Tabula, ille autem Animadversione utramque inter se Figuram compararetis. Quamobrem me quoque juvat comparisonem alteram hic instituere Lectori neque inutilem, neque injucundam, scilicet ut quæ de omnibus fere Glandulis, & Ductibus ad Urethram pertinentibus in ista Animadversione scribuntur, cum iis conferam quæ de iisdem prorsus rebus ab eodem Auctore in sua illa Epistola de Vesicæ Mechanismo ad eundem Cl. Mangetum conscripta sunt. Itaque illa quæ huc pertinent, & quæ hic nos examinatos, spopondimus, huc primum ex eo loco transcribamus. Eam igitur partem Urethræ, quæ inter Prostatam, & Bulbum interest, quam quidem partem ipse, *confiniis legitimis* positus, ad Vesicæ Collum statuit pertinere, eam, inquam, partem a Pseudosphinctere obduci, cum docuisset; hujus musculi, altitudo, inquit,

l. 1. tr. 2.
cap. 24.
Anatom.
Dissert. 2.

Advers. I.
num. 11.

De iisdem
Glandis
Tubercu-
lis.

Adv. III.
Anim. 38.

Theatr.
Tom. I.
415.

, quit, ampliatur non modicum ex strato glanduloso notabili, quod ei & collo vesicæ interpositum myriades glandularum conglomeratarum, foveat in sinu suo, seu totidem liquorum spermatiformium scaturigines, per ductulos excretorios innumeros, totidemque ad colli cavum ostiola corrivantes: hic sedent Prostatae minores, seu appendices prostatarum majorum; hic glandula Cowperianæ, hic Littrianæ, hic grandior una, & solitaria a me observata, adhærens immediate bulbo cerasiformi sub musculo speciali suo; proprioque emissario hians magnifice in cavitatem urethræ. - Hic tandem multiformes aliæ majusculæ, minusculæ, minimæ; omnes duriusculæ, ut prostatae majores, & tanquam fibris tendineis ad folliculos suos colligatae. Hisque postmodum succenturiantur, disgregatae a Clarissimo, amicissimoque Morgagnio, nostroque Terraneo detectæ, & expositæ per urethræ longitudinem, glandemque dispersæ; sed hæc ut a cæpto instituto distractissima, ad lucem aliam destinantur. Et sic ille quidem eo tempore; nunc autem opportunum locum nactus quid demum proferat, & quemadmodum sibi constet videamus. Neque tamen hic quæram, cur in suo de me sermone usque adeo a se ipso dissentiat. Ibi enim me Terraneo anteponebat; hic autem

Is, *quantus, quantus, nihil nisi sapientia est;*

Ego *somnium.*

Ibi, & paulo post, & aliis quoque in Scriptis non nisi *Amicissimi* adjecto vocabulo appellabar; hic autem id nusquam; ut mittam, in aliis Scriptis Adversaria nostra *Aurea* nominari, quæ contra in hisce Animadversionibus haberi pro ferreis, atque adeo luteis, & si quid est pejus, redargutis videlicet ad unam omnibus Figuris, multisque præterea locis, videntur. His igitur missis, hoc unum: quam sibi in ipsa anatome constans fuerit, videamus. Atque ut omittamus, tubercula illa glandis de quibus supra, ut vidimus, in ista Animadversione scripsit: granula illa *supposita glandulosa ex decem mentulis vix in duabus* occurrere, ut ideo *tanquam res tuta, & ordinaria* depingenda non sint: ut, inquam, omittamus, illa ipsa granula sine ulla hæsitazione, & quidem ut glandulosa, in producto Epistolæ suæ loco agnovisse, nomine scilicet *glandularum disgregatarum per glandem dispersarum*; quid ibidem de Cl. Littrii Glandula senserit, attendamus. Hic *sedent*, inquit, *Prostatae minores, seu appendices prostatarum majorum, hic glandula Cowperianæ, hic Littrianæ.* In hac autem Animadversione glandula istæ Littrianæ primum, & recte quidem, mutantur in glandulam illam, - *quæ in formam zonæ - incumbit exordiis urethræ statim sub terminatione prostatarum*; quibus verbis, veluti etiam infra, *confinia illa sua legitima* transilit, atque confundit, eam partem urethræ quæ statim sub prostata est, non partem colli vesicæ, sed exordia urethræ, atque urethram nominans. *Prostatae autem illæ minores, seu appendices prostatarum majorum* evanescent; siquidem *Adstites* quas infra *Prostatas minores* vocari posse, dicit, nihil aliud sunt nisi ipsæ glandula Cowperianæ; ista

De Littrii Glandula, paginem prostatae adoptatur. Ego vero quod non modo colore, sed etiam structura a Prostata differre, video, hujus si propriam & veram propaginem haud facile judicavero, neminem puto succensurum. Accedit diversa secreti humoris natura; nam qui in Prostata secernitur, is aliquando sic mutatur, ut in plurima ex flavo obscura granula quasi *tabacci* in nonnullis cadaveribus coactum invenerim: qualia non modo in urethra ad oscula ductuum Prostatae, sed in tota ferme Prostata quoquoersum dissecta inspiciebam; intra Glandulam autem Littrii nihil unquam ejusmodi deprehendi. Quod si vera ulla propago Prostatae addenda est; ea certe est subrotunda & renitens quasi

Morgagni Adversaria Anat. IV.

glandula, quam cum sæpe Diligentissimus Incisor noster in publicis dissectionibus animadvertisset inter Vesicam, & feminales Capsulas qua se se mutuo hæc jam contingunt, prominentem, & nonnunquam ad angulum quem, conveniendo, efficiunt, prostantem, nos accurato instituto examine nihil aliud esse comperimus quam corporis ipsius Prostatae particulam, non sine aliqua fortasse in iis qui hanc habent (neque enim omnes habent) utilitate, ut puta ad easdem capsulas a compressione distentæ vesicæ defendendas, aut alia ejusmodi, inter hanc, atque illas protuberantem. Verum ut ad Littrii Glandulam revertamur; quam alias Animadversionis Auctor inter Conglomeratas illas connumeraverat quæ suos humores *per ductulos excretorios innumeros, totidemque ad colli cavum ostiola corrivant*; hujus modo excretorios meatus in urethram hiantes manifeste adhuc vidisse se, negat: ideoque hos interim illorum partem esse crederet, quos prostatae proprie dictæ attribuimus. Hæc autem duo, primum, atque alterum ex illis erunt quæ in ista Animadversione cum Terranei scriptis, & ichonibus minime consonant. Terraneus namque, velut supra ostensum est, cum eos meatus quos Prostatae proprie dictæ attribuimus, jam a principio in sua Figura delineasset, alios postea longe lateque infra illos, addidit *rivulos* ad Littrii Glandulam pertinentes, & *plurimos* quidem, ac manifestos, non facturum, nisi *rem tutam, & ordinariam* credidisset; quanquam procul dubio uterque est reprehendendus; nam si in iusto cadaverum numero hujusmodi foramina quævisissent, Terraneus quidem in multis non apparere præsertim *plurima*, deprehendisset; alter vero ad latera rostri capitis, ut vocant, gallinacei quædam, aliquando etiam majora, sed plerunque multo pauciora, quam Terraneus pinxit, apparere, cognovisset.

ANIMADVERSI O XV.

Quemadmodum autem Littrianæ, quas dixerat, glandulae in Animadversione recte in unam sunt mutatae, ita perperam illæ aliæ Cowperianæ, quas videlicet Solertissimus Cowperus tres esse, proposuit, hic in unam, imo in nullam prorsus mutantur. Siquidem illa una quæ hic memoratur, non alia certe esse creditur quam Littriana. Id autem quam sit verisimile, unusquisque intelligere ex eo potest, quod Cl. Littrius in eo Commentario in quo istam ipsam quam hic vocamus Littrianam, descripsit, tres præterea Cowperianas Glandulas, ut prorsus a Littriana distinctas, commemoravit. Et nihilominus Noster id certe credit, & ut credant alii, iterum omnia permiscet; nam Littrianam istam in quam modo Littrianas illas mutaverat, rursus ut *duplicem considerari posse*, dicit, ac perinde quasi Cowperus non Summus Anatomicus fuisset, persuadere posse, putat, partem, & tanquam lobum Littrianæ pro singulari glandula, *unum autem ex multis ductibus* a nobis, & Terraneo delineatis, pro peculiari ejusdem glandulae excretorio vasculo Peritissimo Homini imposuisse. Sed cur non potius illam glandulam *adhærentem immediate bulbo*, illam, inquam, glandulam proprio emissario in cavitatem urethræ magnifice hiantem, quam a se observatam in Epistola dixerat, hic autem ne sigillatim quidem memorat, cur non illam potius a Cowpero visam credit? præsertim cum fateatur, *originalia Cowperi opera, ut pote Anglo idiomate conscripta se adhuc non vidisse*. Quanquam ignorare non debebat, eam ipsam cujus occasione hoc fatetur, trium harum Glandularum Descriptionem ab eodem Cowpero latine redditam, jam A. 1702. prodixisse, imo antequam Terraneus suas *Adstites* inquireret, has ipsas pluribus in libris descriptas fuisse, atque ideo intempestivum prorsus esse, hoc quasi in dubium revocare, scribendo: *Adstites glandulae a Clariss. Terraneo detectæ, aut saltem diligentius exhibitæ*, vel ob quædam jam satis ab aliis

52.

Anim. 7.

Memoir.
de l'Acad.
R. des Sc.
A. 1700.

Prostatae
Propago.

32.

aliis indicata, & in his præsertim opportunam earum glandularum a distento urethræ bulbo compressionem, quam idem Cowperus memoraverat, ob hæc ipsa, inquam, laudare Terraneum. Quod denique addit de aliis præterea ibidem *sedentibus glandulosis corporibus, cunctis hucusque invisis, de quibus suo loco, inquit, attenta erit sermocinatio*; hæc videlicet erunt illæ glandulæ *majusculæ, minusculæ, minimæ*, & illa insuper *in cavitate urethræ magnifice hians*, quas in Epistola etiam promisit, & quas, si veras, & peculiare, & novas glandulas intelligit, miror unde, & qua ratione certo sciat, *cunctis hucusque invisas* esse; sin vero, aut jam descriptas pro novis, aut jam descriptarum partes pro peculiaribus glandulis, aut non glandulas pro glandulis nobis est fortasse propositurus, miror, cur talia toties promittere voluerit. Illud magis miror, qui hæc polliceatur, eum nondum videri animadvertisse, in glandulis præsertim ad hæc loca constitutis, non jam dico minimis, sed majusculis tantam esse varietatem, ut haud raro nonnullæ harum aut prorsus desint, aut ita sint parvæ, ut aliæ ipsarum officium suppleant. Nimirum istæ ipsæ Glandulæ quas Terraneus, & ipse *Adstites*, nos vero cum Cowpero qui sic antea nominaverat, Mucosas vocitamus, istæ, inquam, ipsæ interdum, & quidem haud ita perraro aut desiderantur, aut ita certe sunt exiguæ, ut vel summa adhibita diligentia conspici nequeant. Equidem fateor, cum jam ab Anno 1700. ex Actis Eruditorum Lipsiensibus has Glandulas extare, didicissem, Professorum autem Bononiensium Doctissimi sæpe mihi confirmassent, se jam olim istiusmodi glandulas cum Magno suo Præceptore Malpighio inequo, in asino, in mure domestico majore, nonnullisque aliis animantibus vidisse; fateor, inquam, me in primo quod oblatum est, cadavere humano invenisse, & ea quidem magnitudine, ut *parvum phaseolum* superarent: eademque interdum pari, alias minore magnitudine in plurimis deinceps cadaveribus vel cum aliud agerem, conspexisse. Sed vicissim norunt Amici mei Veneti, quoties non ego modo, verum etiam is qui mecum diligentissime perquirebat, Vir Cl. & Exercitissimus Santorinus frustra easdem indagaverit, cum non cum dumtaxat in quo solent esse, notissimum locum, sed omnem undique viciniam lenta manu, & defixis oculis perlustrarem: quo quidem tempore hoc est A. 1707. ut inter ejus anni observationes scriptum habeo, glandulam vidimus singularem, in medio, sub extremo statim bulbo positam, eique adhærentem. Caterum non tantum Venetiis, sed & Patavii tum mihi, tum nonnullis Auditoribus meis contigit, ut *Mucosas* glandulas sæpe nullo negotio, alias ne omni quidem diligentia adhibita videre possemus. Quod addere hic volui, non ut veri ipsarum Inventoris gloria ulla ex parte imminuatur; neque enim eos qui exempli causa Pyramidales Musculos invenerunt, minus propterea laudamus quod hi non semper occurrant. Sed quemadmodum ad accuratam horum historiam absolvendam hoc ipsum non est omittendum; sic intelligendum est qua in re defecerint illi a quibus hæ Glandulæ *saltem diligentius exhibitæ* esse dicuntur.

ANIMADVERSIO XVI.

Nunc porro ab iis quæ in ista Animadversione ad Terranei Figuram dumtaxat pertinent, ad alia quæ in meam quoque scripta sunt, transeamus: quæ quidem *per plura inter se se subjecta castigate collata, exacte percepta* esse dicuntur. Sed quanta ista diligentia fuerit, ex hac, & proximis Animadversionibus intelligetur. Nos certe quæ pinximus, & quæ descripsimus, ea non *per plura*, sed per plurima sedulo inter se comparata subjecta *exacte* perceperamus. Itaque etsi observationes in singulis habitas, rerum similitudine, & recenti memoria freti neque o-

mnes scripsimus, neque eas quas scripsimus, omnes ad hoc usque tempus servavimus, tredecim tamen ex eo numero adhuc habemus, quibus post edita Adversaria alias quatuor & viginti addidimus; ut quæ nunc scripturi sumus, ea ex subjectis, minimum, septem & triginta accurate inter se collatis didicerimus. Principio autem illud tibi, Mangete Ornatissime, in memoriam est redigendum, nos de minimis istis ductibus quos Terraneus delineavit, non multum sane in nostra descriptione fuisse sollicitos, eaque de causa, & ne Majores ac peculiare quos potissimum curavimus, obscuraremus, consulto nihil illorum nisi oscula appingere voluisse: atque hinc etiam fieri, ut pleraque in ista Animadversione ad Terraneum potius, quam ad me in quem scribuntur, pertineant. Et sane quod primum Cl. Auctor scribit, se „ infra oscula excretoriorum ductuum ex adstibus procedentium, inchoatas ductuum hujusmodi in urethram aperturas vidisse; „ mihi quidem non repugnat, sed Terraneum impugnat, qui aliud pingens, aliud scribens, cum inter litteras P. & N. nullum hujusmodi pingat ductum, in illa tamen eadem area, hoc est supra oscula memorata ductum aliquem ejusdemmodi observatum iri, pollicetur. Itaque hoc erit tertium (nam alia duo superius ostendimus) quod in ista Animadversione *cum Terranei scriptis perbelle non consonant*. Quartum autem erit id quod *præ cæteris notabile* dicitur, videlicet *obliquitas, quam servant in cursu*; nam ut omittam, scriptum esse a Terraneo, *plerosque horum ductuum ita supra Urethræ longitudinem jacere, ut eandem habeant cum Urethra directionem*; non omnes certe sunt ab ipso in obliquo positi delineati; neque adeo debuerunt. Sed cum ad nos Terranei defensio non pertineat, illud quidem pertinet diserte respondere, ut vel maxime obliquos esse omaes istos minores ductus, verum esset; majores certe nostros, quos perperam cum minoribus confundit, non esse; imo hoc ipsum habere peculiare, ut secundum urethræ longitudinem statuatur; idque ita verum est, ut cum in tot subjectis facile ad trecentos observaverim, perpaucos omnino esse notabiliter obliquos, animadverterim. Itaque prima Auctoris *censura*, quod ad urethræ ductus attinet, in meam Figuram cadente tam parum commoveor, ut cum ille statuat, *notabilem esse in memoratis canaliculis obliquitatem*; ego contra diserte statuam, in meis quidem notabilem esse rectitudinem. Addit: *introducenda in eorum oscula setam, specillum, aut acum, facile in ductus hujusmodi cavum per duas, & amplius lineas percurrere*: quod ita de more in universum prolatum, veritati sic repugnat, ut tamen magis ad Terraneum, qui minores illos ductus describendos, pingendosque suscepit, quam ad nos pertineat. Ille enim & in Figura, & in libro ductus aliquos proponit adeo breves, ut *parvulo unice se se prodant ostiolo*. Hoc ergo quintum est in quo Auctor dissentit a Terraneo; qui si in suis observationibus non modo setis uti, atque specillis, sed etiam *acubus*: quod iste fecit; non dubitasset; in nullum, mihi crede, ductum incidisset quem duas, & amplius lineas longum aut non invenisset, aut non fecisset. Sed iste subjicit: *introducenda, quæ dixit, corpora semper ire horizontaliter, seu non recedere ab eadem tunica, urethram intime succingente; ut inde pateat, ductuum horum cavitates consistere in tunicali duplicatura quadam, quam ipsamet interna urethræ membrana in proprio gremio producit, & retinet*. Mitto quærere, num id omne inde pateat. Illud certe patet, sextum, & septimum hunc esse locum qui Terraneo adversatur, secundum autem qui mihi; Terraneo quidem; hic enim & a suis ipsis glandulis convexæ illius tunicæ faciei *velut appensis*, vult, hos ductus *produci, & per hanc tunicam transversos agi*; mihi vero, nam *statim fere sub interna urethræ tunica protensos occurrere* Canaliculos meos, dixi, & rursus dico; atque infu-

De Urethra Canaliculis.

cap. 2.

Ibid.

Ibid.

Ibid. Advers. I. num. 10.

De Cowperi Glandulis Mucosis.

insuper addo, non oportuisse in ista Animadversione cum illis minoribus hos confundi, qui propter suam amplitudinem necessario in eodem plano cum tenui ea tunica esse non possunt: ceterum me ante ipsum vidisse, eosdem & *horizontaliter* statui, & ab ea tunica quodammodo produci, tum mea Figura ad litt. D, tum illud significat quod adjeci: *eadem qua urethra, interius ipsos obduci membrana.*

ANIMADVERSI O XVII.

Sequitur locus adversus Terraneum octavus, adversus me tertius. *Ductus*, inquit, *hujusmodi quo magis ad apertionem rotundam suam in urethram accedunt, eo latiores fiunt.* Contra Terraneus eorum figuram docuit esse quidem *conicam*, sed ita ut hujus *late basis loco ipsa sit glandula, apex in urethrae cavitatem hiatus.* Itaque illius in Iconismo inconstantiam superius notavimus. Verum Animadversionis Auctor docet nos rationem qua possint quales Terraneus pinxit, atque adeo multo etiam latioribus orificiis demonstrari. „ Per dilatationem, inquit, ab acubus, aut „ specillis introductis factam, hujusmodi ostia „ ad ritum tubarum efformata, in finibus scilicet „ suis canales hujusmodi, tanquam tubarum ex- „ tremitates, latissimos demonstravimus. „ Ego vero, Manete Doctissime, existimabam, cum agitur de naturali ductuum, aut foraminum magnitudine, & figura demonstranda, aut delineanda, nullam esse Partibus vim faciendam; itaque meos quidem Canaliculos, & eorum ostia sic exhibui, ut secundum naturam inveni. Igitur ostiorum diametrum majorem certe Canaliculorum diametro esse, fateor, non tamen secundum omnes dimensiones, hoc est non quia horum ostia *ad ritum tubarum* sint efformata, sed quia cum *sæpius elliptica*, non raro etiam *fere triangulari* sint figura; hæc semper, ut docui, & pinxi, *secundum urethrae longitudinem protensa est.* Et has quidem ostiorum figuras, & positum ita meis esse dico Canaliculis peculiares, ut tot habitis observationibus, vix quam paucissimos viderim aliter se habentes; itaque illam ductuum *apertionem rotundam* ut minoribus convenire, concedo, ita meis ullo modo aptari posse, nego. Et ne mihi uni, aut his tantum quibus insipientibus urethras aperui, semper omnia credi, postulem; Verheyenius ipse cum antequam hæc in meis Adversariis animadvertisset, unum meorum observasset Foraminum, hujus certe figuram *pene ovalem*, imo *aliquantulum longiorem* conspexit. Quartum quod in me scribitur, scilicet ductus in suo „ tractu elevationem aliquam, non minus acdu- „ ctus adstitum -, oculos statim offerre, sicque „ & longum suum progressum per dictam membraneam substantiam super hanc intimam ure- „ thrae faciem, vel leviter absque alio artificio „ insipienti facile exhibere; „ id cum minoribus convenit ductibus, tum nec sæpius convenit, & si conveniret, cur tamen pingendum mihi non fuerit, a principio indicatum est. Illud vero quod est difficilius, & in quo Auctor longe melius operam posuisset suam, non ipsi sane magis quam mihi, & Verheyenio, esse video exploratum. *Inexplorata*, inquit, *Nobis hucusque fuit canalium eorundem origo.* Itaque nona quidem vice Terraneo, sed & sibi quoque ipsi repugnat; In eo enim quem supra produximus, Epistolæ loco *disgregatas* glandulas a me, ut tum dicebat, & a Terraneo *detectas per urethrae longitudinem, glandemque dispersas* sine ulla hæsitatione agnoscebat; hic autem, *Nec datum*, inquit, *adhuc fuit, glandulas illas disgregatas distincte conspiceret, quas pro ductuum hujusmodi principiis stabiliebat laudatus Terraneus:* & ita quidem stabiliebat, ut nisi vel post propositam ab ipso administrationem *melius pateant, seu distincte conspiciantur*; non videam quo ejus Inventæ recidant, five Promissa tum in Explicationis, tum in libri sui fronte extantia, de Glandulis videlicet *detectis*, Morgagni Adversaria Anat. IV.

& *novis.* Cæterum quod præter ipsos Canaliculos conspici potest, id in Terranei Iconismo, aut Explicatione frustra perquires; in nostris autem videbis, modo tamen Figuram inspicias aut a nobis exhibitam, aut a Batavis reculam, non quæ in tua ista proponitur Tabula; ea videlicet Foraminula quæ nos in maximorum Canaliculorum interiore facie observavimus, & ex quibus eundem atque ex Canaliculis, humorem expressimus. Horum autem foraminulorum observationes & Venetiis coram Amicis confirmavimus, & hic nuper, inspectantibus nostris Auditoribus, etiam adauximus. Aperto enim Canaliculo, qui pictum a nobis ad litt. D. figura, & latitudine æquabat, ea autem erat longitudine, ut transversum pollicem superaret (qua una ex re quam differant maximi nostrorum Ductuum ab his quos Terraneus delineavit, vel Animadversionis Auctor vidit, intelligi potest) tria vel quatuor foraminula apparere, quorum alia semielliptica, alia circulari erant figura; idque in eo subjecto peculiare habebant, ut quemadmodum Majorum Canaliculorum ostia semper in superiore pariete urethrae, sic ipsa in superiore Canaliculi parte, in una eademque linea secundum urethrae longitudinem disponentur; Horum itaque uni vel alteri cum tenuem setam, nulla vi adhibita, immisissim, hanc secundum eandem directionem *horizontaliter* Prostatam versus, ad aliquam pro foraminulorum ratione longitudinem admitti, luculentissime ostendi. Num vero hi minimi ductus e peculiaribus glandulis enascantur, mihi nondum licet ex Anatome constitueré; non tamen video quid cogat eorum *scatebras ultra tunicam succingentem supponere*; quando & ipsorum, & Ductuum horum omnium tunicas, ut illas vasculorum testium Malpighio judice, pro glandulosis habere, nihil prohibet.

ANIMADVERSI O XVIII.

Quod autem adjicitur: „ esse hos ductus plerumque ad basim urethrae solitarios, nec „ unos in alios se exonerare; „ nihil ad me pertinet, qui de Canaliculis, non ad basim, sed in superiore urethrae pariete constitutis id doceo. Illud vero quod subditur: „ ordinem inter se se „ conservare locationis nullum, ut ideo obviant „ oculo per urethram casu, confuseque dispersi, „ nec per lineam dispositi, ut exprimit Morgagnius; „ quantum nempe est in quo Auctor a me discrepat; sed decimum simul est in quo dissentit a Terraneo. Hic enim eo ipso ordine quo fabri murarii lapides solent, hoc est alterno, Naturam affirmat „ maxime in Intestinis, & Urethra glandulas, earumque canales. disposuissim, se, „ atque adeo concludit: „ quæ inordinatæ, & velut disjectæ per incuriam prima fronte videbantur, glandulas non tales vere esse, „ sed alterne, maximaque cura dispositas. „ Ego vero minorum istorum ductuum orificia ita in mea Figura appinxi, ut quemadmodum re ipsa videre consuevi, nullum magnopere observent ordinem; contra, Majorum ita proprium esse, vidi, ut in eadem recta linea, veluti & descripsi, & pinxi, disponantur, ut in septem & triginta observationibus, quatuor, haud amplius, inveniam in quarum tribus lego, de Foraminibus decem, de sex, de octo unum, in quarta autem, de quinque unum vel alterum ita extra lineam fuisse, ut non multum tamen abesset. Neque illud cum dico, geometrice accipi volo, quamquam in plerisque fortasse posset; sed quod æquissimum videri debet, anatomice accipi satis est. Namque in eo ipso urethrae loco in quo observantur, alba quædam linea extare solet; in hujus lineæ medio (neque enim tenuissima est) Maximos Urethrae Canaliculos omnes ut plurimum esse, dico, aliquem interdum haud in medio, sed tamen intra lineam, omnino autem perraro nonnullos extra

De iisdem.

cap. 2.

De iisdem Canaliculis.

cap. 2.

l. 1. tr. 2. cap. 24.

De ipsorum origine.

Ibid.

cap. 2.

lineam esse, contendo: quæ quoniam non modo ego observavi, sed iis qui aderant, etiam ostendi; idcirco pluribus verbis opus amplius esse, non puto.

Quod subjicit: *ex excretoriis hujusmodi tubiformibus alia grandiora esse, alia notabiliter minor* nemo negavit. Sed quod continuo addit: *utraq; tamen non minus ad latera, & terminos urethræ, quam ad ejus centrum statuta esse*: non modo mihi sexto, Terraneo autem undecimo, sed ipsi quoque manifesto adversatur. Tantum enim abest, ut ad superiorem, aut inferiorem urethræ terminum aliquos istiusmodi ductus agnoscat; supra statuit, *versus urethræ medietatem* incipere; infra autem tradet, supra glandis altitudinem desinere. Terraneus autem majores omnes ad inferiora tantum agnoscit, ac pingit, qua de re videlicet nos quoque ipsum redarguimus. Nos tamen ut in eorum genere quos pinxit Terraneus, huic *cenfuræ* locum esse, fatemur, quatenus scilicet ipsa Figura a nobis proposita ostendit; sic in altero quod nos potissimum attendimus, genere id quod in descriptione posuimus, maxime verum esse, & ante, & post ipsam editam cognovimus: *magnitudinem incertam esse, sic tamen ut quam sapissime quæ prima sunt, eadem maxima quoque sint*. Porro quod de oppositis ductuum directionibus adjicitur, *seu dum eorum pars maxima balanum respicit insertionem suam, intermixtos eisdem nonnullos versus prostates majores & Vesicam directos inseri*; quamquam id de minorum præsertim genere verum est; vix tamen, ac ne vix quidem nobis adversatur qui videlicet de altero genere ita scripsimus, ut esse dumtaxat *ut plurimum* secundum urethræ ductum & naturam disposita, affirmaverimus.

Advers. I.
num. 10.

Ibid.

32.

Tandem, inquit, *ostiola urethræ excretoria jacent plerumque ad ejusdem basin, aut latera basi viciniora, non ad summam ejusdem regionem, ut depinxit Cl. Morgagni*. Ego vero hæc omnia nego. Primum videlicet nego, me hæc ostiola non ad urethræ etiam basin, aut latera basi viciniora pinxisse: quod cum mea Figura satis ostendat, non opus est verbis comprobare. Deinde nego, plerumque ad ea potius loca esse, quam ad summam urethræ regionem; cum in meis omnibus observationibus nihil unquam tale animadverterim. Et hæc quidem generatim respondeo. Quod autem speciatim pertinet ad Canaliculos majores meos, quos ex tota ista Animadversione satis constat Cl. ejus Auctorem nunquam a minoribus distinxisse, atque id plerisque ejusdem erroribus causam dedisse; eos vero si hic potissimum intelligeret, esset quidem septimum in quo a me dissentiret, sed quod tamen eadem qua quintum, responsione concideret. Si enim ex meis observationibus jure docui, Majores Canaliculos disponi in eadem recta linea quæ summam urethræ regionem occupat, certe & illud docuerim, necesse est: eosdem in summa urethræ regione collocari.

ANIMADVERSIO XIX.

De iisdem
Urethræ
Canaliculis.

HActenus qua ratione Figuram nostram examinaverit, ostensum est; nunc quo tandem modo suum concludat examen, & quid denique pronunciet, attendamus. „Hæc, inquit, omnia „sicuti cum laudati b. m. Terranei scriptis, & „ichonibus perbelle consonant, ut ideo non me „teneam, quin asseram, gloriam totam circa harumce partium inventa, & descriptiones vindicare eidem debere & restitui; sic quantum a „veritate, & exactitudine recedat in plurimis „(quorum enumerationem brevitatis gratia prætere) Figura hæc Cl. Morgagni quæ plurimis „cæterum de titulis laudabilis multum est, ne „mo veniet, qui post dicta superius, & facile „cum naturali conferenda, videre non possit. „Æquior certe Judex ipse videri potuisset, si de eo saltem quod modo in quæstionem non veniebat, de inventionis scilicet laude sententiam ferre declinasset. Sed hoc postea videbimus. Nunc cæte-

ra quæ pronunciavit, perpendamus. Supra ostensum est, ex omnis ejus *Censuræ* capitibus in Terraneum undecim, in nos septem dumtaxat cadere, & ex his septem (ne quis peculiaria forte crederet) pleraque Terraneo esse communia. Nemo igitur existet qui, nisi prorsus cæcus sit, non perspiciat, quam recte ab eodem sit pronunciatum, illa omnia cum Terranei scriptis, & ichonibus perbelle consonare; Figuram autem nostram a veritate, & exactitudine in plurimis recedere. Quid? si in Terraneo septem, in me autem undecim reprehendisset? Quid? si tot alia quod in superioribus ostensum est a nobis, in Terranei Figura reprehensione digna non essent? Quid? si Judex ipse, qui superiora omnia, etiam quæ ipse protulit, in Terraneum suum cadere, ne sensit quidem, nova quadam sagacitate denique nonnulla ejusmodi partim animadvertisset, partim se animadvertere, credidisset? „Duo, inquit, „erant quæ in observationibus meis a prædicti „Clar. Terranei assertionibus aliquatenus disjuncta animadvertebam (adeo est quod in anatomis nemini hucusque perfectio concessa), „quasi vero si hæc duo præterea scire Terraneus potuisset, perfectus procul dubio Anatomicus extitisset. Quænam tamen hæc duo sint, videamus. „Primum, quod non tam copiosa per urethram sunt, „ut ipse depingit, excretoria hujusmodi, & eorum ostiola. „Equidem haud raro non nisi pauca admodum conspici possunt; qui tamen plurimas, velut a nobis factum est, urethras accurate inspexerit, is in non paucis quidem tot ferme, in nonnullis vero etiam multo plura quam Terraneus delineavit, comperiet ostiola. „Alterum, inquit, quod altius, certe desinunt antequam penis in balanum veniat; adeo ut eorum nulla in balano animadvertantur, quod ultra ejusdem (Terranei) figuram, & sententiam est. „Hoc quoque, si plurimas inspexisset urethras non ad hunc modum reprehendisset, sed ea tantum ratione qua nos superius reprehendimus. Scilicet non nisi raro accidit, ut ostiola in extrema urethræ parte conspiciantur; neque, id cum accidit, in sola, ut Terraneus pingit, cavernula inveniuntur. Interdum tamen in extrema etiam urethræ parte, & multa quidem, spectantur, ac præsertim qua urethra coronæ glandis subest. Quæ si Noster propter parvitatem non vidisset; at certe ex maximis illis nostris aliquod præsertim triangulare (prima enim hac sæpius figura sunt) & contra coronam, & infra coronam, ubi nos & alias in nonnullis, & superiore anno in quodam qui se suspensio necaverat, & hoc ipso anno in duobus, cum Auditoribus nostris vidimus; non videre non potuisset, si revera in plurimis urethris inspexisset, & eorum quidem quos ob ætatem, Partium harum magnitudinem, ac vitæ genus huic examini magis idoneos censuisset, ac denique si aut secundum urethræ inferiorem longitudinem, aut ab ejus latere, quemadmodum nos sæpe fecimus, sectionem instituisset. Nam aliqua in re certe defecerit oportet qui in supremo urethræ pariete nondum viderit esse Canaliculos ob peculiarem & sedem, & orificiorum figuram, & magnitudinem præsertim a cæteris distinguendos. Non modo enim quodcumque maximi eorum admittunt specillum, cæteri non solent admittere; sed cum hi attentos defixosque Spectatoris oculos ut plurimum requirant; illi statim atque urethra aperta est, ultro solent in oculos incurrere, non meos dumtaxat, aut meorum Auditorum, qui rem se habere ad hunc modum & meis in ædibus, & in Nosocomio, & in Gymnasio semper constanterque viderunt, sed & aliorum Anatomicorum, ut Cl. Santorini qui in Veneto, ut Cl. Stancarii qui in Bononiensi Theatro cum non cæteros, sed peculiare illos tantum nostros Canaliculos ostenderunt, id procul dubio fecerunt, non quod utrosque ipsi non viderent, sed quod ab inspicientium plerisque visum iri cæteros non sperarent, ob parvitatem vide-

De iisdem
Canaliculis
observandis, &
in duplex
genus distinguendis.

videlicet; quæ cum summa ut plurimum, tum aliquando tanta est, ut vix unus ipsorum setam admittat, ne dicam, quod pariter ego observavi, nulum prorsus eorum vestigium appareat. Sed mihi, credo, & ipse, & Auditores omnes mei, & noti Anatomici blandiuntur! Quid ergo Lovanien- sis ille Professor Philippus Verheyenius, mihi nec alloquio, nec epistolis, nec ullis prorsus officiis notus? Primum cum illud de quo antea dictum est, in urethra Foramen fortuito vidisset, non alibi scripsit invenisse, quam in eo latere quod corpora nerveo - spongiosa potissimum respicit, hoc est in urethrae pariete superiore; quod quidem Foramen *aperturam* vocat *admodum insignem*, & (quod vim ipsam veritatis maxime ostendit) *longitudinem*, inquit, *grano communis tritici fere æqualem*, *latitudine nonnihil inferiorem*, cum ego quem nondum legerat, ob eandem observatam magnitudinem, & figuram in eandem prorsus mensuram incidissem, cum videlicet scripsi: *maxima nunquam tanta fuerunt, ut eorum orificium frumenti grano operire non potuissem*. Deinde vero cum jam illis scriptis, in mea Adversaria incidisset, atque ex his non unum modo, sed plura esse Majora illa *Foramina*, cognovisset, ac quæ de cæteris etiam *Foraminulis* adscripseram, perlegisset; candide post mea producta pleraque verba hæc addidit: „ Hæc ego legens mihi ipse subirascebar, liqui- „ dem miratus fueram, neminem hætenus mihi „ notum esse, qui *aperturam* illam, de qua pau- „ lo superius, descripserat, adeo, ut mihi „ tunc apparebat, manifestam: jam autem major „ erat ratio mirandi, quia hanc unicam, cæte- „ ras autem non videram. Opportune vero - se „ se obtulit occasio prædicta inquirendi, nempe „ in cadavere militis suspendio necati, ubi di- „ ctas *aperturas* reperi non tantum secundum lon- „ gitudinem urethrae solitarie positas, sed qui- „ busdam in locis binas; „ qua de re cum antea dictum sit, illud satis erit hic attendere, vidisse igitur Verheyenium illas *aperturas* in pariete, quemadmodum pingit, urethrae superiore, & quod ex eadem pictura, & verbis etiam nonnullis in- sequentibus constat, *magnas* vidisse. Porro hæc subjecit: *Quod parva spectat foraminula de quibus D. Morgagnus, illa erant mihi innumerabilia*: quibus ex verbis cum illud obiter confirmari potest quod paulo ante diximus, perperam videlicet in eo Terraneum reprehensum esse, quasi hæc foraminula æquo plura delineasset, quæ & Graafius olim videtur *innumerabiles vias* appella- visse; tum illud potissimum ex iisdem verbis cum superioribus, & cum respondente Figura collatis est inferendum: ejus quoque Illustris Anatomici oculis, atque judicio non minus quam nostris, visum esse, *Majora* illa *Foramina*, seu *Aperturas* a *parvis Foraminulis* tam magnitudine, quam peculiaribus aliis conditionibus longe esse distin- ctas. Cum ergo *Majora* illa & peculiaria *Foramina*, continuatosque *Canaliculos* Terraneus neque delineaverit, neque descripserit, *Foraminula* autem quæ a Graafio quadantenus indicata fue- rant, minimosque illos ac communes ductus non nisi tertio ab editis meis Adversariis anno descri- pserit; quid causæ tandem esse, putabimus, cur nos- ter iste Judex nequeat, se tenere, quin asserat, „ gloriam totam circa harumce partium „ in- venta, & „ descriptiones vindicari eidem Terra- „ neo debere, & restitui; „ præsertim cum ipse alibi suapte sponte longe aliter pronunciasset, ubi videlicet scripsit: „ disgregatas glandulas „ per urethrae longitudinem, glandemque disper- „ sas - a Clarissimo, amicissimoque Morgagnio, „ nostroque Terraneo detectas esse, & expositas. „ Quod autem postremo subjicit: „ circa liquidum per „ hosce ductus - derivati secretionem, & secre- „ tionis causas, nec per hilum se recedere ab as- „ sertis Terranei; „ nobis quidem satis est, ab iis paucis quæ in hanc rem attigimus, Verheyenium non recessisse. Hic enim cum de eodem li-

quido verba faciens, nostram opinionem propo- suisset (*opinatur*, inquit, *exprimi in urethram per inflationem ejusdem substantiæ spongiosæ, corporumque nerveo - spongiosorum*) continuo hæc ad- jecit: *opportune quidem; cum iis turgescitibus saepe opus sit urethrae inunctione pro transitu se- minis*. Neque tamen minus ipse Terraneus iisdem est usus, quanquam meum; quod & aliis in lo- cis fecit; silentio nomen dissimulavit.

ANIMADVERSI O XX.

SI tibi paulo prolixior super Urethrae Canali- culis visus sum; cave id factum credas quod inventionis eorum laudem tanti esse, existima- verim; sed quascunque *objectiones* tibi, Vir Do- ctissime, non displicuit edere, ad eas me non piguit respondere. Nunc proximas Tabulas tan- to brevius expediamus. Et primum Tabulæ LXVI. Figuram 1. & 2. quicunque cum superio- ris Tabulæ Figuris postremis multo accuratiori- bus comparaverit, is profecto intelliget, alios pas- sim a te productos esse Iconismos aliquanto di- gniores quam nostri, qui non sine additis Ani- madversionibus ederentur. Ego vero illud unum ex te sciscitabor: cum in Figura 1. per litteras II. denotari dicitur *Virile Membrum nexu vali- dissimo ossium Pubis medio alligatum*; quæro qua in Figuræ parte appareat nexus, seu potius vin- culum istud validissimum? Certe non ad eas lit- teras II. Num ergo a dextro latere inter utram- que, diductum scilicet, atque acicula confixum? Sed neque is locus, neque ea parvitas credi si- nunt. Si autem sic ego dubito qui illud vinculum *longe lateque*, ut Verheyenius ait, *descripsi*; quid Anatomia Tirones, omni præsertim ejus Ligamen- ti descriptione in magno isto Opere carentes, quam quidem ex quo in Adversariis admonuimus, neque idem Verheyenius, neque Cl. Fantonus in sua Anatome prætermiserunt. Jam vero ad Fi- guram 3. progrediamur, quam, etsi non unde- quaque probandam, satius erat eundem Verheyenium describere, quam dum novam proposuit, Erectores quidem Penis Musculos prælongos, Di- latatores autem Urethrae dictos extra suam sedem exhibere. Ista etiam Figura, ejusque Explicatio me nonnulla quærere ex te cogunt. Primum, quam- obrem cum Bidlous scribat: „ Interstitia habet „ D. ex tendinum mutua, atque alternata emissio- „ ne; „ tu sic describas: D. *Interstitia inter mu- sculos prædictos, e mutua atque alternata eorundem emissionem enata*. Alterum, quamobrem cum ille continuo hæc addat: „ Interior Intestini laxa „ tensilisque Tunica, Valvulas ab uno ac altero „ latere fingit quodammodo semicirculares; „ tu hæc prorsus omittas? Ego quidem his de Valvu- lis, ut & de Ani Musculis quid observaverim, in Adversariis superioribus scripsi. Mitto alias in Explicatione hac Bidloi, mutationes; ut quæ- ram, de Musculo huc spectante, in tuo autem Theatro nusquam descripto, quid sentias. Riola- nus in Capite de Musculis Ani, Musculum indi- cat quem *Levatores sextum* vocat, *gracilem, & acuminatum, extensum supra acceleratores penis*. Fateor, non omnia quæ in eo Capite scribit Rio- lanus, probare me posse; quod tamen ad eum Mu- sculum attinet, ut ipsum Eustachius, quod alias etiam suspicatus sum, ante Riolanum non deli- neasset, certe hac nostra ærate Nobilis Anatomicus Littrius inter veros Urethrae Dilatatores singu- larem Musculum ab inferiore atque antica Inte- stini Recti parte natum, altero autem extremo ad partem inferiorem posticamque urethrae se se an-nectentem descripsit: quem dum multis in cada- veribus perquirerem, sic observavi. Aliquando exi- lis tantum quasi adumbratio perexigui Musculi triangularis apparebat; alias autem parvus qui- dem, sed perfectior musculus triangularis in con- spectum dabatur: quem in tribus aptis huic per-quisitioni subjectis in duos ejusdem figuræ muscu- los, vel si mavis, in duas expansiones quarum alte-

loc. cit.]

cap. 2.

33.

I. 1. tr. 2.
cap. 24.Ibid.
Diff. 8.Tab. 13.
Fig. 3.Anatom.
hum. cor-
por. Tab.
47. F. 5.

Adv. III.

De Penis
Musculo
Triangu-
lari.
Anthro-
pogr. l. 5.
cap. 40.
Tab. The-
atr. add.
T. 16. F. 1.
pag. x.
Memoir.
del'Acad.
R. des Sc.
A. 1700.

Anim. 17.

I. 1. tr. 2.
cap. 24.Advers. I.
num. 10.

loc. cit.

Tab. 13.
Fig. 1.

18.

Theatr.
Tom. I.
416

34
De Muscu-
lis Accel-
eratoribus.

altera alteri subjecta erat, distinctum conspexi. Utriusque basis cum antica Sphincteris Ani parte, inferior quidem, quæ major erat, inferius, superior autem superius committebatur; vertex utriusque in tendineum contractus fasciculum infimis ac mediis Acceleratorum fibris subtenus bulbum versus urethræ producebatur. Cujus quidem fasciculi, & ex parte etiam subjecti Musculi quoniam inter litteras B. A. & H. H. adumbrationem in tertia ista Figura vidi, idcirco in hunc sermonem ingressus sum. Nam quod Bidlous videtur hæc habere pro *fasciculis* a quibus Musculi Urethram Comprimentes, live Acceleratores *exstruantur*; non negaverim quidem, me quoque in aliquot cadaveribus eum fasciculum tendineum vidisse, ut istuc delineatur, in aliquot Acceleratorum fibras quasi abeuntem; sed quid hoc ad tot alias eorum fibras? Quod si eo in loco Musculorum principium est agnoscendum quo in loco eorum termini firmiores sunt; ego quidem in ea sum opinione, ut magnam saltem Acceleratorum partem a nervosis penis corporibus oriri, censeam, unde videlicet utrinque obliquis demissis fibris spongiosam urethræ substantiam ejusque bulbum complectentibus, in ea linea quæ sæpe effici ex ipsarum concursu solet, hoc est in medio secundum bulbi longitudinem finiantur: qua sane ratione intelligitur, cum ad constringendum bulbum, connexamque urethram contrahuntur, in eo sanguinem (ad cujus copiam prompte quotiescunque opus est pro celeriore spongiosæ substantiæ urethræ, glandisque adeo distensione suppeditandam factus ipse bulbus videtur) in hac autem urinam, aut semen eodem motu & comprimere, & antrorsum (nam ipsi quoque eam versus partem contrahuntur) ad glandem compellere. Non ignoro, contrarium vulgo principium his musculis assignari, atque adeo Illustrem Anatomicum scribere, se in pluribus cadaveribus fibras aliquot carneas vidisse quæ ab illorum antica parte per colis latera eo usque ascenderent, ut in præputio finem haberent, quod retrahere videlicet possent, ne urethræ orificium obduceret eo ipso tempore quo iidem agentes muscoli urinam, aut semen extra urethram ejaculantur. Ego vero cur a pervulgata de eorum initio sententia discedam, supra indicavi; has autem ipsorum fibras usque ad præputium productas cum diligenter in plurimis perquisiverim, in nullo adhuc videre potui, neque in unum aliquem Anatomicum, legendo, aut sciscitando incidere qui istum præputii motum agnosceret. Illud memini, vidisse me olim in cane duos parvos triangulares musculos in unum triangulum junctos cujus basis ad ani sphincterem, vertex autem in oblongum album funiculum, live tendinem producebatur, qui sub pene excurrens, dispersis demum ad glandem, ac præputium fibris, definebat. Verum ii muscoli nequaquam ad Acceleratores quorum postremæ subtendebantur parti, sed potius ad paulo ante descriptum Triangulare Musculum origine, sede & figura pertinere videbantur. Cæterum in homine nunquam illum Triangularis fasciculum ita longum vidi ut Acceleratores æquaret; horum autem anticam partem quæ in carnea duo quasi cornua videtur huc atque illuc dispersita, nunquam longiorem inveni quam ut ab altero latere (id quod in pluribus observavi) nervosum corpus complexa, modo uno, alias pluribus carneis fasciculis ad dorsum usque penis sub ipsa fere pube pertingeret.

ANIMADVERSIO XXI.

De Penis
Musculis
Transver-
sis.

U Num denique in Figura eadem relinquitur quod ex te quæram. Nam si penis musculorum par tertium I. *ab uno tantum latere hic depingitur*; quis ergo iste musculus est qui ab dextro latere huic picto respondet? Porro quod ad hujus Musculi picturam attinet, tenuiorem in proximis Tabulis proponit Cowperus, quicum a me habitæ ad hoc tempus observationes con-

sentiunt. Cæterum ante Bidlous hoc Musculorum Par eodem *Transversorum* nomine Thomas Bartholinus descripserat, auctorem laudans Lindanum, imo Fabricium nostrum ab Aquapendente. Nam quod „ad cavum ovale urethræ im-„ plantari, dixit, ad illud diducendum, & faciendum locum semini istuc primum a Prostatis vehementius erumpenti ac spumanti; „ nempe quod nunc bulbum vocitant, ipse *cavum ovale* nominavit; quanquam ego illos ut aliquando bulbo, sic nonnunquam imis potius Acceleratorum lateribus inhaerentes, interdum etiam ei parti urethræ ab lateribus infixos vidi quæ inter Prostatham, bulbumque intercedit. Illud recte istuc adjecit Bidlous: hos Musculos *non semper inveniri*: quod etsi ab aliis qui post ipsum scripserunt, omissum est; ego tamen testari possum, cum in multis illos præclare viderim, in duobus certe vel tribus cadaveribus, quamvis idoneis, & diligenter etiam cum Amicis Anatomicis perlustratis, invenire non potuisse. Cum autem desunt; eorum munus, etiam alibi a nobis tum in feminis, tum in urinæ ejaculatione indicatum, ab eo quem descripsimus, Triangulari eo facilius suppleri, opinamur, quod in quibus eos non vidimus, hunc certe magis conspicuum deprehendimus. Antequam hanc Tabulam relinquamus, nonnulla Bidloi verba cum iis quæ eidem in Explicatione Figuræ 5. tribuuntur, conferre juvat. Scripserat ille: *C Urethra, eique appositæ, corporibus Nervis similes, Fibra D. Urethræ ascensus E. per glandem F.* Tu vero sic describis: „ C. Urethra. D. Corpus cavernosum Nervosis „ Penis corporibus per quam simile, totam Urethram cingens. E. Urethræ tubus ad usque „ Penis Glandem F. assurgens; „ quasi vero etiam per glandem, quod Auctor dixerat, non ascenderet; Sed hoc misso; quid de istis habendum sit quæ de Corpore Urethræ Cavernoso sunt adjecta: esse Penis Corporibus *per quam* simile, & *totam urethram cingere*; omnes qui illa Corpora inter se diligenter contulerint, & unde illud Urethræ incipiat, animadverterint, etiam me tacente, satis intelligent. Cæterum in Figura 7. atque 8. cum Bidlous, & Verheyenius spongiosam qua cingitur Urethra, substantiam, undequaque æqualiter, crassam proponunt, tu files, quando ex accuratioribus Figuris quas num. 2. in LXVIII. & 2. 6. 7. in LXIX. Tabula profers, facile poteras uno, aut altero verbo corrigere.

ANIMADVERSIO XXII.

T Abula autem LXVII. quam iustum in plerisque Lectoribus excitabit desiderium ejusdem cujus Figuras exhibes, Cowperi Descriptiones perlegendi, ex quibus pauca verba, ejusque sententiæ, Inventisque recte intelligendis non sufficientia in Explicatione Figuræ 1. ad litt. GG. & 4. ad litt. FF. vix interfertis. Nimirum ut nostri Urethræ Canaliculi, sic Littrii, & Cowperi Glandulæ quid essent, non ex propriis Auctorum Descriptionibus, sed ex aliena Animadversione conjici potius, quam intelligi, voluisti. At saltem Cl. Virorum qui Eruditorum Acta Lipsiæ conscribunt, diligentiam esses imitatus, quando ex eorum (nisi quædam me indicia salunt) Volumine tertiam, quartamque Figuram descripsisti. Illi enim tertiam, quam tu majorem certe non exhibes, *naturali paulo contractiorem* esse, admonuerunt; in quarta vero eam cujus potissimum causa confecta est, Glandulam F. exprimendam curarunt, cujus in tua Tabula vix locus dumtaxat intelligitur. Sed quid ego tuam, vel tuarum potius, Vir Doctissime, Operarum diligentiam desidero quæ in postrema hujus Tabulæ Figura ex Bidloo desumpta (ut mittam cætera) se ita gerunt, ut Explicationem litteræ G ad hunc prorsus modum describant: *Vasorum, & præsertim Nervorum Plexus, inflati, exsiccati, & secum-*

Anatom.
quart. re-
nov. l. 1.
cap. 24.

Adv. III.
Anim. 40.

Anatom.
hum. cor-
por. Tab.
48. F. 4.

A. 1702.
M. Nov.

Tab. 48.

cundum longitudinem aperti; cum Bidlous quidem ita scripsisset: *G. Vasorum, præsertim nervorum plexus*: & continuo, sed ad alterius Figuræ Explicationem progrediens, distinctionis nota quam punctum vocamus, interjecta, hæc subjecisset: *Inflati, exsiccati, & juxta longitudinem aperti Penis anterior facies exhibetur in Fig. IV.*, quæ videlicet verba in Figuræ 4. superioris Tabulæ Explicationis initio, jam a tuis Operis descripta fuerant. Tabulas vero LXVIII. & LXIX. aspicere non possum quin eorum mihi veniat in mentem quæ ab Diligentissimis Anatomicis Ruyschio, & Cowpero nova post Graasium scripta sunt de structura Corporum sive Penis, sive Urethræ *Cavernosorum*, de eorum vasis, de sanguinis per eadem circuitu, ac de aliis ejusmodi rebus sine quarum notitia modus atque ratio quæ Penis contingit Erectio, satis intelligi a Medicis atque explicari non potest: ex quorum tamen Descriptionibus tu ne unum quidem verbum in Theatrum tuum transtulisti. Atque ut de Cowpero tantum dicam qui & post Cel. Ruyschium scripsit, & elaboratissimam Penis Descriptionem exhibuit; mirari profecto subit qua unquam ratione potueris eas omnes Figuras quas illius Descriptionis causa edidit, describere; in ipsa autem Descriptione haud animadvertere, quam paucis verbis quam nova, quam elegantia, quam denique digna scribat quæ in nulla Anatomica Historia, & multo minus in amplissimis tuis Voluminibus omittantur. At saltem in earum Figurarum Explicationibus illa indicasses. Diligenter ille varium Arteriarum ortum, & quid inde consequi interdum possit, attendit; diligenter earum divisiones, & quæ loca singuli ex ordine petant rami, proponit; tu illud omittis, hæc vero in Explicatione Fig. 1. sic obscuras, ut nisi ipsa Figura obstaret, credere Tirones possent, quæ Arteriæ Cavernosum Urethræ Corpus subeunt, earundem præcipuum truncum esse kk. qui videlicet longe alio pertinet. Tu ad litteram I. quæ Venam ipsius Penis ostendit, hæc addis, *in qua Valvulæ admodum spectabiles*, quasi vero id potissimum in ejus delineatione spectasset Cowperus, qui ex loco ejus Venæ, transeuntis videlicet sub pubis ossæ, erectionem penis magna ex parte deducit, dum scilicet ea vena a Musculis Erectoribus contra illud os urgetur, atque ita compressa reditum sanguini per se intercludit. Quem tamen ut intelligamus non totum propterea intra Penis Corpora tunc subsistere, quam nimirum ob rem posset concreescere, & in grumos abire, idcirco Venas Præputii K. delineavit, per quas videlicet cum priore communicantes pars aliqua sanguinis interea reduci potest. Cum vero proximos lymphæ ductus pinxit, conjecturam addidit valde probandam, scilicet si ut alii ex inferioribus partibus lymphæ ductus venientes, ita & hi proximas inguinales glandulas subeant, hanc nempe expeditissimam esse viam per quam ex pene ad eas glandulas veneræ Luis materia bubones excitatura transducatur. Sed nimirum non id nobis propositum est quod tuarum certe, Vir Cl. fuerat partium, quidquid Cowperus in ea Descriptione proposuit, indicare; veruntamen ex his paucis quæ data ab una Figura occasione memoravimus, de cæteris quæ a te sunt omissa, conjecturam facere Lector poterit. In postrema denique Tabula LXX. quod ad internam attinet testiculorum structuram, tu quidem plura ex Bidloo adducis; sed quis explicat, atque adeo quis explicare unquam possit quid sibi ille velit crassus quasi annulus quo in Figura 15. transversa testiculi sectio cingitur? Næ tu melius fecisses, si istam, aliasque plures Bidloei Figuras omisisses; aliorum autem & Figuras, & Explicationes aliquanto diligentius describendas curasses, velut in ista ipsa Tabula duas quæ n. 12. & 13. ita ex Graafio sumuntur, ut prætermisso quod Auctor proposuerat, communi argumento, hæc quoque ad bruta, ut quinque superiores, per-

tinere videantur. In secunda autem, & tertia Figura non ita certe amplam Graafius Vasis Semen Deferentis M. cavitatem delineavit. Quod etsi in Terranei etiam Figura reprehenderim, cave tamen credas, a me Verheyenium vicissim probari, ubi de eo Vale scripsit, „ quod non ha- „ beat unicam majorem cavitatem, sed debeat se- „ men quasi transcolari per illius porosam sub- „ stantiam. „ Non modo enim vel infimæ illius parti specillum tenuissimum quidem, sed tamen specillum, nullo negotio quoadusque finit rectitudo Vasis, immitti, scio; sed cum ejus cavitatem secundum specillum aperuissim, vel eo in loco unam esse, & lævigatis quidem parietibus, non inæqualibus, & spongiosis; deprehendi. Itaque cavitatem quidem pingi, volo, sed quæ Vasis Semen Deferentis, non Venæ alicujus, aut Arteriæ, potius esse videatur.

ANIMADVERSI O XXIII.

Statis superque de Virilibus; nunc ad alterum Caput quod est de Partibus Mulierum Genitalibus, transeamus. *Usus Clitoridis est*, ut tu cum Graafio inquis, *Pudenda ne collabascant, sustinere*. Ego vero ut hunc usum prorsus non repudiem; non tamen censeo, ipsum ab Natura potissimum spectari, atque ideo recte inter alios Clitoridis usus hunc a vobis primo loco recenseri. In Vaccis enim, in Canibus, in Ovis, inque aliis ejusmodi animantibus quibus Clitoris data est, cum hæc sit in ima locorum parte constituta, quæ possit ipsa, ne collabascant, sustinere? Quod autem Nymphas in quibusdam defuisse, scribit Riolanus, etsi Graafius videtur credere, non defuisse quidem, sed ob exiguitatem vix apparuisse, idque in virginibus, non vero in mulieribus contigisse; ego tamen aliquando in mulierum, atque adeo etiam in vulgatissimi scorti cadavere nihil prorsus Nympharum inveni: contra in Virginum dissectione præter Nymphas superiores, quæ mediocres erant, ter vidi in imis Pudendi lateribus duas alias parvulas quasi Nymphas protuberare. Sed de omnibus Nympharum varietatibus, ut cum altera vel deest, vel figura, aut magnitudine ab altera longissime discrepat, non est ut hic scribam. De nostris autem ipsarum Glandulis cum multo aptior infra occurrat scribendi locus, hic tantum Lectores monebo, ut si forte in nostra harum quam subjecis, descriptione quo referatur, & quid sibi velit illa vox *concolor*, non assequantur, id non mihi, sed Typographis tuis imputent qui duas proxime adjectas a me voces *glandulis, subalbum* omiserunt. Eisdem quoque rogatos volo, ne in iis quæ paulo post ex me pariter de Hymene producis, & præsertim in iis verbis: *quæ - satis commode Andreas Vesalius, Corpor. humani disquisit. Anatomica, tab. 16. fig. 4. ut mihi quidem videtur, exposuit*; Lectores, inquam, rogatos volo, ne me usque adeo imperitum credant, ut ignorem, Vesalium neque ea inscriptione librum ullum edidisse, neque de Hymene quidquam per Tabulas exposuisse. Quid ergo est? Nimirum ista inscriptio, tabularum ista commemoratio a tuis Operis meis verbis interjecta est; quibus aut nihil, aut certe id ipsum quod ego ad paginæ oram peculiariter indicaveram, haud oscitanter interjiciendum erat; l. 5. c. 15. de hum. corp. fabr. & alib. hoc est non modo in eo majoris Vesalii Operis loco, sed & in Epistola ad Joachimum Roelants, & in Observationum Falloppii Examine. Et sane ut quæ in priore loco de origine, & continuatione, in eodem autem, itemque in altero de inæquali Hymenis crassitudine scripsit Vesalius, semper adhuc vera deprehendi, ita quod in tertio addidit de ejusdem sede, id fere semper observavi, sic tamen, ut cum ille scribat: „ Hy- „ men pudendi inferiorem posterioremque quæ „ anum spectat, sedem, & hujus sedis laterum „ imam tantum regionem occupat, adeo ut in sui

De Vasis Semen Deferentibus.

l. 2. tr. 1. cap. 14.

Myotom. Append.

42. De Usu Clitoridis.

De Nymphis.

43

Advers. I. num. 11.

47

Ibid. num. 29.

De Hymene.

„fui medio illum esse perforatum, haud vere asseramus; „mallem ego ut non *tantum*, sed *potissimum* scripsisset. Re enim vera Hymen ad meatum usque urinarium pertingit, etsi quo magis ascendit, eo magis extenuetur sic ut persæpe potius quam anulum circumcirca æqualem, & absolutum, crescentem lunam referre videatur, quemadmodum Panarolus, & ante ipsum Casse-rius noster, iudice etiam Riolo *exakte* depinxit. Quæ de natura, ac sede Hymenis cum pluri-um puellarum, recens præsertim natarum, dis-sec-tione post Prima edita Adversaria confirmarem, atque illustrarem, tum alia quæ interdum con-tingere, in ista descriptione proposueram, ali-quando conspexi, & in iis semel Hymenis fora-men ab illa parva quasi instita in duo divisum; tum eam quam præter anulum in Virginibus po-sueram, infimæ vaginæ angustiam & semper vi-di, & in tribus nuper habitis dissectionibus hac effici ratione, observavi. Scilicet a superiore Va-ginæ parte intus secundum hujus longitudinem, Hymenem versus duæ tresve, nonnunquam plures insignes Columnæ, seu mavis ex duplicata Vagi-næ interiore substantia corrugationes, non parvo inter singulas interjecto spatio, descendunt. Hæ quoniam ut magis ad Hymenem accedunt, ita magis crassæ fiunt; propterea & Vagina ipsa quo inferior, eo angustior redditur, & extremæ ipsæ Columnarum bases sua tum figura, tum mole pro Myrtiformibus illis Carunculis videntur a multis accipi Anatomicis potuisse, qui videlicet Hymenem nihil aliud esse nisi eas Carunculas mem-branarum ope inter se devinctas colligatasque, tradiderunt. Quia tamen in re quam decipe-rentur, cum ea satis indicant quæ in descrip-tione proposui, tum illud confirmat, quod ego ve-rum, de quo dictum est, Hymenem ab earum Co-lumnarum basibus prorsus sejunctum interdum vide-rimalias autem invenire soleam multo latiore quam ad illas connectendas requiratur. Hæc addere iis volui quæ primum scripseram super Hymenis non tam *existentia*, ut tu, Cl. Vir, dicis, quam stru-ctura, sede, & forma, quibus an eo quo scripsi, tempore *nihil notius esse posset*, ego quidem haud satis scio; illud scio, in iis quos tu memoras, libris eadem certe non exhiberi, Verheyenium autem nostris perlectis Adversariis, veriora ali-quanto quam prius (quod utinam & in II. Li-bro fecisset) de Hymene tradidisse.

ANIMADVERSIO XXIV.

IN Muliebris Urethræ descriptione nonnulla omisit Graafius, quæ a te minime addita sunt. Namque ut præteream, illam, ut ego observare soleo, in ipso fine angustiore fieri; Canaliculis certe non caret, a quibus intrinsecus oblinitur. Quod vel ex Terraneo cognovisse poteras eos de-scribente præter illos quos in principio Urethræ collocat, & Lacunas appellat Graaf, quosque so-lummodo, inquit, describunt vulgo Anatomici; quasi vero ego tribus ante ipsum annis illos eos-dem non descripsissem: quod nuper animadver-tisse video Cl. Heisterum. Quoniam autem idem Terraneus illos exiguos esse, dicit, & a *subjecto glandulari corpore produci*; scire licet, etsi interdum vix, nonnunquam ne vix quidem appareant, sæpe tamen, atque adeo in iis tribus vel quatuor mulieribus quas novissime continen-ter dissecui; ut alias omittam ante I. Adversaria inspectas; eorum oscula, quorum alia elliptica erant, alia semielliptica, alia circularia, plera-que non minora a me inventa esse quam quæ ipse in mediocribus virilis urethræ ductibus pinxit, quædam majoribus æqualia, nonnulla etiam ma-jora. Et ipsorum quidem aliqua, præsertim in-feriora, manifesto vidi ad glandosum urethræ cor-pus pertinere; plura tamen, etiam aliquando in-feriora, Canaliculis inserviebant, eorum qui sunt in urethra virili, simillimis, hoc est recta sub ipsa statim interna urethræ membrana ex qua consta-

bant, ascendentibus, minime autem, quantum adhuc perspicere datum est; ad illud corpus desce-ndentibus; ut me nondum pœniteat quod de ipso-rum origine amplius quærendum censuerim. Quod autem hos Canaliculos omiserit Verhey-e-nius, magis quidem mirarer, nisi Bartholini Pro-statas, ipsumque etiam Vaginæ Plexum Retifor-mem omisisset. Sed cum res ejusmodi jam diu notas, celebratasque non memoraverit; levius sane ferendum est, quod eos Ductus, aliosque per am-bitum Muliebris Fossæ dispositos, quod Liga-mentum Clitoridis Suspensorium, quod certas Men-struorum Scaturigines, quod Cervicis Uteri Ve-siculas, & Valvulas, quod frequentiore Tubarum positum, aliaque ejusmodi non ita pridem a me vel maxime illustrata, vel primum animad-versa, ignoravisse videatur. Quo in numero etiam sunt Papillæ ipsius Vaginæ, quas ego quidem cum in plerisque, minus etiam idoneis, cadaveri-bus post Prima edita Adversaria incisiss, satis ob-servavi, tum aliquando ita confertas, elegantes, ac manifestas iis qui aderant, ostendi, ut Vagi-næ complures rugæ nihil esse aliud quam perpe-tuæ distinctarum Papillarum series viderentur.

Contra in nulla unquam Vagina observasse memini Rugas ita dispositas, ut arborescimitaren-tur, quemadmodum Verheyenius pinxit in Figu-ræ 2. Tab. XVII. inferiore parte, quam tu quando in tua Tabula LXXII. ad n. 5. afferre volebas, utinam monuisses, ipsam ex uno tantummodo sub-jecto fuisse descriptam. Id tamen in eadem a frequentiore observatione minus abhorret, quod pars rugarum sint transversæ, omnes autem qui-busdam in locis interruptæ. Sic enim observa-ri solet, ut alias scripsi; solet, inquam, nam Vaginas quoque non paucas vidi in quibus vix, ac ne vix quidem id appareret. In quibus autem id apparet, suspicor, in iis ferme locis apparere quæ ab iis Columnis de quibus in superiore Animadversione dictum est, a primordiis tenerentur: a quarum quidem basium reliquiis globosas illas Carunculas effici, non dubito quæ haud raro in mulieribus circum Vaginæ orificium una cum py-ramidalibus quæ dilacerati Hymenis reliquiæ sunt eminent, & cum his promiscue Myrtiformes nunc-upantur. Sed & ea Rugarum Vaginæ dispo-sitio quam Verheyenius proposuit in ejusdem 2. Figuræ superiore parte, ut passim rete quasi quod-dam referant, non ita frequenter occurrit. Glandulæ autem quas in eadem Figura appinxit, & post macerationem vidisse, inquit, eas certe hac omissa, minime apparent in muliebribus qui-dem Vaginis; nam in cane quadam anteriorem vaginæ superficiem maxima ex parte evidentibus variæ magnitudinis glandulis obductam, in echino autem plures ibidem extantes glandularum plexus inter dissecandum ostendisse me, memini.

ANIMADVERSIO XXV.

JAm vero quod ad Uterum ipsum attinet; quod illum Graafius, quandoque, licet rarius, nunc magis versus dextram, nunc magis versus, sinistram Hypogastrii partem situm offendisse, se, dicit; id ego semel in Virgine, in Mu-lieribus autem bis vidi, inprimisque in Vidua quadam in qua uteres Ligamentum dexterum si-nistro multo brevius erat, ita in id latus Uterum ferme totum trahebat. Quod autem absolute negat, Uteri partem dextram a sinistra intrinse-cus, per lineam aliquam, secundum longitudi-nem, nem Uteri excurrentem, separari (quamvis il-lam opinionem plerique foveant Anatomici) ni-si substantiam ejus secundum longitudinem dis-secando, lineam illam efformaverint; ego sa-ne etsi ab illa opinione longe absum; tamen in Virguncula tredecim annos nata intimam non cervi-cis modo, sed & fundi uteri posteriorem superfi-ciem bifariam inveni secundum longitudinem di-visam per sulcum quendam profundum, quem in-ter dissecandum non efformatum esse a me, certo scio.

Vid. Tab. in fin. Pen-tec. V. ad lit. I. Ad Spig. de form. fœt. Tab. 8. Anthro-pogr. l. 2. cap. 35. De Virgi-neæ Vagi-næ Colum-nis, & Ca-runculis Myrtifor-mibus.

tr. 5. c. 21.

49
De Papil-lis Vagi-næ.

De ejusdem Rugis, & de Carun-culis Myrtifor-mibus.

Vid. Verheyen. l. 1. tr. 2. c. 31.

De Vagi-næ Glandulis.

48
De mulie-bris Ure-thræ Cana-liculis. De Gland. cap. 2.

Advers. I. num. 10.

Compend. Anatom. n. 192.

De Utero. 51.

52

scio. Sed & quæ res Graafius „ dubitat an fieri possit, ut longior videlicet Penis - (ali- „ quando) in osculum Uteri introducatur, & „ introductus ibi detineatur, „ ejus rei certam compertamque sibi historiam Cl. Valsalvam nobis aliquando narrasse, meminimus. Verum ut in ipsius Uteri anatome attingamus ea quæ Graafii *tela* a te fuerant *intexenda*; ad ulteriora, ea- que longe graviora pergamus. Igitur Graafius docuit: *quo magis Uterus (a primo conceptu usque ad partum) dilatatur, eo magis etiam incrassari ejus substantiam*. Vir autem Cl. Henricus a Deventer, qui post Graafium diligentissime hanc quæstionem tractavit, observationibus quas sæpius habuit, fretus, ostendit, „ Uterum varia quidem „ magnitudine ab imprægnationis initio ad partum usque, *at una eademque semper gaudere „ crassitie, - qua videlicet gaudet dum adhuc „ parvus foetusque expers est.* „ Sed neque Graafius dubitavit, quin illa in dilatatione *totum Uteri fundum* indiscriminatim extenderetur. Contra Deventrius Ligamenta Uteri observat tanto inferius cum hujus lateribus connecti in prægnantibus, quam in vacuis, ut inde conficiat: eam partem fundi quæ supra Ligamenta est, *octuplo vel duodecuplo plus* extendi, quam quæ infra.

ANIMADVERSI O XXVI.

DE ipsa autem Uteri substantia, ac structura potissimum examinanda hæc sunt quæ docet Graafius: „ Extremis (gestationis) mensibus pene membranaceam suam substantiam exuere (Uterus) videtur; ita enim, si dissectur, rubescit, totque foraminulis (quæ nihil „ aliud sunt quam vasa per medium dissecta) „ pervia conspicitur, ut spongiosam quasi substantiam induat. „ Hic primum omittitur illa Uteri substantia quæ tunc maxime est manifesta, & quæ non modo in partu, ut foetus expellatur; sed etiam a partu, ut ipse uterus ad parvitatem pristinam redeat, tantum habet usum; ut paulo post Graafius hoc ipsum explicaturus, ad eam confugere cogatur, mentionem videlicet injiciens *de fibris per uteri substantiam dispersis se se contrahentibus*. Verum Malpighius non dispersas fibras nobis descripsit; sed „ fibras carneas in fasciculos coagmentatas, & reticulariter implicatas uteri structuram ita exterius componere, „ docuit, ut ipsius interior etiam moles sit laceratorum congeries, & complexus, - imo avulso „ chorio, & placenta, musculosa occurrat; „ quod quidem mihi olim, & Amicis Venetis maxime fuit in muliere manifestum quæ altera vel tertia hora a partu ob quandam animi affectum obierat. Extantes namque musculares fibræ inter se intextæ; nisi quod earum manipulus non exiguæ latitudinis, extremis utrinque partibus cum utero connexus, cætera liber ac solutus, prominerebat; partem, atque adeo etiam superficiem uteri interiorem efficiebant; ut minime propterea miratus sim, cum postea legi, Cl. quoque Meryum in muliere post quatuor a partu horas mortua eandem uteri superficiem nulla obductam membrana observasse. Deinde vero cum Graafius eandem inquit Uteri substantiam *tot foraminulis perviam conspici, ut spongiosam quasi naturam induat*; Sinus quidem Uteri vidisse se, ostendit; sed idem tamen cum illa interjecit: *quæ foraminula nihil aliud sunt quam vasa per medium dissecta*; peculiarem eorum Sinuum naturam non videtur agnovisse. De qua cum iis quæ olim Stephanus, & deinde Riolanus scripserunt, conferenda sunt quæ ab Diligentissimis Anatomicis Malpighio, & Littrio sunt observata. Ad id vero quod Graafius scribit: „ sedecim circiter dierum spatio post partum Uterum - ad pristinam fere magnitudinem „ redire; „ adnotandum erat, Riolanum tamen post quatuor & viginti horas id ipsam reperisse, Deventrium autem octavo vel nono post partum die uterum „ tam exiguum & naturaliter adeo

„ constitutum invenisse quasi puerperæ non fuisset. „ Denique ubi Graafius „ patentes Lochiorum vias aliquando in puerperis defunctis „ conspexisse se, dicit, dum per Siphonem liquorem in Arterias Hypogstricas aut Spermaticas „ infunderet, qui non minus quam flatus in Uteri capacitatem erumpebat; „ id quidem minime mirum est. Nos enim in ea de qua supra dictum est, Puerpera cum externa Uteri vasa digitum crassa invenerimus, communicantes autem cum his memoratos Sinus minimum alicubi digitum admittentes viderimus, tum foramina cum his communicantia in uteri superficie qua adhuc placenta pars adhærebat (nam qua jam in partu abstracta fuerat, valde erant imminuta) ea magnitudine deprehendimus, ut in maxima eorum apex minimi digiti nullo negotio immitti posset. Itaque, ut dicebam, minime profecto mirum est quod scripsit Graafius, humorem, aut flatum per vasa immissum intra puerperarum uterum pervenisse. Illud vero quod persæpe observavit Solertissimus Fantonus „ utile, velut ipse inquit, non „ minus quam curiosum est advertere; „ & sane ex ipso afferre non omisit Cl. Heisterus: per venas uteri aerem in ejus caveam, & vaginæ, atque aliquando etiam contra, & in iis quidem quæ non sunt puerperæ, impelli posse. Hæc; ut cætera nunc præteream; *ad Uteri corpus, ejusdemque structuram pertinentia*, si ex iis sunt quæ, ut in subjecta Notula polliceris, *clarius insequentibus manifestas*; ipsa ego frustra commemoravi; sin vero in hoc, & proximo Capite, Tabulisve iisdem subnexis, nihil horum, ut nosti, attingis; frustra inter initia istius Tractationis promissum est, tum „ per varia intexenda, a Celeberrimis „ aliis Viris, post Graafium detecta, & explicata, tum per figuras - unde quaque - conquistas, - materiam hanc magno Lectoris commodo *plene illustratum iri.* „

ANIMADVERSI O XXVII.

IN proxima quam subjicis, Adnotatione, ex tuorum, opinor, Amanuensium incredibili negligentia res mirum in modum lepida orta est, ut ista videlicet de qua loqueris, Virgo Genevæ ægotans ex eo tempore quo primum ejus morbi historiam totidem verbis in Bibliotheca Anatomica proposueras, ætate adhuc eadem esse videatur. Sed ut tuis missis Observationibus, ad nostras quas in consequente Adnotatione super fontibus Menstruorum profers, a nobis quidem non in vagina, sed in uteri fundo conspectis, transeamus; postquam ipsæ editæ sunt, tum Cl. Santorinus eadem prorsus in scæmina vidit quæ eo sanguine fluente, mortem obierat, tum nos ipsi in pluribus quibus non ita pridem, ut videbatur, effluerat, eadem pariter & Amicis, & Auditoribus nostris monstravimus. Illud vero nunquam vidisse, meminimus quod ex Highmore semel, atque iterum proponit Graafius, tunc membranam uteri internam *a prominentibus venarum orificiis asperam esse*. Nec sane id videtur necessarium, cum satis sit, ea foramina per quæ Uteri Sinus cum hujus cavea communicare, supra diximus, eo tempore a vi erumpentis sanguinis tantummodo diduci. Qua per ipsam fluxum imminuta, illa, se se contrahentibus circumjectis fibris, tantum patere existimo, quantum satis sit perpauco sero transmittendo quo uteri cavea humecta servetur. Quod si laxatæ fibræ aut non tam cito, aut nunquam ita se restituant, ut opus esset; sanguinis fluxui feri fluxum succedere, censeo aut per dies aliquot, aut diuturnum, quem *Fluorem Album* vocamus: & hac quidem ratione super hujus frequentiore scaturigine in Graafii sententiam eo. In iis autem quæ de Latis Uteri Ligamentis subjicit, optandum sane erat, ut eam partem quam *Alis Vespertilionum simillimam* infra dicit, quæ scilicet tubam inter & testem intercedit, ab reliqua inter pelvis latera, atque

Anatom.
Diff. 9.
Compend.
Anatom.
n. 192.

56

57

De Men-
struorum
Scaturigi-
ne.

54. 56.

Et Fluoris
Albi.

58.

59

69.

De Latis
Uteri Li-
gamentis.

54

Operat.
Chir. n. 1.
c. Obstet-
ric. c. 8.

Ibid. c. 9.

De Uteri
substan-
tia, &
Sinibus.

Dissert. ad
Spon.

Histoire
de l'Acad.
R. des Sc.
A. 1706.

De Diff.
fest. Part.
c. h. l. 3. c. 4.
Anthrop.
l. 6. c. 2.
Loc. cit.
Mém. cit.
de l'Acad.
R. des Sc.
A. 1701.
Loc. cit.
Ibid. c. 9.

que uterum vaginamque interjecta distingueret. Hæc enim utpote firmiter pelvis lateribus commissa, Ligamenti Uteri Lati & officium, & nomen servare potest; illam autem, quippe exteriori extremo solutam, non Uteri quidem, sed Tubæ Ligamentum vocare malim, aut ex illa usitata assimilatione, Alæ Vespertilionum vocabulo appellare. Ita sane Kerckringii censura declinabitur: quod & Verheyenius vidit; qui tamen in eo lapsus est quod a superiore ista membranæ parte *tubam, & testiculum sustentari*, dixerit, quando constat, hunc vero Uteri Ligamento Lato adnexum, ab ipso potius, cæterisque & membranis, & vasis, & ligamento etiam peculiari quæ infra a Graafio commemorantur, quam ab libera solutaque illa membrana quæ tubam cum ipso teste connectit, sustentari. De vero autem Prolapsu Uteri cum cætera quæ istic interjicit Graafius, & tu ex Cel. Ruyschio confirmas, probamus; tum quod ex improprie dicto Prolapsu Uteri, vaginæ videlicet inversione verum Uteri Prolapsum infert; nos certe in nonnullis quibus inversa vagina extrorsum admodum propendebat, etsi interior uteri cervix longior ex distractione facta erat, ipsum tamen uteri fundum æquo inferiorem sedem obtinere, deprehendimus. Sed ut his, aliisque omissis, ad Ligamenta Uteri redeamus; quanquam ea quæ Rotunda vocitant, sanguiferis magna ex parte vasis compinguntur, quæ in ea de qua in superiore Animadversione dictum est, Puerpera vidi ita sanguine distenta, ut Ligamentorum latitudo medii manus digiti latitudinem æquaret; quanquam præterea (quod Eustachius pariter delineavit, & ego alias perspexi) eorundem vasorum saltem nonnulla ad Cruralia pertinent, tamen id quoque recte fecit Graafius quod Riolanum, per ea Ligamenta Venereorum Bubonum generationem explicantem refutaverit; nam & circuitus sanguinis leges obstant, & quem ad modum eam rem in viris explicari a Cowpero, diximus, ad eundem, aut certe ad non multo ab similem in mulieribus quoque esse videtur explicanda. Illud contra ob ea quæ ex Cl. Deventrio supra attigimus, probare facile non possumus, quod eadem Ligamenta in gravidis magnam uteri molem, ab utraque parte detineant, quo, minus in hanc aut illam ventris partem inclinet, eamque ob causam illa superioribus partibus fuisse colliganda. Neque enim tunc secundum illius observationes ea Ligamenta sunt amplius superioribus uteri partibus annexa; ut frustra laboret Verheyenius, docendo, *extendi illa pedetentim, accedente aliqua substantia quasi nutritiva*; sed uteri moles, ut inquit Deventrius, octuplo, vel duodecuplo grandior, - ac præterea ob figuram plerumque pyriformem, vel ovatam amplior, latiorque multo evadit supra, ligamenta quam infra; Itaque ob has causas Deventrius idem non dubitat, quin distentus gravidarum uterus, proprio suo pondere facillime huc vel illuc feratur, & inclinetur; imo ea re posita, plurima in egregio suo libro deducit ad difficiles partus ex pravo uteri situ dignoscendos, & faciliores reddendos prorsus necessaria; ut propterea gravius feram, quod Experientissimi hujus Viri non modo observationes, sed & Figura uteri in gravidis extensi quam ad vivum delineandam se curasse, testatur, in tuo isto Theatro amplissimo, & *Selectioribus Recentiorum omnium Observationibus* instructo desideretur.

ANIMADVERSIO XXVIII.

Verum illud fortasse inquires, Mangete Ornatissime: his, atque aliis quæ supra ex Deventrio allatæ sunt, observationibus eas quæ a te sunt habitæ, consimiles non fuisse. Optandum tamen erat, ut illas Deventrii observationes etsi non semper respondentes (neque enim adhuc contendere id possim) at certe ab integerrimo, & exercitato Viro habitas, Lectoribus indicares. Multo autem magis optandum erat ut in celeberrima illa Quæstione in cuius nominatim exa-

mine te præsertim non mediocrem diligentiam adhibuisse, diserte in Præfatione testaris, de prima videlicet Conceptionis sede, verisque ejusdem principii quædam non modo ad rei anatomicæ, sed ad ejusdem Quæstionis illustrationem pertinentia, eaque jam olim a Summis Viris Malpighio, & Graafio proposita, nullo modo prætermitteres. Quæ ut qualia sint, & quam ad eam Quæstionem penitus evolvendam necessaria, quam paucissimis verbis ostendamus; ejusmodi nempe sunt, ut ipsis expositis, plura Adversantium argumenta fieri ex difficillimis facilia queant; non expositis, ne illud quidem quid in Viviparis Ovum sit, fortasse intelligatur. Malpighius namque ex suis Luteorum Corporum, & hisce inclusorum ovulorum (in vaccis milii grano haud majorum) observationibus non solum dubitari posse, docuit, majores istas Ovariorum Vesiculas quas tu, & plerique passim in quibus Verheyenius quoque est, sine ulla dubitatione Ova & creditis, & appellatis, non esse vere ova; sed etiam non improbabilius colligendum esse, statuit, easdem non esse rigoroze ova, sed materiam, ex qua glandula (hoc est glandulosum luteumque corpus) excitatur, cujus ope ovulum separatur, foretur, & stato tempore ejicitur. Nec vero aliud (siquis diligenter attendat) Graafii ipsius observationes videntur indicare. Etsi enim Vesiculas istas Ova appellat; cum tamen non modo infra doceat, *brevi post coitum - inter ovi tunicas glandulosam quandam materiam totum ovum involventem, globulique figuram representantem accrescere*; verum etiam in postremo Tractatus sui Capite affirmet, ova decuplo quam ante coitum minora ex illo globulo, hoc est ex Luteo Corpore in tubas expelli; quid tandem veri similius existimabimus, num Vesiculas esse ova, an non esse? Nam si esse ponimus; illud concedamus necesse est, Ova a coitu fecunda facta, principio non, ut ratio, & consequens assiduum in utero incrementum suadent, magis expandi, sed contra ac fieri deberet, imminui. Quanto ergo proclivius est conjicere, Vesiculas esse glandulas eumquem continent, humorem secernentes, ut in ipso ovulum & tutius asservetur, & facilius cum tempus est, incipiat expandi: esse, inquam, glandulas quarum partes eodem tempore, eandemque ob causam amplificentur non tantum ut distracta, & ad extremum pertusa ovarii membrana, ovulo exitus paretur, verum etiam vel ut novum tunc nutrimentum eidem ovulo suppeditetur, vel plus humoris exprimatur quo ipsius ovuli exitus, & per tubam delapsus facilius fiat. Verum si hæc sint rejicienda, siue probanda (alterutrum namque in propositæ Quæstionis non indiligenti evolutione est necessarium) neutrum fieri profecto potest, nisi memoratæ & Malpighii, & Graafii observationes expendantur. Quare igitur a te Malpighius, quasi nihil de his rebus scripsisset, in tota ista tractatione vix semel, ubi de canalibus loqueris quos ipse in vaccinis uteris detexit, memoratur; Graafii vero non modo Caput illud postremum, ac Tabulæ ad ipsum spectantes, sed Tabula etiam huc pertinens XIV. Lutea Corpora, atque horum structuram in vaccis, ac ovibus proponens omittitur?

ANIMADVERSIO XXIX.

Quæ cum ita sint, minus certe mirandum est, quod nonnulla alia non paris quidem momenti, sed tamen ad propositæ Quæstionis illustrationem spectantia, in quæ forte incideras, non attenderis, velut in ista Adnotatione in qua cum Viperæ ovaria scribas te semper vidisse e pluribus ovis conflata, illud interea quod in illis Steno jam viderat, non adnotaveris, scilicet, quodlibet ex ovarii videri esse membram, nam peculiarem, in formam cylindri, seu portionis ab intestino resectæ, utraque parte ad sensum clausæ. Ego vero cum Doctissimis Amicis Venetis, immisso in eum cylindrum aere, non modo

De Vivipararum Ovis, Vesiculis, Luteisque Corporibus.

Dissert. Epist. ad Spon.

63.
71.

De iisdem Ovis.

63

Aët. Dan. Vol. 2. Obs. 89.

modo ad extrema, sed nulla ex parte invenire ipsum pervium potui; idque magis miratus sum in serpente quam hujus rei causa asservabamus, viperæ simili, cum septem vel octo ova nuperime peperisset. Quibus vel solis observationibus satis ii convincuntur qui idcirco ova mulieribus negant quod ovariorum tunicam imperviam habeant; nam & viperis, iisque serpentibus impervia est, & tamen cum opus est, ovis, & quidem non mediocris magnitudinis, certissime patet.

Cæterum quod idem Steno de iisdem Viperarum ovariis semel observasse se, scripsit, an vero perpetuum sit, incertum reliquit, id nos in iis quas dissectuimus, omnibus perspectum habemus, videlicet alterum altero altius esse; quod & marium testiculis, & amborum renibus contingit. Mitto alia cum de earundem Partium inæquali longitudine, tum præsertim de Viperarum oviductibus, in quibus non eadem quæ Steno, observasse videor. Nam si de brutorum anatome hic verba facienda sunt; sane præstat ad ea quæ Graafius ipse de genitalibus Galli, & Gallinæ Partibus post Eximios Anatomicos Fabricium, atque Harveum subjecit, perpauca adnotare.

Quod igitur *binis Penibus gallum adornatum invenisse se*, dicit; etiam binas Vesiculas, seu mavis Capsulas Seminales, atque Epididymides poterat adjicere. Nos enim utrasque cum laudatis Amicis perspeximus, & has quidem non sine Globis, quanquam ille in Tab. XVII. a te pariter omissa, nihil harum rerum appinxit. Illarum autem alteram pinxit quidem ad litt. D; sed & ipsam quoque *Penem* vocavit, neque an cava intus sit, dixit: cuius nos caveam, alias in transversum secando, alias demissa per imum Vas Deferens seta, ac facile per ipsum Penis apicem rejecta, tum secundum setam instituta sectione, conspeximus. Foramen autem illud cæcum, sive potius *bursam*, qua semen a gallina excipi, & *conservari ad ova eo delabentia sæcundanda*, existimavit Fabricius, cuius opinioni quiddam non ab simile profecto, sed tamen, ut in Bombyce, verisimilius a Malpighio propositum est, *Bursam*, inquam, illam non eam ob causam creatam esse, jure quidem post Harveum Graafius censuit vel ob id unum quod eadem prorsus galli etiam tributa sit. Eam ego ad Cloacam potius quam ad Uterum, spectare, existimo propterea quia non solum figura a Graafio in eadem Tabula proposita, verum etiam tunicarum structuræ modo, & secreti humoris colore binis iis subrotundis Folliculis persimilem esse, animadverti qui ad extremum Canis intestinum hinc atque hinc locati, brevi collo in ipso podice desinente cinereum, & graveolentem mucum excernunt. Quos quidem folliculos quanquam ex aliis multo minoribus constare, credo, albicantium punctorum instar per internam illorum superficiem sæpe extantibus; tamen soleo ut simplicior, eandemque obviam, atque conspicuam Malpighianæ Glandularum Structuræ ideam proponere. Hi folliculi sunt illæ glandulæ quas Peyerus scribit se apud Cl. Josephum Verneyum, in hyena odorifera, seu cato, zibeti primum conspexisse, in aliis quoque animalibus reperiundas, præterquam homine. Nec tamen sunt propriæ brutorum omnium, sed *quorundam*, quod & ipse aliquot paginis interjectis agnoscit Peyerus, candide fassus, earum officium sibi esse ignotum, idque, sapientum attentionem oppido mereri. Grewius vero eosdem folliculos, ut in Mustela, Furone, Putorio, Fele, Cane, & Vulpe observavit, sic proprios saltem carnivororum quadrupedum esse, credit. Porro Cowperus in Marsupiali Americano eosdem invenit: neque alio fortasse pertinent illa ampla ad anum foramina quæ a Cl. Fantono in alpino mure observata sunt. Verum ut ad bruta in quorum non podice quidem, sed cloaca hiantes folliculos ipsi vidimus, revertamur; huc spectant fortasse duæ illæ magnæ vesicæ quas Diligentissimus etiam Caldesius in fluvia-

libus Testudinibus observavit; certissime autem spectant duæ illæ, ut Reditus loquitur, „ quasi „ vesiculæ seminales prope duas vulvas Viperarum „ pendentes, quibus pressis, tenuissima aqua exit „ sylvestre quiddam, & proprie serpentinum „ leste & graviter olens: quæ ex marium etiam „ penibus exprimitur. „ Nos autem sic olim Venetiis observavimus. In ima eademque anteriore viperinæ cloacæ parte extremum intestinum delinebat sic ut a vertebra contra atque in perfectioribus animantibus fieri solet, magis ipsum distaret quam uterorum oscula, quæ proxime superiorem locum tenebant; paulo autem superius ureteres hiabant: denique ad labra postremæ fere cloacæ hinc, atque hinc singula erant foramina istarum Vesicularum ex quibus turbidum, ac subflavum humorem illum graveolentem expressimus: qui in maribus, non penibus quidem, sed duabus papillis compressis quæ ad horum basim extrorsum positæ in cloaca occurrebant, exivit.

Quæ quoniam observantibus nobis, aderat cum cæteris Amicis Summus etiam atque Eruditissimus Vir Dominicus Gulielmus, hic postea Actorum Lipsiensium locum ostendit in quo inter Excerpta ex Viperæ Caudisonæ Anatomia ab Eduardo Tyfione descripta Celeberrimi illi Collectores hæc habent: „ Prope Cloacæ terminum „ duo alia insuper conspiciebantur foramina, „ - per quæ duo sacculi ducuntur, quos cistulas „ odoriferas Noster, Charras male parastatas vocat, cum in fœmella quoque viperina observatur. - Liquorem crassum & graveolentem „ continebant. „ Sed hæc hæcenus.

ANIMADVERSI O XXX.

Nunc de Falloppianis Tubis perpauca adnotemus. Et primum „ in vaccis, ovibus, „ aliisque animalibus earum extremitates, non ut „ in hominibus findi, sed perpetuam & tenuissimam membranofam expansionem adipisci, atque eodem fere modo, ut Oviductus in avibus „ terminari, „ non verbis tantum, sed & elegantiori Tabula XV. Graafius docuit, probe gnarus, quicunque illam cum XVIII. gallinæ oviductum repræsentante comparasset, vel ipso protinus oculorum judicio maximam quæ inter Partem utramque intercedit, ut figuræ ac habitudinis, ita & officii similitudinem facile deprehensurum. Tu vero illam ipsam Tabulam prætermisisti. Cur autem ex omnibus quæ ad hoc tempus secui, brutis, in Cane tantum, atque Echino extrema illa membranosa Tubæ expansio in sacculum conformata sit, striis intus (si recte memini) adipolis ornatum, laxæque ovarium complectentem; curque hic idem sacculus non undique sit occlusus, quod tutior ovorum in tubam descensio requirere videretur, sed hiato quodam pertundatur, disquisitione indignum non esset. Postremo etsi equæ gravidæ tubas „ plurimis valvulis toto earum ductu „ munitas „ Whartonus, ut Graafius refert, invenit; nos certe in non gravidæ equæ tubis videre ullam valvulam non potuimus. Quod autem ad duo illa attinet postrema Capita quibus Graafius ea quæ Ovo in Utero accidunt, & Cuniculorum Generationem complexus est; a te ipsa quidem „ consulto omissa esse, dicis, quanquam doquidem illa omnia ad Conceptionem, & fœtus accretionem ac partum spectant, de quibus „ te sequenti Capite abunde esse acturum, „ polliceris. Num vero id præstiteris, an potius plura ad eas res pertinentia, quæ ex eorum Capitum lectione addisci facile potuissent, vel prorsus omiseris, vel non satis perspicue, atque accurate proposueris, videbimus postea. Illud interea certum est, Cuniculorum inspectiones quas novissimo Capite Graafius describit, ex iis esse quæ acer ipsius Adversarius Swamerdamius, cum tot alia in hoc ejus Opere coargueret, diserte laudavit. Neque dubito quin tu ipse, si attentius id Caput legisses, eam quam superiori paginæ subjecisti

Observ.
intorno
alle Vi-
pere.

A. 1684.
M. Mart.

69

D. Tubis
Falloppia-
nis.

73

Miracul.
Naturæ.

72

65.
De Parti-
bus Galli,
& Galli-
næ geni-
talibus.

66

Diff. de
Bomb.

De binis
in multis
animali-
bus ad a-
num Fol-
liculis.

De Gland.
Intestin.
Exerc. 2.

The Con-
par. Anat.
of Som.
chap. 1.
Act. Erud.
A. 1705.
M. Mart.
Anatom.
Diff. 2.

Observ.
intorno
alle Tar-
raghe.
Tav. 4.
Fig. 4.

jecisti, Adnotationem aut omisurus fuisses, aut ita saltem scripturus, ut quas vesiculas *tum intra, tum extra testiculos* illius Matronæ vidisti, eæ vera ova essent, necne, tibi dubium esse, significares. Quod tantum abest ut feceris, ut & ibi generationi ex ovo *majorem confirmationem* sic addidisse te, censeas, & alibi ex tua ista una observatione, abunde constare, affirmes, non raro ova ex ovarii in abdominis cavum delabi, - itidemque evidentissime patere ex eadem observatione, ovum fecundatum ex ovario delabi in tubam uterinam. Cæterum non ea tantum de quibus fassus es, Capita, cum Tabulis sex ad ea pertinentibus, sed cum Præfatione, primoque Operis Graafii Capite totidem Tabulas ad ea ipsa quæ protulisti, Capita spectantes omisisti; ut præter aliorum quæ supra indicavimus, & Luteorum præsertim Corporum, etiam veræ & naturalis intimæ Ovarii Muliebris structuræ, etiam interioris faciei totius Falloppianæ Tubæ, denique Ovilli etiam Uteri, quorundam qui vel post Graafium scripsere, in Quæstione hac lapsus demonstrantis, nullam in tuis amplissimis Voluminibus delineationem habeamus.

ANIMADVERSIO XXXI.

AT saltem quas Graafii Tabulas exhibuisti, eas atque earum Explicationes accurate descriptas haberemus. Num vero habeamus, cognoscent ii qui tuæ Tabulæ LXXI. Figuras præsertim 5. 8. 9. & hujus Explicationem ad litt. dd. cum Graafii libro comparaverint. Jam enim mihi de me ipso magis, quam de Graafio laborandum est, non ob eam (ne forte erres) quam proximæ Figuræ atque Explicationi meæ apposui, Animadversionem, sed ob ea quæ in ipsis, Lectoribus ne suspicantibus quidem, aut addita, aut mutata esse, video. Nam ut de Figura postea dicam; certe ego ejus Explicationem ad litt. AA. GG. H. MMM. pp. QQ. non ita scripseram, ut tu, Vir Cl. edidisti, atque adeo causas habui cur ita non scriberem; exempli enim causa, qui modo generatim dixeram, ostendi a me *Muliebres Partes - discissas, atque explicatas*, satis profecto habui hæc continuo subjicere: AA. *Pudendi Labia deorsum extensa*; illud enim quod illic additum est, *atque diducta*, ibi procul dubio redundasset. Ad litteras autem GG. res multo est manifestior. Istic enim ita loquens inducor: „Hymen ostenditur, & ante hunc alia oscula, „Lacunarum scilicet Fossæ Muliebris, sic in hoc „cadavere inventum; quarum unus vel alter de „lineatione subindicatur; „Ego vero scripseram: *sicut in cadavere hoc inveni, quarum unum, vel alterum ductum delineatione subindicavi*. Quæ attingere hic volui, ut Lectores obiter admone-rem, in iis quoque Adnotationibus quas ex meis Primis Adversariis descriptas Graafio supra apposui, tuos, ut opinor, Amanuenses pari haud raro, & majori interdum libertate alia ex nostris verbis mutavisse, alia omisisse. Verum his in præsentia sepositis, quid subjectæ a te Animadversionis Auctor scribat, mecum, quæso, recognosce. „Glandulæ, inquit, sebaceæ in hac Pu- „dendi Muliebris figura, præter partes quasdam „novas ad os uteri exhibitas, principale Autho- „ris inventum implent. „Quid? si planum faciam, hujus Figuræ vix ullam esse particulam in qua peculiare aliquid non habeam, & hæc inter, quid sit præcipuum, quid non, haud facile esse existimare? Verum id postmodum. Nunc autem quid de Sebaceis Glandulis *generice effetur*, attendamus. „Quod multæ, inquit, ad superficies „humani Corporis, tum intimas tum extimas, „tum medias affideant minutiores glandulæ, tan- „quam miliaribus analogæ, unctuosum quodpiam „secernentes; in illis præcipue partibus expetan- „tur, quæ vel rudibus nimis externorum attacti- „bus custodiendæ, succis hinc mucosis secretis, „tanquam quodam linimento naturali incrustan-

„dæ sunt; non minus ac in mechanicis ferrum „oblinit vernice, ne ab aëre in æruginem „exedatur: vel variis inter se specialibus motio- „nibus destinatæ, ad harum facilitatem sæpius „per diem inungendæ sunt non secus ac rotæ „plaustridiutius exerciti; adeo ut quoad primam „partium classem veniant hæ glandulæ ad mea- „tum auditorium, ad cavitates narium; quoad „alteram ad labra, ad oculorum palpebras, per- „spicue concurrant; hoc omne pro certissimo „comperio; nec eo inficias per consequens, quod „& easdem pro certis descripserint Bidlous, Mal- „phyghius, & Valsalva ab Authore nostro citati; „& mucosas, sebaceas, aut alio simili nomine „ab usu, secretique liquoris qualitate nuncupa- „verint. „Ego vero ex istis omnibus quæ *pro certissimis comperisse* se, dicit, scire velim quomo- do compererit, *meatum* imprimis *auditorium*, & *narium cavitates* inter eas esse Partes quæ sebaceo linimento idcirco indiguerint, quod *rudibus nimis externorum attactibus* sint expositæ? Scire etiam velim, quomodo ad istas ipsas Partes, item- que *ad labra, & oculorum palpebras* a Bidloo, Malpighio, & Valsalva ejusmodi glandulas fuisse *& descriptas, & mucosas, sebaceas, aut alio simili nomine nuncupatas*, compererit? Mihi certe qui tamen eos Auctores citavi, nihil aliud ad hoc tempus notum erat, nisi Bidloum *cutem circa extimum (ani) limbum glandosis scatentem tuberculis* dixisse: Malpighium illius generis glandulas in facie quidem descripsisse; in labris humanis tantummodo memorasse, in palpebris longe alias indicavisse: Cl. tandem Valsalvam & primum omnium iis glandulis nomen posuisse, & quæ sunt in cute auriculæ eas quidem descripsisse; quæ vero in spina, aliisque nasi, ac sub palpebris, dumtaxat memoravisse. Quamobrem gratum mihi, Eruditissime Mangete, faceres, si loca significares in quibus tres illi Auctores eas, eas, inquam, quas iste dicit, glandulas *descripserint*, duo autem priores *mucosas, sebaceas, aut alio simili nomine nuncupaverint*. „Sed (pergit dicere) „quod id omne, quod ad easdem præcipue ex- „ternas superficies granulosum est, in hisce præ- „sertim partibus, ubi nec usus prædicti, nec „ideo dictæ succorum ungentium necessitates affi- „dent, sit inde & glandulosum, & glandulosum „sebaceum, id est quod in animi assensum non „satis penetrat. „Scire hic quoque velim, Man- gete Ornatissime, quisnam tandem hæc docuerit; vides enim, ut paulo etiam infra contendat, „granulosa quædam copiose corpora per eas - su- „pericies dispersa, non per hoc statim statuen- „da esse glandulosa; „vides, inquam, quot ver- bis, verbis autem? imo vero etiam *exercitu tuberculorum hujusmodi*, quo ventrem Domine illius *ad alias ulnas migrata - naturaliter oblitum*, - nec tamen *perpetuo unctuosissimum* adnotavit, ne- scio quem impugnet, ejusmodi granula *perperam in censum sebaceorum advocantem*. Ne enim me impeti, credam, illud facit quod non potest ipse ea verba non vidisse quibus ego in Sebaceis illis Glandulis statuendis me attendisse, professus sum, non istiusmodi *emergentes in diem excrecentias*, non *granula*, non *solida tuberculosa* quæcunque, ut quæ in *vetulis per colli, ventris, aliarumque partium rugas surgere videmus in dies*; sed certa *quædam observata tubercula*, hoc est primum iis Cl. Valsalvæ quæ ipse Sebaceas Glandulas esse, agnoscit, omnino similia: deinde *pilos saltem per- exiguos* proferentia; nam & illis glandulis quas pro Sebaceis ipse habet, pili innascuntur, sive ex sint Malpighii, ut hic descripsit, sive Valsalvæ; ut ego observavi: novissime *sebaceam materiam*, cum *exprimimus*, emittentia: illud nunc addo, vel sine expressione prostantem suis ex osculis ma- teriam sebaceam haud raro ostendentia. Quæ cum in iis omnibus quas in I. Adversariis enumeravi, cutis partibus persæpe observaverim; in iis omnibus Glandulas Sebaceas non minus quam in cute auriculæ esse, confirmo.

Anatom.
hum. cor-
por. in
Expl. F. 5.
T. 47.
Op. Posth.
365

76

Advers. I.
num. 12.

De Glandulis Sebaceis.

ANIMADVERSI O XXXII.

De earun-
dem Glandu-
larum
Ufibus fi-
gillatim.

Anatom.
Diff. 2.

N Ec sane istud me dimovet argumentum : *Quis enim*, inquit, *glandularum hujusmodi ad hasce partes usus esset?* quali vero eas corporis particulas agnoscere non deberemus quarum usum ignoramus. Quanto aliter Cel. Scriptor, & Peritissimus Professor Joannes Fantonus! Hic etsi fatetur: *qua parte cutis lesio ex affricu timenda est, patere usum sebacei linimenti; ceterum quid multis in partibus de eo sentiendum sit, satis non constare*; observationes tamen nostras sine ulla dubitatione amplectitur: *Alterum*, inquit, *glandularum genus in cute observarunt præclari Anatomici Morgagnius, & Valsalva*. Deinde addit: *has secernere lentam materiam similem sebo, quæ cum exaruerit in furfuraceam abit; hinc recte videri glandulas sebaceas appellatas*. Postremo easdem ait in memoratis a nobis partibus, quas & ipse enumerat, *reperiri atque ubertim occurrere*. Cæterum, ut verum fatear, si quis alius, certe Animadversionis Auctor plerumque nostrarum Glandularum usum haud difficile debebat agnoscere. Qui enim sebacei linimenti necessitatem vel ob *externorum attactus* etiam ad *ipsas cavitates narium, & ad meatum auditorium*, vel ob *varias partium inter se semotiones* ad *labra, & ad oculorum palpebras certissime* comperit, eum mirum est, an ulli attactus, ullæ motiones *intra ipsas statim nares* in emungendo, aut scalpendo, *ad genua, ad clunas* in genu flectendo, aut sedendo, denique (nam ipsius de his quoque partibus interrogatio hæc etiam memorare me cogit) *ad pubem, ad penem, ad pudenda muliebria* in concumbendo hominibus accidunt, non advertisse. Huc quoque pertinent illæ de quibus postea dicemus, Nympharum Glandulæ, quamquam harum utilitas adversus non modo affricum, sed acrimoniam quoque urinæ haud mediocris existit. Neque dubitandum est, quin cum acres non raro humores emungantur, ac deiciantur, adversus eosdem quæ *intra ipsas statim nares*, quæque non modo in ipsa ani ora, sed & *ad perineum* occurrunt, Glandulæ præsidio sint. Sed ne quas singulæ afferunt utilitates enumerando, longiores simus; quas omni cuti universæ afferunt: præstabit indicare: ex quibus non difficile erit intelligere, ad cutaneorum affectuum generationem, curationemque illustrandam, harum quoque Glandularum notitiam haud mediocriter pertinere. Et primum quod Malpighius de iis quæ in facie sunt, docuit, „adjacentem videlicet cutem illiniendo ab aeris, erodentium salium injuriis, & activitate tutari; „id ego cum Tachenii, aliorumque per- vulgatas observationes considero quæ omnes scilicet ostendunt, quibus salibus urina, iisdem etiam sudorem scatere; id, inquam, ipsum adversus sudoris sales ab universis Sebaceis Glandulis universæ cuti præstari, credo. Huc accedit multiplex in præcavenda totius cutis siccitate utilitas. Nam sic non aspera, sed lævis, non callosa, sed sensilis, non rigida, sed obsequens subjectarum partium motionibus, ad articulos præsertim, conservatur, easque omnes (ut paucis multa complectar) habet utilitates, quas Veteres frequentibus illis suis inunctionibus augere sibi consuevisse, inter cæteros etiam indicat Hieronymus Mercurialis Municipis meus. Eodemque pertinet inprimis Luciani locus in eo Dialogo qui inscribitur Anacharsis; ibi enim Solonem in hunc modum loquentem inducit: „Corpora deinde oleo perungimus, & „emollimus, ut habiliora reddantur. Absurdum „enim esset, si cum putemus, emollita oleo cor- „ria ruptioni minus esse obnoxia, & diutius „duratura, quæ jam sunt emortua; corpus quod „etiamnum vitæ est particeps, non melius olei „unctione reddi existimaremus. „Denique ut nihil horum a Sebaceis Glandulis præstaretur; ille tamen usum contemnendus non esset, quod id cutanei recrementi genus quod Avicennas præter Morgagni Adversaria Anat. IV.

Et genera-
tim.

Op. Posth.

Hippocr.
Chim. c.
12.

De Art.
Gymn. I.
1. cap. 8.

I. Canon.
Fen. I. D.
4. cap. 2.

insensibilis transpirationis materiam, & sudorem, diserte connumeravit, & *Sorditiem Extrinsecam* dixit, innumeris suis excretoriis osculis per universam corporis superficiem dispositis extruderent. Nam quæ unctuosæ primum, deinde post exsiccationem *furfuracea* materies a Cl. Valsalva observata est ex suis Auriculæ Sebaceis Glandulis prodire, & in hujus foveis congeri, eadem non modo in *capillata Capitis parte*, sed quacunque restitare, & congeri potest, ut in umbilico, interque digitos pedum, ad horum ungues, ad femina, atque adeo siquis, ut ultimæ fortis homines, neque indusia, neque tibialia mutet, nec corpus lavet, & in tota cutis superficie, & in iis indumentis inhærescit: quæ quidem res (ut pinguium, atque oleaginosorum sudorum a Medicis, & præsertim a Møllenbroccio, & Schultzio adnotatorum, & steatomatum originem sic multo facilius explicandam præteream) non modo in iis in quibus nos observavimus, sed & in omnibus cutis partibus Glandulas Sebaceas esse, indicat.

389

Apud Bo-
ner. Me-
dic. Sept.
T. 2.
401

ANIMADVERSI O XXXIII.

A T si essent (recognosce alterum Nostri argumentum, non eo sane melius, quod hactenus refutavimus), „si cunctæ, inquit, per hasce partes descriptæ glandulæ suctos tam facile, „le percolarent sebaceos, ut facile, & tanquam „fila ab eisdem exprimit auctor, cito nimis in- „uncta fordescerent indusia appositæ ad corpus, „tantis sebi scatebris oblitum, nimisque in lo- „tricibus impenderetur. „Quæsi vi supra, ut quædam aliorum loca mihi indicares; nunc locum quæro in quo ipse dixerim (quod tamen ut in plurimis subjectis dicere potuissim) me sebaceam materiam facile, „et tanquam fila a cunctis per hasce partes descriptis glandulis expressisse. Hoc enim dumtaxat a me dictum est: *sebaceam fere ex omnibus expressi materiam*. Sed fac, me dixisse; num consequitur, quam facile ego vi adhibita expressionis extruli, tam facile glandulas per se ipsas tantundem ejusmodi præsertim crassæ lentæque materiæ & in omnibus, & continenter extrudere? Nempe quod satis est sensim lenteque propellunt; & hinc est quod haud raro ejus pars materiæ in ipsarum ferme adhuc orificiis siccari incipiat, & sic prostrans ex iisdem inveniatur. Quod siqui sunt; ut certe non pauci sunt; quibus ea difficilius siccetur, atque ideo in furfures, & squamulas serius abeat, aut quibus majori copia proveniat; his procul dubio cito nimis inuncta fordescent indusia, - nimisque in lotricibus impenditur. Ejusmodi fere homines significavit Ortlobius, cum „in illis, inquit, subjectis, quorum motus ad attenuandum satis validi inve- „niuntur, & quæ calida aliis dicuntur, parca „pinguedo est, quod illæ partes per transpirationem potius secedant, quæ quoque hujusmodi „hominibus copiosissima, & interdum unctuosæ „satis est. „Eisdem quoque indicavit Præcl. Valsalva, cum Sebaceas Glandulas „in aliis (præ- „ter auriculas) locis esse, conjecit ex unctuositate quadam, quæ in indusiis, præsertim in aliis, quibus Subjectis, circa Collum, & Scapulas foret manifestari. „Et de viscosis istis sordibus, quibus, ut inquit Verheyenius, *paucorum dierum spatio indusia linea infici solent*, & de quibus, quando Animadversionis Auctor, ad lotrices provocavit, necessario nobis dicendum fuit, satis superque dictum est. Ut vero ex his quæ hactenus de Sebaceis Glandulis generatim exposuimus, manifestum est, nihil magis quam observationes *ansam* nobis dedisse, ut illas per universam fere cutem describeremus, ita ex iis quæ in I. Adversariis post earum descriptionem subdidimus, manifestum erit, non modo dubitationem, quam iste affert, verum etiam ejus dissolutionem, quam ipse omittit, a nobis fuisse propositam. Et sane si quibus tuberculis pili ignascuntur, ea propterea

De iisdem
Glandulis.

Hist. Part.
Diff. 13.

385

I. 2. tr. 1.
cap. 32.

num. 12.
76

rea non essent Glandulæ Sebaceæ; non tantum pleræque ex nostris, verum etiam quas ab aliis indicatas ipse pro Sebaceis Glandulis agnoscit, Sebaceæ Glandulæ non essent. Neque enim minus quam nostrarum plurimæ, illæ quoque Glandulæ pilos proferunt quas Bidlous ad anum, in facie Malpighius, in auricula Valsalva proposuere.

ANIMADVERSIO XXXIV.

De Sebaceis Nympharum Glandulis.

Nunc quid speciatim dicat de Sebaceis Nympharum Glandulis, videamus. „ Dicit igitur, se pauca quædam, sparsaque irregulariter granula per plures alas muliebres frequenter animadvertisse. „ Se igitur in pluribus, & frequenter vidisse, confitetur. Hoc primum accipiamus quod si negare potuisset, nunquam profecto erat daturus; nam vide, quæso, id ipsum quod dat, quam multis modis extenuare conetur. Dicit pauca, & sparsa, quæ nos ex plurimis, etiam post edita Adversaria habitis, observationibus tot, & tam conferta solere esse, confirmamus, ut in eo uno Figura nostra reprehendi facile posset quod pauciores, & rariores exhibeat, nisi id consulto, & confusionis declinandæ causa factum esset. Quod autem posita irregulariter dicit, nempe Figura quoque nostra id ipsum ostendit; nihil enim aliud in hoc certi habent, nisi ut in iis Nympharum locis quæ in Adversariis excepimus, esse non soleant. At vero „ nunquam, inquit, ea magnitudine, nec ad „ quadrantem prædita animadverti, quam eis in „ hac figura sub litt. e e, largitur Author solertissimus; non ideo de eisdem asserendum quod „ ad figuræ explicationem per eundem habemus; „ scilicet hæc delineatas glandulas naturalibus „ esse vix aliquanto evidentiores. „ Videtur certe Vir Cl. meam hanc Figuram non in meis, sed in tuis, aut in Verheyenii Tabulis inspexisse. Vestri enim Scalptores, quasi istis Animadversionibus de industria subservirent, tantam istis omnibus glandulis magnitudinem, tamque evidens omnibus orificium largiti sunt, ut delineationem istam vestram pro mea non agnoscam. Neque tamen hæc ita velim accipias, quasi concederem, Nympharum Glandulas ne ad quadrantem quidem accedere istius magnitudinis quam vos dedistis, aut iis standum esse, confiterer, quæ Animadversionis Auctor subijcit: „ nec Nobis ulterius „ datum unquam fuit foraminula excretoria in „ earum medio perspicere; nec ex eisdem succum „ quemcunque exprimere; multo minus filum ex „ suppositis hisce foraminulis prodeuntem intueri, „ ut placet clar. Authori. „ Hæc enim ut ego ipsi facile credo; sic vicissim mihi ipsum credere, æquum est, me toties, etiam post Prima edita Adversaria, ista omnia non modo vidisse, sed & iis qui aderant, Amicis, atque Auditoribus ostendisse, ut ad faciendam fidem minime necessarium judicem docere iterum, qua ratione sint inspicienda. Si quis tamen forte id requirat; is sole, vel præclara luce admissa, - leniter tractas, extensasque alas - varie (si est opus) ad lumen inclinet. Sic enim; modo pluribus, iisque idoneis cadaveribus utatur; sæpe, ut ego scripsi, in singularum glandularum medio foraminulum conspiciet, ex eoque proflans concolor glandulis subalbum & pertenuè filum; præsertim si expressione adjuvet: quod dum ego facerem, tantum aliquando materiæ sebaceæ ex singulis foraminulis expressi, ut vel id unum propositam a me glandularum magnitudinem satis comprobaret. Ad hanc tamen cognoscendam, satis erit animadvertere cinereum quendam livorem instar exigui ferme circuli locum unde filum prostat, hoc est foraminulum, ambientem, & per cutem alarum translucentem. Hæc enim Glandulæ sic translucendo prominentium per Nympharum superficiem granulorum speciem referre potius solent quam reipsa prominere; nisi forte inclusa materia turgent. Quæ aut sedis, aut turgentia varietas causa quo-

que est, ut quas ad cervicem, scapulas, clunes, atque alias ejusmodi regiones descripsimus, non ita sæpe tuberculorum forma promineant, ut quæ ad perinæum; & muliebris pudendi labia in habitioribus præsertim subjectis solent occurrere. Caterum nostras Sebaceas Nympharum Glandulas in Bononiensi primum Theatro Præstantissimus Stancarius ostendit, tum in Veneto Ornatissimus Santorinus, & hic præsertim valde conspicuas, & sebaceam materiam evidentissime emittentes. In sua autem Scripta Anatomica; ut Verheyenium omittam; primus retulit Diligentissimus Fantonus ita ut creberrimas esse - foraminulum in centro ostentare, & humoris sebacei scaturigines esse, docuerit. Deinde Eruditissimus Goelickius inter ea quæ ego nova detexi, merito adnumerare se, dixit, quæ de glandulis sebaceis diversis, speciatim nympharum, adnotavi. Novissime Solertissimus Heisterus notandas - in Nymphis esse, admonuit, glandulas parvas substantiam sebaceam secernentes. Quæ commemorare hic volumus, ut tot ejusmodi Professorum auctoritate majus Invento nostro, & descriptioni apud omnes pondus adderetur.

Anatom. Diff. 9.

Hist. Anatom. n. 147.

Compend. Anatom. n. 192.

ANIMADVERSIO XXXV.

Jam vero cum in iis quæ de Lacunis Fossæ Muliebris ego in plurimis cadaveribus & priusquam ederem, vidi, & postquam edidi, ostendi, ne Cl. quidem Animadversionis Auctor quidquam invenerit quod aperte reprehendat; quid tandem super Doctissimi Bartholini Prostatis adversus me scribat, videamus. „ Sed quod hæc „ Caspari Bartholini glandulæ, vel in subjectis illis „ ubi manifeste apparent, aut ea molis vastitate, „ aut amplis illis vesicularum, seu cellularum „ spatiis interne donentur, qualia ab Authore „ clar. delineantur, & describuntur, id est, inquit, quod repudiarem. „ Sed tu vide, quæso, Vir Præstantissime, descriptionem meam quam inter Adnotationes Graafio additas posuisti. Nonne ipse diserte dico, ea aliquoties me vidisse? Nonne ipse nego, me eas vesiculas in omni cadavere comperire potuisse? Nonne ita describo, ut omnes intelligant, non rem perpetuam, sed rem aliquoties tantum a me observatam describi? Non enim sunt, dico; sed erant &c. Si ergo repudiat quasi ut perpetua proposuerim, longe fallitur. Si autem repudiat quasi ne semel quidem hæc ipse viderit, magis fallitur. Nihil enim inde aliud consequitur, nisi aut id quod facile in re anatomica est, in aptiora ad eam perquisitionem cadavera me incidisse, aut id quod multo facilius est, me vel plura cadavera, vel paulo saltem accuratius dissecuisse. Cujus rei vel illud indicio est quod ipse pictam a me glandulæ magnitudinem eam molis vastitatem appellat. Quid? si cerasi, ut semel utrinque vidi, magnitudine pinxisset? At quantulo, inquiet, minorem pinxisset? Non enim videtur id quod in Explicatione etiam indicatum est, attendisse, pictam videlicet esse cum inclusis vesiculis adaperitis, atque ideo & has, & ipsam glandulam sic necessario diductas atque expansas, multo apparere majores; quam ea inter optimos quosque Anatomicos non sine ratione, & discentium utilitate consuetudo recepta est, ut minores præsertim particulæ ex iis subjectis in quibus paulo majores occurrunt, delineentur: cujus rei exempla cum passim vel in tuo Theatro obvia sint, non est sane cur anxie recenseam, præsertim quando ad lepidiora quædam vocor. Vide enim quæ consequantur.

De Prostatis Bartholini. 76.

60

ANIMADVERSIO XXXVI.

„ Sed quid, inquit, de alterata nimium in hujus „ figuræ clitoride extantia, & rotunditate „ glandis, de duplicato perperam illo, nec non „ enormiter ampliato ejusdem glandis præputio? Diceret forsan Auctor hoc esse dumtaxat „ ad oblectamentum inspicientis; si ita esset, de-

„ tur

Tab. 16. Fig. 3.

Advers. I. n. 10. 11.

„ tūr lepiditati licentia , nec aliud super hac re
 „ adjiciamus . „ Ego vero dico , lepidiorem aut
 „ responſionem , aut cenſuram excogitari non po-
 „ tuiſſe . Hoc unum deſuit , ut præputium illud
 „ non tantum ut duplicatum , ſed etiam ut quadru-
 „ plicatum reprehenderetur ; ut enim fortuito in
 „ quatuor rugas , dum ad detegendam exerendam-
 „ que Clitoridis glandem retraheretur , complica-
 „ tum eſt , ita Piſtor deſcripſit ; non autem *perpe-
 „ ram multiplicavit* , niſi forte quod Graatii Piſtor
 „ in ſuperioris Tabulæ Figura 1. ob eandem cauſam
 „ egregie fecit , meus *perperam* in hac feciſſe di-
 „ cendus eſt . Quāquam neque Anatomici ignorare
 „ queunt , & ipſe Graafius ſupra docuit , Clitoridis
 „ quidem præputium eſſe *corrugatum* , ipſam autem
 „ magnitudine multum variare , & admodum inæ-
 „ qualem eſſe : quod ex ejus quoque Figuris intel-
 „ ligitur inter ſe comparatis , eaque præſertim quam
 „ tu in Tab. LXXIV. num. 2. exhibes , in qua
 „ videlicet glans Clitoridis vel major apparet quam
 „ in noſtra . Quæ cū ita ſint ; certe mihi labo-
 „ randum non fuit in rebus præſertim de quibus in
 „ Adverſariis non agerem , niſi ut Piſtor quæ in pro-
 „ poſito ſubjecto occurrerent , ea fideliter , & ad
 „ vivum , quemadmodum in illo erant , delinearet .
 „ Erant contra alia plura quæ ipſe quan-
 „ tum eorum ratio pateretur , cum ſubjectis præter-
 „ ea aliis conferrem . Hæc ut quot , ac qualia
 „ eſſent , intelligi poſſit , pleraque eorum quæ mea
 „ Figura peculiaria habet , velut ante pollicitus ſum ,
 „ in hoc loco memorabo . Ac primum ſub uno aſ-
 „ pectu ſubjicit cum aperta uteri , & vaginæ cavea
 „ continuatas externas omnes , eaſque ex ordine ,
 „ atque diſtincte Pudendi partes , quod fruſtra in
 „ aliis aliorum , & nominatim Graafii Figuris , ne
 „ ea quidem quam tu meæ ſubjeciſti , excepta ,
 „ perquiſiveris . II. Suſpenſorium Clitoridis , &
 „ proximorum Labiorum Ligamentum , quod nemo ,
 „ quod ſciam , ante me delineavit . III. Novas Se-
 „ baceas Nympharum Glandulas . IV. Plures quam
 „ alii unquam pinxerint , Muliebris Foſſæ Lacunas ,
 „ cum varia ipſarum habitudine , ac directione :
 „ quæ res in tua iſta Tabula non æque apparent ,
 „ eum illarum duas in ſiniſtro Figuræ latere Scal-
 „ ptores tui prætermiſerint , qui viciffim tres ad-
 „ didere ad meatum urinarium , ne de *perperam*
 „ deſcripta Nympharum ſumma parte quidquam di-
 „ cam . V. Bartholini Proſtatam , quam nescio an
 „ alii unquam pinxerint . VI. Hymenis ſectionem ,
 „ quæ etſi ſub oculos ponit quam diſpari ad ba-
 „ ſim , atque ad intimam oram craſſitie ſit , tamen
 „ antea vidiffiſſe ab aliis piſtam non memini , ut ne-
 „ que tria illa quæ primus ipſe Anatomicæ Hiſto-
 „ riæ addidi , VII. Certis in locis ceſſantes Vagi-
 „ næ Rugas , VIII. Creberrimas in his Papillas ,
 „ & IX. Corporis glandoſi quo muliebris urethra
 „ cingitur , in vagina Protuberantiam . Atque hæc
 „ novem in Figuræ inferiore tantum parte peculia-
 „ ria ſunt ; quæ autem ſuperior quoque peculiaria
 „ habet , cum quæ adverſus hanc a Cl. Animadver-
 „ ſionis Auctore ſunt objecta , excuſſerimus , tunc
 „ pariter enumerabimus .

ANIMADVERSI O XXXVII.

De Valvulis Cervicis Uteri.

„ Q Uandoquidem , inquit , perſpicuæ ſint , cre-
 „ bræque rugæ , & aſperitates in muliere ,
 „ tum ad vaginam , tum præcipue ad cer-
 „ vicem uteri , etiam prominentes & crenatæ , ut
 „ ait Author Clar. non per hoc eome ferre poſ-
 „ ſem , ut ad ejus morem , valvulas eaſdem nun-
 „ cuparem . „ Supra quidem dixi , videri ipſum
 „ meas Nympharum glandulas in tuis , aut Verhe-
 „ yenii Tabulis inſpexiſſe ; nunc illud dico , meam
 „ de his Valvulis ſententiam videri non in meis
 „ Adverſariis , ſed in Excerpto quodam ipſorum
 „ legiſſe eo judicio , peritiæque confecto , ut , ne
 „ cætera nunc memorem , vagina cum cervice ute-
 „ ri interna imperitiſſime confuſa , quæ in hac po-
 „ ſui , in illa poſuiſſe diſerte ſcribar . Ex quo ta-
 „ men Præſtantiſſimi Viri , Diarii Eruditorum Ita-
 „ Morgagni *Adverſaria Anat. IV.*

liæ Auctores primum , tum Celeberrimus Scri-
 ptor Joannes Clericus , hoc atque aliis ejuſmodi
 maniſeſtiſſimis erroribus prolatis , Excerpti illius
 fidem jure ac merito elevaverant , non verebar am-
 plius , quenquam fore qui ab eodem ſe decipi ,
 pateretur . Sed ſive inde , ſive aliunde Noſter ad
 id ſcribendum permotus eſt ; illud ex meis Ad-
 verſariis planiſſime conſtat , me *crenatas vaginæ
 rugas* nunquam pro valvulis habuiſſe ; & de his qui-
 dem verum eſſe quod iſte ſubjicit : *nullus ſiqui-
 dem reſidet valvularum uſus , nulla valvularum ſtru-
 ctura* . Cæterum de iis Valvulis quas in uteris
 integrioribus in ipſa interna cervice agnoſco , quo-
 modo id probet , attendamus . „ Quoad uſum ,
 „ inquit ; inſolitum penitus eſt quod rugæ hu-
 „ juſmodi ad cervicem appoſitæ ſpecillum ſurſum
 „ adactum aſcendere vel in virgineis , aliſque in-
 „ tegrioribus uteris prohibeant , ut aſſert vir or-
 „ natiffimus : quod per quotidianam autopſiam
 „ comprobatur . „ Multum in hoc loco me tibi
 „ debere , fateor , Mangete Doctiſſime , neque ob id
 „ tantum dico , quod quæ hic iſte reprehendit , tu
 „ ſupra una cum quibuſdam Cel. Ruyschii Obser-
 „ vationibus inter ea quæ *notatu ſunt digniſſima*
 „ poſuiſti , ſed etiam propterea quia ipſa noſtra ver-
 „ ba Lectori exhibuiſti : „ Ob eamque cauſam
 „ efficitur , ut admoto ipſis appreſſoque ſpecillo ,
 „ deorſum quidem minimo negotio aditum per-
 „ mittant , ſurſum vero adactum omnino aſcende-
 „ re prohibeant . „ Hoc igitur volui , ſpecilli ,
 „ non ſurſum utcuſque , ideſt vel per axem cer-
 „ vicis de induſtria adacti , ſed ipſis Valvulis *admo-
 ti* atque *appreſſi* aſcenſum ab his prohiberi ,
 „ cujus quidem ſimiliter *admoti* atque *appreſſi* de-
 „ ſcenſum facile permittant . Hanc ego appreſſi
 „ Valvulis ſpecilli in egrediendo facilitatem , in in-
 „ grediendo autem difficultatem cum illis jure oppo-
 „ ſui Cervicis ejuſdem *rugis* a Bartholino memora-
 „ tis , „ quæ radices habeant inferne ſitas , aciem
 „ vero interne , ſeu ſuperne tendentem , ut in-
 „ greſſum facile , regreſſum difficile ferant ; „
 „ tum merito comparavi cum haud abſimilibus ob-
 „ ſervationibus quas ob *analogam* ad uteri cervicem
 „ ſtructuram in echino , vacca , ove , cerva , dama ,
 „ delphino , aliſque animantibus a natura ſervatam ,
 „ habere licet . E quibus tamen echinum potiſſi-
 „ mum , & vaccam propoſui ; illum quidem , ut
 „ indicatum a me Cl. Segeri locum inſpicientes ,
 „ hæc verba invenirent : „ Parte ea qua uterum
 „ reſpexit (linea , ſive ruga) iſti firmiſſime ad-
 „ nata eſt ; aſt qua pudendum externum , ex par-
 „ te attolli potuit ; unde valvulam haud inepte
 „ æmulabatur ; „ Vaccam autem , quod omnium
 „ manibus Cl. Caſpari Bartholini Epiſtola verfare-
 „ tur in qua : „ in animalibus , inquit , quadru-
 „ pedibus , & præcipue in vaccis in vagina , &
 „ circa os uteri plurimæ rugæ formant diverſas
 „ quaſi valvulas adeo ut me per Epiſtolam mo-
 „ nuerit Malpighius , incredibile fere videri ,
 „ ſubſtantiam ſeminis in uterum penetrare . „
 „ Nec tamen hunc ego uſum iis Valvulis vel „ mu-
 „ co quodam ſeu lentore adjutis quo uterina cer-
 „ vix redundat , „ tribuendum eſſe , conſtitui ;
 „ ſed *aliorum judicium faciens* , ipſe interea *in aliud
 tempus reſeci* ; quinimo illud aperte profeſſus ſum :
 „ ſi aliquis etiam velit , - cervicis valvulas in
 „ cum potiſſimum finem conſtructas , ut ſit unde
 „ poſſint in partu muliebria loca dilatari , huic
 „ me homini non eſſe magnopere adverſatu-
 „ rum . „ Haſtenus de Valvularum uſu .

52

Anatom.
quart. re-
nov. l. 1.
cap. 29.

De Ovar.
Mulier.

Adverſ. I.
num. 14.

Ibid. n. 13.

ANIMADVERSI O XXXVIII.

„ Q Uoad ſtructuram , notabiles hæ interioris
 „ ad cervicem membranæ duplicaturæ , *De iſdem
 Valvulis.*
 „ tranſverſim , vel oblique notabiliter pro-
 „ ductæ , & firmiter renitentes , Nobis , inquit ,
 „ aliſque ſolertioribus longe Anatomicis , nun-
 „ quam apparuere . „ Quod poſt emiſſa Adverſaria
 „ noſtra ſolertioribus Anatomicis nunquam apparue-
 „ rint , id a vero alienum eſſe , mox oſtendemus ; quod
 „ I 2 vero

Hist. Anatom.
num. 197.

vero nunquam ipsi apparuerint, fane haud difficile concedimus; quod denique ante edita I. Adversaria nemo Anatomicorum memoraverit, id vero ni ita esset, neque ego in prima illorum Parte proposuissem, neque Doctissimus Goelickius iis quæ ego *nova detexi*, *valvulas cervicis uteri se merito adnumerare*, scripsisset. Addit argumentum quod ego nunquam expectassem: „ Insuper, „ si dantur hæ valvulæ cervicis uteri muliebris; „ Cur vir eruditissimus easdem, ut res hucusque „ ignotas, necnon gravissimas, summamque ideo „ expositionem exigentes, non clare, distincteque „ delineat in hac figura proportionaliter ad luculentam descriptionem fol. v. S. 14. eidem „ dicatam. - Revera cum fol. citato v. - una cum „ hisce valvulis quosdam etiam describat fasciculorum fasciculos intra uteri Cervicem secundum „ ejus longitudinem, quandoque in medio, alias „ a lateribus extantes; Carneas insuper & Crassas fibras: quis non videt expositas in Cervice „ uteri hac figura strias illas varias, globulis quibusdam mox memorandis intertextas, post additas „ in adversariis descriptiones duas prædictas, Lectori adeo inspectoremque suspendere, ut decernere „ hic prorsus inde nequeant, an valvulas descriptas an fibras musculares non minus descriptas „ per illam iconem intueantur? „ Ego vero neminem adhuc præter ipsum inveni qui in nostro præsertim archetypo; a cujus sive in Valvularum oris tenuitate, sive in congruente umbrarum sub iisdem dispositione tui, Vir Cl. Scalptores negligenter recessere; neminem, inquam, præter ipsum inveni qui satis non intelligeret, non *crassas* quidem *fibras*, sed *tenuis*, & ab inferiore parte solutas membranas hinc, atque hinc delineari. At faciamus, pro rei difficultate id Pictorem meum satis assequi non potuisse, quod ipsius Pictor in rebus longe facillimis, ut orificio cervicis vesicæ, vel ureterum, ut musculis, ut vagina, ut vertebrarum processibus, assequi nullo modo potuit; quis tandem non videt, omnem siqua esset, Lectoris dubitationem tolli per adjectam Explicationem Figuræ, in qua ad litteras eo pertinentes L. L. non *carneas & crassas fibras*, sed *Valvulas-deorsum conversas - in ipsa cervice Uteri* proponi, diserte indicatum est. Quorum tamen omnium Noster securus, vide, quæso, quid concludendum censeat: „ Ut „ ideo potius (Lectores) teneantur concludere, „ nec fibrarum fasciculos intra uteri cervicem extantes, nec valvulas ibidem etiam suppositas „ perspicere. „ Cur vero tandem concludere sic tenentur? „ dum primi, inquit, multum distant „ a tali dispositione; alteræ revera non dantur. „ Nonne igitur jure tibi videor istiusmodi argumentum nunquam expectasse? Sed quoniam huc semper res tota redit, utrum istæ Valvulæ dentur, necne; si, ut ait, *revera non dantur*; quid igitur mecum Pictor vidit, cum ipsas delineavit? Nam certe *fibrarum fasciculos* non vidit, qui nimirum *multum distant a tali dispositione* quam ipse quidem qua summa potuit diligentia, & fide expressit. Vel quid ego tandem in quatuor Virginum, itemque Mulieris quæ in Bononiensi D. Mariæ de Morte Nosocomio decesserant, cervice uterina observavi? Equidem tam certe scio quam quod certissime, in iis omnibus me quas postea descripsi, Valvulas perspicue luculenterque vidisse. Sed & omnes qui rudia nostrarum observationum commentaria velint inspicere, in quæ illas quinque ut habuimus, ita suo quamque loco, interjecta etiam nostra manu delineatione, tunc retulimus, præclarissime cognoscent, in ea ipsa Virgine quæ menstruo sanguine profluente, interierat, & in ea ipsa Muliere cujus in teste ad magnitudinem pugni adaucto innumeras vesiculas vidimus, ut multa alia quorum partem in I. Adversariis proposuimus, ita & eas Valvulas a nobis esse observatas. Et quanquam non quotidie fane uteri secandi offeruntur qui illi habendæ observationi sint maxime idonei (non

modo enim in *virgineis*, aliisque potissimum *interioribus uteris*, & in his ipsis haud semper quidem, sed *sæpius* eas a me Valvulas conspectas esse, iterum dico; sed illud præterea addo, in ætate florentibus & quibus cum mortuæ sunt, menstruus sanguis vel fluere, vel non ita pridem fluxisset, multo evidentiores apparuisse) alias tamen præter eas quinque in commentaria relatas, tum antequam illa Adversaria ederem, consimiles observationes habueram, tum post illa edita, habui. Quarum ut nonnullas tantum commemorem; certe primum A. 1707. Venetiis cum essem, in eo Theatro eas Valvulas ostendi vidi a Præcl. Santorino; qua ex re nimirum omnes intelligent, num *aliis solertioribus Anatomicis nunquam apparuerint*: idque etiam, opinor, intelligetur ex Cel. Ruyschii *Adversariis Anatomicis*, nondum quidem huc importatis, sed in quibus tamen; quantum ex Eruditissimi Goelickii nupera quadam Exercitatione superioribus diebus cognovi; Summus ille Professor, „ lubens fatetur, similem „ se se fabricam circa collum uteri deprehendisse, „ se, nempe *rugis, fibris, valvulisque* contextam, „ tam, qualem etiam *Regnerus de Graaff*, & „ *Morgagni* detexerunt. „ Deinde meis ipsis Auditoribus interdum quidem, & præsertim in duabus mulierculis quarum alterius uterum in Nosocomio, alterius in meis ædibus secui, imo etiam nuper in Virguncula quadam Celeberrimis Professoribus Antonio Vallisnerio, & Joanni Poleno aliquot earum Valvularum ostendi; sæpe autem (ut sæpe minus idonea cadavera oblata sunt) earum saltem vestigia, & rudimenta non obscura monstravi. Quæ quidem persæpe, obvia esse, tum Graafii Figuræ, in proxima Tabula ad num. 2. & 3. a te productæ, tum Bidloi non abfimilis delineatio confirmat. Ac de his Valvulis in præsentia quidem satis.

Exercit. Francof. T. 1. Sect. 1. Exerc. 1. S. 15.

Anat. human. corpor. Tab. 51. F. 4.

ANIMADVERSIO XXXIX.

Porro in iis etiam quæ de Vesiculis uterinæ cervicis sequuntur, etsi Cl. Animadversoris Auctor, illa, inquit, sibi in *subjectis pluribus diligenter inspectis, & demonstratis observare contigisse*; ubi tamen res in quibus dissidet a nobis, cum plurimis sive nostris, sive etiam aliorum observationibus comparamus, facile intelligimus, pauciora quam opus esset, cadavera ab eodem inspecta esse. Nam quod primum negat, eas *Vesiculas per plana multiplicia irregulariter superposita distribui ad cervicem, ut pingit clar. Morgagnius*; imo infra contendit, *eandem semper plani assignati sui servantes lineam, ab eadem non transcendere*; non ego meas bene multas, omnino adversantes, observationes opponam, aut ad meos Auditores provocabo, quibus pluries, atque adeo etiam nuper earum Vesicularum alias quidem in prominentibus cervicis ipsius fibris extantes, alias vero in imis quæ inter has sunt, intervallic subsidentes Inculentissime ostendi; sed Cl. Nabothi earundem Vesicularum, quarum ipse congeriem *Ovarium* appellat, descriptionem obijciam; in qua, *propter fibrosam, inquit, sive cellulofam cervicis figuram, non potest non ovarium integrum apparere inaequale*. Quod autem a Nostro additur: has Vesiculas *ordinario ad duas dumtaxat series limitari, easque regulares, & parallelas*; operæ pretium est primum attendere, quem ad locum duas istas series contrahat. Id clarius ostendit in ea quam alias excussimus, de *ingressu Ilei in Colon* Dissertatione. Ibi enim non modo „ exhibuisse se, dicit, adstantium coronæ vesicularum notabilium coronam ad os uteri (Puerperæ) „ internum insidentem, earumque habitudinem „ ei non valde similem observasse, quam scribit, „ & delineat in adversariis suis Clariss. & amicis. Morgagnius; „ verum etiam, paucis interjectis, easdem vesiculas *partes esse affirmat, interno huic osculo proprias*. Equidem mihi etiam olim contigit, ut in gravida muliere Vesiculas nulloquam

De Vesiculis uterinæ cervicis, seu Glandulis ejusdem Mucosis.

77.

De Sterilitate n. 14.

Theatr. Tom. I. 304.

Adv. III. Anim. 48. 49. 50.

75.

Advers. I. num. 33. & 30.

quam nisi in eodem osculo cernerem, in nonnullis autem aliis prima inspectione id ipsum cernere viderer. Quid, si continuo eo decurrissem, ut *osculi proprias* esse, docerem? Vehementer errassem videlicet. Cum enim præter illius gravidæ observationem, alias habeam quatuor & viginti in commentariis conscriptas earum mulierum quas istarum Vesicularum inspicendarum gratia diligentius scrutatus sum: si quinque detrahas in quibus nullam invenire vesiculam potui vel substantia cervicis atque osculi, si forte intra ipsam conditæ laterent, alte accurateque dissecta, aut etiam compressa, quatuor autem in quarum una intra ipsius osculi anteriora labra prorsus absconditas secundo comperi, tribus autem reliquis, muci globulos exprimendo tum ex osculi, tum ex cervicis substantia, utrobique illas subesse, intellexi; quindecim reliquæ se ita habuerunt, ut septem in osculo quidem, sed etiam per cervicem, hic illic, sparsas Vesículas ostenderent, octo per cervicem quidem, sed nullas in osculo, pleræque etiam nec prope osculum exhiberent. De nostris igitur quinque & viginti observationibus una fuit quæ in ipso tantum osculo Vesículas ostenderit; Graafius, qui ante nos olim has animadvertit, ac pro hydatidibus habuit, non in uteri osculo, sed *in uteri*, inquit, *collo inter rugas, seu fibras potius, sæpenumero hydatides diverse magnitudinis reperiri*; Nabothus tandem, qui post nostra edita I. Adversaria mox easdem, ex „ quamplurimis - cadaveribus tum publice, tum „ privatim - dissecitis descripsit, „ *cervicis uteri superficiem internam omnem fere, ad infimam usque cavitatis fundi uterini partem, occupare*, docuit: addiditque duos, quæ nos pariter observasse, meminimus: „ aliquando tamen vesiculæ, las etiam nonnullas limbum sive circulum orificii „ interni, quocum vaginam respicit, excurrere, „ interdum, licet rarius, in cavitate quoque fundi „ uterini unam vel alteram occurrere. „ Quæ cum ita sint; quis non intelligat, suis æquo paucioribus inspectionibus nimium tribuisse qui has Vesículas partes esse interno uteri osculo proprias, affirmavit, imo qui easdem ordinario, inquit, *ad duas dumtaxat series limitari, easque regulares, & parallelas*. Sed vide insuper, quam longe alia addat Cl. Nabothus: „ Et licet ovarium tale sit simplex, subinde nihilominus „ in circumferentia cervicis interna fere instar binarum arbuscularum cum ramulis expansarum, „ atque fructibus conspicitur. „ Quinimo Cl. ipse Novesius, qui cum in tribus illis quæ hac de causa scrutatus est, cadaveribus extantes vesículas aut non invenisse, aut non curasse videatur, latentes vesículas in uterino tantum osculo indicat; non sane *duas istas series regulares, & parallelas* innuit, cum „ mediocri, inquit, *facta expressione prædicti orificii, illius membrana „ exterior variis in locis inæqualiter turgebat*. „ Sed ne aliorum observationes urgeam qui propriis abundem; ego certe ut numquam memini *duas istas dumtaxat series regulares, & parallelas* vidisse, sic contra hic nullo certo ordine, quemadmodum pinxi, aut sparsas, aut congestas creberime vidisse me, scio. Quam quidem picturam Experientissimus Vallisnerius diserte probavit, & verum earum Vesicularum usum a me esse assignatum, censuit, & quenquam me diligentius descripsisse easdem, negavit. Noster vero ubi in una muliere, eaque puerpera, non illa omnia quæ nos descripsimus, agnovit; continuo in ea de qua supra dictum est Dissertatione monere non dubitavit, vesicularum *habitudinem ei non valde similem observasse quam scribit, & delineat in adversariis suis Morgagnius*; quasi vero in Puerperis peculiare non essent causæ quæ alium earum (manifestiorum videlicet factarum) numerum, & quod consequitur, aliam habitudinem vel requirerent, osculi videlicet uterini angustia maiore muci copia in partu lubricandæ, vel facerent, ipse videlicet fœtus, qui dum easdem angustias distrahit, plurimas quæ sub Morgagni Adversaria Anat. IV.

interna illa superficie magnam partem latebant, vesículas in apertum producit; Quapropter in ea puerpera quam in superioribus Animadversionibus memoravimus, cum illius dissecti osculi peripheria spithamam ferme æquaret, imo cervix ipsa non minus quam uterus, lata esset, minime miratus sum, quod Vesículas, si unquam alias, creberrimas, & manifestissimas observaverim. Sed Puerperis etiam, Gravidisque sepositis, nonne ex nostra quam tu supra exhibuisti, Vesicularum descriptione nihil æque apertum est, quam his Vesiculis eandem neque magnitudinem, neque numerum, neque sedem in cunctis scæminis contigisse, imo esse in quibus ne una quidem illarum appareat? tantum abest, ut *mirificam* istam quam Noster describit, *proportionem* meis possim observationibus confirmare.

ANIMADVERSI O XL.

HAs sane ob causas, & longe aliam de ipsarum Vesicularum natura Graafii opinionem, atque adeo Ortlobii observationem, decere existimavi, ut quem ex muco in ipsis primum a me observato hujus secernendi usum primus afferrem, eum non sine adjecta dubitatione proponerem. Quæ tamen pluribus Cel. Viris, & in his Goelickio, atque etiam, ut dixi, Vallisnerio nostro minime obstitit quin præclare; quam potissimum in partem propenderem, continuo intelligerent; ut Cl. Animadversionis Auctor eo superfedere labore potuisset quem sibi iterato, & hoc in loco, & in sua illa Dissertatione sumit, *quod hydatides non sint mucosa huiusmodi promptuaria, id pro certo stabiliendi; - ut jam super hac re ejusdem, ut inquit, Clariss. Morgagni dubitatio diluatur*; præsertim cum nihil afferat quod alii, atque adeo ego ipse ignoraremus. Quod enim ad id pro certo stabiliendum hanc unam profert rationem: *Intime namque (illa) cum propria cervicis substantia coadunata, & continua demonstravimus*; id longe ante ipsum Cl. Nabothus satis ostenderat, cum „ *cujuslibet, inquit, vesiculæ - pars tertia circiter extra internam cervicis uterinae superficiem prominet, duæ vero partes „ substantiæ cervicis immerguntur, cum eadem „ veluti continue. „ Nos autem ante Nabothum & verbis, & Iconismo docueramus, Vesículas „ intimæ cervicis tunicæ esse intertextas ita „ uti ex altera parte in cervicis cavitate prominent, ex altera intra ejus substantiam se se recondant. „ Quinimo illud quoque addideramus: earum „ aliquot intra cervicis ipsius substantiam penitus latentes „ a nobis esse visas. Nec tamen propterea continuo nobis sine ulla dubitatione pronunciandum credidimus, *non esse hydatides, sed partes interno osculo proprias, debitas, a prima genesi positas*; nec sane ista eadem ratio Cl. Goelickium morata est quin aperte scriberet: *vesículas (quas hydatides rectius dixeris) circa cervicem uteri sitas, & intra substantiam ejus maximam partem demersas*. Cæterum etsi in recens natis, aliisque adhuc teneris puellis eas nunquam Vesículas vidisse, memini; imo contra memini, punctis in quadam Anu iisdem Vesiculis non mucum prodisse, sed, qualis ex hydatidibus solet, humorem in altum profuuisse; in illis tamen ob parvitatem non apparere, in hac autem, quoniam neque ullus in cervice mucus inerat, & prolapsu uteri laboraverat, vitiatas fuisse, ideoque aliam ac par erat, secrevisse materiam, haud difficile crediderim. Easdem vero in Lue Venerea vitiari, etsi veri simile est, tum quia earum sedes, ac lentus quem separant, mucus facile accipiendæ, & communicandæ noxæ videntur aptissima, tum quia ea Lue infectæ formosissimæ scæminæ quam Cl. Novesius memorat, uterinum erat osculum exulceratum; mihi tamen, qui vulgatissima & putida scorta sæpenumero in Nosocomiis dissecui, eorumque uteros diligentius inspexi, perraro contigit; ne dicam, nunquam; ut aut illud, aut aliud ejuscemodi conspicuum vitium eo in loco deprehenderem.*

53

De earundem Vesicularum Usu.

Hist. Anat. n. 284.

Theatr. Tom. I. 305

Diff. cit. num. 14.

Advers. I. num. 32.

lib. cit. num. 280.

Lettres &c. VI.

52.

Diff. cit. num. 12. & 14.

Zodiac. Med. Gall. A. 3. Febr. Obs. 1.

Raccolta di var. Trattati.

ANIMADVERSI O XLI.

NEc aliud, inquit, super hanc figuram dicendum restat. Quicumque dicta ab ipso haec tenus attenderint, & ne rugas quidem præputii clitoridis esse omittas, animadverterint, aliud quod dicat, non restare, facile credent. Restat tamen adhuc aliquid; sed de eodem genere. Postquam enim id scripsit, atque illa subiecit: „ Ipsam (figuram) in genere ut exactissimam, „ elegantissimam, ac elaboratissimam veneror, & „ plaudo. Maculas ad fundum uteri indicatas, „ ut ex hisce loca tributi lunaris peculiariter ex- „ cretoria designentur, comprobare sufficienter, „ aut commendare non possem; „ tum ad institutum rediens, hæc minime voluit prætermittere: „ Quicquid, inquit, de levigata nimis ovariorum superficie, aut de inconsueta tubarum „ flexura, aliisque minutis referre alii ad errorem „ possent, ego lufui expresse per Authorem introducto ad maiorem forsân figuræ lepiditatem „ plus quam lubenter tribuo. „ Non dixi, esse de eodem genere? Supra ab oblectamento, & lepiditate; hic autem a lusu expresse introducto Figuræ nostræ defensionem petendam esse, iudicavit. Quid vero? si hic quoque nulla, & multo minus ejusmodi defensione opus esse, ostendimus? Quid? si ista ipsa quæ arguuntur, non defensione, sed approbatione digna esse, demonstrabimus? Quid enim? Levigata, inquit, nimis est ovariorum superficies. At sic erat prorsus in ea, non muliere quidem, aut anu, sed virgine, eaque admodum adolescente, unde Figura descripta est. At sic in aliis etiam junioribus præsertim virgunculis & vidimus, & ostendimus. Sic ergo pinximus tum ne ulla in re a proposito nobis subjecto recederemus, tum ut quid discriminis vel in ea re inter id ætatis puellas, & maturiores virgines, mulieres, anus haud raro intercedere vidissemus, id vel aliud agentes ostenderemus. Et hoc Noster, referre, inquit, alii ad errorem possent; ego lufui expresse per Authorem introducto ad maiorem forsân figuræ lepiditatem plus quam lubenter tribuo! Quid? quod ista eadem prorsus dixit de inconsueta etiam tubarum flexura; quasi vero pervestiganda causa esset, & ab lusu tandem, ac lepiditate ceu per conjecturam expresse repetenda, cur ego Tubas sic inflexas delineassem, de quibus expresse in Explicatione scripseram ad litt. QQ. Tubæ eo positu delineatæ, quem modo frequentius mihi observatum dicebam. Dixeram autem ad proximas litteras pp. Testes, sive Ovaria: quorum dorsum postquam Tubæ conscenderunt, deorsum post ipsos se se demittunt, infraque eos orificiis propendent alias sursum, scilicet eosdem versus testes, alias vero deorsum spectantibus; ut in hac, aliisque mulieribus observatum mihi frequentius est. Verum, credo, id in ea tantum Explicatione, atque obiter indicavi? Nonne in Adversariis ipsis hac de re adversus Graafii Tabulas ea tradidi quæ tu supra in Adnotationibus eidem appositis exhibuisti? Sed est, inquit, ea flexura Tubarum inconsueta. Scilicet; Nisi enim in Auctorum Tabulis inconsueta esset, a me primum observata, atque edita non esset. Sin autem dicit in cadaveribus quoque inconsuetam; vide quam fallatur. Mihi enim in viginti cadaveribus juniorum, vetularum, virginum, nuptarum, matrum id diligenter inquirenti, tredecies Tubæ inventæ sunt, & sæpius quidem ambæ, ita inflexæ ut superatis testiculis post hosce ipsos descenderent, orificio utriusque ut plurimum deorsum converso, alterius interdum sursum reflexo, nonnunquam ambarum: quæ quidem observationes pleræque, nostris vel Amicis, vel Auditoribus inspectantibus, Bononiæ, Venetiis, Patavii habitæ sunt; quater autem contigit, ut quod Stenonem, atque alterum Scriptorem observasse, docueram, id ipse viderem, Tubas Ovariorum dorso tantummodo insidere; ter deni-

que; non sæpius; accidit, ut infra anteriorem ipsorum partem aut utraque, aut altera dumtaxat Tuba confisteret; ut propterea haud illibenter scirem, quot tandem ex cadaveribus ea qua par est, diligentia inspectis (facile enim, dum intestina attolluntur, nisi id ipsum sedulo caveatur, Tubæ e sua sede deturbantur) Animadversionis Auctor didicerit, Tubam in sua illa Figura dexteram sub antica Ovarii parte constitutam, melius, ut inquit, in situ esse collocatam.

Theatr.
Tab. extra
ord.
IV. F. 1.
Tom. I.

ANIMADVERSI O XLII.

Nunc illud restat, ut quæ peculiaria sunt in Figuræ hujus nostræ superiore parte, quemadmodum promissimus, exequamur. Atque ut ab his ipsis quæ Noster ad lufum, & lepiditatem spectare, credidit, incipiamus; primum esto Tubarum illa positio, ac flexura, ut ipse fatetur, inconsueta, hoc est a nobis primum inventa, ac delineata. II. Ovariorum superficies nimis, ut ipse inquit, levigata, id est si cum ea conferatur quæ a plerisque solet delineari, non vero si cum ea quam in junioribus Virgunculis haud raro ipsi adnotavimus, & cujus etiam imaginem inter tot alias quæ ex maturioribus sunt Virginibus, extare volumus. III. Uterinæ cavæ figuram quam si cum iis quas aut ex Verheyenio in ista ipsa Tabula LXXII. ad num. 6. aut ex Graafio in proxima ad num. 2. & 3. exhibes, omnes autem cum vero comparaveris; facile intelliges, superiores ejusdem cavæ angulos ab utroque eorum longe minus quam par esset, acutos delineari, sive (quod eodem recidit) longe æquo crassiores uteri parietes ostendi quæ Tubæ transmittuntur. Egregias quidem in hac parte, & mirum in modum inter se similes Figuras dedere Eustachius, & Steno, quarum illas ad Theatri calcem, hanc vero in Bibliotheca Anatomica producis; quod tamen ad inferioris (hoc est uterinæ cervicis) cavæ figuram attinet, integrior uteros longe melius referunt illi iidem Graafii Iconismi: quos cum hac in parte Figura nostra imitetur; habet id igitur peculiare ut quæ in singulis ad verum propius accedunt, in hac una omnia exhibeantur. IV. id quod neminem ante, vel post fecisse, cognovimus, menstrui sanguinis scaturigines, veramque, aut certe frequentissimam sedem ipsarum delineavimus. V. Vesicularum, sive mavis Glandularum cervicis uteri Mucosarum primam, atque adhuc pariter; quod sciamus; unicam delineationem edidimus. VI. Denique ejusdem cervicis Valvulas, a nobis primum observatas, pitigendas curavimus. Hæc omnia si cum iis insuper quæ inferiorem Figuræ partem peculiaria habere ostendimus, conjungantur; quindecim nempe sunt quorum primam delineationem, sex autem, vel septem quorum primam inventionem in hac una Figura proposuimus. Horum autem omnium causas si quis diligenter quærere, & perpendere incipiat: quod sit præcipuum, quod non, haud ita facile decernat. Quæ attingere hic volui, non quærendæ laudis gratia, sed reprehensionis depellendæ.

De vera
Uterinæ
Cavitatis
figura.

Tab. IV.
Fig. 4. 5.
Tab. 24.
Fig. 6.

Anim. 36.

ANIMADVERSI O XLIII.

HAec tenus Figuram nostram ab ea quam ipsi apposueras, Animadversione defendimus. Nunc illud sequitur, ut tu vicissim, Vir Cl. descriptas a te Figuras, earumque Explicationes tuearis. In ista enim ipsa Tabula LXXII. frustra Lectores quærent in Figura 2. puncta illa exigua, frustra in 4. illa caca Lacunarum foramina quæ neque in earum Archetypis omittuntur, & in Explicationibus ad litteras A. & EE. designantur. Sed hæc nimirum leviora videbuntur, cum in

77.

De Ovariiis.

De Tubarum Falloppianarum situ frequentiore.

Advers. I. num. 30.

69

loc. cit.

in Tabulæ LXXV. Figura 1. Meatus ipsius Urinarii exitum ad litt. g. incassum perquirent. Contra in Tabulæ LXXIII. Figura 1. ad litt. EE. Cervicis Uteri Cavitatem, & ad litt. N. Testiculi Ligamentum plus quam Graafius pinxit, amplificata comperient. Sed ne per singulas Tabulas, atque adeo Figuras eamus, indicantes quæcumque perperam omissa, addita, mutata sint; præstabit in hujus ipsius Tabulæ LXXIII. Figuræ 4. Explicatione subsistere. Primum litterarum FF. explicationem omittis. Hæc, inquires (& in superioribus etiam inquires) Operarum culpa est. Fateor; sed tamen ita frequens est, ut ista credibilis negligentia in magnum tandem & Auctorum, & Lectorum detrimentum cedat. Quæro deinde, cur & in litterarum EE. explicatione, & in ipso Explicationis argumento nonnulla, ut alibi etiam passim, Graafii verba mutaveris; ubi vero ad litteras hh. ventum est, quo in loco pro *offis ischii tubere* scribendum fuisse *inferiore ossium Pubis* (*Pubis*, inquam, non *Pubium*) parte, tum in Explicatione Figuræ 3. Tabul. LXXI. tum in Clitoridis descriptione Graafius ipse satis indicat, tu nihil mutes, sed & ibi, & in proximæ Tab. Fig. 2. Explicatione ad easdem litteras hh. eundem Eximii Viri lapsum nobis serves. Sed ne a proposita illa priore Explicatione recedamus; inspiciamus, quæso, ad litteras SS. quid addideris. Postquam ipsis ferme Graafii verbis scripsisti: *Vascula Lymphatica, prout ea per brutorum dissectiones edoctus, per Uterum, Testes, & Tubas in mulieribus excurrere opinatus est Clarissimus Auctor*; continuo hæc addis: *quorumque non tantum realem sed etiam multo copiosiore existentiam supra, Tabula scilicet 54. ex Cl. Nuckio demonstravimus*. Nimirum hoc illud est de quo in II. etiam Adversariis monuimus. Scripta enim ipsius Nuckii, imo illa ipsa Tabula demonstrant, neque Nuckium Lymphæductuum per uterum excursum aliter atque Graafium, hoc est prout in brutis se habent, delineare, ut 2. Figura docet, potuisse, & te in 1. Figura quæ vere mulieris est, *Arteriarum Hypogastricarum Uterum, partesque vicinas serpentinis suis vasculis egregie exornantium* excursum illum quidem realem, & multo copiosiore pro Lymphæductuum excursu accepisse. Et sane ipse Verheyenius, quem has Nuckii Tabulas vidisse, constat, *Vasa, inquit, lymphatica an ullus unquam in utero humano observaverit, ignoro*. Sed quid Verheyenium dico? Nuper quoque Eruditissimus Heisterus, Uteri Vasa Lymphatica in brutis tantum observata esse, confirmavit; ut me facile primum fore, credam qui de Lymphæductibus Muliebris Uteri aliquid non ex conjectura, & analogia, sed ex certa accurataque observatione, litterarum memoriæ mandaverit. Scilicet ante annos ferme duodecim in Veneta Puerpera & vidi ipse, & iis qui dissectioni aderant, Amicis Doctissimis ostendi Vasa Lymphatica turgentia admodum, atque adeo satis superque conspicua quæ sub exteriori Uteri tunica prope osculi regionem manifestissime reptabant. Mors foeminæ quæ repente, & brevi a partu sic ut valde adhuc tumeret Uterus, supervenerat, atque addita ab intestinis quæ flatibus mirum in modum distenta erant, compressio, novi hujus, & gravissimi nobis spectaculi copiam fecere.

ANIMADVERSI O XLIV.

Restat Caput ultimum, idque omnium longissimum; sed nos eo breviores in hoc erimus, quo fuimus in superioribus prolixiores.

81 Ejus hunc titulum proponis: *De Conceptione, Fætus efformatione, nutritione, accretione, & partu*. Deinde sic incipis: „Illa omnia, de quibus in hujus capitis titulo, tam erudite atque nitide no-

Morgagni Adversaria Anat. IV.

„bis exposuit Præclariss. Carolus Drelincurtius, „- ut e re omnino futurum sit, si eum elegantissimus. „me pro more scribentem in hisce materiis producamus. „Et continuo ejusdem Scriptoris Opusculis impleas paginas quasi sexaginta. Equidem si Drelincurtium, ut Scriptorem eruditum, & de Dogmate Generationis Viviparorum ex Ovo, si-ve observando, si-ve cogitando, egregie, ut illis quibus scripsit, temporibus, meritum laudes; ultro assentiar; addamque præterea, nonnulla in ejus Scriptis peculiaria inveniri quibus vel recentissimi Anatomici ad illud idem Dogma explicandum, tutandumque sunt usi. At si; quod facis; existimes, *e re omnino esse* ejusdem potius Opuscula hic adhibere, quam alterius Anatomici Scripta, & vel ipsa Graafii quæ omisisti, Capita ad ea quæ in tui hujus titulo promissisti, pressius, clarius, utilius; ne multis; ita ut Anatomicen docentem maxime decet, absolute, atque ordine tradenda, vide ne tua te plurimum fallat opinio. Drelincurtio enim, quamvis *Laconismum sibi*, ut inquit, *familiarem* affectante prolixiorem Scriptorem non facile inveneris. Nam quoties, obsecro, in prioribus Opusculis jam satis exposita, in posterioribus iterat? vel quid tandem attinet ad eos qui ad veram historiam, & ad similia veri cogitata discenda properant, tot falsas traditiones, quas in universum satis erat refellere, curiosa nimis, & supervacanea hisce præsertim temporibus diligentia sigillatim commemorari? In hac tamen re totus est in Adversariis, Hypomnematis, Meltematis, Animadversionibus, Castigationibus, Emendationibus, Meditationibus Elencticis. Utinam sic semper scripsisset, ut in eo Opusculo quod de Conceptu Conceptus inscribitur; in hoc enim quid sibi videatur, cæteris omisissis, proponit. Contra in Lucubrationibus dum Antiquorum pene omnium sententias de eodem Conceptu anxie congerit, quid aliud agit, nisi ut quod illi de Oviformi in utero Conceptu tradidere, de Viviparorum Generatione ex Ovo ab Ovariis delapso incautis fortasse Lectoribus tradidisse videantur. Hic facile dices, etiamne Drelincurtii Scripta arguis? Ego vero in hoc quidem loco non tam ista Drelincurtii Scripta (quæ alioqui esse eruditissima, libens fateor, & quibus elucubrata sunt, temporibus, longe magis fuisse proficua) quam tuum, Vir Cl. consilium spectro, qui istiusmodi Drelincurtii Opuscula hec demum tempore e re tua omnino esse, censueris; deinde non moleste; ut verum fatear; non possum ferre quod ille Summis quibusque Viris, a quorum plerisque non modo provocari, sed ne videri quidem potuit, usque adeo vehementer (idque passim) infensus fuerit, ut de Fabricio nostro ab Aquapendente longe majore quam ipse, Anatomico, & de Fætus Anatome optime merito hæc scribere non dubitaverit: „Nec minus deridicula sunt portiunculæ carni concisæ atque farcimini similes intra farciminales tunicam intra, terdum cum urina repertæ, uti fallaciter narrat F. ab Aquapendente ludibriosa nominis idea, misere deceptus; quasi vero intra plurium brutorum de quibus Fabricius loquitur, Allantoidem concreciones quasdam non inveniremus, quæ etsi aliud sunt, prima tamen facie adipem, aut carneam moleculam repræsentant; ut verissimis De form. Needhamii verbis utar, quando tu files. Quid Fætu. illa proxima? „Nec fœtibus humanis eodem „jure competit Allantois atque brutis, prout nugivendendi deblaterant Hobokenus atque Graafius, „nisi cornua velint eodem jure patribus suis „competere, atque hircis, „Nollem, hæc literato Viro excidissent. Attamen quid si nugivendus iste Graafius longe ipsi a te erat in hac tota Anatomies parte anteposendus? Te ipsum appello, Vir Cl. Si illis potius Graafii Capitibus hic usus fuisses, num toties illi, quoties Drelincurtio, adjectis Notulis aperte adversari coactus esses? nam vel in ista ipsa re propter quam ita Graafio

insultat, tu paulo post ab iis stas partibus, a quibus stetit Graafius.

ANIMADVERSIO XLV.

De Luteis
Ovarior.
Muliebr.
Corpori-
bus.

Diff. ad
Spon.

113 132.

114

141. 161
& Tom. I.
145

115

70

69.

Neque tamen quotiescumque necesse erat, Dre-
lincurtio es adversatus: quod ut planissime
intelligi possit; nos de plurimis non ita multa
loca indicabimus. Tradit ille, Corpora Ova-
riorum Lutea (five Ovorum, ut vocat, nidu-
los) *nervco-carnosa*, seu *fibrosa*, *carnosaque* es-
se; atque ita in natura structuraque eorum, ve-
ra, aut certe præcipua fallitur. Hanc enim glan-
dulofam esse, Graafius docuit, Malpighius autem
ostendit, nosque ipsi in Puerpera ejusmodi Cor-
poris lobulos, & non obscura vestigia vidimus
quasi ramulorum ab iisdem recedentium, & in
medium quendam quasi ductum convenientium;
quam videlicet structuram manifestam in Vaccis
observavit Malpighius. Tu vero hanc neque isto
in loco opportunissimo, neque, ut in superiori-
bus dictum est, alibi commemoras. Illud quo-
que, te silente, docet Drelincurtius: principio in
utero umbilicalium vasorum radículas, medium
Embryonis centrum permeare atque sic perme-
diam Ovi lympham aliquandiu fluitare; sed
illam tandem - tranare universam: - Ovuli pel-
liculas - tandem pertundere: - & succrescen-
tibus acinulis, - massam illam formare orbi-
cularem, quam a figura placentulam vocitant. Non
dicam, longe aliam motus vim in venæ
præsertim umbilicalis radiculis, in quibus & exi-
guum, & huic negotio adversantem motum, idest
truncum versus agnoscimus, longe aliam in iis
omnibus radiculis firmitudinem, summum deni-
que ingenium requiri, ut pertundere ovi tuni-
cas, & certæ figuræ, structuræque organum,
placentam videlicet, efformare valeant. Non di-
cam, eas quas in incubatis ovis habemus, obser-
vationes; eosque vel minimos Embryones quos
a Cel. Anatomicis Ruyschio, Littrio, Bidloo
visos tu ipse exhibes, *fluitantes* per medium col-
liquamentum extremas vasorum radículas non osten-
dere. Hoc unum dicam: si postremum Graa-
fii Caput non omisisses; vel ex ejus embryo-
num cuniculorum Figuris, vel ex eo quod tra-
dit, nondum embryo, sed nubecula tantum
apparente, jam tum placentarum primordia se
se observasse, te longe veriora hac de re tuis
Lectoribus propositurum fuisse. Ex eodem
quoque Graafii Capite intelligi potuisset, non
modo falsum esse id quod porro censet Drelin-
curtius, ovum a semine ineuntis masculi in
utero deprehensum fecundum fieri, cum ova
in cuniculis non nisi tertio ab initu die in
uterum deducantur, sed præterea minime a te
esse, ut in subjecta Notula existimas, *demonstra-
tum*: semen ipsum in uteri tubas ascendere; imo
ad usque ovaria excurrere, pro ovorum inibi
contentorum fecundatione. Qua enim, obsecro,
ratione primum demonstrasti? Ex observatione,
inquis, Præcl. Ruyschii; qui videlicet in il-
la Adultera Tubas vidit refertas *semine albo*,
& bene cocto, aut saltem substantia, quæ se-
mini virili ad colorem & visum similis erat.
Vides ipsum Præstantissimum Observatorem du-
bitantem; & tu nihilominus demonstrasse te,
dicis. At verum semen id fuerit; num propte-
rea in omnibus fecundis initibus idem contin-
gat, necesse est? Graafius certe in eodem Capi-
te negat, a cornibus uteri in cuniculorum Tu-
bas vel flatum ipsum, penetrare propter la-
xas quasdam fimbrias instar valvulæ intestini
Coli concidentes. Verum hoc etiam in
XIV. Capite docuerat: Reperiuntur, inquit,
animalia quæ in Tubarum principio quasi
valvulam obtinent, - quæ impedit, quominus
in Uterum injecta ejus Tubas subire possint, in
cuniculis enim eodem propemodum modo se se

habet, ut valvula Coli; non aliter ac si tuba
laxo principio in Uteri cornu propenderet;
ex quibus etiam Nobilissimi Anatomici locis sa-
tis nimirum intelligi potest, quod sit, & quid
sit ea pro qua alibi jure propugnativimus, Val-
vula Bauhini. Sed hoc obiter. In postremo au-
tem illo Capite hæc præterea observavit Graa-
fius: ex cuniculis unam in coitu, quo fecunda
reddita est, omnem crassiorem masculini seminis
portionem remisisse: ad hæc, dimidia hora post
(cuniculorum) coitum - Testiculorum Ova - for-
san paucillulum immutari; at certe sex circiter
horis post coitum - Ovorum folliculos ad rubedi-
nem vergere; - viginti autem & quatuor horis
post coitum multo evidentiora in eisdem ovis in-
dicia esse, vim qua fecunda fiunt (quæcun-
que ea tandem sit, & quacunque eodem pertin-
gat via) ad eadem pervenisse. Quorsum hæc?
inquires. Eo nimirum, ut constet, ovorum in
ovariis contentorum fecundationem haberi, quam-
vis semen, semen, inquam, ipsum in uteri tubas
non ascendat; quo primum convellitur eorum
quæ demonstrasse te, dicebas; imo quamvis (id
quod ex iisdem observationibus consequitur) præ-
dictum semen ad usque ovaria non excurrat, quo
alterum concidit eorum quæ demonstrata a te pu-
tabas per conceptiones scilicet in ipsis ovariiis fa-
mineis sapius advenientes. Nimirum damus ul-
tro, atque concedimus, ova in ipsis cunicu-
lorum ovariiis fecunda fieri; Hinc autem demon-
strari, semen ipsum in tubas ascendere, & ad
ovaria usque excurrere, hoc vero est quod ne-
gamus. At quid igitur, inquires, & qua via,
nisi ipsum semen, & per ipsas quidam Tubas
eodem pervenit? quasi vero aut Borelli, &
Bohnii, aut Stenonis potius, Bartholini, Fantoni
hac de re sententiæ essent ignotæ; vel si quis for-
te has minus probaret, is potius quam novam
excogitare explicationem, eas prorsus negligere
quas attulimus, imo alias præterea observationes
deberet. Fac enim, priores illas non obstare;
fac, semen ipsum per ipsas cuniculorum tubas
ascendere posse; quæ, obsecro, per tubas ad ova-
ria excurrat, si cum ova in hisce fecunda fiunt,
Tubæ nondum ipsis admotæ sunt? siquidem non
ante elapsas, viginti septem horas post coitum -
Oviductus extremitatem instar infundibuli Testes
undique amplecti, ut in eodem habemus Capite,
observavit Graafius, videlicet ut ova excipere,
non autem, ut advecto semine fecunda facere pos-
sit, ut quæ jam brevi a coitu fecunditatis indi-
cia, velut ante diximus, aperta ostendunt.

Adv. III.
Anim. 12.

ANIMADVERSIO XLVI.

Gitur præstitisset, ut illa quidem Notula, vel
illis potius demonstrationibus omisissis, alia Dre-
lincurtii loca notasses, velut ubi Foetus sangui-
nem, scribit, *unis pulmonibus exceptis*, ab
arteriis ferri singulis in partium porulos; quasi
vero aut bronchialis arteria nulla esset; aut;
quod infra videtur credere; quidquid sanguinis in
arteriam pulmonarem ingreditur, per canaliculum
arteriosum in aortam citra venæ pulmonaris
usum traduceretur: vel ubi sanguinem per um-
bilicalem venam in medias jecoris portas adactum -
jecur intimum neutiquam subire, diserte docet;
canaliculi autem venosi nomine quo eum tubu-
lum Anatomici designare nunc solent qui magnam
quidem illius sanguinis partem recta extra he-
par traducit, Foramen Ovale ipse intelligit eo
magis, apud Tirones præsertim, perplexe atque
obscuræ, quod nihil tu in tota ista Tractatio-
ne, imo in toto Theatro scribis de illo hepa-
tis venoso tubulo foetuum peculiari: vel rursus
ubi celebri *lymphaticum laticem in nares*, & os de-
pluere: vel denique ubi humorem in quo foetus
innatat, hujus esse incrementis proportionem ana-
logum, scribit. Equidem non ignoro, cum non-
nulla

117.

118

118.

120.

124. nulla eorum quæ supra notavimus, tum hoc ipsum maxime ita declinari posse ab iis qui Drelincurtium forte sectarentur, ut cum ipso dicerent, hominum primordia *multum abludere a brutorum animantium primordiis*, de quarum propterea exortu ille *alterum Systema* meditabatur. Veruntamen ut hic non disquiram, num recte dicerent; tibi certe non integrum est ea dicere; hoc autem maxime quod postremo notavimus, vereor ut satis commode vel illi ipsi tutari possent. Nam quod crescente fœtu crescere proportionem is qui circumfunditur, Amnii humor idcirco debeat, ut (quod innuit Drelincurtius) *citra noxam - maternam sese huc, & illuc libere convertere* fœtus possit; hæc certe causa etiam cuniculorum ex. gr. fœtibus communis esset; attamen hi maxime aucti, ita paucis, proportionem spectata, Amnii humore circumfunduntur, ut Graafius in sæpius laudato Capite, eoque præterea quod hoc antecedit, testetur, se nihil ejusdem per eos dies in cuniculorum brevi pariendorum amniis comperisse. Porro iis quæ de causa Partus a Drelincurtio tradita sunt, etsi ea valde infirmavit Doctissimus Amicus noster Fantonus; tu nullam tamen apponis Notulam, nisi eam in qua indicas, „ quæ haberes dicenda „ super Systemate Præcl. Auctoris de Conceptio- „ ne, fœtus nutritione, atque partu, - ea omnia „ ad finem usque Dissertationum ejusdem „ pro totius historiæ fœtus complemento a te „ rejici. „ Verum cum ibi plurima desiderantur; tum certe nihil habetur de Partu, nihil de iis quæ a nobis hactenus in Drelincurtii Opu- sculis notata sunt, aut protinus etiam notabuntur: quibus quidem ea ipsa quæ tu omisisti, Graafii Capita pariter refragantur. Drelincurtius enim Ovariorum Vesiculas ab Ovis non modo non distinguit; sed contra atque a Graafio observatum esse, in superioribus Animadversionibus indicavimus, ova existimat per communem ovariorum tunicam sibi viam facere, dum eam *incremento suo - diducunt*, tum in *sibi appressas tubarum oras - pelli præsentem vel ipsa Venere, vel ejus saltem aliquo phantasmate*; imo infra etiam id attendendum esse, dicit: *in ipso coitu tubarum fimbrias tendi, ac erigi, - eaque propter satis sic validas fieri pro arte constringendo ovario, suo indeque ovo evellendo, quod ori tubarum patulo vorandum exhibeant*. Denique, ne nimius sim, negat sine ulla hæsitatione, Fœtum *intra uterum fugere*; quando alii, & nominatim Graafius, se observasse semper, testantur, in „ embryonis œsophago, & ventriculo liquorem si- „ milem illi, in quo natabat.

ANIMADVERSIO XLVII.

139. AD ea nunc venio quæ post Drelincurtii Opu- scula adjicis, ubi cum vix tandem aliquando Malpighium nomines seu primum eorum qui in vaccinis uteris sunt, canalium Observatorem, addis, *de eorundem usu omnino siluisse Virum oculatissimum*: Attamen quicumque ejus ad Sponium Dissertationem in qua illa primum vasa descripsit, totam legerit, quid de eorum pariter usu, & diserte quidem, neque ita perpauca verbis docuerit, ignorare certe non potest. Quo minus miror, quod horum vasorum occasione cum Clarissimorum Hominum Ruyschii, & Vieussenii Vermiculares, & Lymphatico - lacteos ductus memores; eos præterea singulares ductus quorum *unum utrinque prope tubarum aperturam in cavitate uteri interdum invenisse* se, scribit Solertissimus Fantonus, indicare non memineris, vel quod dum sanguinis circuitum inter matrem, & fœtum, & *vice-versa, abunde manifestare* cupis, præclaram illam omittas Cl. Meryi observationem quam Eruditissimi quoque Lipliensium Actorum Scriptores ut ad eam rem

singulariter confirmandam aptissimam; his verbis laudarunt, & in illa Acta retulerunt: „ Circulum sanguinis matrem atque fœtum me- „ dio placenta uterinæ intercedere, Mery singu- „ lari confirmat exemplo mulieris alicujus ultimo „ mense gravidæ, infelici lapsu subito enectæ, ac „ in dissectione abdominis cavitatem sanguine tur- „ gidam, ediverfo cuncta vasa sanguifera, tum pro- „ pria, tum fœtus una mortui, prorsus vacua „ exhibentis, cum placenta nihilominus uteri- „ na matrici etiamnum integra sine ulla sangui- „ nis extravasatione adhæresceret. „ Illud contra a te egregie præstitum est, ut fœcunda jam facta muliebria Ova nonnunquam intra ipsa Ovaria retenta, nonnunquam ex hisce in ventris caveam delapsa, nonnunquam in Tubis remorata esse, per collectas plures *Historias*, atque in tres quasi Classes ex ordine distributas ostenderes. Hoc unum tamen desiderari in iisdem potest, ut omnes pari diligentia conscriptæ essent. Exempli enim gratia quæ in secunda Classe tertio postremoque loco proposita est, eam si quemadmodum par erat, ex descriptione potius Chirurgi Peritissimi P. B. Calvi qui videlicet ejus mulieris dissectionem, fœtusque extractionem instituit, quam ex litteris Cl. Animadversionum Auctoris exhibuisses; næ illam multo accuratius traditam heberemus. Nam ut cætera prætermittam; quod plerique eorum qui istas reliquas *Historias* scripsere, sibi negligendum non putarunt, & quod Calvus ipse (quantum ex ea Epistola intelligo quam ad Experientissimum Anellium dedit, & ex iis quæ, eodem Calvo communicante, edidit Eximius Vir Fontenellius; nam aliam Calvi descriptionem nondum vidi) & quod, inquam, Calvus ipse non omisit, scilicet ut quomodo Uterus, Tubæque se haberent, & de Fœtus involucro quæ poterant, dicerent, Nolter usque adeo parvipendit, ut Tubas, vel Uterum ne memoret quidem, neque ex tota ejus descriptione id saltem, an membrana de qua dicit, Fœtum circumdedit videretur, & an Tubas, Uterumque contingeret, intelligere queamus. Et tamen hæc ita ad rem tuam, Vir Cl. pertinebant, ut eam ob causam dubitaturus fortasse esses, Historiamne istam in secundam, an in tertiam Classem referres; qui enim Fœtus in cavea ipsa ventris ex minus accurata ista descriptione videtur fuisse, ille idem a Cel. Fontenellio intra saccum, ex impense dilatata dextræ Tubæ exteriori membrana efformatum, conclusus fuisse dicitur. Eam quoque Historiam quam secundo loco in tertia Classe reponis, valde miror cur sine ulla dubitatione non modo eo retuleris, sed ad tuum institutum pertinere, judicaveris, cum videlicet non ignorares, imo ipse in Bibliotheca Anatomica, nulla adjecta responsione; quæ non facilis sane est; Mauricæi locum protulisses in quo diversa penitus & descriptione, & Figura producta, se ipsum, testatur, longe aliud in ea ipsa Historia observasse, atque Vassallus, & qui Vassallo credidit, Graafius tradidere; scilicet Fœtum non in Tuba, sed *in ipsius Uteri herniæ specie relaxati angulo* conceptum fuisse, quoniam sacculo in quo Fœtus creverat, Teres Uteri Ligamentum in ipso medio affigebatur; quod sane Ligamentum Utero, non autem Tubæ affigi, manifestum est.

ANIMADVERSIO XLVIII.

Q Uod superest; etsi in septem quæ adjectæ sunt, Tabulis, earumque Explicationibus describendis non majorem sane quam in superioribus diligentiam præstitam video; tamen de plurimis perpauca tantum loca notabo. Et primum in Tabulæ LXXVII. Explicatione eo minus probandum est quod additum animadverto: per illam *Fœtus in Utero situm natura-*

142.

Suite de
la N. Me-
thod.
Histoire
del'Acad.
R. des Sc.
A. 1714.

Ibid.

143.

Tom. I.
Part. I.

159.

turalem ostendi, quando ad litteras M. & P. cum Bidloo agnoscitur, *hic Manus insolite pedibus adjungi*, & Pedes ipsos *sapissime* alium situm obtinere. In Tabulæ autem LXXX.

Figura 1. explicanda cum Bidlous per litt. B. indicari Vinculum Umbilicale, rectissime dixerit; cur, quæso, ita istic ejus verba dividuntur, ac permiscuntur, ut per eandem litteram ipsius Vinculi Umbilicalis, *initium*, quod tribus digitis transversis, ad litteram videlicet O, altius occurrit, his qui ipsum non consulant, perperam ostendisse videatur. Nec magis intelligo quare in subjecta 2. Figura Umbilicalia Vasa, Vena videlicet C. & multo magis Arteriæ BB. majore admodum quam in archetypo Kerckringii, ex quo descriptæ dicuntur, crassitudine proponantur.

Sed ut ad Bidloun redeamus; hic certe in Figuræ 1. Tabulæ LXXXI. Explicatione Arterias easdem GG. *juxta Vesicæ Urinariæ latera ascendentes* recte dixerat, quæ istic haud recte dicuntur *per Vesicæ latera utrinque ad suas origines progredientes*; ad umbilicum enim, non vero eo unde veniunt, ad suas videlicet origines progrediuntur. In eadem quoque Tabula quis, ob-

fecro, Figuræ a maximam partem DD. intelliget, aut quis potius alia omnia non putabit, nisi per eas litteras, in Bidloi quidem Opere, non vero istic explicatas, non canalem aliquem, aut membranam, sed Chartam significari constet circum quam sit portio Membranae Chorii circumvoluta. In proximæ autem Figuræ 5. Explicatione eo minus miror, ad litteram B. Arterias Umbilicales indicantem, Auctoris ejusdem verba prætermitti: *quarum una circumvoluta Nodum mentitur*; quod de Nodis in funiculo umbilicali satis interdum conspicuis cum quid non sint, aut quid non portendant, Drelincurtius a te supra productus indicaverit, tu quid vere sint, & an ullum habeant usum, in toto isto Capite non docuisti. Atque utinam id unum in ista Tractatione tua de Conceptione, Fœtus efformatione, nutritione, accretione, & partu prætermisisset. Sed cum ubi duo illa Graafii Capita omisisti, te de hisce rebus *abunde* hoc Capite acturum esse, spononderis, cumque iterum in quadam tua ad Drelincurtium Notula, quæ præterea de iisdem haberes dicenda, *ea omnia ad finem usque Dissertatiuncularum ipsius - pro totius historiæ fœtus complemento rejicere te*, scripseris, neque tamen multa ad eandem historiam pertinentia, hætenus a te proposita viderimus; necesse profecto est, ut aut eadem prorsus omiseris, aut in eam quæ una superest, Tabulæ LXXXII. explicationem conjeceris: quam propterea igitur tanto diligentius expendamus.

ANIMADVERSIO XLIX.

Solent Anatomici etiam ii qui ingentia Volumina non conscribunt, in Fœtus historia traenda, quæ discrimina inter fœtum, adultumque intercedant, diligenter exponere; atque adeo vel Bidlous qui per solas Tabularum Explicationes de tota Anatomica Re scripsit, non id sibi prorsus omittendum existimavit, velut iis qui Tabulæ istius Explicationem apud ipsum potius, quam apud te legent, manifestum fiet. Verum ut longe aliud tuum est, quam Bidloi institutum, ita longe major in ea re a te diligentia expectabatur. Nam quod ille quæ pertinent ad peculiare in Fœtu sanguinis vias, prætermiserit, grave est; quod tu idem feceris, gravissimum. At ego, inquis, *canalis Ovalis, ac tubuli arteriosi explicationem ad caput de corde rejeci*. Tubuli autem insignis illius venosi inter Sinum Venæ Portæ & Cavam intra hepar Fœtus aperti quonam, obsecro, descriptionem, quonam saltem de-

lineationem rejecisti? Quinimo Tubulum ipsum arteriosum, cujus explicationem ad caput de corde rejicis, in quam, quæso, tuarum Tabularum ostendis? Sed in iis ipsis perpauca quæ in Explicatione istius Tabulæ attingis, vide, obsecro, mecum, Vir Cl. quam jure possint desiderari. *Arteriæ*, inquis, *Umbilicales D, versus Iliacos ramos internos tendentes*. Mitto id quod supra innui, eas Arterias ad umbilicum, non ad ramos Iliacos tendere, quibus Bidlous, hunc declinans errorem, *continuas* tantum esse, dixit. Hoc unum quæro, unde istæ Arteriæ originem petant? Ab *Arteriarum*, inquis, *Iliacarum ramis internis*. Quid ergo? Prorsusne errasse Graafium in XV. quod tu omisisti, Capite, censebimus, & ante ipsum, Needhamium, qui ab *Aortæ extremitate* oriri, docuerunt? Nos certe ipsi non modo in vaccarum, canum, felium, ut nunc quidem meminimus, semper; verum etiam in nostri generis de quibus hic loquimur, Fœtibus haud semel id ipsum observavimus, ac præterea animadvertimus, qua ratione qui Arteriarum earundem originem in corporibus infantum, adutorumque perquireret, hallucinari facile posset, ita videlicet hic mutata cum influxu sanguinis directione, ac crassitudinis arteriarum proportionem, ut Umbilicales Arteriæ quæ in fœtu originem Iliacis Arteriis præbebant, postea ab Iliacis habere originem ipsæ videantur. Attamen in nonnullis etiam dissectis a nobis humanis Fœtibus illas Arterias ab Iliacis ortas videmur meminisse; ut propterea Nobilibus Anatomicis Kerckringio, & Munickio minus difficile assentiamur, qui *Arterias Umbilicales non uno semper exoriri loco, & variare hic subinde naturam*, docuere. Tu autem non modo hanc varietatem non memoras; sed in Figura 2. ut tuus Scalptor litteram D. alterius earum Arteriarum indicem Venæ fortasse Umbilicali, certe non ei cui Bidlous imposuit, vasi inscripsit, sic tui, opinor, Amanuenses in ejusdem Figuræ Explicatione non minus Lectores, quam Bidloi, qui talia nequaquam scripsit, sententiam implicant. Cum enim agnoscant *Aortæ bifurcationem* ad litteram F; Ramos tamen G, valde infra eum locum ex Aortæ Ramis orientes, ex *Aortæ bifurcatione* prodire, docent.

ANIMADVERSIO L.

Sed ad prioris Figuræ Explicationem redeamus, in qua Capitis quidem magnitudinem Fœtus peculiarem indicas; sed contenti Cerebri molliem, & humiditatem haud minus insignem omittis. In Thorace quoque, & imo Ventre de eo quem Verheyenius præsertim descripsit, humore files. Renalium autem Glandularum, sive Renum, ut vocitant, Succenturiatorum, magnitudinem recte adnotas; sed minime indicas, easdem in ista Figura ab naturali in Fœtibus sede, aut certe ab ea quam Verheyenius descripsit, ac pinxit, esse remotas: quam quidem, etsi ille dubitat, an perpetua sit; sane frequentem admodum esse oportet, cum ego quoque in iis saltem omnibus quos postremis hisce annis secui, Fœtibus eandem observaverim, sic ut illarum Glandularum, & subnexorum Renum unum atque idem primo aspectu corpus esse videretur. In iisdem tamen Fœtibus sæpius tenuium Intestinarum contenta inveni tincta bilis flavedine, quod ille se negat observasse; qui præterea in Hymene, & quibusdam aliis rebus hic labitur, ut in eo insuper quod Vermiformis Appendiculæ majorem pro rata portione in Fœtu longitudinem omittat, ac pinguedinis divulsam, & minus mollem, minusque oleosam substantiam, atque alia quæ tu quidem etiam, sed cum multo præterea pluribus discriminibus prætermittis, quæ ut ego omnia non enu-

Anatom.
hum. cor-
por. Tab.
19.

162

162.

Ibid. Ta-
bul. 62.

Ibid. Tab.
61. F. 2.

163

110.

73

123

163.

De Arte-
riarum
Umbilica-
lium origi-
ne.
De form.
fœt. c. 4.

Spicil.
Anatom.
Obs. 9.
Anatom.

De nonnul-
lis inter
Fœtum, &
adultum
discrimi-
nibus.

l. 2. tr. 5.
cap. 21.
Tab. 6.
Fig.

Ibid. Tab.
63.

158.

enumerem, qualia tamen sint, ex ejusdem Verheyenii, Bartholini, Riolani, aliorumque Anatomicorum lectione colligi potest. Illud verum est, quæ discrimina in ossibus consistunt, ea te in Libro I. satis indicavisse, ubi id non modo, verum etiam, quo passu in ipsis Ossibus efformantur, dis, ac solidandis, a primis Fœtus in utero materno rudimentis Natura procedat, conspicient, dum, exhibuisti. At si hoc de ossibus tibi faciendum vel eo in loco existimasti; cur isto in Capite in quo de Fœtus efformatione, & accretione scribis, de multo nobilioribus Partibus id ipsum non facis, præsertim cum Hippocrates, Fabricius, Harveus, Malpighius non difficilem obscurissimæ alioqui rei vestigandæ methodum in ovi incubati *successivis* observationibus indicaverint, atque adeo quid in ipsis Cuniculorum Em-

bryonibus, pluribus ex ordine habitis inspectionibus, observatum sit, Graafius in postremo illo a te omisso Capite tradiderit. Verum hæc, atque alia, quæ partim supra attigimus, partim brevitate causa reticemus, sive ad Ovaria, atque Ova, sive ad gravidum Uterum, sive ad Embryonem, ac Fœtum spectantia, imo ad hujus anatomicam historiam absolvendam prorsus necessaria, ob eam, credo, causam prætermisisti, quod satis spatii in hoc II. Libro non haberes? Scilicet quo in Libro tantum tibi spatii superfuit, ut esset quod illis etiam adversus nos scriptis Animadversionibus assignares, in eo nihil fuit quod ejusmodi utilissimis gravissimisque observationibus tribueres. Verum enimvero hæc mittamus, & ad Librum III. quem de Medio Ventre, seu Thorace inscribis, transeamus.

Adversariorum Anatomicorum IV. Finis.



FIGURARUM EXPLICATIO.

FIGURA I. pertinet ad III. Animadversionem,



Epresentat ultimam, idest Vesicæ proximam, Urethræ Virilis partem, antè secundum longitudinem apertam, atque diductam, & in ea Carunculam Seminalem quam Caput Gallinaceum vocitant. In hac autem Caruncu-

la præter duo lateralia foraminula per quæ semen emittitur, jam diu nota, Tertium atque Intermedium a nobis inventum, paulo infra, velut erat in hoc cadavere, occurrit, & quidem ex amplioribus.

Præter * qua indicatur locus ad quem usque immissum per Tertium Foramen specillum pertingebat, nullam aliam notam aut characterem huic Figuræ inscripsimus, ne res quarum dumtaxat gratia eandem Figuram paravimus, ex his quæ modo dicta sunt, satis perspicuas, appositis litteris obscuraremus.

FIGURA II. eodem spectans, Easdem quas prior Figura, Partes exhibet, nisi quod duobus lateralibus Foraminulis tenuissima specillorum extrema sunt indita; per Intermedium autem producta sursum secundum longitudinem sectio est, ut peculiaris Sinus intra Carunculam Seminalem excavatus, in quem id Foramen aditum præbet, magna ex parte in conspectum veniret. Litteras autem ob eandem quam modo indicavimus, causam inscribere nolimus.

Figuræ duæ reliquæ etsi ad proxima V. Adversaria pertinent; tamen quoniam in hanc Tabulam sunt conjectæ, hic explicabuntur.

FIGURA III. ad Animadversiones spectans IV. V. VI. VII. VIII. Adversariorum V. Sectionem Mammæ per Papillæ centrum bifariam ad perpendiculum divisæ repræsentat.

A. Papilla.

B. B. Areolæ termini.

c. c. Tria ex Areolæ Tuberculis; tot enim in hac Sectione fere bifariam secari posse contigit, ut potissima eorum structura pars, quantum in ejusmodi re licuit, subindicaretur: quæ videlicet non ex globulis quibusdam adiposis, sed ex ductibus lactiferis ibi dilatatis, moxque in excretorium osculum contractis, & ex Mammæ tegumentis constant.

d. d. Mammæ Tegumenta.

e. e. e. e. Pinguedinis stratum superius, sive exterius.

f. f. f. ejusdem stratum inferius, sive interius.

G. Mammæ Glandula, inter utrumque Pinguedinis stratum locata, peripheria inæquali, non tamen in sejunctas, minutas, subrotundas glandulas dispersita, sed in corpus unicum magnumque compacta; in cujus mediis & penitioribus partibus nulla vidimus notabilia intervalla pinguedine repleta in Mammis saltem quarum structura satis explicata, atque adeo perfecta esset de quibus (ut par erat) in IV. & V. Animadversione verba fecimus; neque enim negamus, in Virginum ac Mulierum quæ non lactaverint, aliisque ejusmodi Mammis multo altius, atque penitius adiposi utriusque strati lacinias notabiles intra glandulam se se immittere. In ipsa autem Glandula sectione nullas vel tenuissimas lineolas adumbrari voluimus, ut melius ipsa a circumpositis Pinguedinis Stratis distingueretur.

b. b. b. Ductus Lactiferi majores, velut in hac Sectione apparebant, a Glandula ad Papillam contendentes.

i. i. i. Ductus alii Lactiferi minores ad Areolæ Tubercula pergentes.

FIGURA IV. pertinet ad Animadversionem XVI. Adversariorum V.

Exhibet Venæ Pulmonaris a corde amputatæ parietem dexterum explicatum, & ab interna parte aspectum, ut quomodo in adultis Valvula Foraminis Ovalis, in Fœtu olim aperti, se habere frequentius soleat, conspiciatur.

a. Interceptam extremis linearum punctis eam partem Valvulæ designat quæ Foramen Ovale occludens, ita unum cum reliqua Venæ superficie planum efficit, ut nisi Foramen a retroposito lumine pelluceret, ubinam fuisset, ab hoc quidem latere intelligi non posset.

b. Interceptam pariter extremis linearum punctis indicat reliquam Valvulæ partem, multo crassior, firmiorem, longioremque in adulto factam, neque tamen Venæ superficiei adhærentem, sed quandam Sacculum efformantem.

c. Sacculi ejusdem orificium.

d. Breve specillum orificio ipsius Sacculi inditum, & hujus totum illum qui a Valvula efficitur, parietem elevans, ut ejusdem Sacculi magnitudo, & figura sic possint quadantenus intelligi.

e. Locus ad quem in adultis quibusdam aliquam adhuc per Foramen Ovale in Sacculum relinqui sanguini viam perexiguam pluries vidimus, nonnunc etiam ampliorem.

F I N I S.

J O. B A P T I S T Æ
M O R G A G N I
A D V E R S A R I A
A N A T O M I C A Q U I N T A.

*Observationes complectuntur distributas in L. ANIMADVERSIONES ad
Librum III. THEATRI ANATOMICI Cl. V. Jo. Jacobi MANGETI
Sereniss. Regis Prussiae Archiatri.*

ACCESSERUNT CELEBERRIMI, ATQUE AMPLISSIMI VIRI

J O A N N I S M A R I Æ
L A N C I S I I

INTIMI CUBICULARII, ET ARCHIATRI PONTIFICII

Differtationes Duæ Anatomico-Medicæ nuper ad Auctorem scriptæ

ALTERA DE VENA SINE PARI;

ALTERA DE GANGLIIS NERVORUM.



V E N E T I I S,

M D C C L X I I.

~~~~~

EX TYPOGRAPHIA REMONDINIANA.

*SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.*




THE  
MORRIS  
ALFRED  
MUNICIPALITY

THE MORRIS ALFRED MUNICIPALITY  
OF THE CITY OF MORRIS ALFRED  
MUNICIPALITY

THE MORRIS ALFRED MUNICIPALITY  
OF THE CITY OF MORRIS ALFRED  
MUNICIPALITY

THE MORRIS ALFRED MUNICIPALITY  
OF THE CITY OF MORRIS ALFRED  
MUNICIPALITY



THE MORRIS ALFRED MUNICIPALITY  
OF THE CITY OF MORRIS ALFRED  
MUNICIPALITY




ILLUSTRISSIMO, ET REVERENDISSIMO PRÆSULI

D. D.

J O A N N I M A R I Æ  
L A N C I S I O

Intimo Cubiculario, & Archiatro Pontificio

*Joannes Baptista Morgagnus S. P. D.*



UM multa, ac magna debeam Viro Præcl. Humanissimoque Hippolyto Francisco Albertino, Bononiensi Medico Præstantissimo, tum illud in primis debeo, quod meis ad Te missis Adversariis Primis, Tuam mihi, VIR SUMME, gratiam, & benevolentiam ante hos duodecim annos conciliavit. Ex eo namque tempore ad hunc usque diem hominem quem de facie nunquam nosti, tot, tantisque Beneficiis complexus es, ut cum ipsa nec satis explicare dicendo, nec percensere numerando ullo pacto possim, ad hunc saltem modum eorum numerum, magnitudinemque significare consueverim, ut negem, plura, aut majora conferri in filium a parente etiam amantissimo potuisse. Quod si Tuas inter eximias, atque a Tanto PONTIFICE spectatas, probatasque Virtutes, quibus non minus sane quam Scientia, Exercitatione, Auctoritate, Muneris Præstantia longe hoc tempore antecellis, ea quoque animi magnitudo non esset, qua in benefaciendo nihil aliud nisi facti pulchritudinem spectas, & in ipsa recte factorum conscientia satis magnum eorum




rum fructum esse positum, judicas; multo mihi esset gravissimum Tua in me tot, ac tanta Promerita sustinere, qui non modo ad hoc usque tempus nihil Tibi iis, aut Te, SUMME VIR, dignum retulerim, verum etiam nihil unquam ejusmodi referri a me posse, confitear. Nam quod mea hæc Quinta Adversaria in Tuo Illustri Nomine apparere velim, non eo sane facio quod Te digna esse, existimem. Quinimo ultro testor, ac moneo, ne forte in Præcordiorum Anatomie, in qua videlicet, ut servatus a me ordo postulat, magna hujus libri pars versatur, præclarum aliquid a me expectes; ut qui in illis perlustrandis etsi aliquam interdum operam posui, nunquam tamen quantam in plerisque aliis Partibus collocavi propterea quod ab eo usque tempore cum primum his studiis me dedi, Te illam tibi spartam, quam non sine magno Rei Anatomicae, & Medicæ emolumento ornares, selegisse, Librosque propterea Tuos de Corde, & Aneurysmatibus avidissime, & summa quadam atque incredibili cum spe jam tum ab omnibus expectari, cognoveram. Quamobrem explicare verbis non possum, quanta me lætitia perfuderis, cum in litteris quas ad me superiore anno VI. Kal. Jul. dedisti, pollicitus es, Te *uberrimam de motu cordis materiam quam primum in synopsis contracturum, contractamque ad me missurum*. Etenim vel ex ea Dissertatione quam *de Structura Usuque Gangliorum* illis cum litteris absolutam, præclarisque Tabulis Anatomicis ornatam misisti, ut ex ea etiam quam *de Vena sine pari* ante miseris, proclive mihi est vera conjectura prospicere, quam multa, quam nova, quam pulchra, quam utilia in copiosa illa, atque a Te diu, multumque tractata materia excogitare, invenire, illustrare, patefacere Tuo isto acerrimo, & excellenti ingenio, summo conjuncto cum judicio, industriaque, potueris. Quod & ab omnibus intelligetur qui duas illas luculentas sane doctissimasque Dissertationes perlegerint. Has enim non solum ob materiæ conjunctionem, atque utilitatem una cum his Adversariis edo, verum etiam, ob idque potissimum, ut aliquid, si minus de meo, at certe de Tuo, VIR SUMME, in hoc libro extet dignum quod Tuo Celeberrimo Nomini inscribatur. Quas ad causas cum illa insuper accedat quod anno superiore, publice atque adeo audiente Senatore Amplissimo, Benignissimoque FRANCISCO GARZONIO, PETRI Historici, & Senatoris Gravissimi Filio, Inclytæ hujus Civitatis Præfecto, & Proprætore Spectatissimo, cum de Corde, Vasisque Sanguiferis dicerem, illas me Dissertationes vulgaturum, promiserim; sperans videlicet, me id facturum esse non modo Te annuente; quod pro Tua erga me Benevolentia concessisti; verum etiam Te laudes quasdam mea parvitate longe majores, & nimis invidiosa Tuæ potius de me spei & voluntatis, quam opinionis & judicii testimonia ex illis Dissertationibus detrahente; quod contra pro Tua in me ornando eximia & prope infinita Liberalitate præcise negavisti; cum igitur ad illas priores ea causa accedat, haud sane crediderim, quenquam hominem æquum fore qui me propterea quia talia ipse de me emisserim, reprehendat, præsertim ubi Epistolas utrique Dissertationi interjectas legerit. Omnes potius magnam mihi gratiam quod ejusmodi præclaras Dissertationes ediderim, habituros, atque etiam (ut illuc unde incepit, hæc denique revertatur epistola) quam nullos, dum mihi faves, Benignitati Tuæ fines terminosque constituas, magna cum Tuæ tum Liberalitatis, tum Modestiae admiratione, agnituros confido. Tu interim, VIR SUMME, synopsis Tuam cujus jam diutius desiderium ferre non possum, fac absolvas, & quid de hisce Adversariis visum fuerit, rescribas: quæ si Tu forte non improbaveris; *perinde ac si omnium gentium hominibus ipsa ostendissem*, videbor mihi (quod in Harmonide, ut probe nosti, excellentem, & prope divinum quendam Virum, Tuique simillimum designans, inquit Lucianus) *in uno calculo cunctos affecutus*. Vale.


D. Patavii Postridie Nonas Februar. MDCCXIX.




1872-1873






















# JO. BAPTISTÆ MORGAGNI ADVERSARIA ANATOMICA Q U I N T A

A D V. C L.

## JO. JACOBUM MANGETUM

*M. D. & Sereniss. Regis Prussiae Archiatrum.*

### ANIMADVERSI O I.

De Morb.  
Artif. cap.  
20. vel  
potius 19.



TOM. II.  
pag.  
164

De Oecon.  
Anim.  
Exerc. 2.  
Art. 9. 11.

Um diebus superioribus quidquid de Nutricum Morbis Ramazzinus noster scripsit, forte perlegerem, in ea loca incidi, in quibus Cl. Viri Caspari Bartholini, Thomæ Filii, de Mammis & Lact. Dissertationem commendat. Hæsi primum, miratusque sum, illud Bartholini Scriptum meos oculos, atque adeo aures tamdiu fugere potuisse; mox autem quæ ex eodem profert Ramazzinus, cum diligentius attenderem, facile intellexi, tuam istam, Mangete Ornatissime, unde Librum III. incipis, de Mammis, & Lactis Secretione dissertationem, ut fuerat a te in Bibliotheca Anatomica Tractatui Bartholini de Diaphragmate subjecta, & quasi continuata, ita a Viro, cæteroqui eruditissimo, ejusdem Auctoris creditam esse. Et quamvis ille huic ipsi Dissertationi subinde refragetur, Hippocratis, Herodoti, & quemadmodum animadverti, etiam Charletoni, qui eosdem laudavit Auctores, verba & rationes quasdam secutus; ego tamen (quod salva nostra haud minore in mortui memoriam, quam erga viventem, observantia dixisse liceat) ut quod de Recentiorum Anatomicorum studiis ipsi quondam exciderat, ita quod de tuis protulit super lactis secretionem cogitatis, judicium facile, & undequaque non sequor. Quanquam tuæ istius Dissertationis pars sane dignior ac melior haud in iis cogitatis, sed in observationibus, & experimentis consistit, per quæ pluries, accurateque instituta caprinorum uberum anatomen, eorumque vasorum usus patefacis. Illud unum optandum erat, ut quæ primum ob muliebrium cadaverum defectum de humanarum mammarum anatome partim attingere non potueras, partim in medio reliqueras, ea nunc demum Dissertationi insereres, & sic rem totam perfectam, absolutamque relinqueres. Quod si per occupationes tuas gravissimas tantum tibi sumere laboris non poteras; at, quod pro tua Humanitate fecisti, ut de meis in Areola observationibus infra videndis Lectorem moneres, id vero omnino de pluribus Nuckii inventis supra in Libro I. exhibitis faciendum fuerat. Quod enim scribis: „Papillas, penis glandi, ut „quibusdam Anatomicis placet, respondere, unde „erigi, atque flaccescere possint ex contactu & „suctione; „id ille innumeris inter reticulares substantiæ Papillarum fibras interstitiis detectis, in quibus opportune subsistere cruor possit, illorum

*Morgagni Adversaria Anat. V.*

conjecturam in historiam mutavit. Ille quoque lactiferorum Papillæ foraminum tum numerum, tum dispositionem (quibus tu de rebus silueras) perspicue docuit. Ipse etiam ex iis est qui arterias, & venas mammarias, in musculis rectis, cum epigastricis ascendentes non raro multiplici anastomosi uniri, non dubitant: quæ de re tu quidem hæc adhuc scribis: „Inter hosce omnes ramos; scilicet tum mammarios, tum epigastricos, communicationes per anastomoses intercedere pronunciare non dubitat Riolanus; contra quem solidissime disputat Glissonius Tract. de Ventriculo, & Intestinis: „quasi vero in Riolani loco quem profert Glissonius, de Arteriis etiam verba fierent, aut de istis communicationibus per anastomoses, quas Glissonius & diserte confitetur se non negare, & non inutiles esse, docet, adversus Riolanum disputaret, aut denique tu ipse cum Brownio in Libro I. non tradidisses: „anastomoses vasorum Mamillarum externorum, & Epigastricorum internorum, faminas constanter habere. „Quod si dicas, te in producto Dissertationis loco, non inter ea vasa, sed inter mammas, & uterum communicationes per ea vasa improbare voluisse, ego vero voluisse, facile credam, num autem feceris, tu ipse judicabis. Quæ vero de nonnullis eorundem vasorum in capris observasti, pertundere videlicet sternum, & dextra cum sinistris conjungi: ac per arterias injecta in lactiferos ductus transire, & hos inter se communicare; his quidem non absimilia Nuckius in mulieribus adnotavit; at nullam in his cisternam, nullam valvulam, sed contra alia quæ mulieribus peculiaris sunt, vidit. Hic fortasse dices, te in Figuræ demum 7. Tabulæ LXXXIII. Explicatione ad Nuckii Figuras Lectores tuos remisisse. Num vero aut in iis Figuris omnia quæ memoravimus, inspicere, aut quæ inspicere queunt, ea non plenius ex Nuckii descriptione perciperentur, tui ipsius, Vir Cl. judicium esto. Postremo quod ad illud Problema attinet: cur Mamillæ viris datæ sint, etsi ultro concedo, explicatu esse difficillimum, nec Tullianum illum usum, ad quendam ornatum, multoque etiam minus Aristotelicum, & Galenicum, ad cordis præsidium, satisfacere; inquirere tamen fortasse poteras, an veri quidpiam Berengarius, quem nuper Cl. Heisterus secutus est, in medium attulerit, cum ex eo quod contrectata papilla in viris etiam erigatur, his quoque mamillas ceu

*Irritamentum veneris languentis*

K

da-

221.

220

41.

167

169.

220

272.

De Mamillis, & lacte in Virginitatibus, ac Maribus. In Mundin. Comp. Anat. n. 195.



datas esse, existimavit. Vel quoniam huic muneri sola satisfacere papilla potuisset; viris autem præter papillam etiam mammaria secretionis organa tributa esse, non modo ex aliorum lectione, verum ex nostris quoque observationibus nobis constat (in quibus videlicet habemus, non in duabus tantum integerrimo utero, atque hymene Virginibus, sed in Viro etiam quodam habitiore dissecando, veri albiſſimique lactis in earum altera multum, in hoc autem, & altera Virgine guttas tantummodo vidisse, tum ex mamillis recens natorum, nostri etiam sexus, infantum serosi lactis, serive guttulas nostris ipsis manibus, cum id olim mulierculis non crederemus, expressisse, imo eorum nonnullis interdum auxiliari debuisse, in quibus ea a nutricibus vel neglecta, vel intermissa expressione, ita circumquaque non sine dolore mamillæ induruerant, ut oleo anisorum cum amygdalarum dulcium oleo permixto illiniendæ, emolliendæque fuerint) quoniam, inquam, hæc ita se habent, disquirere etiam potuisses, an plus forte quam Amicus noster Doctissimus censet, Cl. Virorum Bohnii, atque Ortlobii sententiæ tribuendum sit, qui eam communem utriusque sexui mamillarum utilitatem assignant, ut Amnii humorem, saltem una cum aliis glandulis, fecernant, & augeant.

## A N I M A D V E R S I O II.

**I**N Tabula LXXXIII. ejusque Explicationibus nihil fortasse eram notaturus, nisi tuus Sculptor in Figura 8. describenda ab nostro archetypo recessisset, eique tu unam ex illis Animadversionibus apposuisſes. De quibus quoniam mihi dicendum est, illud primum ex te quæram, cur nullam Animadversionem cæteris istius Tabulæ Figuris addideris? Nam quod in primæ Explicatione ex Bidloo tradis, Valvulas in vasis lactiferis inveniri, propterea quia, injecto in calefacta Mamæ Papilla spiritu vini - in locis quibusdam - variarum formarum, valvulosæ vasorum relaxatæ membranulæ portiones expullulabant, injectumque liquorem fistebant; nonne id a Nuckio rejectum est, docente: Ductus Lactiferos valvulis esse destitutos, meraque figmenta esse eorum, qui credunt eosdem variis in locis valvulis donatos esse; - quod enim vasculorum dictorum quædam variis in locis angustata & arctiora, liquori injecto quodammodo obſtent; - id a valvulis non dependere, sed substantiæ mammarum adiposæ duriusculæ, quæ Tubuli Galactoferi nimirum aliquando comprimuntur, adscribendum. In Figura etiam 3. vides, Bidloum Areolæ Mammariæ Tuberculis, de quibus postea dicemus, F. infixos pilos appingere; nec tamen admones, me in I. Adversariis de ista ipsa Figura loquentem aperte negasse, id cum meis frequentissimis observationibus consentire: quod quidem ita verum est, ut cum antequam illa Adversaria ederem, & postquam edidi, innumeras non muliebrium modo, sed virilium etiam cadaverum Areolas diligentissime inspexerim, semel tamen, atque iterum tenuissimos, & visum ferme eludentes pilos, semel ex aliquot, alias ex perpaucissimis, cum plurima quidem essent, ejusmodi Tuberculis, & quidem e summa eorum mediaque parte erumpentes videre potuerim. Scire etiam velim, cujus generis eæ glandulæ sint, quæ ad litt. B. & D. in Figura ex eodem Auctore 4. delineantur. Certe ejusmodi glandulæ, Papillæ Vasis interstitiæ ab Solertissimis Anatomicis Nuckio, & Heistero non agnoscuntur. Non difficile esset ostendere in reliquis, etiam Verheyenii, Figuris nonnulla esse quæ Partim Nuckii, partim aliorum sane gravium Anatomicorum auctoritate reprehendi poterant. Quid ergo? Num major illius erat qui Figuram nostram reprehendit, auctoritas? an potius nostræ dumtaxat (nescio qua de causa) Figuræ erant in tuo Theatro redarguendæ? Sed quando eas redar-

gui tibi placuit, ne, quæso, vicissim displiceat, quod nos easdem, imo verum potius tueamur.

## A N I M A D V E R S I O III.

**Q**uod tamen antequam facimus, Lectores rogandi sunt, ut Figuram hanc nostram in Adversariis ipsis inspiciant tum aliis de causis, tum ne forte existiment, eam Nuckii Figuris omnibus, & descriptioni refragari; papillæ enim foramina ego certe non isto quo tua Tabula exhibet, mitto numero, at positu, quasi in parallelas series quatuor distributa, sed ferme in peripheriæ ellipticæ modum delineavi. Verum ut ad ipsam Animadversionem veniamus; *miratur protinus* Cl. Auctor ob eam quæ postea afferetur, causam, Areolæ Glandulas a me sebaceas appellari. Ego vero vicissim non miror, quod, ut tota res ad lancem veritatis præponderet, - præstare ipse credat suas hujus anni super hac re observationes evulgare; neque enim nunc primum animadverti, paucas ipsum, nec satis diu perterritas observationes consuevisse in medium adducere, scilicet ut hæc nostris per plures annos in plurimis cadaveribus iteratis apud æquos, & harum rerum intelligentes homines, si Diis placet, præponderent. Qualescunque tamen sunt, eas candidè examinemus. Inprimis, inquit, quoad tubulos lacteos, aliaque ad mammas & earum usum facientia, veracissimam inveniebamus præ aliis Clariss. Verheyeni descriptionem habitam in *Anatomia sua Corporis humani* cap. peculiaris de *mammis*. Nihil mihi accidere gratius poterat quam primas quas profert, observationes nullo modo ad me pertinere; nam si in ipso statim initio, & in rebus quidem ad alios omnes potius, quam ad me spectantibus, eum manifestissime labi, ostendero, multo facilius mihi credes infra ostendenti, quanti reliquæ adversus me ipsum ex instituto congestæ ejusdem anni observationes faciendæ sit. Illud unum moleste fero, quod Verheyenii, cujus ego nonnullos quidem lapsus interdum noto, ne propter Viri alioqui de Re Anatomica præclare meriti auctoritatem Juniores decipiantur, hic pene totum de Mammis Caput, quod iste *veracissimum præ aliis* prædicat, cogar redarguere. In eo igitur Capite, ut Auctoris ordinem observem, primum video ob id etiam mammas binas naturaliter esse dici, ut dum sunt gemelli, quisque habeat unam. Id verumne sit, tu inprimis, Vir Cl. videris, qui supra e contrario scripsisti: si id respexit natura, quidni tres, aut plures fecit, cum aliquando non duo tantum, sed etiam plures foetus humani ab una muliere simul editi observati sint? Mittamus quærere, num in pectore ob eam quoque causam sint positæ, ut non adeo remotæ a corde sanguinem recipiant magis vividum: & num quando in Puellis pubescentibus primum sororianantur, id veri similis sit contingere etiam propria substantiæ solidæ accretione; cum Doctissimus quidem Fantonus, aliquando se notasse, se, testetur, quod licet elegantulæ in Puellulis mammx promineant, in iis tamen vix quicquam adhuc glandulosi, (hæc autem maxime propria earum substantia est), sensibus obvium repiatur. Hæc, inquam, atque alia mittamus, & ad ea quæ Verheyenius de Papilla scribit, veniamus. Hæc, inquit, Mammx distentione erigitur, ejusque depletione flaccescit. Verum id quidem est. Hæc tamen vera etiam sunt quæ ab aliis non omittuntur: a labris sugentis infantis contrectatam erigi, quæ antea flaccescebat: Idcirco tum erigi, ut non modo exfugiri melius possit, verum etiam facilius, directis videlicet explicatisque tubulis; antea autem flaccescere, ut his contractis & corrugatis, nimia atque intempestiva lactis profusio sufflaminetur: Denique erigi, aut flaccescere, quia interstitiis illis inter reticulares fibras dispositis instructa est, in quibus sanguis opportune subsistere queat, aut non sub-

Tab. LV.  
221.

174

1. r. tr. 3.  
c. 2.

164.

Anat.  
Diff. 11.Circ. An.  
Prog. 2.  
Hist. Part.  
Diff. 14.  
& 36.

173

220.

De Areolæ  
Tuberculis.  
n. 12.221. & seq.  
Comp.  
Anat. n.  
195.



Ibid.

Thes. Ana-  
tom. I.  
Tabul. 4.  
F. 4.

subsistere. Utra igitur veracior descriptio est, num Verheyenii, qui de his interstitiis, illisque usibus ne verbum quidem habuit, an Fantoni, qui nihil horum prætermisit? Porro hæc quoque a Verheyenio omittuntur: Papillam exquisiti sensus esse, ut contrectata, ut diximus, erigi possit: Eum exquisitum sensum nerveis speciatim *papillis*, quas Cl. Ruyschius delineavit, qualque etiam laudatus Fantonus memorat, deberi: Foraminum Papillæ numerum, ac dispositionem in aliis aliter, sed certa nihilominus, quantum a Nuckio observatum est, ratione se habere. Atque (ut ea quæ de Areolæ Tuberculis Verheyenius scribit, nos autem infra expendemus, nunc omittam, & de Mamma universa jam dicam) hanc cum pectorali quidem musculo laxis vinculis fibrosis, cum velamentis autem communibus ita arctius connecti, ut dum, pectoris tegumenta, cultro sejungimus, mammas avelli simul contingat, quod recte Fantonus, hinc nimium quorundam Chirurgorum metum redarguens adnotavit.

## ANIMADVERSI O IV.

**S**ed ne forte hic dicas, Verheyenii descriptionem a me quidem minus accuratam perfectamque, non tamen minus veracem ostendi, etsi huic interpellationi paulo ante videar occurrisse; age tamen, quæ docet de interna mammarum substantia videamus. Hanc igitur ex pluribus glandulis, vasis, ac globulis pinguiferis compaginari, dicit: Glandulas magnitudine multum diversas esse: quales sane in ista pariter quam ex eo profers, Figura 6. delineat. Optassem profecto, ut ipse, atque Nuckius rationem, modumque tradidissent, quo utentes plurimas istas quas ipsi proposuere, minutas, sejunctasque glandulas videre possemus. Nam quod ad me quidem attinet, simpliciter fateri non erubescam, cum multas sive siccas, sive lacte scatentes mammas haud negligenter disseccaverim, nihil adhuc tale invenisse. Inveni autem semper quidquid propriæ glandulosæ substantiæ in mammis erat, in corpus unicum, magnumque compactum, cujus ferme centrum Papillæ respondebat. Colore albo, superficie non prorsus æquali, substantia ipsa subdura erat, & cultro inter disseccandum resistente. Intra hanc, dum lacte scateret, nonnullæ quasi cellulæ eodem plenæ spectabantur, quæ ad Ductus Lactiferos pertinebant. Hæc postquam sæpius observaveram, animadverti, Joannem quoque Riolanum scripsisse: „mammæ glandulosum corpus, unicum esse & continuum, non multiplex: „Thomam autem Whartonum substantiam mammarum tanquam „omnium glandularum maximam, compactam, & albissimam, proposuisse, easdemque constare docuisse „ex parenchymate „glanduloso, spongioso, continuo, - in distinctos „globulos non diviso, nisi præternaturaliter affecto. „Cum autem hæc perscripsissem, ecce Cl. Heisteri Compendium Anatomicum huc affertur, in cuius Præfatione Solertissimus Auctor negat, se unquam mammarum glandulas ita ut Verheyenius delineat, rotundas, copiosissimas, - dispersas - reperire potuisse, quamvis lactantium, puerarum, virginum & aliarum mulierum mammas sæpius examinaverit, - verum in medio „mammæ, sub pinguedine, aliam quandam, partem quasi mammam latere, cujus substantia „uberibus brutorum haud absimilis. „Idem censet, Verheyenium „de glandulis mammarum tam „breviter & frigide loqui, ac si nunquam eas „certe vidisset: „& quod de Tubulorum lactiferorum origine habet, id „ex asserto Nuckii „quidem affirmare, sed non sua experientia aut „observatione: „quod quidem in iis quæ super illorum tradit anastomosibus, est manifestissimum, ut in iis etiam quæ ex Whartoni auctoritate de mammarum nervis, & lymphæ ductibus docet. Verum ut ad Tubulos redeamus; quæ de horum numero, cum ductu pancreatico similitudine, & cum arteriis Morgagni Adversaria Anat. V,

communicatione ab diligentissimo Nuckio observata sunt, ea Verheyenius prorsus omittit. Quod autem addit: ipsis Tubulis in Papilla, interjici variis „locis aliquam substantiam glandulosam, „& has glandulas in Fig. 3. delineat; nempe quid de hisce glandulis ego, imo laudati Anatomici censeant, supra ad Bidloi Figuram 4. indicavi. Tab. 13.

## ANIMADVERSI O V.

**R**eliquum est quod de Pinguedine mammarum docet: „Pinguedo, inquit, copiosa „glandulis Mammarum superponi, atque hinc „illinc interponi solet, ut nimirum & repleat „glandularum interstitia, & vasa iis copiosissime „intertexta leniter sustentet. „Equidem plures pinguedinis mammarum utilitates esse, censeo, & ex iis non postremam, ut glandulosa mammarum substantia, quam ex levissimis interdum ictibus, & compressionibus vitiari, constat, ac indurescere, mollius, tutiusque in ea jaceat, atque ubi opus est, & crescere, & lacte distendi facilius queat. Atque ei propterea pinguedinem non tantum *superponi*, verum etiam *supponi*, observavimus sic ut glandulosum, quod descripsimus, corpus inter duo mollia pinguedinis strata fere undequaque contineretur. Non tamen idcirco pinguedinis quidpiam, quod quidem notabile esset, eidem corpori *hinc illinc interponi*, & sic *glandularum interstitia replere*, vidimus, non difficile alioqui intra albam illam glandulosam substantiam internoscentem propterea quia utriusque strati pinguedo flavescere, & in cadaveribus sic satis etiam interdum pinguibus hæc a nobis perquisitio habebatur. Cum igitur Verheyenius in hoc Capite de Mammis ita se gesserit, cumque Cl. Heisterus, dum in eo esset, ut ad illius lapsus patefaciendos ex multis nonnulla tantum loca seligeret, hoc ipsum speciatim Caput omittendum sibi non putaverit; satis, opinor, Doctissime Vir, intelligis, quanti hac in parte ejus & sententia, & observationes, pendendæ sint, qui se, inquit, „quoad tubulos lacteos, aliaque ad mammas & „earum usum facientia, veracissimam præ aliis „Cl. Verheyeni descriptionem invenisse. „

Pinguedinis Mammarum usus, &amp; locus.

Compen. Anatom. Præfat.

## ANIMADVERSI O VI.

**H**uc adde quæ idem Auctor in Areolæ Tuberculis eodem in Capite describendis pecavit, illudque imprimis quod ita manifestum est, ut ultro ipse Animadversionis Scriptor Cl. fateatur. In ista enim laudatione hoc unum excepit, „quod non tam frequenter in subjectis utriusque sexus ordinem illum in forma coronæ ad „papillæ areolam exactum, tuberculorum, - qualem exponit dicto Capite de mammis, observare licuerit. Hæc namque tubercula satis „irregulariter per areolam figuræ, inquit, ab „Ordinatissimo Morgagno exhibitæ, - omnino „conformantur. „Nimirum ego priusquam hæc describerem, aut delinearem, in plurimis areolis diligenter inspexeram, ut quod frequentissimum esset, cognoscerem. Verheyenius autem, quem primam eorundem notitiam meis facile Adversariis, ex quibus & multa alia sumpsit, debere, intelligent omnes qui priorem Anatomies ejus editionem cum posteriore, hanc vero cum iisdem meis Adversariis contendunt, haud ita multa cadavera ejus rei gratia inspexisse mihi videtur. Non modo enim istam eorum Tuberculorum coronæ similem dispositionem reticuisse, verum etiam „utrum singula singulos habeant ductus „excretorios, determinare „potuisset: & quemadmodum „ex iis pressis quandoque educi humorem vulgari sero lactis haud absimilem, imo „verum lac, a muliere lactante expressum fuisse, tradit, ita sebaceam ex iisdem expelli materiam, non omisisset. Hæc omnia a me primum observata, ac litteris tradita Animadversionis Auctori suis observationibus confirmat; illud tamen

De Areolarum Tuberculis, &amp; horum sebacea materia.

Mammarum Glandula.

Anthrop. l. 3. c. 3.

Adenogr. c. 36.



174.

postremum excipit. „ Nunquam cæterum visum „ est, inquit, liquida ex hisce partibus vere se- „ bacea prodire dato etiam quocunque vel pres- „ suræ, vel alterius administrationis tentamine. „ Mihi vero; ut Auditores, Amicique mei probe „ sciunt, inprimisque Joannes Polenus Professor, „ & Scriptor Præstantissimus, ac de Re Physica, & „ Mathematica egregie meritis; ut qui singulari „ quodam tum erga me, tum erga res naturales „ amore ductus, nostris publicis, privatisque exer- „ citationibus adesse solet; mihi, inquam, nihil fa- „ cilius est, nihil promptius, quam ex areolæ (ne- „ que lotæ, neque absterfæ, neque pressæ) tuber- „ culis materiam illius quæ ab nasi, genarumque „ sebaceis glandulis separatur simillimam aut ultro „ prostantem ostendere, aut tubercula hinc atque „ hinc ungibus intercepta paulatim premendo, ex- „ trudere: quæ videlicet causa fuit, ut ipsa, „ pro „ sebaceis glandulis interim habenda existimave- „ rim. „ Id autem est, quod in ista Animadver- „ sione potissimum redarguitur. „ Primo namque „ observari dicitur, tubercula hujusmodi per cu- „ tis texturam dispersa non esse, & immerfa; „ sed adhuc distincte sub ea jacentia; hocque li- „ quere facile, denudatis a cute hisce partibus, „ sicque adhuc sub ea integris, & intactis. „ Ego „ vero tubercula ista, ex quibus sebaceam mate- „ riam extrudo, detracta cute *integra*, & *intacta* „ restare, nego. Sed fac, integra, & intacta resta- „ re; quid tum postea? „ Hinc, inquit, constat, „ glandulas non esse sebaceas; quæ scilicet, ut aliæ „ omnes ejusdem generis, quæ a laudato Autho- „ re describuntur, aut ad extimam cutis faciem „ locari debuissent, aut saltem per intimum cu- „ tis plexum stabulari; „ quasi vero aut inter „ ejusdem generis glandulas, quas descripsi in Pal- „ pebris, non retulissem, aut sebaceas, quas in „ Palpebris descripsi, glandulæ non intra illarum „ cartilagineas conditæ, sed cuti ipsi intextæ forent.

Secundo „ Tubercula, inquit, hujusmodi sub „ cute efformari non a substantia quadam glan- „ dulosa ibidem affixa, sed a glomis quibusdam „ adiposis, eo loco, instar pulvinarium, elevatio- „ nes hujusmodi ad cutem producentibus. „ Ego „ vero in decem, quas novissime continenter secui, „ areolis, cum pleraque ea tubercula qua summa „ potui diligentia perlustrarem, nihil quidquam „ pinguedinis, vel in mulieribus habitioribus, iis- „ dem inesse, vidi, aut ad ea efformanda pertine- „ re, facile alioqui visurus vel ob pinguedinis co- „ lorem, quem in his certe omnibus mammis fla- „ vum inveni. Quinimo cum forte binis areolis „ nihil propemodum pinguedinis subesset, binis au- „ tem nihil prorsus; tubercula tamen ita in his qua- „ tuor areolis, ut in quibus maxime, protuberabant.

## ANIMADVERSIO VII.

Quid ergo, inquires, inerat? quid eorum tu- „ berculorum intimam, profundamque partem „ efformabat? Nempe id quod in I. Adver- „ sariis indicavi; Ductus videlicet Lactiferi. „ Scripsi enim, me in duabus, vel tribus mulie- „ ribus lactiferos ductus vidisse, quales ad papil- „ lam pergebant, & hæc versus areolarum tuber- „ cula contententes, & præterea cum nutrix quæ- „ dam, hortante me, sibi areolam ad motus di- „ gitis vix pressisset, continuo albas velut lactei „ feri guttas de his tuberculis erupisse, tum ab- „ sterfa areola, rursusque pressa, easdem rursus „ erupisse. „ Supra autem scripseram: „ me non „ modo limpidum humorem, sed haud raro ceu „ serosum lac, interdum quoque ceu veri albissi- „ mique lactis guttas de iisdem tuberculis expres- „ sisse ex cadaveribus etiam (quod magis admi- „ rere) virilibus. „ Quod tunc igitur indicavi, „ id in præsentia ex pluries iteratis observationibus „ confirmo. Scilicet ad singula tubercula singulos „ pertingere lactiferos ductus vidi, & sic intra ipsa „ dilatari, ut tuberculorum efformatio eorum du- „ ctuum & dilatationi, & ultra areolæ planum pro-

minentia maxima ex parte deberetur. Istud ego „ lactiferi cujusque ductus extremum ab incluso, „ & pellucente humore distentum pro *glom*o quo- „ dam *adiposo* Animadversionis Auctori imposuisse, „ non difficile crediderim. Sed utcunque id est, „ ubi ad summam tuberculi partem ventum est, „ ibi ductus in excretorium orificium contrahitur, „ atque aperitur. Cur ergo, inquires, ista tuber- „ cula pro sebaceis glandulis habuisti? Ego vero „ quatenus, & quo jure habuerim, & adhuc ha- „ beam, postea declarabo. Nunc Animadversionem „ porro expendere pergamus. „ En genuina, in- „ quit, graviorque observatio nostra, ex qua certe „ & usus & habitudo tuberculorum horumce re- „ velentur. In locis illis areæ per subjacens tu- „ berculum prominentibus, ubi prius ex digito- „ rum pressura guttula lactis gemmaverat, ani- „ madvertebam hiare forinsecus vasculum distin- „ ctum lacteum minusculum, quod ab origine al- „ tiori derivatum, ac per glomi pinguedinei sub- „ stantiam trajiciens, hinc usque ad cutem ap- „ pellit, eamque perforat. „ Genuina ista certe „ est (si glomum illum *pinguedineum* demas) & „ gravior observatio; non tamen ipsius propria est, „ non tamen *revelatio* est. Nos enim in I. Adversariis ante omnes docuimus, ista eadem tubercula „ habere singula excretoria oscula attente inspe- „ ctantibus manifesta: „ quæ in Figura etiam ex- „ hibuimus; reliqua autem an non hic dumtaxat „ diligentius descripserimus, sed & illo eodem in „ loco ita indicaverimus, ut nisi ea legisset, de hac „ observatione nec cogitaturus quidem is fuisset qui „ modo sibi redarguendum proposuit per quem pro- „ fecit; ex iis quæ supra dicta sunt, atque allata, „ æquorum hominum, harumque rerum intelligen- „ tium judicium esto. Rem igitur, quam primus „ ego indicavi, confirmavit ipse, aut etiam, si quis „ ita malit, illustravit; certe neque ipsam rem, nec „ rei usum revelavit. De hoc enim sic ipse diserte „ confessus est, cum meam tuberculorum, seu glan- „ dularum istarum „ usus descriptionem tamquam „ scilicet effluxus lactei vicarias, & coadjutrices „ demonstrando, tam exactam, sicque in æter- „ num laudandam, „ judicavit.

## ANIMADVERSIO VIII.

A Tenim, inquires, non modo is censet quod „ a te fuerat indicatum: „ juvare tubercula „ hæc, & supplere officium papillæ tunc præfer- „ tim cum introrsus hac, non infrequenti nem- „ pe vitio, subsidente & quasi retracta, nihil „ quod infans labris exceptet, nihil quod sugat; „ præter areolam relinquitur; „ sed, „ per calcu- „ lum suum id a natura institutum (pronunciat) „ ut quodcunque sit impedimentum aliquod. ma- „ joribus tubulis versus papillam, - majores hi „ tubuli succis aliquid suis exonerari possint „ in laterales hosce minores (qui scilicet tubercu- „ la perforant) ut hinc & fluxus aliquis de vectis „ succis servetur, & non tam facile in majoribus „ fistulis residua liquida, & a cursu suo remora- „ ta concrecant. „ Hoc quidem, fateor, pro- „ nunciat, nec sane perperam, si modo constat, „ laterales hosce tuberculorum ductus cum iis qui „ ad papillam contendunt, communicare. Verum „ id ipsi nondum constat. Nam, „ si non, inquit, „ adhuc pro certo assevero, vidisse saltem videor, „ eosdem in tubulos majores lacteos, qui prope- „ rant ad papillam, - se se insertum videre. „ Et nos postea mirabimur, ipsum *protinus mira- „ tum* esse, me post mei illius usus descriptionem „ ea tubercula sebaceas adhuc glandulas appellavisse! Ipse enim minime dubitat, quin ex eo quod „ quisque sibi vidisse videtur, continuo tanquam ex „ recerta atque explorata sit pronuncian- „ dum. Ego vero in eo saltem Magnorum Virorum vestigia per- „ sequens, quod mihi diffiderem, neque protinus ju- „ dicium ferrem; postquam illas de quibus dictum „ est, observationes quas certe habueram, non „ vero habuisse visus eram, in I. Adversariis pro- „ posui

Ibidem.

174

Adv. I. loc. cit.

174

num. 12.  
Ductus  
Lactiferi  
in Areo-  
larum Tu-  
berculis  
hiantes.



posui, deductum ex illis præbendi lactis usum, non ut sententiam, sed ut *suspicionem* quandam protuli, imo hæc continuo subjeci: „ Nil tamen „ pro certo de re hac affirmare nunc aulim, ut „ qui neque ex una, aut altera sectione asseve- „ rare quidquam soleam, & vicissim sciam, nu- „ trices duas, cum, me suadente, ea tubercula „ compresserint, nil tale exprimere potuisse. „ Itaque nunc demum pronuncio postquam iis pau- cis sectionibus alias complures annis insequentibus adjunxi, illisque tum in priore nutrice, tum in cadaveribus, a me habitis observationibus confi- similem aliam Verheyenius adjecit: quibus si con- sentientes istius quoque Scriptoris sectiones, & ob- servationes addamus, eo gravius momentum ad- junxerimus, quod qui alias nobis adversari ve- hementer solet, nos ipsos hac in parte sectatur. Illo autem tempore cum in hac quidem re non- dum mihi satis habere iteratas observationes vi- derer; contra autem de prostante ex iisdem tuber- culis materia sebacea ob certissimarum observatio- num copiam dubitare amplius non possem; quid mihi aliud faciendum fuit nisi quod videlicet feci, ut inventum utrumque, ne quis forte ante occu- paret, proponerem, eo tamen discrimine, ut de illo mihi alias amplius videndum, dicendumque relinquerem, de hoc vel tunc pronunciarem. Ita- que non id tantum scripsi: „ Nil tamen pro cer- „ to de re hac (primo illo videlicet invento) affir- „ mare nunc aulim: „ sed hæc quoque addidi: „ Ea potius tubercula pro sebaceis glandulis in- „ terim habenda existimarem, propterea quod „ sebaceam materiam ex eorum osculis prostan- „ tem frequentissime viderim, neque minus fre- „ quenter expresserim. „ Sed altera quoque causa fuit cur dicerem: „ potius pro sebaceis „ glandulis interim habenda existimarem; „ non autem dicerem: sebaceas glandulas esse, sta- tuo. Scilicet quod ex iis tuberculis sebi consimilis materia exprimeretur, compertum id quidem ex- ploratumque habebam, ideoque sine ulla dubitatio- ne pronunciabam; num vero expressa omnis ma- teria unius ejusdemque esset generis, atque origi- nis, & num præsertim tuberculorum omnes par- tes sebo secernendo infervirent, id sane vel pro- pter illas alias observationes non dubium mihi esse non poterat; ideoque comparativa illa, tempo- raria, & ancipiti loquendi ratione ea tubercula nequaquam prorsus, ut *glandulas sebaceas*, quod Noster dicit, *statui*, & *conclufi*; sed quid mihi minus tum displiceret, indicavi.

## ANIMADVERSI O IX.

Glandula  
Areola-  
rum Seba-  
ceæ.

Nec sane est in præsentia, cur me istud in- dicasse pœniteat. Illa enim tubercula non modo ex lactiferis ductibus, verum etiam ex Se- baceis Glandulis compacta sunt: quas omnes etsi nondum satis a me perspectas esse, existimo; quas- dam tamen instar minimorum, & ex flavo albi- cantium granorum in summa tuberculorum parte circa horum excretoria oscula confitas ita certe vidisse me, scio, ut certe e contrario scio, iisdem excretoriis vasis *glomos* illos *pinguedineos* non vi- disse subjectos, qui extremam ductuum partem „ tanquam pulvinaria elevent, tanquam cortices „ investiant, „ imo tubercula ipsa tanquam ma- teria efforment. Quod quidem ultimum, ex quo priora consequuntur, „ ultra autopsiam evidentif- „ simum ulterius esse, „ Cl. Animadversionis Au- ctor contendit. „ Siquidem in gracilibus, in- „ quit, subjectis, aut per morbos aliquos gra- „ cilefcentibus, quibus scilicet extenuatur pingue- „ do, & deprimitur, abolitas omnino observa- „ bam prominentias hujusmodi, quod & annuit „ ornatissimus Morgagnius: - *Ea*, ait, *tubercula* „ *aut perexigua*, *aut etiam nulla interdum se se* „ *ostenderunt, ut in senibus præsertim tabidis, &* „ *macie confectis*. „ Hæc, fateor, scripsi; sed illud tamen, quod ipse omittit, continuo subjeci: *id tamen raro admodum contingit*. Et sane etsi illud Morgagni *Adversaria Anat. V.*

in nonnullis præsertim senibus, iisque, non gra- cilibus, aut gracilefcentibus, sed *macie confectis* mihi accidit; in aliis tamen extenuatorum cada- veribus, & nominatim mulieris tabidæ, cujus non modo costæ singulæ extabant, sed de mammis ni- hil fere aliud nisi papilla, atque areola, relictum erat, eadem tubercula non minora, quam in pin- guibus mulieribus deprehendi. Verum etsi illud in omnibus macie confectis accideret, num, quæ- so, in ejusmodi ægris nulli alii præter pingue- dinem succi minuuntur, ut *evidentissimum* ex illa observatione censendum esset, „ pinguedinea esse „ corpora tubercula hujusmodi? „ Quæ omnia cum ita sint; vides, an non multo potiori jure ipsi reddere suam illam *repetitionem* possem: „ Ab- „ surdum itaque (adhuc repetitur) glandulas vo- „ care sebaceas tubercula hujusmodi ut deposcit „ Cl. Morgagnius; „ præsertim cum alia id ego, ut ostendi, ratione indicaverim, alia ipse *pingue- dinea* esse tubercula hujusmodi, sine ulla videlicet hæsitazione, constituat. Sed ista neglecta *repe- titione*, interrogationes saltem quatuor, quibus suam concludit Animadversionem, attendamus.

## ANIMADVERSI O X.

„ **D** Ato, inquit, quod essent glandulæ ecquid „ sic proceras, & ingentes delineat Au- „ ctor Cl. seu longe ultra mensuram aliarum glan- „ dularum omnium; quas ut sebaceas variis in „ locis proclamat. „ Vel id vult: cæteris ma- jores sunt, ergo glandulæ sebaceæ non sunt; qua- si vero Natura ex pluribus minoribus collectis majores facere glandulas non potuisset, atque adeo non consuevisset. Vel hoc vult: naturalibus ma- jores sunt, ergo perperam delineatæ sunt; quasi vero non esset a Verheyenio suo scriptum: hæc tubercula „ magnitudine varia esse, præcipue „ in variis subjectis: at passim semen cannabi- „ num superantia; „ aut ipse, eorum tantum ordine excepto, *veracissimam præ aliis* Verheyenii descriptionem non *proclamasset*. Hæc cum ita se habeant; ex parte quidem constat, quid de ejus *excessu* in altera interrogatione dicendum esset: „ Et si, inquit, asserit, tubercula hujus- „ modi vidisse in Bidloi & asseclarum tabulis de- „ lineata, naturalibus valde majora, quid de excessu „ eodem hoc suo dicendum foret? „ ex parte autem non satis constat, propterea quia inter no- stra de tuberculis hisce verba, quæ tu, Vir Cl. ante istam Animadversionem exhibuisti, nonnul- la forte desiderantur huc omnino pertinentia. Po- stea enim quam scripsi: „ Hæc postea vidi tuber- „ cula in Bidloi Tabulis delineata, naturalibus „ quidem valde majora, ut quæ ope microscopii „ descripta sunt, neque ita præterea, ut auferri „ mutarive aliquid non possit; „ hæc continuo subjeceram: „ qua in re diligentiam magis desi- „ deres trium, vel quatuor Anatomicorum, qui „ eandem in suos libros Figuram, sed proportio- „ nis nulla habita ratione transfulerunt. „ Quid igitur ita istam interrogationem adornat, quasi id aut in Bidloo, aut in his qui ejus Figuram de- scripsere, argueremus, in quo nos ipsi prolabere- mur, grandiore æquo istorum tuberculorum de- lineationem; qua quidem in reneque ipsi erravi- mus, nec Bidloum, aut alios erravisse, diximus, non illum, quia ope microscopii se illam Figuram delineavisse, professus est, non istos, quia quo pa- cto a proportionem recesserint, non explicavimus. „ Ad tertiam autem interrogationem: Et si lac „ purissimum ex eisdem expressisse tuberculis as- „ firmat Author Cl. cur inde eadem, ut glandu- „ las sebaceas, statuit, & concludit, quarum cer- „ te humorem incolam conforme nihil habere „ cum lacte, nullaque per se ipsum cum scate- „ bris lacteis commercia, notissimum vadit: „ ad hæc, inquam, verba quod attinet, etsi indi- catum est supra, neque id nos statuuisse, & un- de ista admiratio nascatur; addi tamen potest, non satis demum fuisse causæ, cur id Anatomicus mirare- tur

l. r. tr. 3.  
c. 2.

173.



tur, quando notissimum est omnibus, non modo per proxima orificia, sed per idem osculum excretorium duos adeo diversos humores, bilem scilicet, ac pancreaticum succum prodire; mirandum potius esse, qui *pro certissimo* compererit, adversus, rudes nimis externorum attactus, ad ipsum meatum auditorium; ac pro variis inter se separatum motionibus ad ipsa labra sebaceas glandulas requiri, naturale quoddam linimentum, inunctionemque præbentes; eundem ne cogitasse quidem, Areolæ cuti, atque adeo istis tuberculis ab infantis suctione diu, crebroque vexatis linimentum id genus præsto esse convenisse. Quod autem postremo interrogat: „Et si glandulas tubercula ad areolam huiusmodi vocavit, quia notabiliter prominentia, cur non & glandulas vocavit similes supra papillæ superficiem prominentias ordinarias? „ad hoc quoque in aliis Adversariis responsum est, ubi quid in glandulis sebaceis agnoscendis potissimum sequamur, ostendimus; neque enim usque adeo inepti sumus, ut nihil aliud in ea re, nisi prominentiam quandam spectemus. Itaque etsi in Papillæ ipsius tum summa parte, tum lateribus exiguas sebaceas glandulas sæpissime agnovimus; *ordinarias* tamen istas, quas ipse objicit, papillæ *prominentias* pro glandulis non habemus. Cæterum ista objectio atque interrogatio si quid valeret, non sane in nos magis, quam in Bidloum, Heisterum, aliosque homines Clarissimos caderet, ut qui pariter cum istas *ordinarias* Papillæ *prominentias* pro glandulis non habuerint, Areolæ tamen tubercula *Glandulas* vocare non dubitarunt.

Papillæ  
Glandulæ  
Sebaceæ.

173  
Compen.  
Anat. n.  
195.

## ANIMADVERSIO XI.

**N**unc ea vicissim a te mihi venia danda est, Vir Cl. ut super his quæ in Capite proximo de Diaphragmate producis, nonnulla interrogem. Et primum istone diaphragmatis Typo, „qui, prout hæcenus ab Autoribus expressus „est, oculis subjici dicitur, - ut pateat quid in „ter illum & hanc novam diaphragmatis structuram intersit; „istone, inquam, Typo meliorem nullum ante id tempus ab Anatomicis propositum credis? Iste profecto circularis est. At Vesalius, & qui ipsum secuti sunt, ellipticum protulere. In isto etiam, fateor, fibrarum ductus neque superioris, neque inferioris muscoli agnoscuntur. At in eo quem Stephanus edidit, superioris quidem perspicue, in iis autem quos Veslingius, utriusque quadantenus agnoscuntur. Abnormis pariter in isto typo tendineæ intermediæ partis diaphragmatis figura est. At si quæ est in priore Veslingii typo, diligenter inspicietur, non usque adeo abnormis videbitur. Et; quoniam hoc inprimis fere inculcatur; est quidem in parte tendineæ istius typi foramen pro œsophago insculptum. At in eodem Veslingii extra illam tendineam, atque adeo in posteriore parte carnea manifestissime insculpitur. Quæ tamen cave credas ita a me afferri, quasi contenderem, nihil demum novi de diaphragmate ab Nobilissimo Bartholino propositum esse. Plura enim proposita esse, fateor, & plures vulgatissimos errores esse convulsos. Sed illud unum contendendo, non oportuisse istum potissimum typum afferri, ut inde pateret, quam in illud usque tempus Anatomici diaphragmatis structuram expressissent, cum alii, præsertim in nostrorum Antecessorum libris, ut ostendimus, extarent non usque adeo ab omni veri imagine remoti. Super iis autem quæ Ingeniosissimus Auctor de diaphragmatis, & transversis abdominis muscoli continuatione scribit, neque dicam, Vesalium quoque nostrum tradidisse, diaphragma „ad inferiorem costarum extrema, oblique ascendenti abdominis musculo, & longe magis transverso admodum uniri; „neque addam, me tamen olim in quodam cadavere, non *tendines*, sed *laxissimam* quandam, & facile distrahendam membranam,

De Diaphragmate.

176

De hum.  
corp. fabr.  
l. 2. Tab.  
7.  
De diff.  
part. Fig.  
ante c. 38.  
l. 2.  
Synt. An.  
1. edit.  
Tab. c. 9.  
Fig. 6.

177

l. cit. c. 35.

diaphragmatis superiori musculo, & abdominis transverso interjectam vidisse; neque enim ego eundem illam observationem iteravi, & Bartholinus id in homine se perscrutatum esse, negat. Illud potius ex te quæram, num quæ de diaphragmatis motu sentit, relaxatis scilicet ejus fibris, ipsum ex incurvato magis planum fieri, atque in imum ventrem protrudi, iisdem autem contractis, ex plano incurvatum in thoracis caveam magis ascendere; num, inquam, hæc tibi ejusmodi videantur, ut vel omnino probari, vel certe sine ulla, ut facis, adnotatione Lectoribus proponi debeant. Scire etiam pervelim, an fibras istas carneas quibus arteria aspera in nobis contrahitur, & quas inter cæteras Bartholini Figuras in Bibliothecæ Anatomicæ Tab. XLI. Fig. 6. exhibueras, hic, quamvis pariter promissas, exhibere tamen non memineris; nam quod illæ „exprimi in Tab. 84. „Fig. 4. „dicuntur; certe hæc Figura nihil nisi diaphragma caninum exprimit, illa autem quam in Bibliotheca produxeras, hic nusquam apparet. In his vero quæ laudati Auctoris descriptioni adjicis, Nervos Diaphragmatis „duplici, triplicique origine e nervis brachialibus „utrinque enasci, „iisdemque non longe ab „exortu plures in homine accedere a nervo intercostali surculos, „doces. Hæc quomodo concilies, quæro, cum iis quæ de istis ipsis diaphragmatis nervis, longe ea quidem discrepantia, in Tabulis XLVI. & XLVII. cum Solertissimo Vieussenio ostendisti. Idque eo magis quæro, quod ipse primam eorum nervorum originem, non ex Brachialibus, sed ex aliquo proxime superiorum Cervicalium ferme ut Vieussenius proponit, meminisse me anais superioribus invenisse. Non ignoro, in aliis fortasse cadaveribus id inveniri aliter posse, imo fateor, Willisium a quo Vieussenius in eo recessit, eadem quæ tu, tradidisse; illud tantum quæro, cum supra Vieussenii Neurographiam selegeris, quam tu, Lectoresque tui sectaremini, cur hic discrepantem Willisii descriptionem sine ulla hæsitacione sequaris?

177.

179

180.

De Nervis  
Diaphragmatis.

## ANIMADVERSIO XII.

**A**tque ut super adjectis quoque in LXXXIV. Tabula Diaphragmatis Figuris, earumque Explicationibus perpauca interrogem; indices velim, quæ in Figura (ne dicam qua in Tabula) diaphragma in sua sede, ac posito conspiciendum exhibueris; certe non te fugit, id ita esse Rei & anatomicæ, & chirurgicæ, & medicæ necessarium, ut propter ejus ignorationem neque præcipua diaphragmatis utilitas, thoracis videlicet caveam in inspiratione producendi, in expiratione autem corripienti, intelligi satis possit, & plurium interdum morborum sedes, quæ in mediis ventris infima parte est, in imi-suprema, & vicissim, non sine ægrorum, Artisque detrimento, esse existimetur. In Figuræ autem 4. Explicatione, quando aliquot Bartholini verba mutas, cur non aliquod potius monitum interjecisti, ex quo Lectores intelligerent, quæ Auctor ad litt. GGGG „ternas utrinque indicet extremitates tendinosas, „cum haud plures binis utrinque esse videantur; vel non proprie dici perforari, aut *peritundi* diaphragma a descendente Aorta: quod recte post Vesalium admonuit Verheyenius. Hic contra, duo diaphragmatis agnoscit foramina, a te, & Bartholino prætermissa, per quæ videlicet Nervorum Intercostalium trunci in imum ventrem transmittuntur. Hæc ego foramina in illo eodem cadavere in quo supra dixi, me nervorum diaphragmatis originem quælivisse, cum diligentius inquirerem (a primo namque inter diaphragma, & dorsum ii Nervi transire videbantur) reapse in parte ipsa carnea diaphragmatis inveni; dignumque propterea disquisitione existimavi, quid dum ejus fibræ carneæ vel diu contrahuntur, vel crebrius, fortiusque tenduntur, alterneque laxantur, & iis nervis, & nervis itidem octavi Paris, qui

181

De hum.  
corp. fabr.  
l. 2. c. 35.  
l. 1. tr. 3.  
c. 4.

De Nervis  
Intercostalibus & Vagis.



qui videlicet una cum œsophago transmissi, a carnea pariter Septi Transversi parte intercipiuntur, sive in naturali, sive in præternaturali huius motu, quid, inquam, sive utilitatis, sive novæ contingat. Sed hæc fortasse alias; nunc duas postremas istius Tabulæ Figuras inspiciamus.

Nona, quæ ex Blancardo est, vide, quæso, annon, ut pleræque aliæ ejusdem Auctoris, inversa sit? mihi certe vel ex sola ventriculi inspectione videtur. In decima autem, quæ ex Verheyenio est, explicanda, cur, obsecro, parvam illam venam, & arteriam, quas ille, a se observatas, ad litt. II. ostendit, & a „ parte superiori enatas „ dixit, hoc est, non ut GG, & HH a magnis truncis per diaphragma transeuntibus, aut a cœliaca, lumbaribus, adiposis, sed a subclaviis vasis, cur tu easdem „ a parte Diaphragmatis „ superiori enatas „ dicis? præsertim cum arterias a partibus nasci, recte dicere non possimus.

Ille quoque explicationi litterarum LL non fortuito &c. addiderat, sed ad id respexerat, quod in descriptione indicatum erat, „ Succedunt inferius nervuli L a trunco intercostali „ & forte lumbaribus. „ Neque hoc tamen notavi, ut ejusmodi omissionem objicerem; sed ut postremo ex te quærerem, si eos quoque inferiores nervos cum Verheyenio hic agnoscis, eosdem cur supra in iis quæ Bartholino addidisti, non memoraveris?

## ANIMADVERSI O XIII.

**T**ertium autem Caput, quod est de Pleura, ac Mediastino, si versus non amplius decem excipias, in quibus de Illustrium Anatomicorum Malpighii, & Ruyschii observationibus quiddam semel, atque iterum interjicis, ita ex Verheyenii Capite de iisdem Membranis inscripto universum desumptum est, ut non satis mirari queam, quid fieri potuerit, ut ipse per te id testari, & Lectoribus significare oblitus sis. Idem enim est ordo, eademque sententiæ, verba quoque sæpissime eadem nullo negotio agnoscuntur: quod & in iis accidit, quæ in proximis duobus Capitibus de Thymi *extensione* habes, & de sanguiferis sive ipsius, sive Pericardii vasis. Atque utinam eorum quæ ad ipsum pertinent, Verheyenium auctorem laudavisses, & illum quidem, non te, docere, indicavisses, ex. gr. inter Pleuræ usus hunc esse: „ ipsas etiam costas in debito coerere „ cere spatio; „ nam potius contrarium verum est: aut Mediastinum „ mutuari nervos a diaphragmaticis, - dum scilicet per illud ad diaphragma - descendentes, aliquos in itinere surculos in ipsum emittunt; „ siquidem hoc, ut verum sit, cum iis tamen haud satis cohæret, quæ ambo de iisdem nervis *diaphragmaticis* paulo ante docuistis, scilicet „ per Thoracis cavum „ indivisos, ut is loquitur, descendere; „ vel „ ut tu scribis, „ recta per cervicem, ac thoracis „ cavitatem nullo de se emissio ramo, ad diaphragma progredi, in idque per tres quatuorve, in „ quos dividuntur furculos, inferi. „ Vel si in illis omnibus Verheyenium sequi malebas; utinam potius cuncta ipsius verba descripsisses; sic enim neque Pleuræ venas, arterias, nervos omisisses; neque inter ejus usus addidisses, ipsam, thoracis cavitatem lævem, ac lubricam reddere, pro commodiori non pulmonum dumtaxat, sed & *cordis motu*; quasi vero cor, non in pericardii, sed in ipsa thoracis cavea moveretur, aut non pericardium, sed eam de qua ibi agis, pleuram thoracis parietes succingentem, dum movetur, contingeret; denique opus hic esse Figura quam, quæ mediastinum sua in sede ostenderet, oblivisci non potuisses. Verum ut de duobus etiam quæ consequuntur, Capitibus perpauca dicamus; quod ad Thymi *extensionem* attinet: supra indicatum est, ipsa Verheyenii verba inter tua facile agnosci: quod quidem ita verum est, ut grave illius sive Amanuensis, sive Typogra-

Morgagni Adversaria Anat. V.

phi mendum in tua pariter descriptione servetur; nam tu quoque thymum extendi scribis, „ secundum longitudinem aortæ & venæ cavæ inferioris. „ Cæterum non modo secundum longitudinem aortæ, & venæ cavæ superioris extenditur, verum etiam in fœtibus eo usque ascendere interdum vidimus, ut thyroidæam glandulam attingeret. Quo magis a te recte factum credimus, quod minime sis Verheyenio adstipulatus suspicanti, officium thymi illud esse, ut humorem secernat in subjectum pericardium derivandum, idque magis quidem in junioribus, quia „ non apparet opus „ magna illius restauratione, quando semel in sufficiente quantitate collectus est. „ Neque enim glandula ejus magnitudinis opus fuisset, re præsertim sic constituta, ut iusta illius humoris copia, quæ quidem modica est, cum semel collecta esset, magna postea restauratione non egeret. Accedit, me quoque in fœtibus, & in his quadrimestri etiam aliquo, dissecandis universam thymi substantiam albicante quodam sero, & fere chyloso admodum imbutam invenisse, ut neque parum, neque id genus humoris secernere, quod in pericardio colligitur, appareret. Quæ cum observarem, eam quoque vidi, quam Verheyenius indicat, tu autem omittis, insignis istius glandulæ in lobos, & lobulos divisionem. Hic essent mihi nonnulla alia tum de Thymo, tum de Pericardio notanda; illudque inprimis quærendum, cur quando tradis, Pericardium „ partibus vicinis „ adhærere; sed præcipue Diaphragmatis circulo „ nerveo, „ (etsi ego memini carnosæ ejusdem anteriori substantiæ adhærens olim observasse) „ idque homini singulare; „ cur, inquam ejus quoque rei causam inter Pericardii utilitates non attuleris? Sed quoniam id in proximo Capite de Corde Eximius Vir Richardus Lowerus, cujus tu verbis præclare uteris, egregie præstitit; ideo satius erit Lectoribus, ut ibi quærant, indicare; jamque his tribus brevioribus Capitibus dimissis, ad illud ipsum Caput; quo & ejus prolixitas, & materiæ dignitas nos quasi vocat; confestim transire.

## ANIMADVERSI O XIV.

**E**T principio quidem recte admones, non pauca eorum quæ de Pericardio a Lowero scribuntur, „ per ea, quæ post ipsum in hujus facculi, seu capsulæ structura, ac inde enatis ubi „ bus detecta sunt, plane refutari. „ Illud vero desideratur, ut multis aliis ejusdem Auctoris locis similes Notulas simili de causa apposueris. Neque enim minus Lectores a te erant admonendi ubi ex. gr. ille scribit: „ nullam vim aut facultatem se movendi cerebro inesse, qua spiritus „ animales (ut Cor suum sanguinem) dispellat; „ super re tamen ejusmodi Cl. Pacchionum esse legendum. Pariter, ubi affirmat Lowerus, „ propaggines nervosas a solo octavi paris nervo „ in Cor humanum inferri; „ commemorandum erat, te supra cum Cl. Vieussenio rem longe aliter se habere, ostendisse. Verum alia hujusmodi infra attingemus. Nunc vel eo graviore de biventribus Musculis Auctoris lapsu prætermisso, quem alibi memoravimus, ipsam cordis fabricam quomodo describat, videamus. „ In „ corde, inquit, bene excocto & ab auriculis suis „ & vasis majoribus separato tendo satis validus „ apparet qui margineis ejus circa ostia undique „ cingit, & amplectitur, cujus pars aliqua in summitate septi in quibusdam animalibus in osseam „ substantiam induratur. „ Equidem non modo in quibusdam animalibus summum cordis septum, sed in ipsis hominibus orificiorum cordis pars magna haud ita raro in substantiam osseam induratur. Itaque meminimus in Sene quodam in ipsa cordis substantia sub mitralibus valvulis ostium invenisse transverso pollice longius; in grandæva autem muliere os transversum pollice crassius, dimidiatum anulum repræsentans, cui memorata

K 4

ratæ

De Thy-  
mo.

l. i. tr. 6.  
c. 7.

183.

185

187.

188

Tab. 46.  
188.

Adv. II.  
Anim. 3.

De Cordis  
Offibus.

Vid. loc.  
cir.

182

Ibidem.

l. i. tr. 3.  
c. 5.

182.

l. cit. c. 4.

180.



De Cordis  
Tendini-  
bus.

Specim.  
hif. Anat.

Tab. 20.  
Fig. 5.

De Fibris  
Cordis.

189

I. 1. tr. 3.  
c. 8.

Traët. de  
remot. &c.  
princ.

rata vulvula adhærebant pariter ossificata, nisi quod alterius earum magna pars adhuc sana erat, ut claudere posset orificium ab ejus ossis protuberantia fane contractum. An tamen id quod ibi fit osseum, tendo sit, non ita, opinor, evidens est, ut Auctor existimat. Nos enim certe cum in corde juveni, quemadmodum ipse jubet, præparato, tendinem istum *satis validum* diligenter quæreremus, ostia quidem, quibus arteriæ appositæ sunt; ab incipientibus harum parietibus, atque ideo a quadam tendinis specie cincta deprehendimus, at illis ostiis quibus auriculæ præfixæ sunt, nihil circumjectum videre potuimus quod non potius caro, quam istiusmodi tendo esse videretur. Quæ cum ita sint, minus ægre fero, quod Figuram prætermiseris in qua Lowerus circum omnia cordis orificia dispositum tendinem ostendit, præsertim cum sedes singulis orificiis in ea Figura assignata a vero plurimum distet, velut a Cl. Bartholino, aliisque notatum est. Attamen poteras huic incommodo obviam ire eandem Figuram ita exhibendo, ut est a Verheyenio correctæ, ne basis cordis figura, ac certa sedes, quæ iis singulis ostiis a natura attributa est, a tuis Lectoribus ignoraretur. Neque enim sine summa ratione attributa est, ut ostendere fortasse possem, nisi ad quædam alia de multis quæ in describenda cordis fabrica Lowerus exposuit, transire nunc mallet. Addit igitur: „paucas & tenuiores fibras per extimam dextri „ventriculi superficiem recte sursum elatas in ba- „sin terminari. „Et sane si quod paulo post subjecit: „Fibrarum omnium seriem complicatio- „nem atque ordinem facile percipiet, qui Cor bu- „bulum aut ovinum excarnare tentaverit: „de his quoque fibris rectis dictum voluit; nihil facilius quam in vitulinis & agninis cordibus vel nondum coctis easdem ostendere. Sin vero ipsas in corde etiam humano perspicui posse, existimavit, ut Verheyenius, & plerique alii qui eas describant, credere videntur; candide fateor, me in pluribus cordibus diligentius quærentem nunquam videre potuisse; ob eamque causam facile crediderim, ab Diligentissimo Anatomico Vieussenio in fibrarum cordis descriptione esse prætermittas. Quapropter neque admodum displicet quod proximam Loweri Figuram iis fibris rectis ostendis destinata omiseris. Binas tamen quæ illam consequuntur, exhibere profecto poteras, præsertim cum eæ quas ex Bidloo sumptas ipsis videris substituere, haud æque sint laude dignæ, ut ex parte aliqua in loco ostendamus.

## ANIMADVERSIO XV.

Et Auri-  
cularum.

191

De Venis  
Cavis.

193.

Quod autem ad Cordis Auriculas attinet, num Auctori credemus, „earum fibras du- „plici & contrario respectu in oppositos „tendines ferri, - atque alias in hunc, in il- „lum alias terminari? „Mihi certe neque anatome, neque exhibita in hanc rem Figura quidquam firmi videtur ostendere, cur id credam. Atque ut quiddam de pulmonis nutrimento interjectum ob arteriæ bronchialis ignorationem, mittamus; num sinistram auriculam propterea minorem esse dextera, existimabimus, quod „e vena „pulmonali - propter pulmonis in expiratione „collapsum & subsidientiam sanguis expressus con- „festim & copiosius urgeatur? „quasi vero hoc, tempore dumtaxat diafoles, non autem etiam systoles sinistri ventriculi accideret. Num vero istud tuberculum ante limen auriculæ dextræ, venæ utrique cavæ interjectum, in homine „a sub- „jecta pinguedine elevetur, „alii viderint; ego id potissimum ex te quæro, cur duas ad illud pertinentes Loweri Figuras, præsertim nulla alia substituta, prætermiseris? Venam autem Cavam (vel potius Venas Cavas; nusquam enim in unum truncum revera, & proprie conveniunt) Venam, inquam, Cavam „hic in confluio - in majori- „bus Animalibus, tam Homine, quam Brutis,

„totam circumcirca musculosam esse, „non facile assentietur, qui bovinam quidem Cavam vero valido, & rubicundo musculo, insignem sphincterem æmulante, instructam viderit, parem autem musculum in humana (cui tamen non propterea muscularem naturam, & vim nego) incassum perquisiverit. Pariter qui cor in sua sede spectaverit, non facile is (ut alia mittam) intelliget, quomodo ostium ullum cordis *sursum recte*, & non potius oblique aperiatur.

## ANIMADVERSIO XVI.

Is autem quæ de Fœtus Canaliculo Arterioso, & Ovali Foramine attingit Lowerus, Dissertationem tu quidem subjecis, quam, ad calcem „Anatomie Vereyhenianæ antea reposueras; „in qua Dissertatione si quid forte minus probarem, tuæ, Vir Cl. respondere humanitati non viderer, qui in eadem mihi illius Foraminis Valvulam describenti *omnino subscribis*, & meam quandam animadversionem *demonstrationis* nomine benigne ornas. Vide igitur, non quid in ea Dissertatione, sed quid in hoc Theatri tui loco desiderari posse, credam. In superiore Libro cum Fœtus historiam proponeres, canaliculum arteriosum, & foramen ovale non modo non pinxeras, sed vix Drelincurtii verbis memoraveras. Hanc tamen omissionem per te ipse egregie sensitisti, atque adeo scripsisti in ejus Libri extremo: „Superesset jam ut de fœtus in materno sinu, „canali Ovali, ac tubulo arterioso, quorum ope „circulatio sanguinis in iis aliter prorsus quam „post partum peragitur, verba faceremus; verum „hanc explicationem ad Caput de Corde rejici- „mus. „In hoc autem Capite de Corde, primum quod ad tubulum arteriosum attinet, num ipsius delineationem exhibueris, tute seis; descriptionem autem ejus dare non hic Lowerus magis, quam ibi Drelincurtius, aggressus est. Relinquabatur, ut in ea quam adjicis, Dissertatione id ipse præstares. Sed ut in ea scribenda hoc tibi proponere non potueras, ita accidit, ut quamvis Scriptorum quatuor loca protuleris ad eum tubulum pertinentia, ex nullo tamen eorum intelligere Lector queat, in quam Arteriæ Magnæ partem cruor per eum tubulum inferatur. Quinimo quis conjiciat, inferri in eam partem, in qua illa ramis ad superiora omnibus jam emissis, porro incipit descendere (qua quidem ex re ingeniose quædam a nuperis Anatomicis deducta esse, video) quis, inquam, id conjiciat, cum eorum aliquis, quorum verba profers, eum canalem „ducere, ajat „ab arteria pulmonis oriente in arteriam orientem „aortam? „Hic tamen satis instituto fecit suo, quod sane haud erat eum canaliculum describendi. Sed & Cl. Munnickius pro ea quam sibi proposuerat, brevitate, egregie ista scripsit, quæ ex eo producis; „Utramque hanc viam, foramen pu- „ta ovale & canaliculum arteriosum, ætate pro- „cedente natura paulatim obliterat, neque in „adultis referat, nisi cum graves causæ vias con- „suetas impederunt: Et quidem foramen ovale „clauditur non alia materia quam sua ipsius val- „vula; sic ut valvula semper maneat valvulæ cor- „pore, valvulæ tenuitate, & valvulæ perspicui- „tate. „Hæc tamen, ut in tuo isto amplissimo Theatro, illustrari certe magis poterant, primum ex Cowperi observationibus, qui ex infantum sectione comperisse se, docet, si istæ viæ, & præsertim foramen ovale, quod videlicet tardius occludi solet, æquo citius claudantur, sæpe multa mala ipsis inferri, ut capitis, colli, pulmonum inflammationes, in quibus propterea sanguinis imminutionem commendat: deinde etiam ex iis, quæ in adultorum cadaveribus facillime adnotari possunt. Nos enim quam sæpiissime vidimus, eam Valvulæ partem quæ ultra Ovalis Foraminis anteriorem, inferioremque marginem in Fœtu extendebatur, in senilibus etiam corporibus non modo nondum parieti pulmonaris venæ coaluisse, sed instar

194

196

198.

Append.  
Anat.

De Ovali  
Foramine  
ejusque  
Valvula,  
ut in  
adultis.



l. 2. tr. 5.  
c. 20.

Contro-  
vers. cum  
Mery c. 4.

195

instar duorum, vel plurium inæqualium, vel, quod frequentius, unius insignis Sacculi (aut, si mavis, valvulæ sigmoidis, sed angustioris, aut denique, ut Verheyenius loquitur, insignis sinus) cujus orificium deorsum nonnunquam, sæpius antrorsum spectabat, tum crassiora specilla, tum ipsum extremum scalpelli manubriolum inter se, ejusque venæ parietem tam alte admisisse, ut quod Verheyenius in vitulis, diversa temporis distantia post nativitatem mactatis, perspexit, Valvulam videlicet, dum a parte pulmones respiciente parieti venæ pulmonalis adnascitur, adhuc crescere & extendi ubi cor respicit: id in hominibus quoque verum esse videretur. Illud vero certissime observavi, totam fere istam, quæ soluta adhuc erat, Valvulæ partem multo ac multo crassiorē quam in fœtu esset, atque firmiorem esse factam. Quinimo in ipso sacculi extremo fundo inter hunc, & ovalis foraminis anticum, supremumque marginem adhuc apertam cruori viam perexiguam pluries vidi, semel vero ejusmodi, ut manubrioli scalpelli acumen nullo negotio in venam cavam transmitteret, idque in muliere, semel denique in viro annos facile quadraginta nato eandem viam usque adeo apertam comperi, ut apicem ipsum minimi digiti admittere ferme posset a parte quidem venæ cavæ; nam quo magis inde ad sacculi orificium pergebat, eo magis instar conici tubuli contrahebatur. Quæ quidem postrema observatio ut isti prorsus contraria est, quam in alio viro Cl. Littrium habuisse, refert, ita priores illæ suspensionem injicere videntur, annon istud orificium, quod, a parte venæ pulmonalis triplo grandius, quam a parte venæ cavæ, Littrius invenit, ad descriptum potius a nobis sacculum, quam ad ipsum ovale foramen pertineret, hoc est annon minor hiatus quem in vena cava conspexit, ille quidem non foramen totum ovale, sed aliqua dumtaxat ejus pars esset ob Valvulam non undequaque cum foraminis margine conglutinatam adhuc apertam; major autem alter hiatus quem in vena pulmonari vidit, nihil aliud esset, quam quod nos orificium Sacculi nuncupavimus; quod sane ejusdem Sacculi fundo latius plerumqueprehendimus. Atque ut omnes intelligant, me nulla alia causa, nisi veri amore, & studio permotum hæc attigisse, continuo addam quæ in marinæ testudinis corde observavi, magis profecto cum Diligentissimi Meryi, quam cum aliquorum ex iis qui contra ipsum scripserunt, observationibus congruentia. Quod quidem eo libentius faciam, quo magis omnibus notum est, quantum illius cordis structuræ in sua de usu ovalis foraminis controversia Meryus tribuerit.

## ANIMADVERSI O XVII.

Anatome  
Cordis  
Marinæ  
Testudi-  
nis.

**I**gitur in Marina Testudine librarum sex & triginta pondo, quam cum Doctissimis Amicis Venetis dissecuimus, postquam cor a pericardio omnino divisimus; erat enim cum infima pericardii particula, non per tendinea quidem filamenta, sed immediate connexum; ac postquam plures per cordis posticam præsertim partem nervos diffusos perspeximus, auriculasque inspectando, alteram altera majorem agnoscere non potuimus, sectionem aggressi, sic observavimus. Venæ cavæ in amplum corrivabantur Sinus, & fere membraneum. Ex hoc aditus erat in auriculam dexteram per magnum, & propemodum circulare orificium binis membraneis valvulis, fibris carneis instructis, ornatum. Hæ valvulæ, figura, & positu palpebris similes, ita illi orificio, cujus diametro longiores erant, subjiciebantur, ut totum, dum contraherentur, possent occludere. Ab auricula dextra in dextrum, ut ab sinistra in sinistrum cordis ventriculū transibatur, non aliis utrinque ei transitui præfixis valvulis, nisi quæ protinus describentur. Septum erat unam inter atque alteram auriculam amplum, membraneum,

tenuē, sed fibris tamen carneis in superiore parte instructum. Ab ejus septi inferiore parte car-næ duæ crassæ valvulæ altera in dextrum, altera in sinistrum ventriculū propendebant ita inclinatæ, ut proclive esset conjicere, ventriculis se contrahentibus, a compresso sanguine attolli valvulas, & ad auriculas succcludendas compelli. Harum valvularum ea quæ in ventriculū dextrum propendebat, alteram crassitie, & magnitudine superabat. Porro ab summo ventriculo dextero Arteria Magna oriebatur, paulo post in superiorem, inferioremque truncum divisa. Ex eodem quoque ventriculo, sed paulo antè, insignis altera Arteria exibat, quæ post emensum curvo incessu digitorum transversorum circiter decem intervallum, in truncum Magnæ Arteriæ inferiorem desinebat. Qua utraque Arteria ex corde oriebatur, binæ singulis valvulæ semilunares præficebantur. Ceterum ventriculi dexteri paries sinistè Foraminibus duobus, anteriore uno, postico altero pertundebatur. Antè, quod circulare erat, nullisque valvulis instructum, apicem digiti pollicis admittebat. Postè autem, quod figura erat quasi trianguli cujus basis ad superiora spectaret, amplius quidem priore erat; sed a binis illis valvulis, quas ab septo auricularum in ventriculos demitti, dictum est, ab iis, inquam, ita ut dixi, propendentibus ad tertiam fere partem superius obducebatur; reliquæ autem duæ partes tertiæ reticulo tenuissimo ex fibrillis albicantibus constructo, & cruorem tamen per suas areas transmittente, impediabantur. Per hoc Foramen dexter ventriculus cum sinistro, per illud alterum cum tertio quodam ventriculo, qui dextrum inter, sinistrumque erat ab anteriore parte interjectus, communicabat. Porro intermedius hic ventriculus, ut parvus esset, tamen ab ima fere parte cordis ad summam pertingebat, emittebatque in ipsa cordis basi pulmonarem Arteriam, cujus initium binis pariter valvulis semilunaribus ornabatur. Venæ autem pulmonares in sinistra auricula, & hæc porro in sinistro ventriculo hiabat, nullis (quod satis videre potuerimus) aut ad earum venarum fines, aut ad hujus ventriculi orificium valvulis præpositis, si illam unam excipias, quam ex septo auricularum pendere, indicavimus. Quod ad ventriculorum crassitiem attinet, illud videor meminisse, crassioribus parietibus sinistrum fuisse, quam dextrum, hunc vero, quam partem intermediæ anteriorem. Fasciculus autem, in quem arcte supra basim cordis arteriosi trunci colligebantur, qua esset longitudine, & singula vasa qua diametro, haud satis videor meminisse. Illud vero præclare meminisse, nullum certe orificium fuisse per quod aut sinistè ventriculus emittere cruorem posset, nisi Foramen illud postè, aut intermedius excipere, nisi illud alterum antè, per quæ videlicet singula singulos hosce ventriculos cum dextro communicare, proposui. Quæ cum ita essent, agnovi facile, sanguinem tum ab universo corpore, tum a pulmonibus redeuntem, illum quidem per auriculam dexteram immediate, hunc vero per sinistram, subjectumque sinistrum ventriculū, omnem denique in dextrum compelli, ut ab hoc, & communicante intermediū in corpus universum, tum in pulmones propellatur: atque ideo sinistrum ventriculū quasi alteram esse auriculam dextro additam, intermedium autem appendicem esse dextri, dextrum vero eundem esse denique atque illum qui in piscibus unus solet ventriculus inveniri, sed in marina certe testudine ad promovendum cruoris circuitum multiplici tum comminute, tum propellente machina adactum. In marina, inquam, testudine; nam etsi in terrestri ventriculorum communicationem, in fluviatili autem tres ventriculos, ut in marina, dispositos mihi alias videre visus sum; ob earum tamen cordium parvitatem, & minus accuratam, ut in eo qui ad alia properabat, observationem id pro certo in præsentia affirmare nequaquam pos-



possem. Sed ut ad marinam testudinem redeam, etsi haud difficile agnovi, sanguinem ex sinistro ventriculo per Foramen illud posterius in dextrum compelli; non tamen facile intellexi, quā pariter ex sinistra Fœtus auricula per Ovale Foramen in dextram possit transmitti. Ovale enim Foramen a parte auriculæ sinistræ ejusmodi valvula instruitur, quæ & ipsum obducere totum possit, & cum auricula se contrahit, vi compulsi deorsum cruoris, sursum a foramine abduci nequeat.

## ANIMADVERSIO XVIII.

**V** Erum his missis, eo nunc revertamur, Vir Cl. ut alia quædam Loweri loca indicemus, quæ non minus ac primus ille de Pericardio, aliquam a te Notulam postulabant. Huc certe pertinet: liquorem seminalem a cicatrice, com-  
198. pulsum, exitum quærentem, viam sibi facere, atque canalem procudere; atque ad hunc modum, ipsa vitæ nostræ primordia, & corporis staminum ortum ducere videri: „Cor, præ cæteris corporis membris calore magis - vegeto donari; „quo in loco Jo. Alphonsi Borelli contrarium experimentum erat memorandum, aut certe expendendum: „Nervis octavi paris, in  
199. „cervice arcte ligatis, aut penitus abscissis, - Cor-  
De Mor. „statim ab injecta ligatura palpitare & contremiscere incipere, atque ita diem unum & alterum miserum animal corde tremulo & pectore admodum suspirioso languidam vitam protrahere, & brevi tandem expirare; „ubi longe alia Willisii narratio non erat omittenda; hic enim eodem experimento aliquoties iterato, „statim - quidem magnum cordis tremorem observaverat; - verum hoc affectu brevi cessante, „animal per plures dies superstes, tamdiu vixisse, donec præ longa inedia viribus sensim attritis enecaretur: „& sane memini a Viris Experimentissimis accepisse, cum idem experimentum pluries instituissent, multo vero propiorem hanc Willisii narrationem, quam istam Loweri comperisse. Huc adde: „Sæpenumero vermes intra pericardium gigni: „ac, „Venis jugularibus subducto iis filo in cane arcte ligatis, - supra ligaturam - post obitum - musculos omnes & glandulas sero limbo maxime distentas & admodum pellucidas apparuisse; „ubi admonendum fuerat, Industrio tamen Novesio hoc experimentum semel, atque iterum institutum non respondisse. Huc quoque illud pertinet: „in quantum cerebrum humanum rete mirabili (quod feri superflui partem a sanguine excipiat & a cerebro prævertat) omnino destituitur, atque vasa sanguifera tortuosa licet ductu ad frangendum sanguinis impetum formata fuerint, „(quo in loco tu Figuram eorum ab Auctore exhibitam, ut & paulo infra duas alias omitto), „- ideo fieri non posse quin „serosior, & aquosior sanguis, in cerebrum infusetur; „quæ ad verba ut non admoneres, homini quoque rete mirabile tributum esse; illud tamen non videbatur prætermittendum, rete istud ex sanguine ad cerebrum propulso non posse superflui feri partem delibare, excipere, & a cerebro prævertere, nisi aut illi retinescio quam facultatem serosas particulas alliciendi, aut his ingenium affingamus, quo in iis Carotidum, per quos ad cerebrum compelluntur, ramis se se a cæterarum complexu extricantes, in laterales ipsorum ramusculos divertant: quod quidem Willisius, pluresque alii Illustres alioqui Anatomici de his, aut aliis ejusmodi infra, vel intra cranium lateralibus Carotidum ramis verba facientes, & in his etiam Verheyenius, ubi plexus choroidis usus proponit, satis animadvertisse non videntur.

Sed & isti observationi: „venas omnes sanguinem quaquaversum a cerebro excipientes, - non osculis versus occiput (quæ rectior exunt sanguini in sinus laterales via foret) sed, „versus frontem, retro quam cursus ejus est, „apertis hiare: „Cl. quidem Vicussenius ali-

quatenus, at Ridleyus Anglus multo etiam magis adversatur. Postremo ex te ipso quæro, Vir Ornatissime, num, si „necesse est sanguinis uncias quatuor mille intra horam cor trahere; - dato, in hoc homine viginti quinque libras sanguinis inesse; „quæro, inquam, num sequatur, „totum hujusce hominis sanguinem, „intra unam horam sexties per cor circulari? „mihi sane, atque aliis non sexies dumtaxat videtur, sed tredecies, & quod excurrit.

Anat. Cerebr. c. 6.

211.

## ANIMADVERSIO XIX.

**T** Abulæ sequuntur, „quibus non tantum, „inquis, superius allata confirmantur, ac „Docti Lectoris oculis quasi subjiciantur; verum etiam novis explicationibus ac demonstrationibus non parum illustrentur. „Attamen præter alias Loweri Figuras quas subinde a te esse omittas, indicavi, sex illæ præsertim desiderantur, quibus ea quæ novissime ex eodem attuleras de apparatu ad Transfusionem sanguinis necessario, commonstrentur. Sed & Figuræ 6. & 7. Tabulæ LXXXV. quas ex Bidloi Anatomia sumptas nonnullis Loweri Figuris substituis, vide, quæso, num quæ hic docuit, confirmet, aut illustrent. Nam; ut alia mittam; Lowerus certe docuit, & recte quidem, exterioris ordinis fibras in cordis, „dextro ventriculo - oblique dextrorsum ascendere; „in istis autem Bidloi Figuris, „omnes fibræ exteriores dextri lateris, B., oblique sinistrorsum ascendentes monstrantur. Figuram autem 9. ejusdem Tabulæ a Bidloo pariter acceptam, ejusque Figuræ Explicationem, ut apud Bidloium legitur, si cum Tabulæ proximæ LXXXVI. Figura 1. ut apud Lowerum habetur, hujusque Explicatione comparaveris, intelliges facile, 9. illam Figuram omitti potuisse, aut ejus saltem Explicationem paulo aliter exhiberi. Sed & in memoratæ modo Tabulæ Figura 4; ut de 5. fileam; vide, obsecro, num littera A. *Ventriculum dexterum*, an potius Venam Cavam; & num littera B. *sinistrum*, an potius Arteriam Magnam ostendat, & num denique in 6. Figura litteras GHIK omittere, an earum Explicationem cum Bidloo subjicere præstitisset. Verum hæc leviora; illud fortasse gravius quod cum Figuris hic tot protuleris, quibus ea quæ supra allata sunt, confirmares, atque illustrares; in nulla tamen, non jam dico Venæ Coronariæ Valvulam semilunarem, a Lowero ipso non memoratam, sed vel tres Sigmoides Pulmonaris Arteriæ Valvulas, vel totidem dextræ Auriculæ subjectas Tricuspidales tuis Lectoribus indicaveris. Mito reliqua, & quo me vocas, non istiusmodi dumtaxat Animadversione in meam Figuram apposita, sed istiusmodi quoque ejusdem Figuræ Explicatione supposita, quo inquam, me vocas, eo descendo.

216.

217.

218.

## ANIMADVERSIO XX.

**E** T primum manifestius est, quam ut inculcari debeat, cum me non fugeret, plerasque corporis Particulas aliquanto aliter in aliis cadaveribus inveniri, una autem Figura istas omnes varietates ostendi non posse, idcirco haud nudas Tabulas esse a me editas, sed cum ejusmodi descriptionibus conjunctas, ut quod pictura minus possem, id oratione sic satis complecterer. Tu vero meis quidem Figuris omnibus in tuo Theatro locum dedisti; respondentibus autem descriptionibus, quamvis ego inter initia Explicationum interdum, & hic præsertim, eas memoraverim, & ad ipsas nominatim remiserim (si unam, vel alteram Figuram excipias) non dedisti. Quid? quod ne istam quidem Explicationem quam meæ Figuræ, meo nomine inscripto subjicis, ne istam quidem ita exhibes ut ego scripseram. Nam in mea certe Explicatione nihil de *Boum Cordibus* interjectum, nihil de *usu descriptæ Mechanicæ* adjectum est, quæ tu videlicet omnia quali

218.

l. 1. tr. 4. c. 8.

Nevogr. l. 1. c. 2.



quasi ibi a me scripta, addis, atque interferis. Contra in mea ob eas quas dixi, varietates, tum in ipso titulo, descriptionis huic Figuræ respondentis locus indicatur, tum litteræ *aaa* sic declarantur: „Corpuscula quæ qualia in cadavere hoc erant, singula in singularum valvularum occurrunt limbo, fibra tendinea firmato. „Tu autem illud quidem prorsus omittis; has autem litteras ita me inducis explicantem: „Corpuscula „rotunda, in medio Valvularum Semilunarium „limbo posita, fibrisque tendineis firmata. „Sane de Jacobo Henrico Pauli, qui non absimili modo cum Bellino egerat, Virum Gravissimum Marcellum Malpighium censuisse, ab illo jus gentium esse violatum, tute optime scis, qui illa Malpighii verba in tuo Theatro exhibuisti: „itaque „violato jure gentium textum ipsum mutilatum „typis vulgari jussit. „Sed hic mihi nequaquam placet ita severe tecum agere, Vir Cl. Meam descriptionem, quamvis a me nominatim indicatam, omisisti. Fortasse non necessariam existimasti. Mea illa verba de Corpusculis *qualia in cadavere illo erant*, ostensis non posuisti. Fortasse in describendo contigit, ut te invitum fugerint. De his igitur non queror. At te Animadversionem quandam in meam istam Figuram continuo additurum, mea verba paulo diligentius non attendisse, atque illa præsertim omisisse, quibus omisis, aliquis, non omisis, nullus fere ipsi Animadversioni sit locus, de hoc vero si quereretur, jure ne, an injuria quereretur, tu ipse tecum existimabis. Vide enim, quæso, quam facile per ea ferme tantum quæ tu omisisti, *scrupuli* isti omnes evellantur, quos sibi Figuram hanc nostram *imponere*, Cl. Animadversionis Auctor scribit. Concedit namque, „quod in illo cadavere quod erat præ „manibus Diligentissimi Autoris, inventa fuerint illa corpora quæ ab ipso stabiliuntur in „medio singularum valvularum limbo, seu sub „angulo valvularum curvilineo. „Satis quidem erat ut diceret, „in medio singularum valvularum limbo; „id enim semper verum est; at quod de suo addit, „seu sub angulo valvularum „curvilineo, „illud non æque verum est; is enim angulus etsi a me in illis quos tunc inspexeram, bobus, & præterea in plerisque hominibus, atque adeo in eo quoque, unde est Figura descripta, visus est, non tamen semper in omnibus est valvulis; quæ causa fuit, ut in hominibus quidem illa corpora *sub eo angulo non stabiliiverim*. Sed quoniam concedit quod satis est; idcirco hoc omisso, quæ deinde neget, videamus.

„Affero, inquit, post hæc non in subjectis omnibus ad valvulas omnes corpora hujusmodi „inveniri. „Primus hic est ipsius *scrupulus*. At hunc sibi ipse evellere poterat, si nostram Explicationem, ac descriptionem ante, ut æquum erat, perlegisset, quam in respondentem huic Figuram Animadversionem conscriberet. Explicatio enim docuisset, ita in Figura ea corpuscula ostendi atque occurrere, ut *in cadavere illo erant*; in descriptione autem verba illa se se obtulissent: „ea „corpuscula sæpius in aortæ, quam in pulmonaris arteriæ valvulis comperio. „

## ANIMADVERSIO XXI.

*Deiisdem.* **H**ic dices fortasse: At gravior erat *scrupulus*, quam ut istis verbis eximi posset. Nam „in „plurimis, inquit, nullum (corpusculum) invenimus; in aliquibus ex valvulis omnibus, „non minus aortæ, quam arteriæ pulmonaris, „unum dumtaxat; duo in aliis, & interdum tria. „Eximi tamen debuisset, si, ut par erat, animadversum fuisset, nostras illas descriptiones post „cadaverum longam seriem attente spectatam, „ut in Præfatione monueramus, fuisse editas. Et sane, quamvis non eas omnes quas tunc habuimus, observationes scriptas servemus; ex illis tamen quæ forte servatæ sunt; & ex iis quas novissimis hisce annis coram nostris Auditoribus iteravimus, humana corda, minimum, quindecim

continenter inspexisse nos certo scimus; quorum in duobus, Arteriæ Magnæ valvulæ omnes, in totidem una, in uno dux, & rursus quorum (promiscue videlicet tum memoratorum, tum reliquorum) in quatuor; Pulmonaris Arteriæ omnes valvulæ, in uno una, in quinque dux corpusculis carebant, cum cæteræ quidem singularum Arteriarum valvulæ in iisdem, & omnes in reliquis cordibus non carerent; hæc, inquam, nos certo scimus; ipse vero hujus observationis habendæ gratia, antequam suam istam Animadversionem emitteret, quot corda inspexerit, nescimus; ex his quæ pronunciat, non quot sufficerent, inspexisse, conjicimus. Conjecturam autem hanc nostram illa haud leviter confirmant primum quod Anatomicus exercitissimus Arantius, illorum corpusculorum Inventor, ea scripserit in memoratarum Arteriarum valvulis *magna ex parte* apposita esse; deinde vero quod postquam a nobis eadem, hac nostra ætate passim ignorata, sunt iterum Anatomicorum notitiæ restituta, Cl. Fantonus diserte docuerit, istiusmodi tubercula „ad „instar verrucæ e medio limbo cujuslibet valvulæ „prominentia se *persæpe* in homine invenisse; „Verheyenius autem, dum eadem; quæ *nodulos* appellat; describeret, atque ostenderet, utrumque iis verbis fecerit, quibus ea quæ ut plurimum (ne dicam semper) inveniuntur, describi solent, atque ostendi. Cum ergo nobilis hic Anatomicus ita se gerat, duo autem illi priores, Viri sane exercitissimi, alter *persæpe*, alter *magna ex parte* se invenisse, testentur, existimare omnes poterunt, rectene, an secus id quod diximus, de eo conjecerimus, qui *in plurimis nullum* se asserit invenisse.

## ANIMADVERSIO XXII.

**H**æc etsi evidentissima sunt; tamen qui nihil aliud nisi Theatrum tuum legerit, ipsi facile in eo saltem assentietur, quod de me subdit: „Qua de re dicendum illud non esset, quod „ipse asserit in figuræ explicatione: *singula in „singularum valvularum accurrunt limbo fibra tendinea firmato*. „Qui vero Explicationem meam legerint, cum illa sæpius memorata verba: *qualia in cadavere hoc erant*: cum istis ipsis a me conjuncta, ab utroque autem vestrum ommissa, animadverterint, tum illud de me dictum esse, tum hæc quoque subjici, mirabuntur: „Et certe, te fibra etiam illa tendinea in omnibus subjectis „non venit. Mitto intensam nimium dictorum „corporum exhibitam molem, &c. „Quamquam revera vel mea illa Explicatione seposita, leviores *scrupuli* isti sunt, quam ut objici debuissent. Nam peculiarem illam fibræ tendineam vix uno in cadavere, quod inspexi anno superiore, de fuisse memini, cum in cæteris quidem fuerit, in aliis crassiuscula, in aliis tenuior, in tribus præsertim, in omnibus fere Magnæ Arteriæ valvulis etiam multiplex; sed ita ab his natura, an morbo soluta, ut summiis ipsarum lateribus, mediisque corpusculis hinc dumtaxat, atque hinc alligata, inter se, valvulasque subjectas duo utrinque interstitia relinqueret, per quæ scalpelli manubriolum transmitti posset: qualem fibrarum dissolutionem in extremo interdum limbo conspexi ejus quoque valvulæ quæ in crescentis lunulæ modum major aliquando, alias minor Coronariæ Cordis Venæ præficitur; quam quidem valvulam semel etiam vidisse memini ita ab ejus Venæ ostio sejunctam, ut cornibus tantummodo cum eodem colligaretur. Quod vero ad ostensorum corporum magnitudinem attinet; ipse quidem „intensam nimium eorum molem reputat; pro ut, licet etiam aortæ ipsæmet valvulæ aliquantisper ultra „naturalem magnitudinem delineentur, nulla tamen adhuc proportio dictorum corporum cum dictis valvulis est, pro ut referente etiam Arantio ab Authore citato *grani panici imaginem* & „molem repræsentant naturaliter hujusmodi corpora; sicque longe ultra delineationem minutiora; quod & per Autopsiam patet; „quasi vero ipse

Anat. Obs. c. 33.

Anatom. Diss. 12.

J. I. tr. 3. c. 8.

De earundem Valvularum Fibris.

De earundem Corpusculis.



ipse tritici, atque adeo fabæ magnitudine delineassem, qui eorum medium aliquanto etiam minus, quam tuus Scalptor, delineaverim, aut valvularum dimensiones ultra naturalem magnitudinem amplificassem, qui circini ope & tunc fideliter ex vero desumpsi, & nuper, ex vero desumptas esse, nonnullis meorum Auditorum ostendi. Quod si quis forte dubitaret, utrius scripta, inter se adeo dissidentia, ad veritatem propius accedant, neque cadaverum copiam haberet; at is saltem verba ista quæut Arantii a nobis citati alia forma scripta objecit, cum Arantii observationibus, aut cum Adversariis nostris conferat; & si aut apud Arantium, aut apud me, hunc laudantem, inveniat, grani panici *molem* repræsentari *naturaliter* ab istis corpusculis, si duo, inquam hæc verba inveniat, tunc quin de mea in rebus anatomicis fide dubitare incipiat, non repugnabo. Quibus autem cadaverum copia erit, ii velim in tot cordibus, in quot nos quæsimus, ante perquirant, quam de his rebus quidquam statuunt. Haud raro enim in corpuscula quædam incident nostris æqualia, interdum & majora; nos certe in cadaveribus quatuor bis in una, & bis item in duabus valvulis majora ostendimus, quam quæ pinximus sic ut in una Pulmonaris Arteriæ valvula transversum quoddam esset corpusculum transversum, quod maximum delineavimus, etiam majus. Sæpe etiam, fateor, invenient neque ita magna, neque ita extantia, atque distincta. Sed num, quæso, oportebat, me primum corpuscula quædam ignota, atque exigua idcirco delineantem, ut in pristinam lucem revocarem, ex iis cadaveribus describere, in quibus minus apparerent? Non ita sane, ut alias dixi, se gesserunt plerique Summi Anatomici quorum Figuris tuo in Theatro passim uteris; sed cum Particulas per se exiguas pingere deberent, ex iis potissimum subjectis describere, in quibus, intra naturæ limites, majores invenissent; reliqua autem, in quibus minores, minoresque vidissent, neglexere.

„ Quorum æmulari exopto negligentiam

„ Potius quam istorum obscuram diligentiam; „ istorum, inquam, qui id mihi posthac vitio darent quod eorum commodi causa feci. Istos ipsos præterea moneo, ne sibi facile imponi patiantur a multis cadaveribus in quibus primo oculorum judicio nulla corpuscula esse, credent, quæ tamen tactu judice non deesse, mox cognoscent; sunt enim interdum compressa, neque ita distincta præsertim cum trianguli formam habent, in quod subjectæ valvularum Magnæ Arteriæ fibræ quasi in peculiarem tendinem conveniunt: quo potissimum illa pertinent quæ in descriptione posui: „ ea corpuscula aliquando intus carnea, alias vero quasi tendinea comperiuntur: „ atque inde etiam factum est, ut nonnunquam, aliis fibris alio, omnibus tamen inter se proxime desinentibus, corpusculum unum quasi ex tribus coagmentatum invenerim.

#### ANIMADVERSIO XXIII.

**S**ed reliquos Animadversionis *scrupulos* perpendamus. „ Non loquar, inquit, de valvularum figura, quæ non sat fidelis videtur mihi. „ Utrum eam dicit, quam meus, anquam Scalptor descripsit tuus? In hac enim quædam vel ipse desidero. Ut enim mittam quod de corpusculo medio dixi, aut tendineam fibram huic in summo sinistro limbo proximam, quæ nostra crassior est; certe neque illam crassitudinem, quam in laterali, atque ima valvularum peripheria per tenuem, albumque quasi dimidiatum annulum de industria expressi, neque fibras mediæ præsertim, sinistræque valvulæ satis fideliter descripsit. Verum enimvero tantum abest, ut de his rebus Animadversionis Auctori scrupulus infederit; in iis nobis adversatur; itaque cum alterum scrupulum occultet, alterum patefaciat, illum de quo filet, eo facilius mittamus, quo hunc de quo loquitur,

apertius exponit, atque ita quidem, ut; quod Tullianis verbis dicam, „ signi satis det, si quid „ esset quod posset dicere, se tacere non posse, „ ut quandiu in cæteris rebus tacuerit, scire omnes possemus, nihil habuisse quod diceret. „ Illa enim, inquit, „ duplicatura a tuberculo utrinque eleganter descendens, ut vitta, qualis in figura depingitur, obvia mihi nunquam fuit, quantumvis supponi possit, dari per valvulas fibras „ aliquot carneas, earumque & aliquot usque ad „ valvularum tubercula propagari. „ Sincere tecum agam, Mangete Ornatissime. Supra quidem credidi, in non multis, at in aliquot tamen valvulis suas ipsum observationes instituisse; hic vero nimis paucas inspexisse videri potest. Ego enim qui tot inspexi, atque ostendi, vix perpauca Arteriæ Magnæ valvulas inspexisse, aut ostendisse memini, in quibus id ipsum quod „ obviu sibi „ nunquam fuisse, „ asserit, obviu mihi, omnino autem paucas, in quibus obviu etiam his qui adstabant, non fuerit. Quinimo vide, quæso, Verheyenii descriptionem, & Figuram descriptioni respondentem. Nonne in illa tanquam de re perpetua, de iis valvularum fibris loquitur, „ locatis magis transversim-quarum plurimæ con- „ veniunt in medio limbi, qui a corderemotior „ est, ubi reperitur nodulus quasitendineus, qui „ apparet formatus ex iisdem illis fibris, saltem „ earum haud paucis ibidem concurrentibus? „ Nonne addit, præterea se, „ invenisse in utroque „ latere valvulæ tres fibras crassiores (aliquando „ in altero latere tantum duas) ac firmiores, „ valvulam oblique percurrentes versus nodulum, „ in quo desinunt; & quidem aliquando convergentes antequam nodulum attingant? „ Quid ergo aliud est illa quam nos pinximus, „ duplicatura, ut Animadversionis Auctor vocat, a tuberculo utrinque eleganter descendens? „ aut quid aliud potissimum ostendit illud curvilineum triangulum quod in singulis valvulis per ea puncta indicavimus, nisi quod ad appositas litteras *bbb* a nobis explicatum est, „ Valvularum scilicet fibras „ carneas, quarum aliquot ad Corpuscula pertinent: „ quas quidem fibras describentes cum in bove primum docuissimus, „ transversim per „ valvulas ab harum lateribus promitti, & esse „ istarum sæpe aliquot quæ ad limbi angulum „ sursum protensæ descriptum ibi corpusculum faciunt; „ tum subdidimus: „ neque admodum „ ab similem in nobis esse eorundem corpusculorum, & valvularum structuram, „ & speciatim „ has fibris carneis ornari pluribus, valvulas „ quidem pulmonaris arteriæ in transversum ductis, ostiola vero arteriæ magnæ oblique ut plurimum etiam protensis: harumque sæpius aliquot „ hinc atque hinc evidenter ad corpuscula elongari. „ Hæc autem Verheyenii, & meorum I. Adversariorum loca contuli non modo ut constaret, eadem quæ mihi, Verheyenio quoque fuisse obvia, verum etiam ut omnes intelligerent, quemadmodum ipse de Blancardo questus est quod suis, nulla sui mentione facta, usus esset, me quoque de ipso Verheyenio, si viveret, ob ejusdemmodi causam queri posse. Nam in priore Anatomie suæ editione, ut ego nondum Valvularum Fibras descriperam, aut earum Corpuscula restitueram, ita ipse ne verbum quidem de his rebus fecerat, aut earum Figuram dederat, quam postea dedit ita propositæ a me similem, ut eam quam in XIII. Tabula primam posuit, alii a me exhibitæ consimilem esse, alio in loco notavi; usque adeo nihil eorum quæ ego pinxi, sive corpusculum, sive fibram illam crassiorem, summum limbum firmantem, sive eas de quibus nunc agimus, fibras, totumque illud triangulum curvilineum spectes, prætermisit. Habet tamen quædam tum in descriptione, tum in Figura peculiariam, quæ pro nostris minime agnoscimus. In neutra enim valvulas Pulmonaris Arteriæ a Valvulis Arteriæ Magnæ separavit, sed de omnibus simul eadem proposuit, cum tamen quædam esse, quæ his non

De earundem Valvularum Fibris.

loc. cit.

Animadv. in Anat. Blancard.



non illis convenient, ex supra dictis intelligatur. Atque item corpuscula fere tota pinxit supra valvularum limbum prostantia, cum tamen ut plurimum ipsum non superent, aut certe non tantum superent; verum hæc atque alia omittamus. Neque enim decet oblivisci, in hunc de Verheyenio sermonem idcirco potissimum ingressos nos esse, ut ipsi quoque id *obvium* fuisse, ostenderemus, quod Animadversionis Auctor sibi unquam fuisset, negat.

## ANIMADVERSI O XXIV.

De iisdem  
Fibris.

Adv. III.  
An. 37. 38.

**H**ic igitur postquam scripsit: „ quantumvis „ supponi possit, dari per valvulas fibras a „ liquot carneas; addit: verum tamen est, strias „ illas copiosas per valvularum aream rete curio- „ sum efformantes, vasa potius esse sanguinea, „ quam musculares fibras, ut nuperrime demon- „ strabamus in quodam subjecto ex aortæ aneuris- „ mate denato. „ Nunc demum nova ista in fi-bris carneis agnoscendis orta difficultas est. In ex- „ tima Vesicæ tunica, & in superficie interna Pro- „ stata, ubi ne una quidem fibra vere carnea satis „ perspici ab aliis potest, ipse vel Musculos facile „ videt; in hisce autem Valvulis, in quibus ego „ fibras carneas manifestissimas ostendo, ipse mavult „ nescio quod *curiosum* rete ex vasis potius sangui- „ feris, quam ex fibris carneis observari; nimirum „ --- hic ubi opus est,

„ Non veretur; illic ubi nihil opus est, ibi „ veretur „

fibras carneas negare. Et hic in unius subjecti valvulis, iisque, ut in homine, ex aortæ aneu- „ rismate denato, fortasse morbofis, vasa potius „ sanguinea, quam musculares fibras se demonstra- „ se, mihi narrat, qui in tot cordium recte consti- „ tutorum valvulis fibras carneas luculentissime osten- „ derim! Neque enim memini Pulmonaris Arteriæ „ valvulas explicatas, objecto ex altera parte lumi- „ ne, unquam inspexisse, quin plures rubicundas fi- „ bras, non in retis modum intertextas, neque in „ ramos, ramulosque sanguiferorum vasorum more „ diductas, sed in transversum extensas & ipse, & „ quicumque aderant, tam clare viderimus, quam „ quod clarissime. Etsi vero in valvulis Arteriæ „ Magnæ non æque promptum est eadem ratione „ fibras carneas ostendere propterea quia totum il- „ lud trianguli curvilinei spatium; in quo quidem „ potissimum eæ locantur, multo valvulis prioris „ Arteriæ, ut quæ illo triangulo carent, crassius „ est, ideoque non ita pellucidum; non tamen us- „ que adeo vel mediocrem Anatomici diligentiam „ effugiunt, ut non modo suam illam, quæ obvia „ est, dispositionem, sed naturam etiam non pro- „ dant. Quo magis existimo, te quoque, Vir Cl. „ easdem vidisse, præsertim cum meæ Explicationi, „ quasi subjectæ Animadversionis securus, hæc ad- „ dere non dubitaveris: „ Ex hacce jam descripta „ mechanica, apparet qua vi Valvulæ Semiluna- „ res se moveant, quodque earum clausura ac re- „ laxatio, impetui sanguinis, aut ponderi non „ unice debetur. „ Et recte id quidem.

## ANIMADVERSI O XXV.

Descripta-  
rum Fi-  
brar. &  
Corpuscu-  
larum  
Ufus.

Anatom.  
Obl. c. 33.

Anatom.  
Diff. 12.

**Q**uod ut melius intelligatur, juvat hic per- „ pauca de singularum, quas in his Valvulis „ aut restituiamus, aut observavimus, Particu- „ larum utilitatibus attingere. Itaque Arantius post- „ quam „ in medio circumferentiæ - Valvularum „ cartilagineum corpusculum, - & earundem ex- „ teriorem circumferentiam reliquo corpore soli- „ diorem - quasi ex duplicata membrana constan- „ tem „ descripsit, hæc facta esse, indicavit, ut „ Valvulæ „ tum cartilaginei corpusculi, palpebra- „ rum in modum, beneficio, tum propter solidam „ adjacentem substantiam, facilius attolli, & con- „ nivere possint. „ Viro autem Ingeniosissimo „ Joanni Fantono, cum eandem structuram obser- „ varet, non modo „ statim cum tarso palpebrarum

„ analogia occurrit; „ verum etiam id postea sub- „ jicit: „ trinas valvulas orbiculares ad axim canalis „ venientes relinquere in axe ipso modicum spa- „ tium, quod a trinis tuberculis, quæ contigua „ fiunt, dum valvulæ turgent, commode reple- „ tur. „ Id ego eo facilius fieri posse, existimo „ quod medius valvularum limbus plerumque „ ut „ supra dictum est, in curvilineum angulum, si ex- „ plicetur, procreseat; explicari autem opportune „ posse ab eodem sanguine qui valvulas explicat, „ eo facilius videtur, quod ipsi angulo corpuscu- „ lum est appositum; & fortasse etiam quod car- „ neæ illæ fibræ hinc atque hinc ab imis valvula- „ rum lateribus assurgentes, & in corpusculum de- „ sinentes, eodem tempore contractæ, & valvulas „ deprimant, & illum angulum tendant. Utcunque „ hoc est; illud minus dubium videtur, illas alias „ transversas fibras, dum contenduntur, explicatas „ valvulas contrahere, ut vicissim erumpenti e cor- „ de sanguini facilius, ac promptius obsequantur, „ eodemque fortasse motu in proximas Arterias Co- „ ronarias vel primam has subeuntis cruoris par- „ tem, cum earum orificia supra limbum sunt val- „ vularum, vel postremam, cum infra ipsum pror- „ sus latent, compellant. Nam quod Cl. Fanto- „ nus „ veretur, ne potius ab aorta se contrahen- „ te mittatur sanguis in coronarias, quam a cor- „ de ipso contracto, quoniam videlicet eæ sunt „ aptissime ad directionem repulsi sanguinis ab „ aorta constitutæ, & sanguis a corde tam vehe- „ menter, ac rapide advolat in truncum arterio- „ sum, ut minimum ejus reverti eo momento in „ coronarias posse videatur; „ id sane ego etiam „ vererer, nisi eundem truncum ita plenum sangui- „ ne esse, ponerem, ut hoc renitente, is qui a cor- „ de impellitur, in trunci latera, ut hujus diastole „ ostendit, vim facere cogeretur, atque ideo in co- „ ronarios ramos videretur posse irruere: quod qui- „ dem eo libentius dico, quod eundem video Do- „ ctissimum, Amicissimumque Virum paulo post „ agnoscere: „ omnes velle non sine ratione vide- „ ri, ut etiam sanguinem in systole cordis coro- „ nariæ recipiant: „ quibus id negari posse non „ videtur, cum harum tamen orificia supra limbum „ sunt valvularum. Cum autem infra hunc tota la- „ tent, ut per valvulas ab erumpente e corde san- „ guine appressas eo tempore obstruuntur, ita neces- „ sario videtur relinqui, ut cum postmodum Arte- „ ria se contrahit, ac propterea repressus sanguis „ valvulas dimovet, atque explicat, in illa orificia „ tunc admittatur: eoque in casu Eruditissimo Boer- „ haavio assentiendum, docenti: arterias coronarias „ esse in diastole, dum reliquæ corporis arteriæ „ in systole constituuntur. „ Etsi vero hæc „ ut dixi, ita a primo habere se videntur; acrius „ tamen cogitanti fortasse hæc in variis hominibus „ in tanta re varietas tanta non satis veri similis „ invenietur. Namque illud præterea accedit, ut „ quoniam in uno eodemque homine arteriarum co- „ ronariarum alterum quidem orificium supra, al- „ terum autem infra valvularum limbum interdum „ comperi, ea ratione in uno eodemque corde ea- „ dem varietas eodem tempore videretur agnoscen- „ da. Quid ergo est? Alterutrum est fortasse „ eligendum: & quoniam earum arteriarum oscula „ in iis quibus pone valvulas prorsus delitescunt, „ vix, nisi eo tempore quo cor dilatatur, posse san- „ guinem admittere, certum est; ut sibi natura „ constet, id ipsum in omnibus instituisse credenda „ est, eoque magis quod etsi illæ arteriæ supra val- „ vulas aperiantur; tamen non modo, ut Cl. Fan- „ tonus admonuit, „ aptissime ad directionem re- „ pulsi sanguinis ab aorta, „ non vero impulsæ „ in aortam, sunt constitutæ; verum insuper quo „ tempore is impellitur, cum a corde se contrahen- „ te impellatur, nihil ipsæ, aut minimum posse ad- „ mittere ob validam fibrarum cordis ipsius constri- „ ctionem videntur. Verum iidem Sapientissimi „ Viri, quorum alterius suspicio, alterius sententia „ in hunc sermonem me induxit, hæc melius omnia „ dijudicabunt; nos quidem in medio relinquimus.

A N I-

Utrum  
Cordis Ar-  
teriæ Coro-  
nariæ eo-  
dem quo  
reliquæ,  
an alio  
tempore  
cruorum  
admit-  
tant.  
loc. cit.

Instit. Me-  
dic. n. 183.

De sede  
orificio-  
rum ea-  
rum Ar-  
teriarum.



## ANIMADVERSI O XXVI.

219  
De eadem  
re.

**N**Equè enim demum ad præsens institutum hæc valde pertinent; atque adeo miror, istam Animadversionem his verbis concludi: „ Quod autem præcipue advertendum; oscula arteriarum coronariarum non semper ad latera laudatarum valvularum, ut exhibentur in figura, naturaliter jacent; non semper tam alte posita, ut sic conspicua veniant supra valvularum limbos; „ quasi vero id mihi *præcipue* proposuissem, cum meam illam Figuram paravi, ut perpetuam eorum osculorum sedem esse, ostenderem, ad latera, & supra limbos valvularum. Enimvero si in eo quo sum usus, cadavere pone valvulas illa orificia latuissent; ut Pictor ea non vidisset, sic neque delineasset. Sed quoniam hac de refermo supra est a nobis injectus, & præterea ut istum novissimum *scrupulum* non minus, quam priores, tenuem, atque adeo minimi momenti esse, ostendamus; referre non gravabimur, de novem postremis cadaveribus quæ iterandarum circa has valvulas observationum causa continenter inspeximus, quinque haud inferiora (ne dicam superiora) ea oscula quam nostra Figura, exhibuisse; in duobus cum alterum æque ac nostra, supra limbum apparet, alterum in uno superius, inferius in altero fuisse; vix igitur in duobus ambo infra limbum delituisse, ut ex duodeviginti osculis quinque, non amplius, latuerint, tredecim reliqua supra valvularum limbos conspicua fuerint, atque ideo si forte mihi proposuissem (quod ad ipsa attinebat) non quod erat in eo cadavere, sed quod est in plerisque, delineare, certe aliter ac feci, delineare non debuerim. Quod quidem eo facilius affirmo, quo notius tibi esse, scio, idem esse ab Exercitativissimis Anatomicis Bartholomæo Eustachio, Richardo Lowero, Raymundo Vieussenio observatum. Hi namque omnes suis in Tabulis quibus tu, Vir Cl. tum in hoc Theatro, tum in Bibliotheca Anatomica sapienter usus, & præterea Andreas Vesalius, alique Gravissimi Professores, istiusmodi *scrupulorum* securi, earum arteriarum oscula ambo supra limbos, alterum plerique etiam ad latera valvularum pinxere. Jamque istos omnes *scrupulos*, quos Figura nostra *imponere* dicebatur, si æquorum, & in hujusmodi rebus diu exercitatorum hominum judicio standum est, satis videmur exemisse: sin aliis; ut Tullianis verbis utamur; „ scrupulus „ tenuissimus residere aliquis videbitur; non modo patienti, sed etiam libenti animo „ ejusmodi hominum dubitationes feremus.

## ANIMADVERSI O XXVII.

221

**I**N Capite VII. quo „ de Circulatione Sanguinis, ac de ipso sanguine varia „ complecteris, non est sane cur moremur. Non modo enim vix pauca affers, quæ in Bibliotheca Anatomica non protuleris, verum etiam ex his multa sunt, ut tu ipse alicubi agnoscis, inter *præternaturalia* potius, & *morbifica*, quam inter vere anatomica connumeranda. Ne tamen hæc omnia non legisse prorsus videar, nonnulla quæram: & primum quomodo hoc etiam tempore affirmes: „ horris „ ris ac æstus febrilis æthiologias „ non ex ipso „ sanguine, sed a succo nervoso, a sanioribus „ hodie peti? „ Deinde iis positis, quæ de Columbo nostro, aliisque Italis Anatomicis Eruditissimis Drelincurtius attulit; ut de Serveto illo Hispano Medico nunc fileam: per quæ videlicet luce meridiana clarius constat, eam saltem circuitus sanguinis partem quæ per ventriculos cordis, & pulmones habetur, ante Harvæum non ignotam fuisse; quomodo inter initia hujus Capituli pollicitus es, te post rationes quibus circuitus sanguinis „ inventionem - Medicis multis Harvæo non parum anterioribus - notam fuisse, „ assertum est, alias producturum esse rationes,

225.

227.

221

„ quibus - Magno Harvæo inventionis suæ gloria „ *plene* asseritur? „ Porro cum ibidem promiseris, adjecturum te esse „ genuinam rationem, „ qua sanguis ex arteriis in venas, & in alia vasa, „ tum variis secretionibus, tum & ipsi nutritio- „ ni dicata, traducitur; „ ubi vero ad locum in quo rationem istam adjicis, ventum est, hæc inter cætera proferas: „ ex Ingeniosissimi Cowperi authopsis demonstrari, & vasa lymphatica, „ & canales - secretorios - de parietibus dictorum „ vasorum, arteriosorum ac venosorum nasci; „ & quod ad secretiores attinet, „ specialius quid „ videri posse - in Tractatu de Hepate, ubi - de „ secretionem bilis; „ quæro ex te, oblitusne sis, te ipsum, ubi Figuras binas Cowperi huc pertinentes explicasti, admonuisse: „ ad vivum nullatenus esse primam Figuram, sed unice ab Autore afferri pro sua de Lymphaticorum origine „ sententia explicanda; - alteram autem Figuram „ edocere modum quo Ductus Excretorii a Vasis „ sanguiferis proveniant, secundum mentem - „ Autoris; nec ad vivum aliquid per eam depictum tradi. „ Nam quod ad *Tractatum* illum de Hepate attinet, num *genuina* ibi Secretionum *ratio* proponatur, satis ex III. Adversariis intelligi potest. Etsi vero tum Lowerum supra adduxisti scribentem, se in concretionibus cordis polyposis *plurimas venas advertisse*, tum hic Diemerbroeckium producis asserentem, se in polypis duobus *vasa sanguine turgida*, - *vasa sanguinea* vidisse; optassem tamen, ut istud *vas sanguineum* quod *in medio*, & *per totam longitudinem* cujusdam polypi a te visum memoras, diligentius descripsisses. Hæreo namque; ut verum fatear; non quod mihi, qui tamen plurimos inspexi polypos, id nunquam se obtulerit, sed quod Malpighius ipse negat, id sibi *videre contigisse*. Atque adeo etsi ego quoque cum eodem concedo, „ ex se se „ insinuantibus sanguineis particulis, dum hinc „ inde fibrarum concretione coercentur, tubulos „ efformari posse; „ veras tamen venas, vera sanguifera vasa non facile concesserim, nisi aut certæ, & peculiare horum tunicae describantur, aut in veris ipsorum parietum cordis, vasorumque excrecentiis, non in ejusmodi polypis, quorum naturam egregie explicat Malpighius, inventa sint.

## ANIMADVERSI O XXVIII.

**P**orro, ut „ Polypos istos narium, & fungos „ e cranii fissuris oriundos - momento renatos „ præteream; quæ paulo infra de Viperis habes, non sane video quæ unquam possim cum innumeris Experientissimi Redii observationibus conciliare. Tu enim scribis: „ morsus viperarum „ seu spiritus horum animalium efferati per „ vulnus a dentibus inflatum in venas delati. „ Ille autem demonstrat, non modo non *efferatæ*, sed mortuæ, atque etiam, nulla adhibita vi, mortuæ non minus quam viventis, & efferatæ viperæ mortiferum esse morsum. Tu scribis: „ spiritus illos eo minus facile inter exeundum „ avolare, atque commodius in partem demorsam „ infundi, quod maritentur vehiculo apto, humori sc. pingui & oleoso sub dentibus caninis „ itaposito, ut iisdem dentibus, (ut evenit) „ per iram arrectis, atque parti demorsæ durius „ admotis, comprimantur subjectæ vesiculæ humorem prædictum concludentes, unde ille continuo & necessario per dentis tubulati cavum progreditur ad foramen laterale non longe infra „ dentis apicem situm, sicque in vulnus inflatum „ una cum spiritibus mortiferis ita effunditur, „ &c. „ Reditus autem ostendit, eundem humorem longo temporis interjecto spatio exsiccatum, atque adeo in pulverem comminutum, vulneribus injectum mortem pariter attulisse: detectis autem viperæ dentibus, eundem lethiferum succum per dentis non cavum, sed superficiem ab radice ad apicem manifesto descendere. Denique

233

Tom. 1.  
217

207.

238.

239

235.

Lettera  
al Moro.

Ibidem.

Observ.  
int. alle  
Vipere.

tu



tu id potissimum inculcas : „ sanguinem anima-  
 „ lium a viperis demorforum solidius coagulari ;  
 „ quam ab infuso quocunque demum spiritu a-  
 „ cido ; „ id, inquam, inculcas ; non modo e-  
 „ nim istam insignem in corde, & vasis coagula-  
 „ tionem paulo ante descripseras, sed & in Capite  
 238. de Mammis indicaveras, & præsertim in quadam  
 169 Lowero apposita Adnotatione, „ sanguinem mo-  
 206 „ mento coagulari - a viperarum morfu, ita po-  
 „ sueras, ut inde satis superque patere, affirma-  
 „ res, venenum viperinum de salium volatili-  
 „ um, alcalicorum, sanguinem fundentium ac dissol-  
 „ ventium, natura minime participare, sed po-  
 „ tius ad salium oppositorum indolem accedere. „  
 Ibidem. At Reditus post multa experimenta in canibus,  
 felibus, ovibus, capris, pavonibus, columbis,  
 aliisque animantibus ejus rei inquirendæ causa  
 instituta, negat, se quidquam comperisse quod  
 pro satis explorato ac vero scribere possit, ut  
 qui, etsi in quibusdam animalibus viperarum mor-  
 fu interfectis coagulatum in ventriculis cordis san-  
 guinem inveniri, confitetur, se tamen non sem-  
 per in omnibus invenisse, testatur. Cæterum  
 238 cum quidquid Malpighianæ de Polypo Disserta-  
 tionis addidisti, ideo potissimum addideris, ut  
 eandem adversus Kerckringium defenderes, mira-  
 ri subit, cur quæ Kerckringio ipse reposuit Mal-  
 pighius firmis rationibus, propriisque, & Fracas-  
 sati, ac Bonfilioli observationibus suffulta ne me-  
 moraveris quidem, cum præsertim istum quoque,  
 240 ceu *partim lapideum*, Polypum esses memoraturus,  
 quem tamen non modo non lapideum, sed neque  
 osseum fuisse, tum ex nostris Animadversionibus  
 Adv. II. cognoscitur, tum ex ipsa Gl. Observatoris descri-  
 Anim. 42. ptione, qui duritiem non in Polypo incluso, sed  
 Theatr. in Arteria includente adnotavit. Sed illud ma-  
 Tom. I. gis etiam mirandum est, quod, Polypos ex cor-  
 194 195. dis, vel arteriarum, „ parietibus, ac etiam profun-  
 „ diori substantia ipsa non aliter enasci ac ve-  
 „ getare, quam varii fungi, & musci ex arbo-  
 „ rum tubulatis fibris assurgunt : „ tu ipse do-  
 234 ceas, qui paulo ante in Notula Malpighii Dis-  
 sertationi subiecta scripseris : „ quidni idem san-  
 „ guls, qui extra vasa sua stagnans concretiones  
 „ tam firmas, tamque irresolubiles, per fibras  
 „ suas morbo affectas, efficere potis est : quidni,  
 „ inquam, eveniat ut idem ille sanguis in vasis suis,  
 „ & præcipue in cordis ventriculis polypos etiam  
 „ duriores procreet ? „ Hæc certe cum illis con-  
 sentire non videntur, neque cum eo, quod de Mal-  
 pighiana sententia dicis, scilicet *vix ac ne vix*  
*concupi posse*. Quod autem tui istius novi iudicii  
 rationem hanc subijcis : „ quandoquidem validus  
 „ cordis motus, sanguinisque velox admodum in  
 „ propiores arteriæ tractus effusio, ejusmodi sta-  
 „ gnationibus præpediendis, pelliculisque inde  
 „ enasci incipientibus dissolvendis omnino sunt  
 „ aptæ ; „ sane quomodo huic dubitationi occur-  
 rendum sit, ex parte ipse Malpighius ostendit,  
 Ibidem. ex parte autem ex iis colligetur, quæ nos in II.  
 Anim. 40. Adversariis attigimus, præsertim cum illud quo-  
 41. que addi possit : in Polyporum generatione haud  
 raro ea præcedere, aut una observari consuevisse,  
 ex quibus sanguinis motum non ita esse tunc ve-  
 locem, vehementemque, conjiciamus.

## ANIMADVERSI O XXIX.

244 **R**estat Caput ultimum, de Pulmonibus. De  
 246 quibus ut recte profers geminas Malpighii  
 Epistolas, sic recte etiam vellem, Iconismos qui  
 ad certa earum loca pertinent, indicasse; neque  
 enim video, figuram, aut positionem lobulorum  
 in Figuris „ 4. 5. Tabulæ tuæ 89. „ monstrari,  
 sed tantum in 3. „ nec ranæ pulmones ostendi in  
 ejusdem Tabulæ „ figura 1. „ sed in 5. Verum  
 id a tuis potius Operis, quam a te, est facile  
 requirendum; illud a te ipso, ut ex iis quæ Sum-  
 mus ille Anatomicus in Posthumo Opere Episto-  
 lis hisce addidit, nonnulla selegisses, per quæ cer-  
 ta quædam earum loca non mediocriter illustra-

rentur. Quorum ut unum modo exemplum pro-  
 feram, necesse non est ab iis quos nuper forte  
 memoravi, ranæ pulmonibus recedere. Hos e-  
 nim cum in altera Epistola dixisset „ scisso per  
 „ longum abdomine, crumpere, neque ut in  
 „ cæteris animantibus illico flaccescere, sed ten-  
 „ sos ad animalis libitum perdurare „ vellicatus  
 deinde ab Entio, huic in Posthumo Opere ita  
 respondit, ut ex ulteriore anatome non modo  
 causas cæteras indicaverit, quæ id efficiant, ve-  
 rum etiam primus omnium, ut adjecta ad Ol-  
 denburgium Epistola ostendit, *reticularem mu-*  
*sculum* revelaverit, qui „ non tantum exteriori-  
 „ rem pulmonum ambit regionem, sed interiori-  
 „ res quasunque vesiculas, & sinus circumdat,  
 „ ita ut suo motu singulas pulmonis partes com-  
 „ primendo, expirationem promoveat : & hanc  
 „ eandem structuram in pulmonibus perfectorum  
 „ animalium proportionaliter observari, „ do-  
 cuerit. Hisce igitur carneis fibris ranæ discif-  
 sæ expirationem ex parte adscripsit ; inspiratio-  
 nem autem iis instrumentis per quæ inferior buc-  
 cæ pars amplificata, & mox contracta aerem in  
 pulmones compellit. Et mihi quidem cum  
 Amicis Venetis ejusmodi observationes iteranti  
 manifestum fuit, „ ranas ad libitum aperto e-  
 „ tiam thorace proprios exinanire folliculos, &  
 „ mox etiam turgidos reddere ; „ quinimo id  
 ipsum, dum fluviale quendam testudinem vivam  
 inciderem, observavi, invenique, totam eam  
 partem quæ intra cavitatem mandibulæ inferioris  
 est, multum posse extrorsum curvari, ut hinc  
 aer immitti posset, pulmones vero fibrarum rete  
 firmari, ut hinc aer vicissim posset remitti. Of-  
 ficulum quoque vidi in rana, illi aeris motui sub-  
 serviens; in ejus autem pulmonibus non laxioris  
 tunicæ, ut Entius inquit, corrugationes, sed  
 elegantissimam, quæ a Malpighio descripta erat,  
 alveolorum structuram. Illud verum est, nos ejus  
 officuli alterum extremum, non reliquæ basi æ-  
 quale, sed in parvum quasi circulum dilatatum  
 vidisse : neque ex alveolis, sive majoribus sinibus  
 tot hexagonos, aut ex inclusis minoribus tot vi-  
 disse, qui idem fere cum majoribus centrum ha-  
 berent, quot Figura proponit, non ista quidem  
 a tuo Scalptore minus accurate expressa, sed alia  
 quævis accuratissima : neque demum illos „ ala-  
 „ ryngæ binos ductus semicircularibus aliquot an-  
 „ nulis conflatos in membraneas vesiculas hian-  
 „ tes „ perspicere potuisse. Non tamen propterea  
 credimus, tantum Anatomicum in iis præsertim  
 animantibus, quorum *fere totum genus* se dissecando  
*perdidisse*, scribit, esse facile hallucinatum, sed  
 potius in omnibus fortasse ranis non idem prorsus  
 observari; neque enim ex. gr. inclusi illi minores-  
 que pulmonum sinus (quod & ipse egregie adno-  
 tavit) in ranis minoribus sunt conspicui. Num  
 vero haud absimili ratione defendi possit quod de  
 Viperæ pulmone scripsit Veslingius : in eum vi-  
 delicet „ duplici distractam ramo asperam arteriam  
 „ delabi : „ alii viderint ; nobis enim, qui multo  
 plures vyperas, quam ranas secumimus, nunquam  
 certe datum est duplicem istum ramum videre,  
 cum & ipse viperæ pulmo simplex sit, idest unus  
 oblongus lobus ex innumeris primum circumcirca  
 quasi vesiculis in favi modum apertis, deinde ex una  
 magna continuata vesica manifestissime constructus.

## ANIMADVERSI O XXX.

**A**D ea nunc transeo, quæ de Respirationis  
 Organis affers ex Willisio. Atque illud  
 primum occurrit de Vasorum in Pulmonibus dis-  
 positione : „ Trachea ejusque rami medium usque  
 „ locum tenent, supra hanc vena, & infra Arte-  
 „ ria pneumonica feruntur. „ Cum Vir Cl. Do-  
 ctissimusque Petrus Antonius Michelottus a me  
 per litteras petiisset, ut hanc vasorum dispositio-  
 nem in perfectis, ut vocant, animalibus diligen-  
 tius inquirerem, ego autem Viro & Amicissimo,  
 & ad Physico-mathematicas meditationes id  
 quærenti satisfactorius, ter quaterve inquire-  
 rem,

De Ranæ,  
 Testudi-  
 nis, & Vi-  
 peræ Re-  
 spiratio-  
 nis Instru-  
 mentis.

Op. Posth.  
 Tab. ult.  
 Fig. 1.

247

Observ.  
 n. 72.

De Vaso-  
 rum in  
 Pulmonib.  
 dispositio-  
 ne.

249



rem, sic reperiēbam. In agno, sinistro quidem bronchio arteria suberat, vena incumbēbat, dextro autem illa vicissim incumbēbat, hæc suberat, sic tamen ut neutrum bronchium exacte inter utrumque vas medium esset: quod clarius ex his quæ de humano pulmone addam, intelligetur; sic autem id quod dico, vel in agno accipiendum est, ut quod capiti proximius est, id superius; quod ventri, inferius habeatur. In Viro igitur utrinque erat super bronchio vena, arteria autem sub bronchio; huic enim a tergo apposita erat. In altero autem Viro ab utroque latere cum arteria esset anterior, posterius bronchium, vena intermedia; arteria comparata bronchio, superior fuit, vena inferior. In tertio denique, quem in sinistro dumtaxat latere diligenter inspexi, in superiore quidem pulmonis parte, bronchio tum vena, tum arteria superstabat; in parte inferiore substabat bronchio vena, arteria par erat; in media autem bronchio ambæ erant pares, sic tamen ut anteriora ibi teneret vena, posteriora arteria, bronchium inter utramque consisteret. Hæc autem omnia, etsi de horum vasorum maioribus tantum ramis sunt accipienda, cum ferme, quod Willisius ait, „impossibile sit hominum omnium simul incedentium, quoad furculos & propagines minores, protensiones, & varias inter se complicationes describere; attamen satis ostendunt, quid de allato Willisii loco, neque minus quid de illo altero Verheyenii censendum sit, in quo tum verbis, tum Figura traditur: „ramum asperæ arteriæ perpetuo esse medium, eique ab altero latere adjacere „ramum arteriosum, ab altero venosum.”

## ANIMADVERSIO XXXI.

249. Sequitur Laryngis, & Bronchi historia, in qua quantum; sive anatomen spectes, sive admirabile confirmandarum vocum artificium, desideretur; & nimis longum, & non ita necessarium esset indicare. Ipse enim Willisius cum ejusmodi Partium „descriptionem, & usus ab „Anatomicis adeo exacte tradi, inquit, ut non „opus sit iisdem amplius describendis immorari, & „se methodi gratia compendio quædam tantum „advertere; „satis admonet, fuisse istic ex aliis Anatomicis exactam, plenamque ipsarum historiam adjiciendam. Quæ sane quam necessaria fuisset, etsi ubi ad proximas Tabulas ventum erit, ex parte intelligetur; nunc tamen illud omitti non potest: in istis Willisii verbis: „laryngem „cartilagineas quasdam majores diversiformes, „aliasque uniformes habere; priores ob similitudines, quas ad res alias gerunt, dicuntur Epiglottidis, Cartilago scutiformis, Annularis, & „apud avicennas. Huic ultimæ continua cartilaginum eadem prorsus figura & ratione conformatarum series succedit; quæ singulæ, cum „circuli cujusdam sed non absoluti formam referant, „&c. „in istis, inquam, verbis semel, atque iterum videri Doctissimum alioqui Virum esse hallucinatum. Nam illæ uniformes cartilaginee, sive circuli non absoluti ad laryngem, asperæ, ut inquit, Arteriæ initium non pertinent, sed ad hujus truncum; illi autem ultimæ diversiformi cartilagini continua istiusmodi circulorum series non succedit, sed Annulari. Porro quod subdit, cujusque circuli „partem posteriorem, „ubi œsophago incumbit, quo melius deglutioni ciborum inserviat, in membranam abiire, „etsi non pertinaciter negavero; contendam tamen, non eam potissimam, aut certe non unicam esse causam cur sint imperfecti, cum id esse factum, ut asperæ arteriæ diameter pro re nata contrahi possit, illud satis indicio sit, quod non modo ea pars ejusdem arteriæ, quæ œsophago incumbit, verum etiam primorum bronchiorum usque ad pulmones uterque ramus ex imperfectis pariter annulis compingatur; neque enim verum est quod docet Verheyenius, qui & ista

Willisii verba descripsit: „cartilaginee in duobus loc. cit. „illis majoribus ramis esse quodammodo perfectæ. c. 21. c. 12. „cæ annulares.”

## ANIMADVERSIO XXXII.

250. Sed a Bronchiis ad Bronchialia Vasa, interjecta istic Adnotatio tua me avocat, Vir Cl. Equidem me Summum Anatomicum Ruyschium „plurimi facere, magnæque semper, & multa „habitura fateri, „nemo qui mea scripta legerit, ignorare potest. Præterea, quod ad Bronchialem Arteriam attinet, hanc ab ipso restitutam, auctamque libentissime fassus sum. At tamen ejusdem quoque existentiae, initii, atque insertionis inventum si acceptum ipsi retulissem, me Veteribus Anatomicis, quorum unius, atque alterius verba protuli, injurium esse, existimassem; neque enim ut tibi, ita etiam mihi eorum locorum, „prior - prorsus obscurus; aliter vero „paulo dumtaxat evidentior: „imo evidentissime iis adversari videtur verbis quæ paulo infra producis: „Hanc Arteriam a nemine adhuc esse „observatam, intrepide affirmo. „Certe aliter quam tu, judicavit Cl. Fantonus, qui „hanc, „inquit, arteriam a Galeno, & Fernelio descriptam fuisse, ostendit Doctissimus in Adversariis „Morgagnius; „quinimo Cl. ipse Heisterus, Vir non veri minus, quam Ruyschii, sui quondam Præceptoris, amicus, iis locis perlectis, huc demum rediit, ut illud tantummodo quod ego, concluderet: hunc „ramificationis ejus arteriæ „perspicuam descriptionem, & delineationem „primum dedisse: „quod si satis esse homines censeant, ut illi omnem inventionis ejus arteriæ gloriam adscribamus, mihi denique non id molestum sane erit, sed longe jucundum, propterea quia pares ob causas, multarum rerum quas auctas, primæque perspicua descriptione, & delineatione illustratas restitui, Inventorem pariter me dicent. Verum ut aliis propriis observationibus contentus, id neque tum quæsi, neque nunc spero, ita hic maluissem, te aliquid de Bronchiali Vena utiliter addidisse, quam istud de socia Arteria incassum dixisse. Bronchialem enim Venam etsi Sagacissimus Ruyschius scribit „nec adhuc dum eam sibi videre licuisse, neque „autem eam hic magis necessariam esse, quam „in hepate, ubi Arteria Hepatica nullam quodque peculiarem sibi & sociam vendicat Venam; „Cowperus tamen; ut ea quæ de Bronchiali Vena habet Verheyenius, omittam; unam, vel plures sæpe vidit, & in subclavas influere, observavit.

## ANIMADVERSIO XXXIII.

255. Jam vero de pluribus quæ in Willisio insuper notari possent, unum seligamus. Pulmones in inspiratione „totam, inquit, thoracis ampliat cavitatem implere: „mox vero „ob „pectus contractum, & pulmones compressos, „expirationis actum succedere. „Ego autem cum essem Venetiis, vivo canis, utroque in latere tantum pleuræ detexi; quantum satis esset, ut per eam membranam, quæ sic satis pellucida est, quod spatium pulmones intra thoracem omnino clausum occuparent, cognosci posset. Itaque & ipse vidi, & Amicis ostendi, in inspiratione, & multo magis in expiratione satis spatii inter thoracis parietes, & pulmones relinqui. Verum ne forte credas, me libentius Willisii Scripta impugnare, quam confirmare, vis eadem veri cujus studio unice agor, me cogit, ut quid super iis quæ de Pulmonum Interstitiis postremo addit, cum iisdem Amicis observaverim, non reticeam. „Experimento, inquit, sæpius facto „evidenter constat, aerem Tracheæ fistulæ (quæ „unicus ejus in Pulmonem aditus est) insufflatum, „hæc lobulorum interstitia minime subire, aut inflare: attamen si foramini in quolibet ex his interstitiis facto insufflaveris, illico spatia hæc omnia in „toto

250. Advers. I. n. 18.

n. 24.

Ibidem.

Anatom. Diss. 13.

Præf. Comp. Anat.

Anatom. of. hum. Bodies.

255. Num Pulmones thoracem totum implent.

257. Num a Fistula Pulmonis in hujus Interstitia aditus sit.



„toto Pulmonis lobo inflata intumescunt. „Hæc nos experimenta in bovini pulmonis lobo eo diligentius iteravimus, quo pluris faciebamus, & facimus Magnum alterum Anatomicum, qui hæc sibi negat successisse. Igitur etsi diu, multumque aerem in bronchium immisimus, observare tamen nunquam potuimus, interstitia dilatari; quinimo vidimus manifeste, a distentis lobulis interstitia comprimi, & plurimum minui. Cum autem in unum interstitium, facto foramine, aer immitteretur, & illud, & multa alia vicina interstitia distendebantur. Illud addidimus, ut cultro per medium interstitiorum adacto sic ut lobuli a lobulis dividerentur, ac deinde parvi cerei flammula iis scissuris admota, aer per bronchium pluries, vehementerque impelleretur, si forte illa agitatione sua aliquod aeris in caveas interstitiorum transeuntis indicium daret; verum lobulos quidem dilatari semper vidimus; flammulam autem vel leviter nutare, aut concuti, nunquam vidimus.

## ANIMADVERSI O XXXIV.

258

**C**æterum tum quod postremis verbis docet Willisius: vasa lymphatica pulmonum, dum „versus ductus Thoracicos tendunt, - in itinere „Œsophagum, necnon Tracheæ & Aortæ truncos superascendere, in iisque varia insertione „propagines multas amittere; proinde ut videatur aliquantum humoris Lymphici pro vasorum „istorum parietibus lubricandis impendi: „tum quod ex Verheyenio addis: „per Bronchiales „glandulas separari humorem lymphaticum, eumque per propria vasa inde transire ad ductum „thoracicum, ipsi haud quaquam videri probabile: „tu, Vir Cl. dijudicabis. Mihi certe, Naturæ consuetudinem attendenti, magis probabile videtur, illa de quibus Willisius loquitur, vasa lymphatica ab œsophaghi, earumque arteriarum parietibus propagines multas in itinere assumere, quam in easdem partes immittere. Istud autem Bronchialium Glandularum munus non ita ego, ut Verheyenius, improbandum esse, censeo, primum quia Malpighius, optimus, siquis alius, istarum rerum existimator id ipsum probavit, cum in Epistola de Structura Glandularum *quasdam grandiores glandulas, tracheæ hærentes*, inter Conglobatas recensuit, hoc est inter eas quibus excretoriorum vasorum loco lymphæ ductus esse, conjiciebat; deinde quia ipsarum substantia aliquando *dura ac quasi tartarea*, alias *mollis & succulenta*, - *color subniger*, & pleraque alia a Verheyenio recensita, apprime, ut ex eadem liquet Epistola, Conglobatis Malpighii glandulis conveniunt; novissime quia quæcunque Verheyenium in eam sententiam perduxere, haud ita difficile solvi possunt. Nam quod primum se videre, negabat, „in quem finem tunc Glandulæ istæ forent longe „maiores & plures circa majores asperæ arteriæ „ramos, „& quod subiciebat: „an quia ibidem etiam vasa sanguifera majora sunt, adeoque plus lymphæ suppeditare possunt? Sed lymphæ non potest immediate sequestrari ex vasis „magnis, sed ex parvis & quodammodo minimis; „nimirum ut illud omittam, quod supra ipse confitetur: „inveniri aliquando nonnullas, „quæ - minoribus asperæ arteriæ ramulis adjacentes, superioribus magnitudine antecellant; „etsi verum est, non ex magnis, sed ex minimis arteriis lympham separari; attamen verum quoque est, ex majoribus arteriis plures minimos furculos, quam ex minoribus emitti posse. Accedit, eos qui Malpighium sequentes, hic quoque censeant, per minimas glandulas bronchiales lympham secerni, per majores autem & secretam a minoribus excipi, & novam addi, non difficile intelligere, cur ad inferiores, easque adeo plurimas arteriæ asperæ divisiones minimæ glandulæ, ad alias vero, atque alias, ut hæ superiores, atque adeo semper pauciores sunt, ita majores glandulæ apponantur.

Quod vero addebat Verheyenius: „lympham Morgagni Adversaria Anat. V.

„illam debere separari a sanguine quam cito hic „expulsus est ex dextro cordis ventriculo, & „iterum statim per ductum thoracicum & partem venæ cavæ transire ad eundem ventriculum: cujus separationis & transitus rationem „rursus assignabit nemo; primum novi ego qui ejusmodi causas afferat & secretionis lymphæ, & hujus in sanguinem reditus; ut istam quoque rationem facile possit assignare; deinde illud negare Verheyenius non poterat: quidquid lymphæ in pulmonibus separatur, aut a bronchiali dumtaxat arteria afferri, aut etiam a pulmonari. Si ab hac etiam, in eandem ex parte quæstionem, vellent, nollet, recidebat; sin autem a bronchiali solum arteria, nullus omnino relinquebatur isti dubitationi locus; nam & in bronchialem arteriam ex sinistro cordis ventriculo cruor impellitur, & nihil præterea erat causæ, cur ex eadem arteria, ex qua ramos in bronchiales glandulas immitti ad proprium harum usum, agnovit, lympham secerni intra ipsas posse, non putaret. Verum hæc, ut dixi, tu videris; nunc ad Tabulas quas huc adjecisti, transeamus.

## ANIMADVERSI O XXXV.

**E**T primum in Tabula LXXXVIII. haud satis intelligo, quo consilio tot Verheyenii Figuras attuleris, quibus constat, non facile alias ipsi excidisse negligentius delineatas. In Figura enim K, ut errores omittam ad litteras EE. FF, in primis, alterisque Adversariis notatos; certe in iisdem primis Adversariis insignem alium errorem indicavi, cum falli eos omnes ostendi, qui pro una Thyroidæa Glandula „binas tradunt, „& hinc atque hinc unam a lateribus summæ asperæ arteriæ, inque medio penitus disjunctas „depingunt; „& sane ex tot quæ secui, cadaveribus vix unum vidi, in quo isthmus, sive ea pars intermedia Glandulæ, quæ utrumque lobum continuat, desideraretur. Verheyenius autem cum ea legisset, illudque præterea, quod isthmus „lobi „utriusque non supremam, ut aliquis pinxit, sed „infimam solet partem connectere; „descriptionem quidem suam, in qua duas esse, tradiderat, sic emendavit, ut tamen adderet: „quia ab utraque „parte asperæ arteriæ dependent, ab aliquibus non inepte dicuntur esse glandulæ duæ; „at omissis iis, quæ de ejusdem glandulæ structura, succo, positu addidimus; quæ neque in Theatro tuo inveniuntur; delineationem quam in ista Figura ad litt. HH. exhibuerat, & quam mea illa postrema verba designaverant, non mutavit; ut novam hanc Cl. Heisteri censuram meruerit: „Glandulam thyroideam ab utraque asperæ arteriæ parte dependere, & haud inepte duas dici, ait, „Verheyen, & sic etiam eas depingit. Verum recte demonstrat Morgagnus eam male produci a multis haberi, cum unica sit, & crescentis lunæ figuram obtineat, cujus cornua sursum spectent, non deorsum, uti a Verheyeno delineatur. „De Epiglottide etiam multa in iisdem Adversariis monueram, & in iis „inferior rem illius partem multo apicem contractiorem esse; „se; „quod num Verheyenius attenderit, istæ ipsius Figuræ satis ostendunt; deinde quid olim traditum, & quid habendum esset sive in nobis, sive in bobus, ovibusque de musculis Levatoribus, & Depressoribus Epiglottidis: quæ quidem cum his quæ scripta reliquit Verheyenius, conferri velim; nam quod ad vomentes attinet; ne rejecta, in epiglottidem multum incurrant, fortasse tum lingua efficit tunc exerta, ideoque per annexa ligamenta Epiglottidem antrorsum reclinans, tum vero uvula, quæ per suos musculos retrorsum ad pharyngis superius orificium opportune defendendum elevata, viam amplificat, tum denique laxa illa, & valde mobilis, de qua Verheyenius loquitur, membrana exteriorem posticamque Laryngis partem obducens, quam

n. 6.  
Anim. 13.  
n. 26.

De Glandula Thyroidæa.

l. r. tr. 3.  
c. 11.

Præf. Compen. Anat.

n. 23.

n. 28.

loc. cit. & tr. 4. c. 20. in fine. Qui fiat, ne vomitu rejecta, in epiglottidem, & pulmonis fistulam incidant.



ego membranam, non *per motum peristalticum inversum*, sed per ipsum rejectorum impulsu tunc sursum trudi in his præsertim, in quibus laxior, ampliorque est, facile credo, quantum satis sit, non ut ipsi laryngis rimæ superponatur (neque enim vel in iis ipsis solet usque adeo extendi posse) sed ut materiam ultra laryngis caveam, & epiglottidem ipsam dirigat. Verum ut ad ea quæ ad Figuras quoque pertinent, revertar; multa etiam de structura, & glandula Epiglottidis, a me primum observata, adversus Verheyenii descriptionem, Figurasque monueram. Iis ipse; quamvis meo nomine omisso; ad suam descriptionem ex parte emendandam usus est; Figuras autem non modo non illustravit; sed quas primum proposuerat ad plures illas glandulas minores ostendendas, quibus videlicet existimaverat, totam Epiglottidis concavam faciem obsideri, easdem prorsus ad ostendenda orificia ductuum Glandulæ epiglottidis reposuit; eæ sunt apud te, Vir Cl. 3. & 9.

## ANIMADVERSIO XXXVI.

Sunt tamen, ut verum loquar, in istis quas exhibes, Verheyenii Figuris quædam errata Scalptori tuo tribuenda, ut in 2. *Fissura* illa c, quam Explicatio in cartilagine Thyroide indicat, fere prorsus omissa; ut fortasse in 3. ad litteram E (cujus explicationem frustra quæro) annuli arteriæ asperæ absoluti; nam ut hunc errorem in Coloniensi editione vel evidentiorē inveniam, in Lipsiensi certe non video; ut in 4. eam Epiglottidis delineationem, quæ subest litteræ B; in cuius explicatione quoniam quid sibi Auctor velit per eam *partem globosam*, Lectores nunquam satis intelligent, te Auctoris descriptionem omittente; dicam ego, idem esse quod olim Riolanus epiglottidis *pediculum* vocavit, eam quoque memorans Fissuram Thyroidis, de qua modo dictum est; Laryngis, inquit, introitum, contegit, claudique altera cartilago oblonga, cum pediculo ex fissura antica Thyroidiseducta. Sed illud vicissim Auctoris potius, quam tui Scalptoris, erroribus est accensendum, quod in Fig. 5. & 6. Arytænoides ita pingantur, ut ipsarum non modo vera forma cum descriptis a me cavitatibus agnosci non possit, verum etiam ipsa amplitudo nullam ad proximas Figuras proportionem servet. Huc pertinent restituta a nobis capitula duo per quæ Cricoides cartilago cum utraque Arytænoidē articulatur; hæc enim ut descriptioni suæ, nostro omisso nomine, Verheyenius addiderit; Figuris tamen 7. & 8. minime addidit. Huc Musculi pertinent AA. multoque etiam magis B. in Fig. 9. ut omnes intelligent, qui eosdem aut in cadavere, aut in nostra proxima Figura 16. inspiciant ad litt. ii. & K, quanquam ad hanc litteram tuus quidem Scalptor nonnihil erravit; quemadmodum in Figura quoque 10. ubi in ipso asperæ arteriæ latere annulos fere deficientes exhibuit. Cæterum in eadem Figura 10. explicanda error excidit Verheyenio, quem miror in posterioribus editionibus non esse sublatum; quis enim, *Musculus* est *Crico-Thyroideus lateralis*, qui per E litteram monstrari dicitur? Itaque ne Tirones istuc hæreant, monendi sunt, scribendum fuisse: *Crico-Arytænoides lateralis*. Idem pariter monendi sunt, siqua in Figura KK. ejusque Explicatione non satis intelligant, ut Figuram nostram 17. & partem quoque 16. una cum ipsarum Explicationibus inspiciant. Ex iis namque nec obscuris, neque ita, præsertim si archetypos nostros spectes, inelegantibus suam istam Figuram ferme confecit Verheyenius, quam propterea cur ante nostras proposueris, nequaquam video. Ego certe neque ea figura Epiglottidem, neque; ut alia omittam; ea ratione Thyroidem, Arytænoides, harumce cartilaginum glandulas delineaveram, ut neque *Caput Laryngis*, sed Laryngem ipsum, secundum ejus longitudinem posterius sectum, atque expansum, ostendere me,

dixeram. Porro, ut ad proximas Figuras trans-eam; illud quoque in I. Adversariis monueram: n. 24. esse Figuram in libris anatomicis, qua arteriæ asperæ cartilagines sic ostenduntur, ut non solum utrinque omnes in acutum desinant angulum, sed interstitium quod in posteriore arteriæ parte est, illud quoque explere totum videantur. Addidi: hanc non minus mirari me Cl. Homini excidisse, quam a studiosissimo alio Professore in suam humani corporis Anatomiam receptam esse; ex bove enim opinari me, eam Figuram, non ex homine expressam esse. Nunc autem addo, me multo magis mirari, Verheyenium non intellexisse, Cl. illum Hominem esse Willisium, se vero studiosissimum illum Professore; si enim id intellexisset, abjecisset sane illam Figuram, aut non pertinere ad hominis anatomen, monuisset. Illa autem Figura ista ipsa est quam tu num. 14. exhibes. At me, Willisium dumtaxat innuentem, non intellexerit. Num Malpighium quoque non intellexisse, credemus, qui Willisium nominatim reprehendit, quasdam hujus Figuras, mente, & arbitrio artificis delineatas, - & fictas, ob-scurasque, esse, pronuncians. Iis certe Figuris Verheyenius sine ulla dubitatione usus est. Istæ autem ipsæ sunt, quas tu num. 15. tanquam elegantissime, simulque accuratissime descriptas, ipsius Willisii verbis proposuisti; tuus autem Scalptor ita insuper depravavit, ut cum neutra quidquam ostendat eorum quæ Willisius pinxerat, tum in prima, cui videlicet littera A. apposita est, illud ipsum *manifestum vasorum rete*, quod unum in ipsis Malpighius probaverat, vix ac ne vix quidem agnoscat.

## ANIMADVERSIO XXXVII.

Quo facilius mihi ferendum est, quod meæ proximæ Figuræ 16. (mitto nunc Explicationem certas quasdam partes ad F. b. A. K. minus istuc diligenter descriptas videam, inprimisque eas glandulas ad OOO, quas ego, ut *subrotundas, & ovales, sed compressas* esse, docueram, ita etiam levius adumbrandas a meo Scalptore curaveram; tuus autem tantum singulis umbrarum addidit, ut si de industria inservire subjectæ Animadversioni voluisset, non magis extantes effingere potuisset. Quo enim alio tandem redit tota ista Animadversio? Certe *Musculos, cartilagines, os hyoides, aliaque annexa*, hoc est totam reliquam Figuram Cl. Auctor commendat. Nam quod, expositam summitatem alterius ventriculi Laryngis g videtur excipere, ut non nimis claritati conformem; sane id ipsum *mittere* se, dicit; & merito quidem, neque enim ibi id, quod satis alia Figura præstat, quomodo ea *summitas* sit facta, ostenditur, sed tantummodo locus indicatur, quo usque in eo cadavere pertinebat; id autem vel clarissime sic intelligitur. Itaque Animadversio tota contrahitur, solum ad glandulas illas notabiles per magnum tracheæ & primorum bronchiorum interstitium membranaceo-musculare O. O. O. aggerime depictas. Eas enim non modo non ita sole-re esse extantes, sed aperte contenditur, nunquam, nisi morbose sic condita magna hæc turbercula, aut visibilia occurrere: nec, quæcunque sit diligentia, animadverti unquam posse in statu naturali corpora hujusmodi glandulosa notabilia numerosissime delineata. Denique vix conceditur; granula disperse minutissima eaque sat rara conspici, nec partem vigesimam molis glandularum descriptarum æquantia. Ego vero non modo *nunquam* memini, has glandulas non *visibiles* fuisse, sed cum observationes scriptas habeam cadaverum, minimum, viginti quæ harum glandularum causa continenter inspexi; non me tamen pœnitet tradidisse, esse ipsas *crebras, esse varia magnitudine, at miliaribus ple-rasque majores, præsertim ad inferiorem truncum aspe-*

n. 3.  
l. i. tr. 3.  
c. 11.

De Cartila-  
ginib. Epi-  
glottide &  
Thyroide.

Anthrop.  
l. 4. c. 11.

Op. Posth.

261

Adv. I.  
n. 25.

De Glandulis Aspe-  
re Arte-  
ria.  
261.



asperæ arteriæ. Neque enim ullo modo verisimile est, in illis omnibus viginti cadaveribus fuisse morbosas; quinimo Auditores mei optime norunt, quoties in subjectis, quod ad thoracem præsertim attinet, longè sanissimis, ut in robusto Juvene ex inflictis vulneribus illico mortuo, ut in Senæ a fortissima, ut vocant, Apoplexia brevissimo spatio temporis interempto, ut in Viro femoris vulnere intra dies quidem duodecim, sed tamen sine ullo pulmonis affectu, consumpto, istas glandulas ea magnitudine ostenderim, ut cum pleræque ipsarum plerisque ex illis quas ego delineavi, minime cederent, tum nonnullæ vel maximas illarum evidentissime superarent. Quod vero ad ipsarum numerum attinet, iidem norunt, in iisdem cadaveribus multo etiam plures fuisse, quam in mea Figura conspiciatur; imo præter ipsos adeo superiore anno Cel. Professor Polenus, cum in quadam Muliere ita confertas ostendi, ut se se pleræque contingerent in summa etiam parte interstitii asperæ arteriæ, in qua alioqui solent esse rariores. Sed ut plures alias ostensiones tum in Nosocomio, tum in Theatro habitas omittam, in quibus hæ glandulæ eo numero, ea magnitudine fuerunt, ut vel exteriore ejusdem arteriæ tunica non datracta, satis superque essent conspicuæ: quod & nuperrime, atque adeo cum hæc typis describerentur, in Viro quodam inflictis capiti vulneribus intersecto viderunt Primarii ac Cel. Professores Antonius Vallisnerius, & Joannes Gratianus; quis demum hoc ipso anno cum de aspera arteria in publico verba facerem, atque hinc in exili cujusdam Mulierculæ fistula pulmonari, quam, ut superiorem quoque, nullo thoracis morbo laborasse, constabat, has glandulas satis & conspicuas, & crebras ostenderem, hinc vero narrarem, fuisse tamen qui scriberet, easdem, nisi morbose, aut visibiles non esse, aut sat raras conspici, nec partem vigesimam molis glandularum (a me) descriptarum æquantes; quis, inquam, fuit qui non plurimum miraretur, eorum præsertim, qui cum cæteras Animadversiones eodem modo, ac præsentis ostensione alias confutarem, non adfuissent? Quid, si addidissem, sic quoque Venetiis, sic Bononiæ, sic Lugduni Batavorum, sic Londini, sic Altorfii, sic Lovanii esse observatum? nam ipsum, ut Animadversionis Auctor infra vocat, *fidelissimum*, ac *solertissimum* Verheyenium, si ejus superioris Figuræ KK partem ll cum respondente in nostra, asperæ arteriæ summa parte, habita magnitudinis utriusque ratione, contendamus, non aliter observasse, inveniemus. Quid? quod ne id quidem fieri ullo pacto potest, ut usquam gentium aliquis usque adeo facilis existat, ut quod per jocum Redium de gallicis, hetruscisque viperis dixit, id serio de structura humanorum corporum credat, putetque, aliter fortasse Augustæ Taurinorum, quam in universo terrarum Orbe, istas glandulas se se habere. Quo enim gentium Acta Eruditorum non importantur? In his autem, ubi Publici Taurinensis Anatomici Joannis Fantoni Anatomia memoratur, hæc diserte habentur: „in „ postica tracheæ parte tales numerosissimæ glandulæ, quales Morgagni expressit, autopsia Auris confirmantur. „

## ANIMADVERSI O XXXVIII.

**H**icce ita positis, Animadversionis argumenta expendamus. „ Si Author Celeberrimus hæc sitabat ordinariam glandularum tam grandium in subjectis humanis assidentiam stabilire, ut hæsitat de facto, quoties in explicatione hujus figuræ circa hæc glandulas dicit: *Quales fuerunt in hoc homine*; & hæsitare revera debet, prout nunquam in hoc strato membranaceo, segmentis tracheæ & bronchiorum annularibus intermedio, nisi morbose sic condita magna hæc tubercula aut visibilia occurrunt; cur igitur fig. 3. Tabulæ 109. sub lit F. oscula ea Morgagni Adversaria Anat. V.

De iisdem,  
earumque  
osculis ex-  
cretoriis.

„ rundem excretoria in tracheam & bronchia aperta, ta ad solum hoc subjectum non limitare tantum, sed potius ad omnes quasi homines extendere videtur? „ Si mea cum Figura meam istarum glandularum descriptionem edidisses; Lectores omnes intellexissent, cum in Explicatione dixi: *quales fuerunt in hoc homine*, me de ipsarum in omnibus existentia non dubitasse. Quid igitur mihi volui, cum id dixi? Illud certe primum, in parte interstitii superiore in multis rariores, in quibusdam nullas apparere. Deinde, etiam esse in quibus vel in reliqua interstitii parte aut ea magnitudine, aut eo numero non appareant. Illud vero, ut ex dictis constat, venire in mentem nunquam potuit, secundum naturam non esse visibiles, ut propterea ipsarum oscula excretoria, quæ vix, ac ne vix quidem in uno cadavere non vidisse, memineram, „ ad omnes quasi homines extendere „ non deberem. Atenim (pergit Cl. Animadversionis Auctor dicere) „ nec per microscopii subsidium oscula hæc excretoria animadverti possunt. „ Quisnam, obsecro, id docet? Ipse Animadversionis Auctor alio in loco: „ ego, inquit, nec per microscopium attingi posse, se, animadverto; licet revera probabiliter adesse plerique ex Anatomicis judicaverint. „ Ego vero, ut ista ipsa oscula sive ipse viderem, sive aliis ostenderem, microscopio nunquam sum usus, ut optime sciunt & Amici Veneti, & nostri assidui tum cives, tum exteri Auditores, quibus præsentibus, nullam unquam pulmonarem fistulam aperui (aperui autem plurimas) quin ea ratione qua in I. Adversariis docui, eadem oscula evidentissime commonstrarem. Itaque dici non potest, quam mirer, aliquem extitisse, qui non modo ut ea videret, microscopio uteretur, verum etiam cum hoc uteretur, ea tamen non videret. Neque minus mirum est, eundem scripsisse: ea probabiliter adesse plerosque ex Anatomicis judicasse. Haud enim probabiliter dumtaxat loquitur Cl. Casparus Bartholinus, qui „ Tracheæ, inquit, mi- lires glandulæ intra membranam ejus internam sitæ, cuivis obviæ sunt. - Nuper Schraderus Dec. I. Obs. 9. asperæ arteriæ internam superficiem infinitis minimarum glandularum porulis præditam monet -- glandulæ miliares pressæ guttulas manifeste erumpentes produnt. „ Neque probabiliter tantum Solertissimus Ruyschius loquitur, qui vel in puerilis, atque ideo exiguæ asperæ arteriæ portione secundum longitudinem aperta, tunicam hujus intimam ostendit „ innumeris „ (ita dictis) glandulis foveolas repræsentantibus, „ refertam: „ additque continuo hæc verba ab eo qui in posteriore ejusdem arteriæ parte crebras, & visibiles glandulas negat, attendenda: „ A parte posteriore Glandula conglobata dependet, „ quæ numerosæ & diversæ magnitudinis istic loci reperiuntur in corpore nostro. „ Denique non se probabiliter tantum loqui arbitrabatur is, quem supra etiam laudavimus, Fantonus, cum suis nostras observationes confirmabat: „ Ego, „ inquit, nuper in postica parte asperæ arteriæ glandulas deprehendi numerosissimas, quales expressit Morgagnius, sectoque per longum canali, poris etiam innumeris internam superficiem perviam vidi; hi, digitis canalem premendo, „ viscidulum humorem eructabant. „

437

Diaphr.  
Struct.Thef.  
Anat. I.Anatom.  
Diff. 13.

## ANIMADVERSI O XXXIX.

**Q**uæ cum ita essent, intelligis profecto, Vir Cl., si quis in hac parte esse videretur reprehendendi me locus, non in eo certe videri debuisse, quod istas glandulas plene, atque accurate, vel quod ista excretoria foramina primus pinxissem; utraque enim conspicua sunt; sed in eo fortasse, quod ista foramina ad istas glandulas pertinere, primus, ut opinor, omnium affirmassem. Quod tamen si quis forte miraretur, ac quæreret, cur non potius cum Viris Cl. Bartholino, & Ruyschio ea foramina ad mi-  
L. 2 nimas

De iisdem.



nimas quasdam interioris tunicæ glandulas spectare, censuissim; has mei iudicii rationes afferrem. Primum non semel esse a me observatum, & in eo imprimis Juvene quem supra ex inflicis vulneribus illico mortuum esse, dixi, etiam ostensum, digito pictis a me glandulis subtus appresso, per foramina a me picta tot guttulas erupisse, ut tota proxima arteriæ asperæ superficies maderet, mox autem eo humore absterfo, & digito rursus appresso, novas guttulas erupisse, idque porro toties, ut omni illi humori qui de uno foramine prodierat, continendo minima una glandula par esse non posset. Deinde cum totam istam intimam tunicam, in qua minimas eas glandulas statuunt, a picti interstitii magna parte quondam detraxissem, pressis postea, ut soleo, subjectis glandulis, memini, easdem quas antea, humoris guttulas adhuc expressisse. Accedit, me olim Bononiæ in magno quodam cane id quod subiciam, observasse, cujus quidem descriptionem, & ex parte etiam delineationem asservo. Inter cæteras quæ asperæ arteriæ interstitio accumbabant, glandulas, una erat multo crassior, quæ ad dextrum interstitii latus prope annulorum extrema adhærebat. Cum arteriam e regione aperuissem, tria conspexi oscula in eadem linea recta eo ordine disposita, ut singula singulis trium annulorum extremis adjacerent. Eorum medium erat maximum; sed duo etiam reliqua ejusmodi erant, ut non modo setam, sed & seta crassius specillum, ut mox dicitur, transmitterent. Glandula compressa, subalbus & crassus humor per illa oscula egrediebatur. Tum seta, & specillum etiam, his inditum, nullo negotio intra glandulam transiit, in qua duas, vel tres exiguas caveas, dissecando, inveni. Porro nullum sive in glandula, sive in iis osculis agnoscere indicium potui, quod prægressam inflammationem, erosionemve significaret. Denique anno 1706. vii. Kal. Novembres in eadem Urbe in anili quodam cadavere eandem prorsus quam in cane, observationem habui, nisi quod loco unius glandulæ tres erant, singulæ singulis excretoriis osculis in arteria aspera hiantes.

## ANIMADVERSI O XL.

**J**Am vero ad Animadversionem redeamus, in qua de eo etiam dubitari, video, an picta a me *granula* sint *glandulosa*. Quod ut facile ferendum, sic minime confutandum in eo est, quem ex iis quæ dicta sunt, constat, nunquam ea satis videre potuisse, præsertim cum quotquot videntur, omnes glandulosa esse cognoverint, & in his laudati alias Bidlous, Ruyschius, atque Fantonus, quibus accensendus est Cl. Heisterus, *multas glandulas* (in Figura hac nostra delineatas) agnoscens; sed nullo pacto omittendus est is qui in ista, ut diximus, Animadversione, ut *fidelissimus*, ac *solertissimus* commendatur, Verheyenius; hic enim, ubi ipsas delineat, „*Glandulas* parti „membranaceæ, trunci (Asperæ Arteriæ) inhæ- „rentes „pariter vocat. Cæterum Cl. Animadversionis Auctor, qui de ea re dubitat, de qua nemo, quænam contra, *ultra dubium esse*, & *tutissima*, pronunciet, mox videbimus. Nam perinde ac si quæ anatomicis observationibus sunt comprobata, ea rationibus, & istiusmodi quidem rationibus, convelli possent; „quid, inquit, inest „dubii quod vastissimæ illæ bronchiales Livescen- „tes glandulæ singulis bronchiorum diramationi- „bus exterius affidentes, succum sequestrent a „sanguine intimæ bronchiorum cavitati oblinien- „dæ designatum? Quodque ideo liquida sua per „peculiares ductus usque ad dictam cavitatem de- „rivent? „Ego quidem supra ostendi, non impro- „probabilem eorum sententiam esse, qui per glandulas bronchiales lympham fecerni, conjicientes, istud alterum earum officium cum Malpighio adhuc non agnoscerent. Heisterus, credo ne in re incerta quidquam statueret, ipsarum usum prætermittit. Fantonus istud quod negari posse, dixi-

mus, earum munus *verisimile* tantum esse, dicit. Verheyenius ipse, etsi de eo, scribit, se vix dubitare; tamen „qualis sit liquor ille, quem se- „parant, quorsumque tendat, non ita clarum „esse „non dissimulat. Unus est, quod sciam, Animadversionis Auctor, qui hoc *ultra dubium esse*, & *tutissimum*, asseveret. Nec minori securitate, „Quis, inquit, dubitat, ad summitatem, „tem, progressum, & totum integre tractum trachealis trunci, cujus certe subsidio pares esse „non possent inferiores hujusmodi bronchiales „glandulæ, appositam fuisse ingentem, supra quam- „cunque cum hisce suppositis glandulis paritatem, „tyroideam glandulam; ex qua inde latices un- „ctuosi & continui per ductus peculiares in ean- „dem tracheam confluant? „Imo enim vero quis dubitat, Thyroidæam Glandulam appositam non fuisse „ad progressum, & totum integre tractum „trachealis trunci; „cum videlicet ex inspectione constet, ad ejus tantummodo *summitatem* fuisse appositam? Quod autem ad illius usum attinet; ut mittamus, nos illud in medio reliquisse, an peculiari ductu instruat, & quando hoc etiam instrueretur, an ipsum in pharyngem, atque œsophagum, an vero in summam arteriam asperam immittat; neque enim hanc tantum, sed & illa attingere, & sub musculis esse positam, qui non modo in vociferando, sed & in edendo ipsam comprimant, animadvertimus; certe Cl. Vercellonno placet, ejus canales ad œsophagum pertinere; Viri autem Doctissimi Fantonus, & Heisterus ita suam sententiam proponunt, ut is alterum illum usum non indubium, sed *verisimilem* dumtaxat esse, dicat, hic vero glandulæ ejusdem usum *incertum*, aut *adhuc dubium* esse, testetur; atque; adeo Verheyenius ipse, qui in prima Anatomia suæ editione, ex eadem „humorem quandam viscosum in fistulam pulmonalem pro ejus humectatione jugiter depluere, „quasi id constaret, affirmaverat; postquam nostram perlegit censuram, cautius eum locum ita rescripsit: „hæc glandulæ, la proculdubio etiam inservit ad humectandas „vicinas partes: „quibus tamen ambiguis verbis uti, imo se usum hic esse, in uno ex proximis Capitibus oblitus est.

## ANIMADVERSI O XLI.

**S**ed nihilominus concedamus id quod nondum est concedendum, Glandularum Thyroidææ, & Bronchialium illum usum esse certissimum, & in fistulam pulmonis suos quasque ductus promittere. Quid tum postea? „Fuit, inquit, Lin- „ceus hucusque aliquis, qui Thyroidæ ductus „detexerit? „De Bronchialium autem ductibus „nemo, inquit, adhuc, nec ipse fidelissimus, ac „solertissimus Verheyenius primus harumce Promulgator, & Indagator, vias hujusmodi earum „excretorias detegere, & demonstrare valuit; nec „nos in hac re, quacunque etiam minutiori inquisitione, meliorem sortiebamur fortunam. „Hic vero plura sunt, quæ fateri cogor, mihi nova prorsus accidere. Quomodo enim in hac re meliorem ipse non est sortitus fortunam, qui ante non multos annos pollicitus est, *Cursum Anatomico - Pathologicum* suum præter alia „imper- „specta hucusque varia, - Ministeria glandulæ „Thyroidææ, & aliarum bronchialium, earum- „que vasa excretoria „speciatim, esse daturum? Vel quomodo Verheyenium *primum Promulgatorem*, & *Indagatorem* pronunciat glandularum bronchialium, de quibus Verheyenius ipse pro certo negare noluit, *aliquem quidquam edidisse*; tu autem, Vir Eruditissime, ita scripsisti: „nobis „exhibere Præcl. Verheyen Glandulas Bronchiales, a se, *ut opinatur*, primum detectas; „quas Viri Cl. Fantonus, & Heisterus, ille quidem a Severino, & Drelincurtio, hic vero ab Hornio, Borrichio, & Bartholino demonstratas, descriptasque esse, docuerunt; & quas nos denique Malpighio non prorsus fuisse ignotas, cum ex Epi-

258.

Advers. I.  
n. 26.

183.

locis cit.

tr. 3. c. 8.

l. 1. tr. 3.  
c. 11.  
c. 13.Comp.  
Anatom.  
n. 104.

260.

Anim. 34.

loc. cit.

Anatom.  
Diff. 13.Hist. He-  
pat. Præf.

258

Ibidem.

Anatom.  
Diff. 13.  
Comp.  
Anatom.  
Præf.



244

Epistola de Structura Glandularum, supra indicavimus, tum ex prima de Pulmonibus Epistola hic confirmare possemus, ubi „denigrationem, ait, „deprehendi in glandulis lateribus asperæ arteriæ „continuatis. „Novissime quomodo idem Verheyenius, Anatomicus alioqui, ut sæpe libenter sum fassus, diligens, atque industrius, in iis ipsis Animadversionibus in quibus ob perpauca quædam, idque immerito, ea ex nostris Tabula reprehenditur, a cujus accurata delineatione respondentes ejus Figuras, descriptionesque tot in locis distare, supra ostensum est, quomodo, inquam, in istis ipsis Animadversionibus, *fidelissimus, ac solertissimus* appellatur? Attamen his missis, illud unice attendamus, quo tandem ista omnia spectant, quæ hæcenus præmissa sunt: pictas a nobis glandulas vix esse *visibiles*, & fortasse non esse corpora *glandulosa*: esse *ultra dubium, & tutissimum*, Bronchiales Glandulas, & Thyroidæam suos in arteriam asperam canales immittere; hos tamen nondum esse detectos; videamus, inquam, atque attendamus, quo hæc tandem omnia spectent; & quamvis pleraque eorum a vero alienissima esse, ostenderimus; hic tamen omnia pariter certissima esse, fingamus. „Glandulis, inquit, Glandulis ideo tam magnis, usu secretorio, & distributivo tam certe, tam ample productis, Natura lusu quodam inaudito emissaria sua celaverit; hisque interea in quæstione de Glandulis, & earundem usu, substantia, præsentia tam incertis, patentia tamen excretoria concesserit, dum per legem & rationem quamcunque naturalem, illis istis tot vicibus majora, sicque & tot vicibus patentiora esse debebant. „Quam vera est, Mangete Ornatissime, illa Theognidis sententia: *Opinio quidem hominibus malum magnum est; experientia autem optimum*. Iste enim, dum rationibus nimis indulget, ea profert, quæ quilibet ab anatomica experientia non destitutus, a vero prorsus aberrare, cognoscit. Quid enim? Mucosæ Cowperi glandulæ, imo glandulæ palatinæ, aut intestinorum lenticulares, aut etiam faciei, aliarumque Partium sebaceæ glandulæ num forte superioribus Bronchialibus, aut Thyroidæa sunt majores? Aut cum usque adeo minores sint; num forte illarum ductus, & excretoria oscula nostros adhuc effugiunt oculos? Jure igitur, omnia hæcenus dicta in quam paucissima contrahentes; quibus ille verbis suam istam Animadversionem conclusit, prope iisdem admonere ipsum possumus: „quid ratiociniis improbare niteris, „quod inspectione & autopsia evidentissimum venit? „

## ANIMADVERSIO XLII.

262.

De excretoriis Foraminulis inferioris Laryngis.

Nunc ad quinque illas Animadversiones transeamus, quas nostris totidem Figuris proximis apponis. Prima in Figura 17. „elegantiam, „& uniformitatem cum Archetypo -etiam atque „etiam veneratur, & commendat. „Addit tamen: *In duobus solum oculus haudquaquam oblectatur*. Hæc igitur quænam sint, videamus. Primum haudquaquam oblectari dicitur, „in foraminibus illis per tunicam cartilagineas tum „laryngis tum trachæ interne obvelantem copiose „se disseminatis; quæ, ut alibi advertimus, re, „vera non occurrunt. „Quid, si ita crebra pinxissem, ut in Figura sua KK. Verheyenius, quem tamen „fidelissimum, ac solertissimum „nuper Animadversionis Auctor vocabat? Equidem fateor, de novem Laryngibus in quibus ea potissimum perquisivi, in tribus non apparuisse; in sex tamen reliquis occurrerunt. Deinde in ea distractione, quam ad eum rerum aspectum delineandum larynx patiatur necesse est, ut glandulæ comprimuntur, sic guttulæ ex ipsis prodire solent, & foramina, etiam a primo non apparentia, indicare. Itaque sive id quod sæpius occurrit, sive partium in mea Figura pictarum distractionem attendisset, Morgagni Adversaria Anat. V.

iis foraminibus esset oblectatus. Quod autem secundo loco oblectari se, negat „in cellulis illis ad cricoidis sectiones BB. exhibitis, propterea quia veniunt hæc quidem ad conspectum in subjectis omnibus, sed decies ad minus pauciores, res sunt, quam hic exponantur; „si meam illarum litterarum explicationem attentius legisset, me istas cellulas ostendere, *sicut in eo homine occurrerunt*, intellexisset. Nec sane ita ostendere potui, ut in omnibus occurrunt, propter insignem hac in re vel ob varium tantum annorum numerum varietatem; nam ut in senibus totam solent, quemadmodum pinxi, partem illam cartilaginis annularis tenere; ita in minus, minusque inclinata ætate magis, magisque paucæ sunt, atque adeo in junioribus, & præsertim in puellis fere nullas memini, imo nullas vidisse; ut prorsus a vero alienum sit quod ipse dicit, *in subjectis omnibus* in conspectum venire. Quod quidem nisi mihi credat, Verheyenio suo credere poterit, qui certe aut „fidelissimus, ac solertissimus „non fuisset, aut si in eo subjecto invenisset, quo ad memoratam Figuram K K absolvendam usus est, in Cricoidis illius sectionibus delineasset. Nunc quando vidimus, quænam in nostro archetypo duo illa sint, quibus Cl. Auctoris oculus haudquaquam oblectatur; tu vicissim in isto Iconismo quem tuus Scalptor ex eo descripsit, duo inspicere, Vir Doctissime, quibus, & potiori quidem jure, mei sane oculi non oblectantur. Nam primam arteriæ asperæ cartilagineam, quam ad litteras II. „ea figura, & magnitudine, qua mihi sæpius inventa est, delineavi, „istic neque ita in medio amplam, neque ab altero saltem latere a proxima sejunctam esse, video. Longius autem Arytænoidææ Glandulæ Crus E. in dextro Figuræ latere, imaue ejus parte abnormi extenuatione deformatum aspicio. Quod & in subjecta Figura conspicitur 18. cui sua pariter appolita est Animadversio.

## ANIMADVERSIO XLIII.

DE qua antequam dico; quod multis aliis in locis memorare potuissim, hic certe est nullo modo prætermittendum. De iis Partibus nostri corporis, quas in I. Adversariis, aut novis, aut accuratioribus tum descriptionibus, tum Figuris illustravi, quæ, & quot passim sive omitterentur, sive perperam traderentur, intelligere quisque poterit, qui Anatomicorum libros eo tempore omnium manibus tritissimos cum iis Adversariis contendet. Id in Larynge potissimum observetur, velim, ut in qua non ii modo, qui universi corporis anatomen tradebant, verum ii pariter, qui de voce, ejusque organis singulari studio scribebant, haud obscure ostenderent, se haud satis scire, quid Glottis ipsa esset, cujus potissimum causa ut vox efficitur, ita larynx tota constructa est, & præterea tum rem sine qua dilatationis, & constrictionis glottidis verus ignoratur modus, Articulationem videlicet Arytænoidum cum Annulari Cartilagine se ignorare, tum insignes & maxime attendendas ad ipsius glottidis latera Caveas duas tanto artificio constitutas, ut ea dilatata dilatentur, contracta constringantur, nescire. Cum igitur ego hæc omnia, quod & in aliis Partibus feci, meis additamentis aucta, atque illustrata non sine multo labore non modo in lucem revocassem, sed tam in aperto, quam nunquam antea fuerant, posuissim; multi quidem intelligentes, & æqui Viri plus etiam, quam mihi sumo, meæ diligentiae grato, & liberali animo tribuerunt; alii autem ita mecum egerunt, ut me fere interdum exantlati laboris pœnituerit. Nam

„Ut ad pauca redeam, & mittam illius ineptias „qui dum in quodam Adversariorum nostrorum Excerpto, non quid vere in ipsis tradatur, sed quam parum ipse

De Cellulis Annularis Cartilaginis



ipse judicare possit in anatomicis rebus, ostendit, ad eos ipsos qui ista omnia quæ nos restituiamus, ignorabant, Lectores remisit; quid tandem de Verheyenio, quid de Cl. Animadversionis Auctore, quid de te ipso, Vir Ornatissime, dicemus? Tu enim nostras omnes quæ ad Laryngem, atque Asperam Arteriam spectant, descriptiones prorsus omittis vel ad nostras quas profers, Figuras intelligendas, vel ad Organa, a Galeno ipso, & multis aliis Summis inter Veteres Professoribus non omissa, cognoscenda, vel denique ad unam ex nobilioribus Anatomiae Partibus absolvendam eo magis necessarias, quod in toto tuo isto Theatro earum rerum, inprimisque Glottidis, Articulorum Arytænoïdum, & Ventriculorum Laryngis aliam nullam descriptionem invenio. Verheyenius autem ut in iis Articulis se gesserit, supra dictum est. In glottide vero describenda cum in prima Anatomiae suæ editione nihil aliud dixisset, nisi quod illa ab Arytænoïdibus *junctis constituitur*, mox lectis Adversariis nostris, descriptionem quidem suam perficere conatus est, sed rem ita obscure, & perperam gessit, ut cum illa quæ ex me innominato sumpsit, vix ipse intelligam; contra intelligere omnes possint, nonnulla quæ de suo addidit, & nominatim ligamentum illud laterale in Figura K K, a quo ait, *continuum solidumque effici rimæ limbum b b*, & quod unum, isto in loco, a me primum descriptum vidisse se, dicit, intelligere, inquam, omnes possint, illud ligamentum neque ad *rimam*, hoc est glottidem, neque ad meas descriptiones pertinere; & propterea non in me, sed in ipsum recidere, quod de eo addit, judicium. Denique mecum egit adeundem prorsus modum in Ventriculis Laryngis. De quibus cum in eadem illa prima editione Anatomiae ne unum quidem verbum fecisset, postquam eos demum ex Adversariis nostris cognovit, in observatione quidem, quæ præcipua in re anatomica pars est, per quem profecisset, reticuit; ubi vero ad nomen venit, tum scripsit: „Galenus *has cavitates*, inquit D. Morgagnus, *princeps invenit*, „& *Ventriculos appellavit*: at quia orificium habent reliquis partibus latius, *Sinus* eos rectius „vocari judico. „Scilicet ego, qui istas caveas ut in lucem revocaveram, ita eo quod mihi magis placuisset, nomine, potiori jure nuncupare potuissem, æquum tamen magis, piusque censuerim impositum à primo Inventore vocabulum retinere; Verheyenius autem, qui hæc omnia non obscure a me didicit, de eodem mutando agitet, ac tantum, si Diis placet, sibi sumat, ut se aliquid *rectius*, quem eloquentissimus Galenus, vocare posse, existimet. Non ita Stephanus, non Fabricius, non Casserius Anatomici Doctissimi, quorum exemplo minus miror ipsum non esse permotum, quod „eum haud magna librorum supellectile „fuisse instructum, „Cl. Heisterus confirmat. „At enim *orificium habent reliquis partibus latius*, ut satis recte Ventriculi appellari non possint; quasi vero Græcis Medicis Anatomiae Parentibus in consuetudine non fuisset ventris vocabulo quamcunque corporis cavitatem significare, aut Cerebri Caveas Verheyenius ipse cum cæteris Anatomicis Ventriculos non vocaret. Quo in loco quæro abs te, Vir Cl. si Verheyenio pariter in mentem venisset, istas ipsas Cerebri Caveas ejus Ventriculi in quem cibi, potusque descendunt, nullo modo similes esse, atque ideo non Ventriculos, sed Sinus rectius esse appellandos; quæro, inquam, num propter rationem, ac dubitationem istiusmodi, posthabita Galeni ipsius, & eorum qui ipsum secuti sunt, Hominum Eruditissimorum consuetudine, easdem Cerebri Caveas tibi esse censes quidvis aliud potius, quam Ventriculos nuncupandas? Et tamen non absimili Verheyenii rationi tantum videris tribuisse, ut quos Galenus idem, alique Summi Anatomici Ventriculos nominarunt, tu & in Indice, & in huic Tabulæ præfixo argumento Laryngis *Sacculos* appelles, quinimo (quod gravius est, & cujus rei causa ego

ipse, qui de nominibus invitatus aliqui disputo, in hunc sermonem ingressus sum) eam me retinere consuetudinem, non patiaris, sed quasi barbaro, aut nunquam apud Anatomicos audito nomine usum, alio continuo addito corrigendum existimes. Cum enim in Figuræ 17. Explicatione per litteras *h h* indicari scripsissem *Ventriculorum laryngis orificia*; tu me ad easdem litteras sic inducis scribentem: *Ventriculorum, sive Cavitatum Laryngis orificia*: & ne quispiam id fortuito factum credat; etiam in Figura 16. explicanda cum ad litt. *g* hæc verba addidissem: „sunt enim *Ventriculorum Appendices* alias majores, alias minores; ut hinc quoque fieri videatur, ut natura alii graviore, alii acutiore voce sint, juxta ea quæ n. 16. sunt proposita; „tu sic edidisti; „sunt enim *Ventriculorum, seu Cavitatum Laryngis appendices*, alias majores, alias minores; „ut hinc quoque fieri videatur quod natura, alii graviore, alii acutiore voce sint: Si modo hæc cavitates, huic usui inserviant. „

## ANIMADVERSIO XLIV.

Accedit, te ista postrema verba meis adjunxisse, atque adeo admiscesse, facile ut vel Verheyenio, vel Animadversionum Auctori, vel utrique faveres. Nam Verheyenius post injectam illam de Ventriculorum nomine dubitationem, alteram de usu quoque eorum voluit injicere. Destinatos esse, inquit, „ut vocem reddant magis „sonoram, judicasset, nisi eos in equis mihi „monstrassent Authores, in bobus abesse ostendisset autoplia; ubi tamen hi edunt voces magis sonoras quam isti. „Miror tamen, quod ejusmodi dubitationem ita proposuerit. Ego enim ipse, postquam de Ventriculorum usu meam suspicionem, hujusque rationes, quas nemo adhuc convulsit, indicaveram, hæc continuo subjeci: „Cæterum sive hanc, seu conjecturam aliam aliam „quam circa usum ventriculorum recte, ut solentis, & diligenter judicare velitis, ante illud „facile requiretis: quibus porro in brutis, & quæ ratione, quemque ad modum conformati hi „ventriculi reperiantur. „Ac protinus cum quomodo in canibus essent facti, & a quonam in equo, itemque in sue essent descripti, ostendissem, hæc addidi: „In ovibus vero, atque in „bobus neque ulla pars glottidis duplex est, neque ulli uspiam ventriculi, aut aliqua saltem „ventriculorum similitudo reperitur. „Quæ omnia cum apud me Verheyenius legisset, facile profecto intelligere poterat, si multum ista dubitatio valeret, mihi ignotam esse non posse; sin vero ob alia fortasse, quibus suppleri in bobus, atque adeo longe superari ventriculorum usus queat, ut insignem ex. gr. arteriæ asperæ, laryngis, ac glottidis latitudinem, parum ea valeret dubitatio, ob id ipsum fuisse omittendam. Porro Auctorem quoque Animadversionum decuisset aliquanto diligentius attendere, quæ mihi de usu ventriculorum sententia fuisset, priusquam ad ipsam impugnandam descenderet. Huc enim tota pertinet Animadversio quam in Figuram 18. conscripsit. Nam quod principio quidem ait, „duplicaturam illam membranosam unde initia „appendicum ventriculorum designantur, nimis „supra verum excedere; „id nempe istiusmodi est, ut satis superque sit respondere, neque ullam me *duplicaturam membranosam* hic memorasse, & quidquid id est, quod ille sic vocat, si forte „supra verum excederet, „non mihi, sed ei distractioni quam partes in ejusmodi Figura delineatæ necessario patiuntur, esse imputandum. Igitur reliqua attendamus: „Cæterum ipse, inquit, non confluo in opinionem meritissimi Auctoris circa usum ventriculorum hujusmodi: „siquidem eosdem dum locatos animadverto extra „iter aeris ad vocem modulandam per expirationem conducti, seu omnimode exterius ad „glotti-

De usu  
Ventriculo-  
rum La-  
ryngis.

loc. cit.

Adv. I.  
p. 16.

tr. 3. c. 8.

l. 1. tr. 3.  
c. 11.

loc. cit.  
De Ventri-  
culis La-  
ryngis.

Comp.  
Anatom.  
Præf.



„ glottidis latera apertos; cum eodem non con-  
 „ curro in consequens; inservire hosce ventriculos  
 „ ad varios vocum tonos edendos. „ At tu, Cl.  
 Vir, vide, quæ ipsum decuisset animadvertere.  
 Primum illud diserte a me fuisse præmonitum:  
*nihil me de ventriculorum usibus, ut de re perdis-*  
*ficili, mecum adhuc constituisse.* Tum vero hæc  
 omnino verba addidisse: *Illud tamen aliquando in*  
*mentem venit: Faciantne aliquid ventriculi ad to-*  
*norum vocis diversitatem.* Denique dum istam  
 meam, ut bis vocavi, *suspicionem* exponerem,  
 & duas cavitates commemorarem Ventriculis pro-  
 portione respondentes in iis ranis quæ gravio-  
 rem vocem edunt, hac ratione esse locutum: *sic, ut*  
*„ opportuno ejusmodi cavitatum additamento ea vo-*  
*„ cum gravitas, vel potius, ut ingeniosissimus Do-*  
*„ dardius loquitur, earum saltem gravis resonitus*  
*„ debeatur.* Hæc omnia si aut ille attendisset,  
 aut tu una cum Animadversione Lectorum oculis  
 subjecisses; quid proclivius fuisset, quam intelli-  
 gere, siquis Censor adversus me insurgere, &  
 summo jure agere velit, a me demum sic posse  
 responderi: neque ullam me *opinionem* constitui-  
 se, neque in ea suspitione, quam quasi exercita-  
 tionis causa, more institutoque meo, Sodalium  
 Doctissimorum judicio subjeci, posuisse: *inservire*  
*hosce ventriculos ad varios vocum tonos edendos;*  
*sed illud tantum quævisse: facerentne aliquid ad*  
*tonorum vocis diversitatem;* atque hoc ipsum ea  
*potius* ratione quam Dodardius præmonstraverat,  
 ut iisdem non ipse gravis vocis tonus, sed ejus  
*saltem gravis resonitus deberetur.* Cujus quidem  
 quæstionis nondum video, cur me debeat pœni-  
 tere. Nam ut dispicere omittam, num revera sint  
 omnimode extra iter aeris eæ cavitates quæ in  
 ipsis glottidis lateribus aperiuntur, atque adeo an  
 ad ipsos vocum tonos conformandos una cum glot-  
 tide convenient; illud saltem planum est, si ad gra-  
 vium vocum resonitum buccarum dilatationem in-  
 servire, cum Dodardio censendum est, multo ma-  
 gis eidem rei videri posse utilem duarum dilata-  
 tionem cavitatum quæ ad glottidis ipsius latera  
 sunt constitutæ, & sic constitutæ, ut dum graves  
 voces eduntur, necessario dilatentur. Atque ita  
 quidem suspicionis meæ ratio se habet. Nunc  
 an meliora aut iste, aut Verheyenius attulerit,  
 videamus.

## ANIMADVERSI O XLV.

loc. cit.

**E**T Verheyenius quidem, Hi Sinus, inquit,  
 „ forte serviunt ut eodem halitu soni edan-  
 „ tur longiori tractu, aere ex dictis sinibus alte-  
 „ rius defectui subveniente. „ At tu vide, obse-  
 cro, ut hic vicissim oblitus sit dispicere, num  
 soni a bobus, cæterisque brutis quæ ventriculis  
 destituuntur, longiori tractu non edantur. Vide  
 insuper, ut minime animadverterit, aerem, dum  
 voces eduntur, ex iis ventriculis opportune extru-  
 di non posse; nam aut illæ graves sunt, & eo tem-  
 pore, quemadmodum in I. Adversariis ostendi,  
 qui muscoli comprimere ventriculos possent, ii  
 remittuntur; aut sunt acutæ, & tunc iisdem  
 musculis statim contractis, nihil, aut certe parum  
 aeris continere ventriculi possunt, qui mox *alte-*  
*rius defectui subveniat.* Porro Auctor Animad-  
 versionis, se „ potius existimare, inquit, quod  
 „ Ventriculi tanquam scaturigines, & melius  
 „ promptuaria mucæ necessarii trachealis, cumu-  
 „ lent eundem in se se, & reservent ad tempus;  
 „ effundant consequenter per tractum Laryngis, &  
 „ tracheæ in actibus Locutionis quo casu a cir-  
 „ cumjacentibus Musculis, actis in motus varios  
 „ contractiles, pressi, & contracti, hi ventriculi,  
 „ liquido elutriato suo debent necessario exonera-  
 „ ri; „ quasi vero nullis præter hominem ani-  
 mantibus hi essent ventriculi tributuri; quid enim  
 cani, equo, sui cum *actibus Locutionis*? Hista-  
 men brutis majores certe quam homini, laryngis  
 ventriculi obtrigere. Atque ut intelligere plane  
 possis, an illud Verheyenii argumentum potiori  
 Morgagni Adversaria Anat. V.

nos jure, præsertim adversus, non *suspiciantem*, aut  
 quærentem, sed *existimantem*, urgeamus; age, ut  
 libet, pro *actibus locutionis* quæ certe, si proprie  
 loquendum est, brutis haud convenit; actus vocife-  
 rationis reponere; nonne illud semper relinquitur,  
 verisimile non videri, bruta, & quædam potissimum,  
 quæ multo rarius, quam nos, vocem edunt, ma-  
 jora multo, & profundiora, quam nos, *prom-*  
*ptuaria mucæ necessarii trachealis* obtinuisse; inter  
 ipsa autem bruta nulla bobus fuisse concessa,  
 quibus tamen amplissimi *laryngis*, & *tracheæ* pa-  
 rietes in sua illa gravissima vociferatione erant  
 humectandi; imo nulla quoque avibus, iisque in-  
 primis, quæ longo, & assiduo cantu eadem or-  
 gana maximopere fatigant. Huc adde observatas  
 a nobis Ventriculorum Appendices, quæ certe,  
 non summæ, sed imæ eorundem parti appositæ  
 essent, si id eorum esset officium, *ut cumlarent*  
*mucum in sese, & reservarent ad tempus.*

Atenim „ in hunc, inquit, sensum ducor, eo  
 „ quod perspiciam parietes horum ventricu-  
 „ lorum investitos iri carne quadam glandulosa  
 „ a muscolari sat diversa, & quoad colorem,  
 „ consistentiam, & structuram substantiæ glandu-  
 „ larum arytænoidearum analoga. „ Ego vero  
 quibus substantiis investiti sint ventriculorum pa-  
 rietes, me satis credo & vidisse, & in illorum  
 descriptione indicavisse. Quæ quidem ita se ha-  
 bent, ut non appareat, quæ plus humoris in ven-  
 triculorum, quam in laryngis parietibus secerni  
 debeat: at si plus etiam secerneretur, per illorum  
 tamen jugiter patentia orificia sensim in laryngem  
 redundaret; neque enim quod in veris humorum  
 promptuariis solemne est artificium, ut horum vi-  
 delicet orificia angusta sint, & coarctata, id in  
 ventriculis non modo servatum esse, video; imo  
 e contrario video, ipsorum orificia tum amplifi-  
 sima esse, tum valde, & continenter patentia;  
 neque ferret facile natura laryngis cumulati mu-  
 ci affatim factam effusionem, quando constat,  
 unam vel alteram forte irrupentem aquæ, aut  
 lenissimi cujusque humoris guttam non ferre;  
 quamobrem censeo, institutum esse, ut is ipse suc-  
 cus quo assidue, & præsertim dum voces edimus,  
 larynx oblitur; ex epiglottidis glandula, no-  
 strisque arytænoideis, & annexis aliis laryngis  
 tunice glandulis (tot enim certas illius scaturi-  
 gines habemus, ut excogitatis istis promptuariis  
 non egeamus) ex iis igitur omnibus glandulis ex-  
 pressus, non per canales paucos, sed per innume-  
 ra, ac propterea minima, & tenuissimas guttulas  
 sensim emittentia, foramina intra laryngem infe-  
 rat. Eandemque ob causam fieri, suspicor,  
 ut si humor a Thyroidæ glandula secretus ad  
 laryngem spectet, per tot fortasse influat, atque  
 ideo ita exiles canaliculos, ut mirari non oporteat,  
 quod tot diligentium Professorum oculos ad-  
 huc effugiant.

De Glandulæ Thyroidæ Ductibus.

## ANIMADVERSI O XLVI.

**H**Actenus tum sententiam nostram exponen-  
 do, tum proposita ab aliis vel adversus hanc  
 argumenta, vel diversa Munera Ventriculorum re-  
 futando, indicatum a nobis ipsorum Usus de-  
 fendimus. Quod si nihil horum facere placuisset,  
 satis superque erat istorum dissensui opponere as-  
 sensum, auctoritatemque Viri Summi Jo. M. Lan-  
 cicii, qui in Notis ad Eustachii Tabulam XLII;  
 tibi autem XVIII. „ quod spectat ad usum ven-  
 „ triculorum laryngis - nostræ sane opinioni suam  
 „ quoque libenter adscribere se „ fatetur, cau-  
 „ sis cur id faciat, copiose, ingenioseque productis.

Ejusdem quoque laudatissimi Viri perbeni-  
 gnas laudes satis esset objicere proximæ Animad-  
 versionis in Figuram 19. Nam, ne una quidem vel mi-  
 nima ex nostris Figura esset, quam Censor Cl. non  
 argueret; „ Volo (hic inquit) quod Figura 19.  
 „ peculiarem explicet magnitudinem & figuram  
 „ ventriculi sinistri Laryngis in quodam solum  
 „ cadavere occurrentes; interim deviam nimis  
 „ ideam relinquit ventriculorum hujusmodi, tan-  
 quam



Ibidem.

De Ventr-  
culorum  
Laryngis,  
eorumque  
Appendi-  
cum varie-  
tatis.

30.

quam scilicet a causa nimis violenta adeo elongatorum, ut in hoc casu multum ultra naturalem adepti longitudinem fuerint, multumque amiserint latitudinis suae consuetae. Gravissimus autem Vir Lancisius, *Horum quoque*, inquit, *orificiorum figuram elegantem plane suis in Adversariis edidit clarissimus Morgagnus Tabula II. Figura 2. & 3.* (hæ tibi sunt Figuræ duæ superiores 17. & 18.) in 4. vero (hæc ista ipsa est 19.) *sinistrum ventriculorum a complectentibus illum particulis diligenter vindicatum exhibet*. Noverat quippe Vir Experientissimus, & in ventriculorum sectione, una cum Cl. Pacchiono, sæpe verfat, quæ nos in Figuræ 16. Explicatione attigeramus, esse verissima: esse videlicet Ventr- culorum Appendices alias majores, alias minores; ut hinc quoque fieri videatur, ut natura alii graviore, alii acutiore voce sint; atque adeo illa subjecit: Porro ex horum ventriculorum, atque orificiorum majori, vel minori amplitudine magnam partem oriri suspicamur naturalem diversitatem tonorum vocis in hominibus. Etenim qui prominentiori majorique thyroide sunt præditi, quoniam amplioribus ventriculis donantur, plus minus gravi, immo etiam gravissima voce loquuntur. Qui e contrario thyroidem nihil omnino prominulam habent, ut sceminae, & spadones, acutissimam vocem emittunt; nimirum quia in iis contenta cavitas minima est. Et sane orificiorum majorem diametrum in aliis pollicis, in aliis digiti indicis apicem æquasse, meminimus; appendicum autem longitudinem, latitudinemque non modo in aliis aliam, sed interdum in ejusdem laryngis dextro, sinistroque latere non eandem invenimus. Has igitur tot varietates, propter quas in Figuræ Explicatione illud interjicere debuimus: *sicut in cadavere isto occurrit*: cum Vir Sapientissimus non ignoraret, tantum abfuit, ut illam recedere censuerit ab naturali longitudine, aut ab latitudine sua consuetâ, & sic *deviam nimis ideam relinquere; diligentiam* in eadem nostram laudavit. Quam utinam ego pariter in tuo, Vir Cl. Scalptore laudare possem: at is, quasi Animadversionis Auctori (quod sæpius videtur facere) subserviret, Appendicis latitudinem multo quam ego, minorem exhibuit.

Cæterum alia ad Figuræ hujus nostræ delineationem pertinentia, alias fortasse, cum opportunius videbitur, proferemus.

## ANIMADVERSIO XLVII.

De Epiglottidis structura, &amp; Glandula.

Nunc enim præstat ad 20. Figuræ defensionem transire. In ea primum, hiatus illos præcipue majores, in epiglottide per medium, secundum longitudinem dissecta; quos ego certe vidi, meusque Pictor ope circini fideliter descripsit; illos, inquam, quasi in rerum natura extitissent nunquam, tam secure, tam aperte, atque adeo *omnimode repudiari*, plurimum miror. Neque enim satis est scribere: En breviter quæ sit epiglottidis structura a nobis minutissime examinata; imo ut hoc ipsum scribi jure adversus me possit, necesse est tot Epiglottides, quot ego, *minutissime examinasse*. Tot qui secuerit; imo etiam qui multo pauciores secuerit, eum non posse scribere, certum est: hanc cartilagineam ejusdem esse ubicunque crassitie. Quid enim? An non ex. gr. in summo fieri tenuior solet? An non eas ob foveas quas nos primi pinximus, atque descripsimus, multis in locis extenuatur? Hoc sane ita conspicuum est, ut qui tradit: hanc cartilagineam ejusdem esse ubicunque crassitie; mox idem, ad sulcorum regionem gracilescere cartilagineam, fateatur.

Sed ut ad hiatus illos redeam; neque ita multas Epiglottides opus est secuisse, ut apertissime cognoscatur, num foramina quibus ea cartilago pervia est, ita sint exigua, ut vi parvæ acus apicem admittant; cunctaque eandem circiter diametrum fervent. Sane ego nullam memi-

ni humanam epiglottidem aliquanto diligentius incidisse, in qua plura foramina multo istis, quæ ipse definit, majora non invenerim, & iis qui aderant, Auditoribus, Amicisque satis superque non ostenderim. Ex quibus eum potissimum nominare interest, quem sæpius magno suo merito laudo, Joannem Polenum Philosophiæ Professorum Experientissimum. Huic enim in Nosocomio Patavino non modo epiglottidis hiatus ostendi, quales in superiore Figuræ meæ parte meus quidem luculenter (nam tuus non satis) Scalptor exhibuit, non modo alios istis ipsis ita majores, ut per eos mediocris acus (non dico *apex*) capitulum ipsum transmitti posset; nam tales quoque hiatus cum nuper Viri Præstantissimi, atque ut præclaris Scriptis de omnibus, ita singulari benevolentia de me egregie meriti Joannis Gratiani Primarii Philosophiæ Professoris, tum pluries meorum fere omnium Auditorum oculis subjeci; sed unum præterea monstravi illo ipso maximo qui in mea Figura conspicitur, vix minorem, qualem etiam alias nonnullis ex meis Auditoribus ostendi, hos autem, ut semper cæteros omnes eadem glandulosa substantia qua epiglottidis utraque facies obducitur, plenos penitus, atque refertos: quod ut ego primus observavi, sic non plures, sed unam eandemque evidenter esse hujus cartilaginis Glandulam, constitui, quæ videlicet ab una ipsius facie ad alteram operiendam per eos hiatus continuetur. Et huic quidem structuræ modo, cartilagineæ videlicet substantiæ hic illic tum per insculptas foveas extenuatæ, tum per interjectam glandulam interruptæ, id deberi, minime dubito quod ad epiglottidis officium requiritur, ut hæc multo cæteris laryngis cartilaginibus flexilior sit. Cæterum, ne ab iis quæ toties a nobis & observata, & ostensa esse, diximus, hic longius abeamus; ea igitur cum revera ita esse, & nobis, & tot aliis constet, facile intelliges, Vir Ornatissime, quam parum nobis laborandum existimemus, quod Cl. Animadversionis Auctor scribat, se de antica, posticaque portione epiglottidis glandulosa non idem quod nos censere; sed ut duas distinctas omnimode glandularum aggeries considerare: multo minus stabilire in hominis epiglottide animadverti posse amplas illas scissuras, quas (inquit) ut dictæ continuationis, seu identitatis glandulæ interpretes exhibet Anatomicus noster præclarissimus. Nec sane etiam plus laboro, quod, excedentem nimis esse, dicat, molem delineatam utriusque ad epiglottidis faciem strati glandulosi, respectu ad molem naturalem; non modo quia animadverti, in ea quoque re Naturam haud raro varietates admittere sic ut sæpe id stratum glandulosum quo cava epiglottidis facies tegitur, supra hujus medium opposito crassius esse, viderim, verum etiam quia in rebus alioqui parvis primo per Figuras exhibendis & Summorum Anatomicorum exemplum, ut sæpius dixi, & discentium utilitas me permovere, ut iis potissimum subjectis uterer, in quibus omnia pro rata portione essent majora.

## ANIMADVERSIO XLVIII.

Itaque de eo potius laboro quod postquam ego illam mihi cogitationem susceperam, ut peripicuis tum Iconismis, tum descriptionibus discentium commodo inservirem, toties & Scalptor tuus ab nostris archetypis discesserit, & tu verba nostra prætermiseris. In hac enim ipsa Figura ille quidem præter id quod de superioribus epiglottidis meatibus supra admonui, alia etiam perperam descripsit, & præsertim illas quibus cartilago excavatur, foveas, quarum vix unam expressit. Cum autem ego in Explicationis ejus Figuræ argumento me demonstrare epiglottidem, dixerim, ea ratione, uti omnia quæ n. 3. de cartilagine, ne eadem traduntur, hac inspecta sectione conspici queant; tu me sic loquentem induxisti:



xisti: „ ea ratione ut omnia quæ de eadem car-  
 „ tilagine tradita sunt, conspici queant. „ Num  
 etiam singulares illæ minores glandulæ, quibus  
 concavam ejus faciem obsideri, Verheyenius tra-  
 diderat? Num etiam ipsius cartilaginis *eadem*  
*ubique crassities*, quæ ab Animadversionum Au-  
 ctore tradita est? Ego quoque explicationem lit-  
 teræ *b.* sic concluderam: *quæ præd. n. 3. memo-*  
*rantur*; tu vero his ibi verbis omissis, ea paulo  
 supra interjicis: *prius memoratis*. At quandonam?  
 aut ubinam? inquit Lectores. Num forte Ani-  
 madversionibus longior erat nostra descriptio, ut  
 cum illas edere posses; hanc non posses? Sed  
 & in proximæ Figuræ 21. Explicatione ( ut alia  
 modo hujusce generis loca præteream ) ad litte-  
 ram *d.* ita scribis: „ Ea vero tenuis lacinia qua  
 „ capitulum hoc ( Cricoidis ) antèrius ambitur,  
 „ illa nempe est quæ ex mucilaginoso constare  
 „ glandulis reputatur. „ Cuinam, quæso, repu-  
 tatur? nam ut mucilaginem ego primus in eo  
 quoque minimo articulo, sic etiam eam laciniam  
 observavi, hujusque naturam istiusmodi esse, cen-  
 sui. Itaque sic ego quidem scripsi: „ Ea vero  
 „ tenuis lacinia, qua capitulum hoc interius am-  
 „ bitur, illa nempe est, quæ mihi ex mucilagi-  
 „ nis constare glandulis reputatur. „ Huc  
 accedit Typographi error ita explicationem litteræ  
*g.* ab explicatione litteræ *b.* sejungentis, ut ne-  
 mo, mea præsertim omiſsa descriptione, & pro-  
 ximis verbis mutatis, intelligere prorsus queat,  
 quid illud sit, quod iis cavitatibus Arytænoidis  
*alte excipitur*. Verum, ut ad Scalptoris negli-  
 gentiam redeam, certe ego Glandulæ Arytænoi-  
 dæ nec Crus longius *K.* ita crassum, neque Co-  
 lumellam *l.* ita latam, aut per alterum Crus bre-  
 vius *i.* productam delineavi, ut ipse in eadem 21.  
 Figura ostendit. Qui cum Scalptoris errores  
 certissimi sint; tu mihi adversus eandem Figuram  
*dubietates* affers Auctoris Animadversionum, &  
*dubietates* quidem ejusmodi, ut ad unam omnes  
 ex eo argumentorum loco, & quasi fonte haultæ  
 sint, quo obſtructo, perpauca sane Scriptor ille  
 habuisset, quæ contra omnes Figuras nostras con-  
 gereret. „ Crederem, inquit, revera, quod pos-  
 „ set aliquis obiter asserere, non minus finum  
 „ arytænoidis, capitulum cricoidis ad articula-  
 „ tionem excipientem, quam & ipsummet capi-  
 „ tulum exceptum, illum scilicet in cavitare,  
 „ istud in protuberantia, ultra naturalem statum  
 „ aliquantulum efferri. Item & forſan imputari  
 „ posset, tum cavitatibus ad anteriorem Arytæ-  
 „ noidis faciem, pro glandulæ ejusdem nominis  
 „ positione, locatis; tum glandulæ ejusdem Ary-  
 „ tænoideæ expansioni; tum Columellæ, per to-  
 „ tum ejus cruris longioris tractum conductæ.  
 „ Hæc cæterum omnia licet ultra veri parvita-  
 „ tem nonnihil deducta, exactissima tamen sunt,  
 „ totaque claritate & nitore insignita. „ Ego  
 vero non solum *crederem*, sed certe scio, illa o-  
 mnia non futura fuisse *tota ista claritate insigni-  
 ta*; nisi ad ipsa delineanda, ea ( quod pluries di-  
 xi ) subjecta potissimum selegissem, in quibus il-  
 læ particulæ majores occurrerent. Interea tamen  
 pro isto consilio, atque industria hæc mihi refer-  
 tur gratia. Sed hæc leviora sunt præ iis quæ  
 interdum cogor devorare.

## ANIMADVERSIO XLIX.

Q Uis enim credere unquam posset, cum ego  
 anno 1706. ista edita Figura, & non mi-  
 nus perspicua descriptione, cartilaginis Cri-  
 coidis cum Arytænoide Articulationem, a Galeno  
 olim, aliisque Anatomicis celebratam, postremo-  
 rum vero Scriptorum communi ferme negligentia  
 obsoletam, in antiquum notitiæ, publicique usus  
 locum restituissem, cumque ipsam Nobiles Ana-  
 tomici Verheyenius, atque Fantonus, ille anno  
 1710. hic vero anno 1711. in suam quisque Ana-  
 tomiam Corporis humani tranſtulissent, atque  
 adeo alter hæc etiam diserte, humaneque addi-

l. 1. tr. 3.  
c. 11.

disset: *Singula hæc dilucide exponit in suis Ad-*  
*versariis Eruditus Morgagnius*; cum, inquam,  
 hæc ita essent; quis unquam posset credere, anno  
 demum 1715. extitisse aliquem apud Litteratissimam  
 Nationem Doctorem Anatomiam, qui ita scribe-  
 ret: Galenus „ in cartilagine cricoide capitula  
 „ ostendit, in aritenoeide autem sinus, & per hæc  
 „ utramque cartilaginem mobili admodum com-  
 „ mitti articulatione demonstravit; *De his tamen*  
 „ *recentiores anatomici multum silent*; quanquam  
 „ sine eorum notitia actiones & utilitates earum  
 „ cartilaginum explicari non possunt. „ Quid,  
 inquiet aliquis, si is Scriptor tuus, Verheyenii,  
 Fantoni Scripta non vidit? Quid vero, si mea  
 non vidit modo, sed ita vidit, ut ista ipsa quæ  
 modo protulimus, verba, istud ipsum: *multum si-*  
*lent*: ex meis Adversariis descripserit? Ego enim  
 ita scripseram: *Galenus igitur in cartilagine cri-*  
*coide capitula ostendit, in arytenoide autem sinus;*  
*per hæc vero utramque cartilaginem mobili admo-*  
*dum committi articulatione, demonstravit*: tum  
 paucis interjectis: *Neque - arytenoidum actiones,*  
*& utilitates explicari satis possent, nisi ea capi-*  
*tula, ii sinus, eæ cartilaginum junctura haberen-*  
*tur*: denique post non ita multos versus hæc sub-  
 jeceram: *Sed qui a Caspari Baubini temporibus in*  
*hanc usque diem Anatomici floruerunt, - ita de*  
*iis rebus multum silent, ut &c.* Nimirum igitur  
 si istam Articulationem non restituissem, si hæc  
 non scripsissem; ille *recentiores anatomicos*, atque  
 ideo me quoque ipsum, si Diis placet, *de his re-*  
*bus multum silere*, non scripsisset. Ac fuit qui-  
 dem cum egomet crederem, in ejusdem Scriptoris  
 manus mea Adversaria non venisse, propterea quia  
 neque in Auctorum Catalogo, quibus se esse usum,  
 confitetur, meum nomen invenirem, neque mul-  
 ta, a Veteribus Anatomicis, ut ego ostenderam,  
 reperta, suis quæque Auctoribus, quemadmodum  
 lex ejus Operis poscebat, tributa viderem, imo  
 aliquod iis adscriptum comperirem, quibus non  
 esse adscribendum, monstraveram, ut cum de Pau-  
 lo Sarpio, *Senatore*, ut ipse inquit, *Veneto* hæc  
 sine refutatione scribuntur: „ In homine etiam,  
 „ magno rei medicæ incremento, pupillæ mo-  
 „ tum, i. e. constrictionem & dilatationem pri-  
 „ mus omnium notasse perhibetur: „ quem ego  
 motum saltem ab Alexandro Achillino, qui la-  
 bente anno 1520. in vivis amplius non erat, per-  
 spicuis fuisse verbis propositum, demonstraveram.  
 Verum postquam animadverti, non modo ubi de  
 illa Articulatione, sed & ubi de Ligamento pe-  
 nis Suspendorio a Vesalio indicato, ac de mini-  
 ma testiculorum structura ab Arantio observata lo-  
 quitur, meis ipsis verbis uti; miratus sum, ho-  
 minem in eo præsertim Opere quod nisi summa  
 fide conscriptum esse, constet, parvi ab omnibus  
 pendatur, adeo manifestam, ac facile deprehen-  
 dendam dissimulationem haudquaquam vitavisse.  
 Quoniam tamen incuriam, oblivionem, Opera-  
 rum negligentiam, & quidvis potius, quam id  
 parvi animi vitium in Cl. & erudito aliqui Vi-  
 ro malumus suspicari; idcirco ( dum hunc ite-  
 rum errorem non erret ) ipsius nomini libenter  
 parcemus.

## ANIMADVERSIO L.

N Unc illud relinquitur, ut de tribus proxi-  
 mis Tabulis perpauca dicamus. Et pri-  
 mum quinque Malpighii Figuras siquis cum ea-  
 rum archetypis diligenter conferat, in singulis  
 quædam inveniet non satis fideliter, accurateque  
 descripta. In Figura autem 6. quæ ex Willisio  
 est, quis eo, in quo Auctor delineaverat, positu  
 mutato, Arteriam *B. subjacentem*, aut Venam *C.*  
*superpositam* intelliget? aut quis proximam Ver-  
 heyenii Figuram cum archetypo contendens, ori-  
 ficium *B.* alieno loco, a tuo, Vir Cl. Scalptore  
 exhibitum non cognoscet? Porro ut in eo laudan-  
 dus est Verheyenius, quod dum in ista Figura lo-  
 bulos pulmonis internos *e. e.* sic ostendit, ipsos  
 juxta

Diff. 13.

Advers. 1.  
n. 15.

Ibid. n. 26.

Ibid. n. 18.  
& 19.

263.



An. 1699.  
M. Febr.

264

265

An. 24.

264.

265

Anim. 14.

266.

juxta Willisium se ostendere, quasi videlicet ut in re non satis explorata, profitetur; ita dum tu eosdem ex Willisio in Figura 8. quæ illa nempe est, ad quam respexit Verheyenius, sine ulla animadversione exhibes, multis profecto in mentem veniet ejus Cowperi censuræ, quæ in Actis etiam Eruditorum memoratur: „lobulos pulmonum ea „figura separari non posse, quali a Willisio re- „presentantur. „Accedit, Willisium in eadem, aliisque Figuris bronchialium ramorum cartilagine non modo annulares pingere, verum etiam in illius Explicatione ad litt. CC. scribere, se illorum „partem superiorem integram, sive clau- „sam exhibere, ut Cartilagine Annulares ap- „pareant; „quæ tamen quam variarum sint formarum, cum Bidlous infra docet, tum alii ante eum docuere, ut in I. Adversariis demonstravimus. Denique in postrema hujus LXXXIX. Tabulæ Figura Vasa sanguifera cccc. lobulos perreptantia, quæ quidem in Willisii archetypo adumbrantur, incassum perquiro. In ea autem quæ consequitur, Tabula XC. vide, quæso, an non præstitisset istiusmodi Figuram i. omittere, quam in ejus Explicatione revera, ut tu quoque agnoscis, non parum obscura illustranda, divinare. Quod cum ego facere non ausim, idcirco in Figura 6. (quæ certe, ut 5. etiam, paulo ante propositæ Cowperi censuræ obnoxia est) pro certo dicere non possum, an litteram D. ab Auctore Bidloo omissam, recte collocaveris; illud plane video, in ejus. Figura pulmonum lobulos a pulmonum vesiculis non satis perspicue distingui. Bene vero factum, quod levis admodum momenti sit, quo potius colore tincta cera in hoc, vel illud pulmonare vas injiciatur; nam ego quidem neque illud dicere pro certo possem in Explicatione Figuræ 10., Venam A. cera rubra, Arteriam autem B. cera flava repletam esse, cum idem Figuræ Auctor nihil aliud scribat, nisi eas *diverse colorata cera fuisse repletas*. Superest Tabula XCI. de cujus paucissimis Figuris inverso idcirco ordine dicemus, ut ab iis quæ ad eundem Bidlolum pertinent, incipiamus, II. videlicet, ac 12. His, & proxima, quæ ex Verheyenio est, tu quidem in Indice affirmas, *Pharyngem - accurate explicari*. Nos vero cum in II. Adversariis ostendimus, quid de 10. Figura Tabulæ tuæ XI. habendum esset, cur hæ quoque omnes sint rejiciendæ, satis indicavimus. Hic unum, vel alterum de 12. speciatim addemus. Hanc tu „sub „iisdem quæ in priore habentur Characteribus, „eosdem, inquis, qui mox descripti fuere, musculos, a parte postica ostendere. „Et Bidlous quidem, in hac Figura *hos Musculos a parte postica ostendi*, inquit; iisdem autem, qui in prio-

re habentur, characteribus ostendi, nec dicit; nec dicere, sane potest; alii enim aliis musculis, & nonnulli præterea, qui in priore Figura non erant, appositi sunt; itaque singulos rursus explicat. Ceterum hic eosdem Musculos a tergo ostendi, non facile intelligo, cum scutiformis cartilaginis anteriorem faciem videre hic videar, cujus lateribus Musculi DD. quos Bidlous Oesophagos esse, dicit, adhuc inhæreant. Ex cæteris autem hujus Tabulæ Figuris me una potissimum morata est, 2. videlicet. Hæsi enim primum, cum in ipsius Explicatione per litteras CC. non duos ramos, in quos Bronchialis Arteria dividitur, sed hujus *exortum* monstrari vidi e tertia Arteria Interco- stali. At facile expedierunt me quæ forte eodem tempore in manibus erant, Acta Eruditorum. In his enim eidem Figuræ litteram C. appositam vidi in eo quidem loco quem ista ipsa explicatio postulat, duobus autem istis ramis, quibus tuus Scalptor litteras CC. adjecit, duas vidi punctorum series appositas, ita cum *Trunculis AA.* Figuræ tuæ i. ex parte altera conjunctas, ut ab his eos ramos abscissos esse, indicarent. Cum vero per litteram D. *Portionem* monstrari *Venæ Azygos* animadverti, tum venit in mentem quærere, ubinam totam eandem Venam ostenderes, aut ejus saltem admirabilem dispositionem describeres. Sed tuam Venarum Tabulam inspiciens, eam Venam ita sub Cava latentem deprehendi, ut (quod alibi quoque a me notatum esse, memini) vix ac ne vix quidem intelligi possit. Cum autem in eo quidem Capite quod illi Tabulæ respondet, animadvertissem, te „de aliis ad venarum historiam facientibus - alia - polliceri ubi „de Sanguinis Circulatione, & ubi de variis in „specie Visceribus verba facienda venirent; „totum de eadem *Circulatione* Caput, imo totum hunc de Thorace Librum diligenter relegi, si forte id quod quærerem, in his invenirem. Cognovi denique, nisi interea dum tu Theatrum parares tuum, Eustachianæ Tabulæ, in quibus pluries ea Vena proponitur, ab Illustrissimo Viro Lancisio editæ essent, te facile in toto tuo Opere nihil, aut ferme nihil de eadem Vena traditurum fuisse. Quod quidem cum ex eo potissimum esse, videam, quod de admirabili ista vena ut Veteres Anatomici plura scripsere, ita perpauca ab Recentioribus edita sunt; facturum me operæ pretium, spero, si cum una, aut altera Epistola nostra duas huc adjiciam, quas Amplissimus Lancisius ad eas rescripsit longe doctissimas Dissertationes, quarum prima ejusdem Venæ historiam, & causas copiose edisserit, altera quendam prioris Dissertationis locum ingeniosissime illustrat.

265.

An. 1697.  
M. Janu.Adv. II.  
Anim. 46.Tom. I.  
202

Adversariorum Anatomicorum V. Finis.



*Illustrissimo, & Reverendissimo Viro*

D. D.

JOANNI MARIAE  
LANCISIO

Intimo Cubiculario, & Archiatro Pontificio

*Joannes Baptista Morgagnus S. P. D.*



Perlegenti mihi, Vir Amplissime, quos pro eximia tua liberalitate misisti ad me nuper, de Noxiis Paludum Effluviis Libros, rerum vel copia, vel utilitate præstantissimos, cum alia plura occurrerent, quæ in Tui admirationem pertraherent, tum illud inprimis, quod non istis modo occupationibus, sed ista præterea ætate, ac valetudine tam multa pergeres, & tam difficilia commentari. Equidem alias (idque ipse, opinor, memineras) Te etiam atque etiam oravi, obtestatusque sum pro tua summa erga me benevolentia, pro mea immortalis in Te observantia, ut tandem aliquando Tibi parceres, ut cæteris sepositis studiis omnibus, in eam unice rationem incumberes qua Te nobis diutius servares. Sed quando intelligo, atque adeo perspicio, a tuis Te commentationibus nullis precibus divelli posse, alia aggrediar via, faciamque iterum quod superiore ætate in illo tuo gravissimo casu; cum Te videlicet ad disputandum avocavi, quonam potissimum veneno Cleopatra videretur occubuisse; ut saltem ab severioribus studiis ad aliquanto amœniora traducam. Quanquam modo disputationem haud proponam, quam (ut eo tempore, meum, credo, consilium intelligens, fecisti quo me in posterum absterres) jocos vellicare jure queas, ceu Te minorem, & propemodum juvenilem; imo vero nodos afferam in medium & dignos Te vindice, & a tuis sive præsentibus, sive præteritis studiis non ita sejunctos. Nam qui de Aneurysmatibus, atque ideo de Motu Cordis nunc scribat, de Eustachii autem Anatomicis Tabulis jam scripserit, eum puto causas illius Venæ quam sine pari vocamus, non illibenter indagaturum, quippe ita peculiari ratione, tantoque, ut sic dicam, artificio constructæ, atque dispositæ, ut quemadmodum hujus admiratione vel olim permotus Eustachius videtur ad ipsam cum singulari opusculo, tum multiplici iconismo celebrandam, ita in hac Anatomies luce ab iis qui circuitus sanguinis expandunt causas, multo sit diligentius attendenda, omnique cura, & studio excolenda.

Quid igitur, Lancisi Ornatissime, existimabimus esse causæ primum cur quidquid sanguinis ex arteria magna per intercostales plerasque ef-

luit, id omne, non per totidem venulas quæ in cavam pari ordine desinant, in hanc refluat? Deinde cur non in cavæ inferiorem truncum redeat, sed in superiorem? Tum vero cur istuc, non per duas venas, singulas videlicet more institutoque naturæ ab singulis lateribus positas, sed per venam sine pari inferatur? Postremo cur hujus ipsius venæ truncus, non a sinistris, sed a dextris prorepat? Hæc enim quatuor mihi quidem videntur potissimum vestiganda.

Num ergo primum ideo fieri credemus, quod longiore, minusque commodo, ac tuto itinere singulæ venæ intercostales ad cavæ truncum, præsertim inferiorem, deducerentur, ut qui non ad vertebrae dorso est, sed medio in thorace collocatur?

Num alterius causam hinc quoque repetemus? an potius aliam quandam perquiremus congruentem iis quæ de causis venæ sine pari Viri Clarissimi proposuere Hermannus Boerhaavius, & Guilelmus Cowperus? Censet enim Boerhaavius, „admirabili hoc apparatu id fieri, ut liberrima hic, nec impedita a copioso sanguine venæ Cavæ fiat sanguinis circumductio: dum partes in eam venam (sine Pari) se exonerantes, nempe intercostalia loca, & magna pars membranarum in thorace positarum, haud ferant impedimenta, sine maximo, & præsentissimo quidem vitæ periculo. Quam eandem, inquit, ob causam hic est laxum ex arteriis in venas iter: unde intelligitur ratio celeritatis in his viis, ut & frequentia acutissimorum hic toties accidentium morborum. „Cowperus autem, si recte memini quæ olim in ejus legi Anatomia, in ea fuit sententia, ut existimaret, ea ratione sanguinis ex inferioribus partibus redeuntis ascensum plurimum adjuvari. Ut enim huic motui ipsum cruoris pondus non mediocriter reluctatur; ita Cowperus cum venam portæ idcirco factam credebat, ut maxima pars sanguinis ex imo ventris ad cor rediret in eam venam recepta, inferiorem cavæ truncum non ante subiret, quam hic diaphragma trajiciens assiduo hujus motu juvari posset: tum putabat, venam quoque sine pari non absimili de causa constructam esse. Nam ut rami hujus infimi cum lumbaribus, atque interdum cum emulgentibus etiam venis communicant, truncus autem, intercostalium (paucis superioribus exce-

Institut.  
Med. n.  
308.



exceptis ) cruorem admittit, ita planum esse, non dubitabat, partem aliquam sanguinis ex imo ventre, magnam vero ex infimo thorace redeuntis, & propterea in cavam inferiorem corrivandi, ne hæc nimio sursum vehendo onere prægravaretur, in istam singularem venam divertere, a qua ut per arteriæ magnæ latus quasi perrepente, eo facilius sursum vehi, ut vero in cavam superiorem definente, eo proclivius, utpote deorsum, ad cor ex eo loco posset contendere. Quam quidem sententiam, cum mihi ea primo cognita est, non parum fateor placuisse sive quod revera habeat, cur placere debeat, sive quod similes ob causas ipse olim conjecissem, thoracicum quoque ductum, non in proximam venam cavam inferiorem, sed in ramum superioris influere.

Nunc vero ut eadem placeret, non tamen inde eam causam assequerer, quam tertio loco esse proposui perquirendam, cur videlicet simplex, non duplex, ea vena condita sit, maxime cum id adjumenti a duabus facilius, quam ab una vena afferri sanguini potuisse videatur. Num ergo unam dicemus esse factam, ne si duæ, e regione sibi objectæ, in eundem locum influerent, altera alterius usui adversaretur; satis namque ibidem; vel sine hoc; magna difficultas cruori objicitur, & ab

inferiore loco, & contra alterius deorsum labentis cursum influxuro.

An potius unam eandemque esse credemus causam, quare vena azygos & una sit, & ab dextra parte, de quo novissime quærendum posui, constituta, quod videlicet impedimentum in sinistro thoracis latere aliquod obstitit, ne ejus venæ truncus satis commode ibi potuerit collocari; nunc enim certe satis commode locatus est ab ista ipsa parte, quam cava tenet, in quam ille debet influere; quem ad locum si ex adverso latere contenderet, interposita magna arteria fortasse obsteret; Quanquam haud me fugit, priusquam aliquid statuamus, variam eam rationem perpendendam esse, qua in variis animantibus, atque adeo in quibusdam etiam hominibus vena azygos disposita est.

Verum ego & id, & quæcunque supra attigi, non ideo attigi, ut judicium interponerem meum, sed ut tuum, Vir Doctissime, exquirerem. Quod si mihi pro tua spectatissima humanitate aperueris, cum gratum erit in posterum, quod in proposita disquisitione habuero, in quo conquiescam, tum erit in præsentia gratissimum, quod Te a tuis istis gravioribus studiis paulisper avocaverim. Da operam, ut valeas.

D. Patavio VI. Kal. Decembres MDCCXVII.





*Viro Clarissimo, Doctissimoque*

**D. JO. BAPTISTÆ MORGAGNIO**

**Medicinæ Doctori, & in Patavino Lyceo  
Primario Anatomies Professori**

**JO. MARIA LANCISIUS S. P. D.**



Emper quidem in litteris, quas a Te accipio, Vir Clarissime, singularis doctrinæ tuæ, atque humanitatis imaginem intueor. Nunquam enim ad me scribis, quin præclarum, ac nobile aliquod eruditionis simul, ac benevolentia in me tuæ argumentum suggeras, & proponas. Nam superioribus mensibus, cum post incommoda valetudinis rusticarer, ac proinde a severioribus negotiis me subduxissem, amœnissimam disputationem de veneni genere, quo Cleopatra extincta fuit, quasi per jocum intulisti: nunc vero vacantem me lucubrandis difficillimis Commentariis de Corde, atque Aneurysmatibus, ad Anatomicam de Vena Azyga exercitationem non minus jucundam, quam abstrusam, acerrimoque ingenio tuo dignam, amice provocas. Libenter igitur susceptum antea laborem paulisper intermitto, ut pro nostra consuetudine, studiorumque conjunctione tecum agam, eoque libentius, quod materiam alioqui obscuram jam videam luminibus Epistolæ tuæ magnopere illustratam. Patere tamen, mi Morgagni, ut a Methodo tua, cæteroqui accuratissima, paululum recedam, remque ipsam aliquanto altius repetendo, antequam ad problemata a Te sapienter excitata respondeam, vestigare institui, quam potero diligentissime, tum statum, tum structuram, usumque venæ Azygæ. Et quamquam non ignoro, summos Viros tam olim, quam nuper solertiam, ac sedulitatem suam in eadem perquirenda, explicandaque egregie probasse; nihilominus non pauca huc usque, ni fallor, prætermissa, me detesturum confido.

Fateor tamen, nec otium mihi suppetere, nec epistolæ modum pati, ut longius nunc digrediar, inquisiturus in singula fere animantium genera, in quibus vena Azyga singulari aliqua proprietate distinguitur. Nam si numerum spectes, in homine quidem, simia, canē, equo, aliisque unica est ut plurimum, eaque per dextrum thoracis latus producta ramos ad utriusque partis intercostales musculos protendit. In echino, & mure sinistrum dumtaxat latus illam perreptare, & utrinque suas propagines mittere, observavit Eustachius. In bove autem, capra, & ove non solitariam, quæ id muneris præstat, venam, sed geminam in utroque pectoris cavo nos etiam comperimus. Suibus vero duplex quidem data est, mirabili tamen artificio disposita, quemadmodum idem Eustachius animadvertit, ut sinistra a dexte-

ris quoque, sed inferioribus costis, sanguinem excipiat. Denique gallinaceum genus quatuor venis azygæ officio fungentibus, utrinque scilicet binis, præditum offendimus.

Quod si quæramus locum anastomoseos ejusdem Azygæ cum trunco majoris venæ; non omnibus idem est. In homine siquidem vena sine pari, sive Azyga ubi unica invenitur, ibi semper cum superiori cava extra pericardium, & supra asperam arteriam inosculatur. In simia, canē, & felē jungitur cum eadem superiori cava; sed intra pericardium, & prope dexteram Cordis auriculam. In equis uno ostio, in bobus, & suibus duplici, verum ab invicem per intermedium musculare septum diviso, basin dexteræ auriculæ ingreditur. In volatilibus venæ, quæ Azygæ vicem suppleant, binæ tam in lævam, quam in dexteram axillarem sanguinem effundunt. Quæ vero in hominibus sinistra aliquando invenitur, in lævam subclaviam se se exonerat.

Hæc porro, multoque forsitan plura in cæteris animantibus discrimina proprietatum, ac conditionum venæ Azygæ, quoniam a natura non cæco casu, sed summa industria, ac mechanica exigente necessitate fuerunt instituta, ingentem sane, immensumque campum mihi aperirent, in quo tecum, Vir doctissime, disputando, vagari libere, nec sine aliquo eruditionis fructu liceret. At vero, cum a Te ad humanam dumtaxat Azygam expendendam accersitus sim; id certe oneris tanto alacrius suscipio (utinam sustinere firmiter possim) quanto magis intelligo, ejusmodi venam apud homines peculiari artificio instructam fuisse, quippe qui respirationis organis uti debuerant, tum ad vocem multifariam excitandam, flectendamque, tum ad varios, ac pene innumeros corporis, ac præcipue thoracis edendos motus, tum denique ad nonnullos pectoris morbos per anacatharsim profligandos: quo magis admiror, venam Azygam post detectum sanguinis circulum, perinde quasi omnino inutilem, ac vetustate quadam evanescentem, etiam in hominibus a nonnullis Auctoribus fuisse neglectam.

Itaque vena Græcis Azygos, Latinis vero sine pari, seu sine comite, locata est in hominibus, ut probe nosti, intra thoracem ad radices costarum secundum dextrum vertebrarum latus, & cæterarum venarum more valvulis (\*) munita sursum progreditur, a septo nimirum transverso inter pleuræ membranas, atque in ascensu e singulis intercostalibus musculis tam dexteris, quam sinistris

(\*) Vide controversiam inter Priscos de hujusmodi valvulis: has enim quas Amat. Lusit. in 1. Med. Curat. Centur. in Schol. 51. se animadvertisse, affirmat; Falloppius Obs. Anat. pag. mihi 89. penitus negat, Amatuniquē conviciis plane lacessit: Jo. tandem Riolanus Amatuniquē præclare tutatus est Anthropographiæ lib. 3. cap. 8.



stris ramos accipit, tandemque insignem truncum constituens curvo itinere, seu paululam in arcum flexo supra tubum asperæ arteriæ inter quartam ut plurimum, & quintam dorſi vertebram aſſurgit, ac ſanguinem, quem convehit, univerſum ingerit, atque immittit intra ſuperiorem cavam, quo loco nondum pericardium ingreſſa eidem aſperæ arteriæ incumbit, ac firmiter adhæret. Et quanquam aliquibus viſum eſt, venulas a tribus, vel quatuor ſuperioribus coſtis in Azygam non derivari; re tamen vera primus ramus, qui inter tertiam, & quartam, vel quod frequentius accidit, inter quartam, & quintam coſtam progrediens, in Azygam aperitur, tres ſurculos admittit in via, qui ſanguinem e muſculis primarum coſtarum ( unde revehunt etiam venulæ a ſubclaviis, & axillaribus, præſertim in lævo latere ) ad eandem venam ſine pari, veluti per communem canalem regerunt, & important: quos quidem ramulos Eulſtichius etiam noſter diligenter inſpexit, atque deſcripſit. *Vena, inquit, ſine pari ad quatuor ſuperiores coſtas non recta ſerie, ſed vago ductu propagines mittit.* Hoc autem inde factum puto, non ſolum propter ſitus anguſtiam id exigentem; verum etiam quia, cum ſuperiores coſtæ circumferentia cæteris minores ſint, minorem quoque ſanguinis copiam ab arteriis excipiunt, & in venas reddunt, atque ideo, ut cujuſdam veluti æqualitatis ratio inter omnes Azygæ propagines ſervaretur, ejuſmodi tres, aut quatuor ramuli ſanguinem congerunt in eum ramum, qui reliquis etiam & ipſe minor fuiſſet, niſi horum trium influxu major evaderet: ita enim rivulorum omnium in Azygæ quaſi amnem confluentium vis quodammodo æquatur, id ipſum porro clariuſ occurrat in ſiniſtro latere, in quo Azygæ rami tam primi ſuperiores, quam ultimi inferiores ex minorum confluxu augetur, illique proinde, qui recta in Azygæ caudicem aperiuntur, numero pauciores apparent. Sunt etiam in lævo latere venulæ a primis ſuperioribus coſtis prodeuntes, quæ ſanguinem in axillarem breviori itinere infundunt.

Ut vero perſpicue deprehendantur omnia, ac ſingula germina venæ ſine pari, ſumma cautio adhibenda eſt in exſpiciis, ne ſuperior cava ſaucietur: ſtatim enim ac illa diſciſſa fuerit, inaniuntur, & concidunt ramuli ſanguinem in Azygam corrivantes, præſertim ſuperiores, ac vicinioreſ; eaque ratione ægre in conſpectum cadunt, faciuntque, ut non niſi octo majores Azygæ rami, cum revera decem ſint, in dextro potiſſimum latere, numerentur; ſunt enim qui etiam a diaphragmate regerunt.

Sedulo tamen hic quoque animadvertendum duco, naturam variis modis in divaricandis venis, quæ ſanguinem ab intercoſtalibus muſculis referunt, ludere conſueviſſe; ita ut ſæpiuſ, quam vulgus Anatomicorum huc uſque putavit, ſiniſtro in latere alia vena deprehendatur, quæ Azygæ officium præſtat: ipſe enim in frequentibus cadaverum ſectionibus jam decies, aut etiam ampliuſ illam ( ſæpiuſ tamen in ſcæminis, præſertim quæ thorace longiori gaudebant, quam in Viris ) obſervavi ea lege diſtributam, ut non cum vena cava, ſed cum ſubclavia copularetur; atque a quinque, aut ſex tantum ſuperioribus intercoſtalibus ſpatiis per conſpicuos ramos ſanguinem reduceret, ultimumque ejus ſurculum ſub Aorta deſcendente in dexteram Azygam tranſverſo itinere protenderet: atque interim ab inferioribus lævarum coſtarum muſculis venoſæ propagines pro conſuetu naturæ more in dextram venam ſine pari mitterentur. Quare in ſiniſtro latere cum etiam invenitur, non niſi Hemiazyga dici poteſt.

At enimvero, Vir doctiſſime, non eſt ut Te inutiliter hoc loco detineam ſingillatim recenſendis omnibus extremis venæ Azygæ ramulis, qui ab externa thoracis parte, atque ex abdomine recurrunt, & cum aliis venis inoſculantur. Nam

Te minime latet, inter alioſ Anatomicoſ Jacobum Falloppium, ac omnium diligentiffime Eulſtichium, ſinguloſ ejuſdem ſineſ perſequutoſ fuiſſe, præſertim vero demonſtraſſe, germina venæ ſine pari tum ſuperne per ipſiuſ ſterni cartilagineſ in externoſ pectoriſ muſculoſ divaricari, eaque cum mammariis conſpicua anatoſi copulari; tum prope dorſi vertebræſ in poſterioreſ, ac lateraleſ externoſ parteſ uſque ad membranam adipoſam produci: tum demum inferne ad lumbareſ quoque muſculoſ deferri, ac, ſuperato diaphragmate, eadem germina in latere ſiniſtro ſæpe cum vena emulgente, in dextero frequentè cum cava, aut cum recurrente a teſtibuſ, atque etiam in Mulieribuſ ab utero ( ut ſemel noſ vidimus ) concurrere.

Illud utique ſilentio prætereundum minime arbitror, me plurieſ tentafſe, quorſum pateret adituſ injectiſ per ſiphonem liquoribuſ, ab Azygæ ne inferniſ ramuliſ in emulgentem, & cavam, an e contrario; ac deprehendiſſe ( quod experimentum oſim factum impulſo ſtatu legimus a Jacobo Sylvio ) liberum iter tam a cava, atque ab emulgente ſurſum in Azygam, quam ab hujus externoſ ſurculiſ deorſum in cavam, & emulgentem excurrere: ut non ſit dubitandum, quin ipſiuſ naturæ providentia paratæ ſint ejuſmodi vaſorum inoſculationeſ; ne videlicet vena modo Azyga, modo cava in magniſ, variſque corporiſ conatibuſ, atque adeo diaphragmatiſ potiſſimum contentionibuſ nimiam plenitudinem propter interceptum, ac ſubſiſtentem ſanguinem paſſa, diſrumpi poſſet. Hoc porro artiſcium imitantur paſſim Aquilegeſ, quotieſ periculum imminet, ne fluminis aqua ſupra modum aucta extra ripaſ diſſuat; tunc enim foſſaſ ad riparum latera excavare, perque eaſ in alium alveum exuperanteſ laticeſ derivare ſolent. Similiter ne aquaductuſ alicubi ob ſolito vehementioreſ lymphæ, aut aeris impetum rimaſ faciant, & rumpantur, certa quædam foramina, atque etiam tubuloſ ( evaporatoria vocant ) ad lineam inſtruunt, per quæ urgente neceſſitate, tum aqua, tum aer ſubito erumpere, ac proſilire poſſit.

Veruntamen cum ſapienter naturæ conſiliis proviſum ſit, ut iſdemmet inſtrumentis, quibuſ bona valetudo facta, teſtaque in animalibuſ conſervatur; ægra quoque, atque infirma curetur, ac reſtituatur; idcirco a ratione forſitan minime diſſentire cenſebis, Vir ornatiffime, ſi quiſ ſuſpicetur morboſ pectoriſ, atque etiam abdominiſ per variâſ horum ramulorum Azygæ cum externoſ, internoſque, ſuperniſ, atque inferniſ veniſ inoſculationeſ, variâſ pariter inter ſe permutationeſ ſubire, atque in varioſ decubituſ deſinere ſolere. Id certe exploratum, compertumque eſt, nonnullaſ pleuritideſ ab externoſ in internoſ, nonnullaſ contra ab internoſ ad externoſ intercoſtaleſ muſculoſ quandoque per metaſtaſim, quæ Græciſ diadoche dicitur, tranſferri; imo vero ( ut ipſe biſ vidi ) in externum ſubcutaneum tumorem abſcedere: nimirum quia, ut minimæ quædam propagineſ venæ ſine pari ab adipoſa membrana, perforatiſ externoſ muſculiſ, intro feruntur, perque eaſ humor pleuriticuſ ab externoſ in interna ſpatia poteſt recurrere, obicemque ponere ſanguini ab aliis exiguiſ internoſ veniſ reſluxuro; ita arteriæ intercoſtaleſ ( forſitan etiam per ipſa membranarum interſtitia diſtenta, ampliataque ) facilem aditum, paratumque iter eidem humori, cum fluxior reddituſ fuerit ab internoſ in externoſ parteſ munire valent. Propterea factum eſt, ut in pleuritide notha, in qua vehemens ad tactum etiam dolor urget, poſt ſectam ſemel, aut iterum pro febris, viriumque magnitudine, venam, nullum præſtantiuſ auxilium invenerim affixiſ duabuſ cucurbituliſ, inciſa priuſ cute ſupra dolentem partem ( proximum enim ventrem ſecandum eſſe, docuit Hippocrateſ ) incantamenti ſiquidem, ut ajunt, inſtar, evulſo, educitoque ſanguineo ſtimulo, ceſſavit

l. cit. An-  
tigr. 6.

Calumn.  
Depul. 17.



savit dolor, ac febris: quod sane remedii genus etiam in pleuritide interna, modo pulmones simul non afficiantur, aut sputum critice non erumpat, optimum præsidium post phlebotomiam interdum expertus sum.

Sed quid plura de vulgaribus, tritisque animadversionibus tecum disputo, mi Morgagni? supersunt profecto quædam circa venam Azygam detegenda, quæ, arbitror, Te, nostra ætate inter Anatomicos facile Principe, multo esse digniora, quippe quæ aliorum industriam, ac diligentiam, quod sciam, hætenus eluserunt.

Tria vero præ aliis occurrunt, quæ in Azyga præsertim humana longo jam ab hinc tempore mihi contigit observare; dixi autem in humana, quia in aliis animalibus, præsertim in iis, quæ prona incedunt, non eadem structuræ elegantia donatur; cum in iis nec respirationis tantus sit usus, nec lateralium malorum crises per sputum tam facile accidunt. Itaque animadvertimus Primo nervos quosdam utrinque per dorsi costas inter pleuræ membranas usque ad posteriora diaphragmatis, singulas intercostales venas vago itinere, & sæpe ad rectos fere angulos secantes: Secundo orificium ejusdem Azygæ in cavam dehiscens semicirculo musculari instar hemisphincteris cum peculiari nervo munitum: Tertio denique in eadem anastomosi venæ Azygæ cum cava (quæ sane inosculatio adamussim accidit supra dorsum asperæ arteriæ priusquam in duos majores bronchiorum ramos facessat) animadvertimus, inquam, minimos tubulos ab inferiori ingredientis Azygæ, atque excipientis cavæ parte inter tracheæ annulos, ac membranas sensim irrepentes, atque ad internam usque ipsius tracheæ tunicam pervadentes.

Ut autem hæc forte non contemnenda clarius a me possint exponi, non erit, spero, Tibi molestum, si nunc singula luculentius persequar, ostensurus videlicet, quæ peculiari observatione in iisdem a me fuerint deprehensa.

In primis autem notatu dignum est, memoratos nervos posterius intra pectus, utrinque secundum dorsi vertebrae excurrere, qui e regione perbelle respondent nervis, qui antè sub sterni utrinque decurrentes, ac in anteriorem diaphragmatis portionem penetrantes phrenici appellantur; illi enim postica thoracis parte a septima colli vertebra insignem truncum deducunt: minores enim ramos a superioribus tum colli paribus, tum a vago, & cardiacis intra cerebrum accipiunt: ex quibus omnibus nervis tam extra, quam intra cranium prodeuntibus ganglion coalescit, & conflatur secundum sextam, septimamque colli vertebrae, ac paulo post axillares nervos supergrediuntur, a quibus ramulos etiam derivant, atque ad ipsos elevatores scapulæ, humerique musculos mittunt; deinde per interiora thoracis sub pleura, & supra ramos venæ Azygæ utrinque erratico flexu, & geminatis pleuræ hederæ instar claviculis perreptant, variisque locis per emissas fibrillas partim cum iisdem venis intercostalibus, partim cum nervis dorsalibus se se permiscunt, deinde autem perforato diaphragmate per abdomen ad os usque sacrum descendentes varios furculos ad viscera, atque ad alios nervos, ac demum ad crurales emittunt. Hi vero nervi, qui, motus diaphragmatis quoque gratia, deorsum per thoracis posteriora feruntur, cum in via tum ramulos, tum caudicem venæ Azygæ secant, se seque cum illis, & cum singulis nervis a spina dorsi prodeuntibus per fibrillas commisceant, atque etiam prope ingressum ejusdem venæ sine pari in cavam progrediuntur; tuum erit, Vir Ornatissime, dijudicare, num simul conferant arbitrio, ubi opus fuerit, nostro, ad moram aliquam injiciendam sanguini ab intercostalibus musculis per Azygæ tu-

bulos refluenti; quemadmodum antè nervi phrenici comparati videntur, ut mediastino, venæ cavæ, pericardio, atque anteriori diaphragmatis segmento vigorando inserviant. Etenim cum nervi illi tendi nequeant (tenduntur vero maxime, ac facilius ad animalium voluntatem, qui gangliis muniti sunt, ut in libris nostris de Corde fuse demonstrabimus) tendi, inquam, nequeant, quin subnexos ramos, ipsamque Azygam comprimant, & adstringant, proindeque refluxum sanguinem a singulis intercostalibus membranis, & musculis intercipient; certe hujusmodi nervos ad promovendas, cum libet, plus, aut minus eorundem musculorum tensiones, ceu moderatores quodammodo, conspirare necessum est. Et quanquam non ignoro, unumquemque intercostalem musculum peculiari tum nervo, tum arteria instructum esse; nihilominus quia motus thoracis non tantum est perenniter alternus; sed nonnunquam expedit illum longe celeriores fieri, atque intendi; idcirco providentia naturæ sapientissime consultum fuisse reor, ut isthæc actio aliis etiam nervis tum in venas, tum in dorsales nervorum ramos immixtis pro temporum opportunitate adjuvaretur; quemadmodum in mechanicis opus operi additum aliis, novisque adminiculis sæpe juvari conspiciamus.

Neque aliunde accidere, existimandum videtur, ut in vera pleuritide dolor fere semper ad scapulam, atque ad humerum ascendat; sequitur enim memorati nervi ductum, & progressum; atque hinc etiam proficisci, censerem, quod diaphragma tam facile in ipsa pleuritide, præsertim postica, inflammationem contrahat; nempe quia sanguis, quo plus acerbis salibus scatet, eo magis fibras nerveas, quibus tum spatia intermuscularia donantur, tum ipsæ venæ alligantur, irritando, convellendoque, vias ad regressum in Azygam a finitimo quoque septo angustat, atque intercipit. Vidimus propterea in sectionibus cadaverum illorum, qui ex sæva pleuritide in peripneumoniam, & septi inflammationem facessente, diem suum obierunt, ramos venæ Azygæ lateris, quo ægri primum doluerunt, in varices abiisse; quod olim lib. 1. de Morbis num. 11. & 17. admonuit Hippocrates (\*), quia videlicet idem sanguis natura sua acerrimus simul, & subcrassus, cum ab intercostalibus spatiis recurrit, & ad locum intersectionis horum nervorum pertingit, stimulos in eorundem fibras, venulis permixtas, necessario adigit: quamobrem tam fui, quam nervorum culpa subsistens, non solum venas tumefacit, varices elevat, atque in polypum abit, (quem insigni magnitudine a caudice venæ sine pari in cavam, atque ad dextram usque cordis auriculam propagatum vidimus superioribus diebus in quodam Viro, qui ex præcordiorum inflammatione decessit: cujus rei plura olim exempla, cum scilicet Nosocomia, & cadavera frequentare magis solebamus; non levi cum admiratione spectavimus) verum etiam ipsius pleuræ, ac diaphragmatis substantiam crassiorem reddit, atque in iisdem suppurationes excitat: unde modo pleura, modo septum, frequentius etiam utraque pars pulmonibus (& ipsis ob stantia fluida mole auctis) adhærere incipit.

Orificium subinde (ut ad secundam ex nostris observationibus veniamus) quo Azyga cum ipsa cava inosculatur, artificii similiter plenum est. Nam si portionem trunci ipsius venæ sine pari una cum segmento superioris cavæ ita dissequeris, atque e cadavere detraxeris, Morgagni amicissime, ut seorsim in memoratum Azygæ ostium oculos diligentius possis intendere; cernes membranosum fornicem inosculacionis ejusdem musculari quodam semicirculo valide muniri: quod clarius adhuc perspicias, si segmentum illud luminis objeceris. Nam eo in loco fibrarum compa-

go;

(\*) Eodem loco agit Senex de Venæ Azygæ convulsione, & varice.



go; quanquam ubi fit inosculatio, semper firmior apparet; crassior tamen, & rubentior occurret, quam alibi spectari soleat. Hoc autem semicirculare munimentum phlogosi omnino affectum, seu rubentissimum, me quondam detexisse recordor in nonnullis, quorum scisse oportet statum antea vitæ, & eorum malorum, propter quæ mortem obierunt. Sed plerunque Juvenes anatomicis studiis confuse operam damus; propterea ad omnia accurate, ut opus esset, non respicimus.

Ne vero dubitemus, quin textura orificii venæ Azygæ revera sit muscularis, se se inquirentibus offert singularis nervus ex intercostalium familia, qui in eam muscularem membranam immergitur. At, inquiet aliquis, quid officii præstat istiusmodi hemisphincteris apparatus? Scilicet ut quemadmodum passim, ubi sunt carnosæ fibræ, ibi motum edi, certissimum est; ita in orificio venæ sine pari quædam constrictio secundum naturæ indigentiam, atque animalis arbitrium fieri possit: ac proinde particula illa cum nervis, azygæ ramulos secantibus, sit quasi rector, ac moderator refluxus sanguinis ab intercostalibus musculis.

Neque certe quis suspicabitur, supradictum muscularem semicirculum casu quodam in aliquibus dumtaxat a me fuisse observatum: affirmate enim profiteor, me illum in cunctis, quæ secui, cadaveribus, comperisse; immo etiam in ostio sinistra Azygæ quo cum vena subclavia interdum conjungitur, non absimilem fibrosam cum nervis machinam deprehendimus, & spectatoribus ostendimus.

Postremo pulcherrimi, nisi decipior, sunt tubuli, quos in parte inferiori, seu basi inosculationis venæ sine pari cum cava semper conspeximus. Nam quotiescunque rem sedulo persecuti fuimus, nunquam non truncum venæ Azygæ, & portionem cavæ ibidem cum subjecta aspera arteria connexam vidimus; nec vero per simplicem adhæSIONem, sed per validas etiam fibras, & minuta vasa, quæ ad usque internam tracheæ faciem penetrant; ut proinde non levem mihi dubitationem injecerint, num, quemadmodum nonnulla ex iis vasculis esse possunt ramuli a tracheæ substantia referentes, ita obscuri lateant aditus ab Azyga intra asperam arteriam inferentes, quos natura (quæ docta sine magistro cæcas nobis, atque ignotas, sibi vero perspicuas, ac notissimas vias extrudendis morborum causis invenit) in vera pleuritide, seu laterali simplici morbo, per sputum cito, facileque desinente, recludat, atque aperiat; ut scilicet breviori itinere, quam illud esset, quod per cordis dextrum ventriculum in pulmones, vesiculas, & bronchia confici deberet, morbosum humorem per anachatarum derivet.

De hac vero nostra conjectura limatissimum judicium tuum exquiro, Morgagni solertissime; satis enim nunc mihi esse duxerim, si nonnulla Te admonuero, quæ suspicionem meam lactare quoquo modo videntur. Etenim cum olim pluries observaverim, ægros benigna pleuritide laborantes ante quartum diem cruentam, mox etiam albam, costamque, ut ajunt, lympham spuere, quam non a profundo pectoris hauriebant, & traducebant, sed a loco, quem sciscitanti mihi indigitant, sub sternum, ubi Azyga se in cavam aperit (hos autem ante decimum quartum diem a malo liberatos animadverti) sane tunc suspicari cœpi, an compendiarie pateret via, quæ in simplici pleuritide affectis per Azygam ab intercostalibus spatiis duceret in asperam arteriam.

Hanc deinde qualemcunque opinionem confirmavit Muliercularum quarundam mos, qui Romæ præsertim invaluit; solent enim, ubi primum pleuritide quis corripitur, dolentem partem oleo prius inunctam, pollice unam inter, alteramque costam vehementer fricare, ac versus dorsum pellendo, ita urgere (quod Italorum vulgus dicunt *rompere la puntura*) ut ægrotus paulopost

tussi corripiatur, ac fere semper sanguinem expuat, mihiq; cum sæpe huic experimento adfuerim, ab iisdem ægrotantibus assertum sit, se ab ea parte acrem stimulum ad tussendum, simul etiam obscurum cruoris egressum sentire, in qua ingressus est Azygæ in cavam.

Hoc autem inde proficisci putarim, quod per validam eam pressionem sanguis acer, ac morbosus in tubulis, atque interstitiis fibrarum muscularium stagnans extruditur, ac per Azygæ ramos citius, ac uberius refluit, qui mox ad inosculationis locum perveniens hemisphincterem irritando, ac subjectos tubulos fodiendo, tussim excitat, sibi que meatus in tracheam aperit.

Non est vero, Vir Clarissime, ut hic Te commonetaciam, raro ejusmodi remedium feliciter cedere; nimirum quia plenique intempestive, nec humore adhuc concocto, viisque dehiscen- tibus adhibetur; sæpius enim tum propter inductam jam inflammationem, tum ob copiam morbosæ materiæ tantum abest, ut eam allevet, ut illam adaugeat, atque intendat; præsertim si vel affecta pars (quæ mollibus, & oleosis esset tractanda) vehementi frictione nimium irritata, atque contracta acrem sanguinem jam hærentem non remittat, immo etiam alium affluentem intercipiat; vel idem sanguis extrusus quidem, sed nimia velocitate, crassitie, copiaque cum reliquo per Azygam ita impellatur, & confuse permisceatur, ut deflectere in tracheam haud possit, sed per cavam in cor, atque in pulmones, ubi peripneumoniæ gignit, pergere cogatur.

Sed, ut ad propositum redeamus, accedit, ut suspicor, ad faciliorem expressionem sputi a loco inosculationis Azygæ, quod major venter musculi triangulari sub sternum locetur: quare cum tenditur, thymum, subjectamque venam cavam, atque adeo inosculacionem ejus cum azyga, ipsamque tracheam necessario premere debet, introque ita adigere, ut per hujus musculi adauctam, cum volumus, vigorationem, ipsa quoque anacatharis plurimum promoveatur. Et profecto, cum ipse ego ab ineunte ætate interdum pectoris doloribus, & catarrhis laboraverim, sensu percipiebam majorem costæ laticis partem non a profunda, atque vesiculata pulmonum regione, nec quidem a bronchiis, verum ab ea portione asperæ arteriæ prodire, in qua vena Azyga cum cava inosculatur, sputumque per vim etiam musculi triangularis facilius me foras propellere potuisse.

Quod vero cæci meatus pro temporum opportunitate in nobis dehiscant, ut morbosæ potissimum causæ exitum parent; non est ut Tibi, Vir optime, persuadeam, quem tum diligens ægrotantium observatio, tum anatomicæ sectiones satis informarunt. Quot enim hypochondriorum, quot capitis morbi, referatis sanguineis, aliisque vasis, hæmorrhoidum nempe, nasi, oculorum, aut aurium, quæ clausa sunt, cum firma valetudine fruimur, desinunt, ac penitus cessant?

Multo adhuc minus negotium Tibi facesset, quod in simplici pleuritide non solum sanguis, verum etiam mucosa materies per sputum excernatur, quæ exiles, ac vix perspicuos tubulos pervadere non posse videatur. Nam probe scis, horum humorum particulas sensim, ac per minima stillicidia e canaliculis, porisque suis effluere, postea vero propter moram, aerisque contactum mutuo coalescentes facillime crassescere: quod in mucosarium, sordibus aurium, & oculorum, aliisque nostri corporis liquidis passim animadvertimus.

Nolim tamen existimes, dulcissime Morgagni, me opinari, universam, quæ per tussim a plerisque pleuritide laborantibus egeritur, puriformem colluviem trajici per recensita solum Azygæ, cavæque foramina, ex trachea postmodum rejiciendam: arbitrarer enim, siquando ejusmodi conjectura a Te probaretur, ab aliis quoque inferioribus bronchiorum glandulis, atque ab ipsis extre-



tremis vesicularum pedunculis illius colluviei partem frequenter secerni solere. Etenim quemadmodum raro accidit, lateralem morbum esse simplicem, ac solitarium; quoniam sæpe sæpius jungitur, & complicatur cum trachearum, & pulmonum catarrho; ne quid dicam de phlogosi; imo vero cum totius sanguineæ massæ rheumatica diathesi (quamobrem sanguis per sectam venam eductus ut plurimum in polypeum crassamentum coit) ita facile fieri posse crediderim, ut portio illa acris, & sulphurei laticis, quæ in solis intercostalibus spatiis semel inflammationem induxit, cum solvitur, ac maturata dulcescit, per Azygæ ramulos versus cavam paulatim regeratur, ac magnam partem in eisdem inosculatationis meatus impingat, atque illinc beneficio superincumbentis musculi triangularis ad internam tracheæ superficiem urgeatur. Nec sane inficiari auderem, quidquid reliquum est morbosæ lymphæ recurrentibus ad præcordia fluidis admixtum, anastomoseos locum præterire, ac subterfugere, tandemque aut sociatum catarrhis, qui a bronchiorum glandulis, & vesicularum pedunculis secernuntur, per anacatharsim rejici, aut circulationis legibus obsequens, vagum, & errabundum huc illuc secundum diversas occurrentes secerniculorum dispositiones modo per urinam, modo per sudorem, modo per secessum utiliter extra corpus derivari posse; vel contra, quod sæpe fit, ad præcordia rursus refluens in præaffectos pleuræ, ac pulmonum locos lethali-ter decumbere.

Sed ne quid intactum relinquam, unde Tu, Vir studiosissime, de nostra conjectura recte, aperteque sententiam ferre possis, dicam insuper, nos repetitis experimentis promptum, facilemque ab Azygæ, & cavæ trunco intra tracheam liquidorum transitum comperisse. Nimirum secto cadavere, superiorem cavam, sanguine prius inanitam, supra & infra inosculatationem cum Azyga vinculis constrinximus: deinde per foramen apertum in Azygæ caudice tepidam, & croco infectam aquam siphone semel, iterumque injecimus; ac statim conspeximus subcroceum liquorem primo per nares, mox etiam per os emanantem: erat enim cadaver supinum capite extra tabulam propendente. Ut vero accuratius permeantis liquidi vias, rationemque exploraremus; cultro sub cartilagine thyroide per longum scidimus asperam arteriam, atque illinc, dilatato vulnere, vidimus post novam injectionem jucundo spectaculo a superiori interna ipsius tracheæ superficie, quæ cavæ trunco, & Azygæ anastomosi subjicitur, flavum ichorem excitatis bullis per minima orificia stillantem, atque scatentem. Id autem sæpius renovatis tentaminibus cum in Viris, tum in fæminis confirmavimus.

Sed cum jure in dubitationem inciderimus, num injectus liquor ex tubulis potius a cavæ, quam ab ipsius Azygæ membranis, vel etiam ab utrisque in tracheam dehiscen- tibus prodiret; idcirco novo usi fuimus artificio. Azygam enim ligavimus ubi cum cava inosculatur, alterumque vinculum injecimus cavæ versus cor, seu infra anastomosim, indeque per subclavi- am in cavam similem aquam infudimus, illamque prodire quidem ex trachea, sed tardius, ac parcius, quam in antea-ctis observationibus, conspeximus. Unde colligi tuto posse, censuimus, meatus hosce longe numerosiores, aut patentiores ex Azyga, eique proximo cavæ spatio, quam ex reliqua cava intra asperam arteriam dehiscere, atque aperiri.

Et quamquam non me lateat, ligata in vivis animalibus quavis vena, serosum laticem in proximum, unde sanguis refluit, ventrem paulatim effluere; ac proinde alicui mirandum forsitan minime fore, si liquor injectus per distentos, ampliatosque Azygæ, cavæque (vinculo prius constrictarum) poros in asperam arteriam transeat, depluatque: tamen omnem adhuc ab animo meo scrupulum evellere non possum, quin suspicer, minimos patere tubulos a supradictis venis intra

Morgagni *Adversaria Anat. V.*

eandem tracheam; tum quia ejusmodi liquidi trajectio ex cava, & Azyga non paulatim, quemadmodum alibi, sed illico contingit; tum vel maxime quod injectus liquor, ne minimis quidem suis guttulis elabatur, aut exodat a superna illarum venarum parte, quæ vel dextrum thoracis cavum, vel mediastinum respicit; tametsi iis locis venarum membranæ sunt graciliores, laxiores, ac magis denudatæ; atque idcirco impetui liquoris minus reniti valent, quam in parte inferiori, ubi cum aspera arteria valide connectuntur, ejusque tunicis, annulisque adhærentes firmiori structura donantur, magisque obniti deberent trajectioni impulsu liquoris; qui tamen cum illinc libere præterfluat, luculenter videtur ostendere, minimos ibidem latere canales, per quos, cum res postulat, liquida egrediantur.

Hæc porro tentamina si Tibi etiam cum veritate congruere viderentur, jam inde, veluti per corollarium, nobis deducere liceret, Priscorum assertum de serinis destillationibus a capite in tracheam cum sicca plerunque tussi, a ratione non adeo absonum existimandum esse, quemadmodum Recentiores fere omnes autumarunt. Nam serum acre, atque ad nerveas, muscularesque fibras pungendas, irritandasque aptum, quoties in cerebro quavis de causa collectum per jugulares venas refluit in cavam, statim atque pertingit ad locum enunciatis foraminibus pervium (est autem a jugulo usque ad divisionem tracheæ in bronchia) minimo negotio in eadem foramina penetrare, stimulosque nervorum villis, & intercartilagineorum musculorum fibris subdere potest, tussimque siccam excitare, quam in gracilibus, ac studiosis, præsertim si longiori collo donati fuerint, frequenter animadvertimus incipere, sedemque suam primum figere in ea potissimum tracheæ parte, ad cujus contactum apud homines locata est cava, quasi vero ipsa natura admonere illos velit, ut sine ulla mora omnes mentis labores deserant, & omittant, aliudque vitæ genus eorum valetudini conservandæ magis proprium suscipiant; ne scilicet malum, adaucta causa, atque ad pulmones propagata in phthisim concedat. Sed ad majus otium ejusmodi quæstionem rejiciamus, cujus interim rationes tecum deputare per otium poteris, Vir Clarissime, quippe qui, cum totius Medicæ Artis scientia perpolitus es, tum in Anatomicis studiis ita emines, ut cætera sint Tibi quidem communia cum multis, horum vero tua quodammodo propria possessio videatur.

Sed jam tempus est, ut fidem liberaturi, ad tuorum solutionem Problematum descendamus, quæ quidem, quanquam per Te satis enucleata, atque explanata videantur, tamen ut Tibi inter amicos amicissimo morem geramus, opinionem qualemcunque nostram proferemus. Ac primo quidem quæris, Quid sit in causa, cur quidquid sanguinis ex arteria magna per intercostales pleurasque effluit, id omne per totidem venulas non in cavam pari ordine delinentes, sed in Azygam refluat? Hoc profecto sapienti ipsius naturæ opificio ob mixtam rationem (quantum conjicere possumus) factum fuisse, arbitramur; scilicet ut facilius, promptius, celeriusque, secundum voluntatis arbitrium, ad respirationem retardandam, sollicitandam, retinendamve, cursus pariter, & immissio sanguinis ab Azyga in cavam, modo retardari, modo celerior fieri, modo etiam retineri possit: facilius enim est unum emisarium, quam plura uno, eodemque tempore regere, ac moderari. Nam si sanguis per distinctos, disjunctosque ramulos a singulis intercostalibus venis cavam subjisset, majorem certe renixum passus esset, quam ubi nunc uno, eodemque communi Azygæ alveo exceptus vehementiori vi, seu quod eodem recidit, celerius, ac promptius propter majorem cumulatam molem in eandem cavam ingreditur. Quod sane passim instituto ipsius naturæ etiam in defluxu aquarum per terræ superficiem respondet: ex multis enim rivulis in unum torrentem,

M



tem, ex hoc in minorem amnem, tandemque in regium flumen facilius devolvuntur. Neque assertum nostrum infirmat, quod alibi venulae intercostalibus etiam minores, in cavam sanguineum fluidum corrivant. Siquidem peculiaris viget ratio, cur singulae intercostales a proximo in cavam influxu fuerint prohibendae; nempe quia sanguis ab Azygae ramulis in cavam refluxurus non solum, ut communiter, circuli leges subire, sed alterno etiam respirationis motui inservire debebat, qui eodem tempore peragitur a musculis huic muneri ancillantibus: id quod in ceteris venis per alias corporis partes perreptantibus usu minime venit.

Contra vero in arteriis intercostalibus accidit. Nam cum sanguis in eas non ingredi, sed ab iisdem magno cum impetu egredi debeat, nulla erit ratio, cur eadem non potius ex aortae trunco, quam ex ejus ramo proficerentur; utrinque enim sanguis pene aequali, atque analogo impetu in arteriolas omnes esset erupturus. Natura autem compendii amans, simpliciora, ac semper breviora feligere consuevit.

Sed quid dicemus, Morgagni Celeberrime, de re per se quidem evidenti, de qua tamen altum apud Anatomicos silentium? scilicet arterias intercostales, quae ab aorta sinistram latum petunt, breviores iis esse, quae ad dextrum tendunt. E contrario vero ex ramis in Azygam desinentibus, sinistros dextris esse longiores. An id a natura, quae nihil frustra facit, fortuito factum opinabimur? An potius, ut acerrimi ingenii tui erit inquirere, quod major vis adhibenda esset in latere dextro ad ipsius thoracis dilatationem, nimirum quia hepatis moles liene major a spuris costis loco suo paululum in ipsa inspiratione esset movenda? An ut in viribus sanguinis utriusque lateris musculorum aequalitas quaedam servaretur?

Ad alterum deinde problema quod attinet, Cur scilicet vena Azyga non in cavae inferiorem truncum, sed in superiorem exoneretur? causa perspicua, atque evidens (ut Tu quoque ex Cowperio ratiocinaris) esse videtur; nimirum ne sanguis, qui ab intercostalibus musculis, aliisque thoracis partibus vario impetu secundum varios respirationis motus per Azygam refluit, si in cavam inferiorem illaberetur, sanguini per illam jam acrius ascendentem moram inferret. Cum enim uterque sanguis, Azygae nempe, & cavae, directionibus non eodem tendentibus feratur, necessario in ipso utriusque concursu, sive supra, sive infra cor fiat, retardatio aliqua sequi debet: proinde nihil commodius institui potuit, quam ut huiusmodi retardatio in superiori, non autem inferiori cava contingeret. Et quidem cum sanguis in nobis, qui erecti stamus, ambulamusque, per superiorem cavam vi etiam proprii ponderis, praesertim in cursu, facilius, velociusque ad praecordia descendat, quam sanguis per inferiorem cavam ascendat (quo factum est, ut ad frangendam, hebetandamque superstitem quandoque descendens sanguinis vim, paratum sit in cava inferiori prope cordis auriculam, apud homines, quoddam valvulae genus ab Eustachio nostro indicatum, quod nos in pronis animantibus non invenimus) propterea ad servandas, quoad fieri potest, aequalitatis leges voluit natura descendens celeritatem in superiori cava parumper refrenare; quod quidem optime praestitit per Azygae sanguinem, qui per superiorem cavam ad lineam cadenti occurrit directione prope modum horizontali.

Quod autem huc spectaverit natura cum Azygae sanguinem in superiorem cavam infudit, nemo Te melius, mi Morgagni, nosse poterit, qui cum in Scriptorum lectione, tum in cadaverum omnis generis sectionibus tam assidue versaris: animadverteris enim, in quadrupedibus, quae prono semper corpore consistunt, atque incedunt (cujusmodi sunt boves, equi, caprae, sues, aliaeque multa) venam Azygam non quidem cavam superio-

rem, aut inferiorem petere, sed in ipso utriusque confluxu, hoc est, intra dextram auriculam aditum vel unicum, vel duplicem sibi aperire: quod sane non alia ratione factum fuisse videtur, quam quia, cum uterque sanguis, superioris nempe, atque inferioris cavae, in pronis animantibus ad horizontem fluat, celeritas neutri detrahenda fuerat; atque ideo in ipso utriusque concursu, ubi aequantur vires, Azygae inosculatio locata fuit. Neque certe ob aliam rationem in simia, cane, fele, atque urso vena sine pari non penetrat auriculam, sed superiorem cavam, intra tamen pericardium, atque e regione conjunctionis ejusdem cavae cum auricula: ita ut multo sit infra nostram Azygae anastomosim; sed aliquanto supra illam, quae in equis, aut pecudibus cernitur; non ob aliam, ut aiebam, rationem, nisi quia simiae, canes, feles, atque ursi non degunt semper proni, sed cum vigilant, magnam temporis partem capite, pectore, atque imo ventre ad horizontem inclinato sedere; atque ideo neque erecto trunco, quemadmodum homines, neque omnino prono, ut cetera bruta animalia, vitam traducere solent. Itaque Azygae anastomosis in iisdem medio loco inter omnino prona, & erecta fuerat collocanda: sed Tu haec subtilius philosophaberis.

Venio itaque ad tertium, Cur, nempe, sanguis ab intercostalibus refluens, non per duas, sed per unam venam sine pari in Cavam inferatur? cuius solutionem petendam esse arbitror ab ipsiusmet Azygae usu, & actione. Nam cum ea sanguinem revehat a singulis intercostalibus musculis ac diaphragmate, quae quidem musculares partes simul omnes uno, eodemque tempore, prout respirationis usus postulat, moveri debent, oportebat, ut sanguis omnis uno, eodemque alveo exceptus, universus quoque simul non magno, sed facillimo negotio retardari, vel celerior fieri potuisset; quod quidem etsi inficias non eam aliis modis a natura praestari potuisse; nemo tamen negabit, ut supra innuimus, hunc ejusdem genio, quae facilliora semper aggreditur, fuisse magis consonum.

Confirmatur vero, hanc mechanicam rationem ceteris paratiorem esse, quod natura ad Azygae ostium unico hemisphincteris sufflamine omnium intercostalium venarum moderando sanguinis cursui apprime consuluerit: atque, ubi altera vena in laevo pectoris latere invenitur, quae Azygae officium supplet, ibi opificium pariter semicircularis sphincteris apposuerit.

Hoc quidem loco investigatione tua dignum censeo, Vir disertissime, qui fiat ut in ruminantibus duae Azygae (hoc est sua cuique thoracis lateri) positae sint. An quia ejusmodi animalia, cum hebetiora futura essent in motu, eorum etiam sanguis minori energia, & velocitate, quam in agilioribus, pollere debebat? Unde si universus intercostalium sanguis ad unicam, eamque in dextero dumtaxat latere locatam Azygam fuisset dirigendus (bobus enim costae num. 26; cum homini 24. solummodo datae sint) tam lente illuc appelleret, ut ejus lateris renixum in tam longo itinere vincere haud potuisset.

Denique, licet novissimum problema per Te ingeniosissime solutum videam, non dubitaverim tamen asserere, ad rationes a Te allatas alteram quoque adjungi posse, scilicet ideo Azygam non a sinistris, sed a dextris prorepere, quia in sinistris eodem itinere, quo vena sine pari collocanda esset (ab inferioribus nempe ad superiores partes secundum dorso vertebrae) jam defertur Pecqueti ductus, cui sane ipsa Azyga, si comes adderetur, plurimum obesset, non tantum quod spatii aliquid eidem demeret; verum etiam quia sanguinem corrivaret in eandem illam subclaviam, in quam Pecqueti ductus chylum, lymphamque immittit. Solet enim, cum apud homines hemiazyga laevo in latere invenitur, in sinistram subclaviam sanguinem effundere: quod in angustum nimis locum duo liquidorum quasi amnes confluentes sibi invicem impedimento fuissent; praesertim si quis,



quis, tempore motus chyli, violenta aliqua corporis exercitatione occuparetur.

Secus vero in dextero latere major spatii libertas aderat, cum in hoc neque arteria magna, neque Pecqueti ductus pro naturæ instituto locentur.

Hæc, qualiacunque sint, diuturnis observationibus ex cadaverum præsertim sectione deprompta sedatiori animo, ac tranquilliori tempore exarare peroptassem: tecum enim mihi res erat, cujus eximiam eruditionem, ac limatissimum iudicium semper maximi feci. Sed cum nollem responsionem meam in longum differre, eandem propterea dictavi inter ipsos Natalitios Redem-

ptoris. Nostri festos dies per quos innumeris pene qua civilibus, qua sacris occupationibus distentus fui. Nam & Romæ degimus, ubi otium optare, ut Paulus Manutius ait, ejus est, qui Romam ignorat; & in ipsa Summi Pontificis Aula, nimirum in Sacrosancta Religionis Arce versamur. Si quid igitur Tibi Viro omni doctrina, sed Anatomica præcipue politissimo, minus probabitur, partim pro tua humanitate ignoscas, partim pro amicitiae candore admonere ne prætermittas. Tua interim tam secunda, quam tertia Adversaria cedro digna, totiusque posteritatis encomio celebranda anxie præstolamur. Vale.

Romæ III. Kal. Januarii MDCC XVII.





*Illustrissimo, & Reverendissimo Præsuli*

D. D.

J O A N N I M A R I Æ  
L A N C I S I O

Intimo Pontificis Maximi Cubiculario, &  
Archiatrorum Comiti Meritissimo

*Joannes Baptista Morgagnus S. P. D.*



GO vero, Lancisi Ornatissime, nihil unquam legisse memini, quod magis quam postrema tua ad me Epistola, *novis auctoritatem dare, obscuris lucem, obsoletis nitorem* videretur. Quo magis cumulata a me Tibi gratiæ agenda sunt, quod non modo præclare (id quod petieram) obscura illustraveris, verum insuper tum vetera quædam ingeniose restitueris, tum nova plura, iteratis etiam nuper observationibus, & experimentis subnixis, in medium attuleris. Sed nihilne, inquis, habes quod admoneas? Mihi vero nonnulla fortasse essent, quæ coram libentius, quam per litteras rogarem; nihil autem est quod admoneam, aut si quid est, id longe alio pertinet, quam quo Tu pro tua singulari modestia facile existimas. Neque enim, ut sum publicis, privatisque occupationibus distentus, satis in præsentia habeo temporis, ut tuas observationes, atque experimenta diligenter iterem: & si vel plurimum haberem; non tamen mihi tantum sumerem, ut Te Eximium Virum, & Sæculi Exemplar, atque Ornamentum admoneri a me posse, crederem. Nam qui tuam in observando Solertiam incredibilem non minus, quam Ingenium summum, perspectam habeam, ut in iis quæ mente assequimur, si quid forte a me dissentis, non Te quidem labi, sed me intelligere minus, censeo; ita in his quæ oculis usurpamus, si quid non satis responderet, non Te minus oculatum, sed me minus industrium, diligentemque existimarem. Quid ergo erat, inquis, quod admoneres? Nempe id quod pro tua moderatione non sentis, Te, Virum alioqui Beneficentissimum, in publica commoda peccare, qui cum tot, ac talia Rei Anatomicæ, atque adeo Medicæ illustrandæ utilissima tam brevi tempore vel tantas inter occupationes dictare possis, non tamen facias; sed dum totus es in Libris de Motu Cordis subtilius elaborandis, & quasi eliminandis, hæc interim omnia prætermittas. Quid si (quod tamen Superi avertant omen, ac detestentur) quid, inquam, si tua ista affecta ætas, ac valetudo iis Libris ex animi sententia absolvendis, perpoliendisque non sufficeret; an quæ res ad tot alia argumenta, imo ad istos ipsos Libros pertinent, & quæ a Te ut non cito scribi, & undequaque perfici, at dictari facile, & sic satis indicari certe possent, an eæ omnes non sine magna tantæ, & a qua vel cogitanda refugit animus, jacturæ accessione, tecum

una, Vir Doctissime, commorerentur? Est exempli causa in ultima hac Epistola quod innuis: *eos maxime, ac facilius ad animalium voluntatem nervos tendi, qui gangliis muniti sunt*. Hoc in Libris de Corde Te fuisse demonstraturum promittis. At quod multis ibi ostensurus es, in ea poteras Epistola perpauca indicare; ego sane quod non feceris, gravissime tuli. Ex hoc autem conjecturam facere Te, velim, quantopere illa cupiam, quæ & tractatu digniora sunt, & explicatu difficiliora, in quibus primo loco facile pono arduum illud, agitatumque Problema, in quo præsertim a Te elaboratum esse, vel ex injecta superioris Problematis mentione conjicio: quæ fiat, ut Cordis motus sit jugiter alternus, atque ea quidem ratione, ut nobis haud liceat pro arbitrio, non dico ipsum sistere, aut immutare, sed ne celeriores quidem, tardioresve reddere, quod tamen vel in eorum qui respirationi interviunt, musculorum alterno pariter, ac perenni motu sane licet. Quid ergo admoneam, habes; quid cupiam, non satis habes. Cum enim hæc non in meum tantum, sed in commune omnium commodum abs Te petam, primum ea ratione a Te mihi indicari, velim, ut Epistolas his de rebus tuas non modo Te annuente, sed nemine carpente, vulgare possim. Ut enim omnis expertus juris, & humanitatis censeret, si quid de tuo, Te inconsulto, in manus hominum emitterem, ita essent procul dubio, qui modestiam desiderarent meam, si quantum in tuis Epistolis, & nominatim in hac postrema, pro tuo incredibili erga me amore mihi tribuis, tantum ipse, easdem edendo, agnoscere, & mihi sumere viderer. Alterum est, ut si quas paratas forte Figuras habes (non paucas enim habere, scio) ad tuas hæc observationes pertinentes, easdem Epistolis adjungas. Postremum est idemque præcipuum, ut si non incommodum hunc, quem commendando, expeditumque tua nobiscum communicandi modum e re, & valetudine tua magis, ut ego quidem spero, esse, intellexeris, quam perpetuam istam, difficilemque, cui nunc insistis, scribendi rationem; mihi, ut benigne soles, annuas; sin minus; id, quod facis, pedetentim tamen, neque plus, quam ætas, valetudo, occupationesque tuæ gravissimæ patiantur, facias. Tuis enim istis Commentationibus ægre quidem, sed aliquo tamen pacto carere possem; Te autem ipso, Vir Sapientissime, meique Amantissime, nulla, ut mihi videor, ratione possem. Eriam atque etiam Vale.

D. Patavii IX. Kal. Februarii M DCC XVIII.

CL A-



CLARISSIMO, DOCTISSIMOQUE VIRO  
D.  
J. O. BAPTISTÆ  
MORGAGNIO

Medicinæ Doctori, & in Patavino Lyceo  
Anatomiae Professori Primario

JO. MARIA LANCISIUS S. P. D.



Ameti de opusculis meis, prope-  
rato potissimum stylo exaratis,  
non ita sentire audeam, ut illa  
in publicam lucem proferri, fa-  
cile patiar; tanta est tamen judi-  
cii, fidei, & candoris tui existi-  
matio, ut quemadmodum cæteris  
in rebus, ita in edendo Commentariolo de  
Vena Azyga a me, Te Auctore, conscripto,  
sententiæ tuæ refragari non possim: non enim  
vereor, ut doctis Viris sint placitura, quæ a  
Te haud improbentur. Cave tamen, ne quid  
in eodem schediasmate ex iis detrahas, quæ &  
maxime vera sunt, & a me plurimi fiunt, hoc  
est de laudibus tuis, quas & egregie promereri  
doctrina, & virtute pergis, & pro tua summa  
moderatione defugis, & averfariis; ac profecto  
libentius Dissertationem sempiternis tenebris ob-  
volutam vellem, quam vel minimum de meritif-  
imis præconiis tuis reticeri.

Quod autem humaniter admones de vitæ bre-  
vitate, quæ opera nostra vel animo solum con-  
cepta, vel ruditer adumbrata intercipere solet,  
plurimas ago, habeoque gratias, tuique consilii  
rationem, atque utilitatem ipse præ ceteris agno-  
sco, qui & inclinata jam ætate, & affecta ad-  
modum valetudine inter curarum, & negotiorum  
æstus successiva vix tempora ad scribendum subri-  
pio. Quamobrem, ut his etiam monitis tuis  
proficiam, uberrimam de motu cordis materiam  
quam primum in synopsis contraham, contra-  
ctamque ad Te mittam; ut si quidem, Deo fa-  
vente, vita, & sanitas suppetet, integrum ple-

numque opus emittam; sin vero aliter divinis  
consiliis præscriptum fuerit, rudem saltem illius  
imaginem tutelæ tuæ suprema voluntate commen-  
dem.

Quominus vero eandem synopsis de Motu  
Cordis statim ad Te mittam, prohibent sacri la-  
bores, quibus nunc distineor in excutiendis scili-  
cet nonnullis sanationibus, quæ pro laudabili Se-  
dis Apostolicæ more ad Medicam præsertim tru-  
tinam librari solent, ut legitima sint Sanctitatis  
Særvorum Dei testimonia. Cum primum igitur  
iis studiis perfunctus fuero, obstrictam Tibi fi-  
dem præstabo. Interim, ne vacuam epistolam  
accipias, alteram saltem mandatorum tuorum par-  
tem facere libenter aggredior, ac tecum commu-  
nicabo quæcunque per annos duodeviginti obser-  
vare mihi licuit circa Gangliorum structuram,  
usumque; quanquam jam video a Te consueta  
ingenii tui sagacitate deprehensa, & paucis,  
feliciterque in Secundis Adversariis adumbra-  
ta. Tuum igitur erit Dissertatiunculam hanc  
proprio judicio, & censura dignari, tuumque de  
eâ sensum pro consueta animorum, studiorumque  
conjunctione perscribere.

Addo præterea duas, alteram de Vena Azyga,  
alteram de Gangliis Icones, quam potui diligen-  
tissime descriptas; nosti enim plerorumque Pi-  
ctorum in ejusmodi rebus ingenium, qui artis  
suæ magis, quam nostræ, peritiam, & patien-  
tiam (tametsi magnam Ricciolus meus osten-  
derit) præstare solent. Vale, & me, ut fa-  
cis, amare perge.

Romæ VI. Kal. Julii MDCCXVIII.



# JOANNEM BAPTISTAM MORGAGNIUM

In Patavino Lyceo Anatomiae Profess. Primarium, & Præsidem Meritissimum

## De Structura, Usuque Gangliorum

### D I S S E R T A T I O.



Inter obscuras humani corporis partes, quæ hætenus Anatomicorum diligentiam exercuerunt, postremum certe locum minime obtinent naturalia nervorum Ganglia, quorum quidem altum est apud Antiquos silentium: illi enim, quem-

1, 7. c. 6.

Defin.  
Medic. &  
Comm. 2.  
de Artic.  
t. 56.

Obs. Anat.

admodum scripserunt inter Latinos Celsus, atque inter Græcos Galenus, (qui vocem hanc ab Hippocrate libro de Articulis mutuatus est) Gangliorum nomine appellarunt dumtaxat morbosos nervorum nodos, seu renitentes fibrarum contractiones, tumoresque incertis in sedibus a plaga, vel nimia compressione subortos. Apud Recentiores vero non multum est, quod perutilibus Falloppii observationibus additum invenitur. Ille enim, cum in rebus Anatomicis ita se gesserit, ut incredibilem ejus diligentiam, summumque ingenium nemo non admiretur, naturalia, ac citra morbum Ganglia primus detexit, eademque ob figuram *olivaria corpora* vocitavit.

Et quanquam subinde illa eadem a Willisio, & Vieussenio ad sedulum cultri examen rursum fuerint revocata, Tuque præsertim, Vir doctissime, propriam solertiam, ut semper soles, in scrutanda eorum textura, usuque mirabiliter probaveris; pro candore tamen animi tui ea, quæ innuis, non ut certa proponis, aliosque propterea ad diligentiores involutæ hujus particulæ investigationem provocare videris.

Hæc igitur argumenti sterilitas curiositatem, industriamque meam exacuit, ut quatuor præter ea, quæ in genere ad situm, numerum, ac figuram Gangliorum spectant, præcipue de iisdem quærerem, I. structuram, II. vim, III. usum, IV. demum morbosas affectiones: an vero ea, quæ rimando, observandoque alia ex aliis apta, & necessitate quadam sibi invicem nexa cognovi (quanquam animum meum nondum satis explent) naturæ, ac veritati omnino congruant, Te judicem legi, constituique. Tu siquidem, qui occultissimos humani corporis recessus aperire, atque illustrare, si quis alius nostra ætate, optime nosti, meo hoc in specimine vera a falsis probe distinguere, meque, quod maxime flagito, ubi opus fuerit, utiliter poteris admonere: non enim, is sum, qui ita mihi placeam; ut conjecturis temere assentiar, proindeque aures monitoribus claudam.

Ab initio autem nostræ Dissertationis, longum sermonem minime instituemus, quærentes in genere de situ, ac numero Gangliorum: nemo enim est, in animalium sectionibus vel parum exercitatus, qui nesciat, pusilla quædam Ganglia, seu Gangliorum rudimenta in nervorum truncis a cervice per ventres, atque per artus ubivis locorum inveniri, in quibus diversi ordinis nervi simul coeunt, majoremque, ac prædurum caudicem efformant, a quo postmodum veluti a trunco ramuli prodeunt, ac dispertiuntur.

Neque vero certuseorum numerus definiri potest, quia Natura in iis construendis sæpe variare consuevit. quemadmodum eorum inventor Falloppius indicavit. Est tamen, ut hic Tyrones Artis commoneam, ne singulos nervorum plexus pro perfectis Gangliis accipiant, ut a nonnullis etiam gravissimis Anatomicis factum animadverti. Enimvero, ut inferius ostendemus,

rami nervorum, qui a veris Gangliis proxime proficiscuntur, lacertosi sunt, ac musculares, iique in varios deinceps veluti nerveos tendines abeunt, ubi postea in alios, atque alios distribuuntur, tendinea pariter tunica circumvestiuntur, plexumque sæpe effingunt, qui non est considerandus tanquam novum Ganglium, sed ut plurimum veluti pars, seu membrum a superiori Ganglio productum, atque elongatum.

Et quidem ad rectam Gangliorum naturam, ac discrimina stabilienda, illud præterea diligenter est observandum, quod in animalium corporibus organorum structura ita procedit, ut a simplicissima ad magis compositam per gradus ascendatur, ut in musculis, & glandulis aperte conspicitur. Nam in prioribus simplices, atque unius ordinis fibræ simplicem muscularem membranam contexunt; quæ alibi pro variis additis novarum fibrarum stratis, ac directionibus, variam etiam, magisque compositam muscularem texturam compingunt, donec ad cor, propter mirificam, ac pene immensam, atque incredibilem fibrarum complexionem, musculorum fortissimum perveniatur. In posterioribus vero quemadmodum sæpe sæpius simplicitas glandularum constituitur ab unica membrana foraminibus pervia, nudisque folliculis contexta, ita quo magis membranæ cum utriculis fibroso rete, ductibusque tum reductoriis, tum excretoriis complicantur, & augentur, eo validius, & uberius glandularum munera præstant, & glandulæ conglobatæ, conglomeratæ, mixtæque indolis merito nuncupantur.

Non absimili ratione, atque analogismo nervos extra calvariam conjungi, procedere, atque ad invicem hinc illinc separari deprehendimus. Nam alii sunt, qui laxa tantum membrana, veluti vagina contenti, per simplicem a sociis diductionem, ac sejunctionem in varios ramos divertere conspiciuntur. Sed ii revera jam antea fuerunt ab usque spinali medulla, ipsoque cerebro inter se penitus distincti, licet contigui procederent. Alii vero robustiori tunica, ac fibris non tantum exterius, sed interius quoque valide muniti, atque intertexti a superiori Ganglio dependent: cujusmodi porro nervorum complicationes (quæ passim plexus nervei vocantur) quoties in ovalem, aut saltem hordeaceum tumorem minime elevantur, pro absolutis, perfectisque Gangliis non videntur considerandæ; verum accipiendæ sunt vel pro tendineis propaginibus supernorum Gangliorum, vel (quod non negaverim) pro colligationibus plurium simul nervorum, quos interdum ipsa Natura, medio quodam artificio inter perfectum Ganglium, & simplicem tunicam, necit, atque complicat; quæ quidem Natura ipsius tandem opere eadem majora Ganglia, seu conglomeratas, mistasque glandulas, & veluti robustissimos musculos extruxit, & fabricata est.

Et quanquam ad propositam Gangliorum disputationem propere descendentibus immorandum nobis minime videretur in eorum describenda figura; tamen quia plerique Scriptores ad illam exprimendam usi sunt voce nodorum, ducta e plantis similitudine; non abs re futurum arbitramur, si ad externam ipsorum quoque figuram animum obiter adverterimus. Ego enim semper suspicatus sum, Recentiorum Anatomicorum mentes ab hujusmodi Gangliorum cum nodis similitudine præoccupatas



ad illorum usus investigandos, inveniendosque fuisse præpeditas; nam ex plantarum Anatome satis innotescit, frumenti genicula, arundinum, arborumque nodos circulares; non oblongam figuram præferre, ac veluti intertextas zonas, annulosque stirpium fibras, ac tubulos (ubi aut in novellas gemmas, aut in folia dirigi debent, atque absumi) ne dissolvantur, ac laxentur, colligare tantummodo, atque perstringere; in animalibus vero alia se prodit Gangliorum facies, nimirum figura non orbiculari, sed ovali, seu olivari; ita ut verum Ganglium constare quodammodo videatur (quod maxime annotatum velim) ex duobus conis per bases committis, atque in medio conjunctis, quorum apex superior principium, inferior finem, seu caudam constituit. Hinc autem suo loco apparebit, Ganglia non colligandi solum, sed premendi etiam, ac se elevandi, urgendique munere donari.

At ne, ut Plautus ait, proloquio Te exanimem, ad causæ momentum veniam, ostensurus primo loco, qualem ipse hætenus pertentatis experimentis Gangliorum structuram deprehenderim, quæ tamen, quoniam, ut scis, tenacissimo, firmoque villorum, ac fibrarum contextu coalescit, concrescitque, accuratæ, exquisitæque dissolutioni pertinaciter magnam partem reluctatur. Te non latet quid alii de Gangliorum structura literis mandaverint; cum Tu librorum voracissimus jam videris, ab inventore Falloppio Ganglium per hæc verba fuisse descriptum: *est corpus oblongum, olivaris figuræ quod colore carneum videtur, ac substantia nervea, durumque admodum est, & paulo inferius, nulla alia substantia donatur, quam nervea, & quasi in callum concrecente*. Willisius autem Falloppii sensum pene exscripsisse videtur, ac tantum addit, *plexus esse quasi nodos in canna, aut arboris caudice*.

Vicussenius utique paulo accuratius texturam Gangliorum, ut ipse nuncupat, attigisse visus est, cum illos *e nerveis fibris, arteriis, & venulis pia crassaque meninge involutis contextos* affirmavit, adjunxitque, *maiores eorum fibras carnosarum fibrarum tum colorem, tum substantiæ modum emulari*; cui postea sententiæ paucis mutatis superscripsit Joannes Mauritius Hoffmannus in sua Idea Machinæ Humanæ, alique. Nemo tamen, quod sciam, internam Gangliorum substantiam persequutus est, fibrarumque ordinem, principium, situm, modumque, quo excurrunt, recte pervidit, atque ad usum illinc colligendum, delineavit.

Tu vero inter tot ambages, ac tenebras rem acutegisse visus es; cum in Ganglio muscularem substantiam quærendam esse, proponas. Et quidem diligenti, accurataque adhibita Gangliorum sectione, quæ modo cruda, modo cocta, modo etiam longo tempore tum in urina, tum in aceto macerata animadvertimus, tuto asseverare possumus, eadem esse peculiares, sui generis musculos, cum re ipsa musculari textura donentur. An vero glandularem etiam naturam participent, hoc profecto est, de quo vehementer dubitamus, tuamque sententiam exquirimus.

Uc autem muscularis in Ganglio fibrarum complexio evidentius nobis appareret, selegimus majus, quod nostro in corpore invenitur, de quo Falloppius primum scripsit, & posteriori ramo nervi paris vagi attribuit.

Sed hic mirari subit; peritissimum, exactumque Anatomicum in re tam evidenti fuisse hallucinatum. Siquidem olivare, ut ipse vocat, corpus, quanquam fibras accipiat a nervo paris vagi, cumque eo per communem membranam in itinere involvatur: perquirentibus tamen originem, sedemque illius liquido apparet ab alio insigni nervo (internum appellant) repetere, qui dum Ganglium ingreditur, non solum non candicat, quemadmodum vicinus nervus paris vagi, sed aliquantulum rubescit; atque etiam a diverso cranii foramine profiscitur, nimirum

Morgagni Adversaria Anat. V.

ab illo, per quod arteria carotis intra calvariam penetrat; cui quidem arteriæ per multiplices etiam fibras adhærescit, secus ac nervus paris vagi qua finitimus est venæ jugulari, atque ab ejus foramine (interposito dumtaxat osseo isthmo) egreditur; ita ut admodum salebrosam, sed tantundem pulchram, atque admirationis plenam rem offendat, qui ejusmodi nervorum, paris nempe vagi, & intercostalis radices a primis quibusque initiis seorsim persequitur. Quod sane ignoramus, an ullus hætenus Anatomicorum felicissime sit assecutus.

Sed relinquentes nervos paris vagi, in illum, qui ad efformandum Ganglium fertur, oculum, & cognitionem intendamus. Hic itaque nervus consideratus intra calvariam, seu antequam superet cranii repagula, quoniam exiguis fibris coagmentatur, ejusdemque est cum medullari cerebro, ac dura matre coloris, vix distingui potest, unde præcipuum fontem, atque originem habeat. Accedit ad operis difficultatem, quod cum cerebrum necessario flecti, ac revolvi debeat, ut principium hujusmodi nervorum spectari possit, idem propter summam exilitatem, molliem, ac teneritatem, quam servant, cum primum a medullari cerebri parte profiscuntur, facillime disrumpi, aciemque effugere solent. Quantum autem repetitis sectionibus perspicere potuimus, nobis visi sunt primum oriri a protuberantiis cerebri, ubi cum pedunculis glandulæ pinealis abnectuntur.

Quod autem certo certius asseverare licet, illud est, nervum hunc non procul ab ortu suo supra illam statim duræ matris sectionem ferri, quæ dividit cerebrum a cerebello, cumque ea per nerveas fibras ita complicari, ut ejusdem progressus non nisi per lanceolam, discisso villorum complexu, apparere possit; ac proinde factum arbitror, ut Anatomicorum diligentiam huc usque fefellerit.

Postquam autem nervus hic ad os sphenoides eadem dura matre irretitus pertigerit, inter nervum oculorum motorium, plexumque eorum nervorum, qui audiunt gustatorii, penetrat os ipsum, quo loco ingreditur arteria carotis, cui per multiplices fibras connectitur. Dum autem trajectur per cranii foramen, ac postquam ab illius angustiiis vindicatus est, nonnullos ramulos accipit ab aliis, immo fere ab omnibus nervorum paribus, quæ intra cranium nascuntur, nimirum ab optico, ab oculorum motoriiis, nec non etiam a gustatoriis, & auditoriis; quamobrem Ganglii nervus, quem intercostalem dicimus, ex multis conflare, ac veluti in fasciculum collectus internam carotidem sensim complecti pene videtur, donec novas fibrarum suppetias nanciscatur tum a posteriori nervo paris vagi, tum a nervis linguæ motoriiis. Hisce denique fibrarum surculis locupletatus nervus juxta secundam cervicis vertebra Ganglio augetur, implicaturque, cujus luculentam historiam nunc daturi sumus. Hinc vero perspicue apparet, primum, seu superius Ganglium ad nervum paris vagi nequaquam pertinere, tametsi aliquot ab illo fibras deducat.

Tibi autem, Vir eximie, investigandum, ac perpendendum relinquo, an multitudo nervearum fibrarum, quæ, ut diximus, ab hoc nervo exorta internam carotidem complectuntur, eadem secundum arteriæ ductum reflexæ, ac recurrentes per singulas ejus intra calvariam distributiones tam in membranis, quam in retibus comitentur, atque implicent, quemadmodum compertum est evenire in ramis externæ carotidis, ad quos nervi infra Ganglium orti quaquaversum recurrunt, omniumque pene mutationum, & affectionum, quæ in humana potissimum facie secundum pathematum vires animadvertuntur, non immerito causæ existimantur.

Nos interim adnotatione rursus dignum censemus, nunquam a nobis Ganglium in nervo paris vagi ejusque posteriori ramo per collum excurrente inventum fuisse, quidquid ab aliis Anatomicis observatum referatur, qui



forſitan cum Falloppio id aſſeruerunt, quia non raro nervus intercoſtalis ſtatim ac ex calvaria egreditur, in duos ramos diſpertitur, & in unoquoque Ganglium admittit: unde fieri poteſt, ut pro Ganglio paris vagi acceptum fuerit illud, quod interdum eidem propinquius, cumque eo communi quadam tunica velatum invenitur, quamquam non ad nervum paris vagi, ſed ad intercoſtalem pertineat.

Ne vero in parergis fuſiores eſſe videamur, d iſtitutam Ganglii anatomen propius accedamus: in qua tametſi ea quæ a nobis obſervata ſunt, vix poſſint adeo dilucide ſcribi, quemadmodum viſa fuerunt; adſcita tamen in auxilium pictoria arte, ſperamus fore, ut ſtudium noſtrum haud omnino improbes.

Patere interim, Vir doctiſſime, ut de Gangliorum natura dicturi, mutuato a magnis Scripto-ribus exemplo, nonnulla prius tum in genere, tum quæ ſunt oculis magis obvia, perſequamur; ita enim ad penetralia tutum nobis utcunque iter munire poterimus.

Primum itaque obſervamus, Ganglia nuſquam uni dumtaxat nervo appendi, atque adſolvi ſolere, ſed multos ſimul admittere, connectere, permiscere, & colligare.

Secundum, ex nervis, qui in Ganglia feruntur, nonnullos ſuperne, ac fere ad lineam, nonnullos tranſverſim, ſeu oblique penetrare: pleroſque ad internam illorum ſubſtantiam pertingere, aliquos ad ſolas membranas, aut exteriorem corticem diſpenſari.

Tertium, ubicunque verum Ganglium invenitur, ibi quidem nervi magis conſpicui, qui tam ſuperne, quam inferne ad intimam, ac pene medullarem ejus ſubſtantiam penetrant, ſubrui, ſeu levi quodam ſanguineo murice tincti apparent, cum alii, qui ſine Gangliis vel a cerebro, vel a ſpinali medulla proficiſcuntur, præſertim vero par vagum, ejusque rami, priuſquam cum Ganglio ſe ſe immiſceant, omnino albicent.

Quartum, intra Ganglia ubique locorum vaſa ſanguinea tam inſlua, quam reſlua, & quidem conſpicua ex proximis caudicibus derivari obſervantur.

Quintum, Gangliorum moles major eſt, quam ſit aggregatum omnium vaſorum ingredientium, atque egredientium: quo ſit, ut ad eorum productionem concipiendum neceſſe ſit concurrere, præter communia vaſa, peculiare aliud corpus excitatum non tam ex cohærentia, & complicatione præſatorum nervorum, ac ſanguiferorum, quam ex novis organicis partibus, quas provida, ſolersque Natura ſubſiſtentibus, probeque commixtis, excoctiſque liquidis, ſimul etiam elongatis, prolatis, varieque diſpoſitis ſolidorum fibris, fingit, & creat. Sed jam tempus eſt, ut noſtras de interna Gangliorum ſubſtantia obſervationes pandamus.

Accepimus itaque ſuperum in collo, quod majus eſt, Ganglium plerunque ſiniſtrum tum humanum, tum, ut ejus particulæ facilius cerni poſſent, equinum; atque in utroque eadem exteriùs animadvertimus, videlicet

Primo quod attinet ad ſitum, collocari Ganglium hoc inter primam, & ſecundam cervicis vertebram prope arteriam carotidem internam ſub vena jugulari, ac nervo paris vagi. Vide Figuram Primam.

Secundo, quod ſpectat ad vaſa, arteriolas ab interna carotide accipere, quæ quidem ſuperiorem præſertim ejus verticem ſubeunt, ac pervadunt; venulas vero in jugulares remittere; nervos quamplurimos a pari vago mutuari. De lymphaticis autem quidquam affirmare non audemus, cum eadem nunquam in oculos noſtros incurrint, etiamſi probabile admodum cenſemus, aliquot ibidem inveniri; cum ubi eſt vaginalis tunica, ibi lymphæ ductus quoque aſſeſſe ſoleant.

Tertio, tribus membranis Ganglium involvi (quamquam non Te latet, tunicarum numerum per anatomicum artificioſum minui, augeriſque facile poſſe) quæ quidem tunica, non dubitamus,

quin ſuam a cerebri membranis originem ducant; licet parumper atgeantur, & craſſeſcant circum Ganglium, per acceſſionem novarum fibrarum, & nutritii ſucci moram. Harum exterior laxè illud involvit ad inſtar tunicæ teſtium vaginalis: ita ut integrum hujus Ganglii corpus, ſi digitis comprimatur, tanquam contentus nucleus huc illuc elabi, ac quoquo modo diſfluere videatur.

Hæc autem contextitur craſſioribus, & ad muſcularem indolem accedentibus fibris, quæ quidem propter permixta vaſa ſanguinea ſubrubent. Interna ſui facie lubrica eſt, leni quodam liquido mollita, quemadmodum pericardium, cujus ut ſpeciem referre, ita etiam uſum præſtare videtur: nam ut illud cor, ita hæc Ganglium laxè involvit, & complectitur.

Secunda membrana arctius Ganglium ambit, eaque tenuioribus quidem, ſed magis invicem complicatis, & cohærentibus fibris inſignitur.

Tertia occurrit tendinea, atque adeo valide cum Ganglii corpore conjuncta, contextaque, ut ab ejus ſuperficie ſine illius divuſſione, ac laceratione ſeparari nullo modo poſſit, ac proinde dici mereatur circularis quidam tendo, cujus fibræ cum carneis ipſius Ganglii omnino continuæ ſunt.

Summa vero hic animadverſione dignum eſt, quod exiles, teretesque nervi, ſeu potius nervei tendines, qui ex Ganglio, ſuis a membranis nondum ſpoliato, prodeunt, ut in Fig. Secunda, quique ad vicinas partes, præſertim muſculares, atque ad ſanguinea etiam præcordiorum vaſa, potiſſimum arterioſa, pertingunt, non proficiſcuntur ab externis Ganglii membranis, ſed ab interiori ejusdem ſubſtantia; quare pulcherrimum sæpe nobis fuit rem hanc quam diligentiffime pertractare: ſumpſimus enim unum, alterumque ex illis tendineis nervis a vaginali tunica propendentibus, cumque illos modo exteriùs digitis comprehenſos, modo interius ſtylo elevatos pertraheremus, ſemper vidimus ita invicem reſpondentes, ut terebratis membranis, penitus continui apparerent: viderenturque veluti tendines digitorum perforantes, dum ipſæ membranæ perforatorum tendinum vicem gerunt.

Hoc ſane loco non erit abs re illas obſervationes adnectere, quas nos etiam de progreſſu nervorum a ſuperiori Ganglio prodeuntium fecimus. Nam licet ab aliis id Anatomicis forſitan tentatum fuerit, noſtris tamen oculis fidere conſultius duximus.

Primum itaque, quantum obſervatione propria colligere potuimus, ſubrui ejusmodi nervorum ramuſculi ad colli, ad pharyngis, ad laryngis, ac linguæ muſculos, finitimarumque partium membranas feruntur, cumque earum texturis ita permiscetur, & adſolvuntur, ut mille claviculis cum muſcularibus fibris etiam artuum ſuperiorum implicentur.

Jucundum præterea nobis fuit cernere hujus nervi fibras per œſophagum ad ventriculi etiam oriſcium descendere, ac per ipſos membranaceos, quos intercartilagineos dicunt, trachæ muſculos, quaquaverſum in bronchia ſpargi, ac diſſeminari.

Deinde alii etiam nervi in vicinas arterias præſertim carotides feruntur, & cum iſdem, ut ſuperius indicavimus, reſſectuntur tum extra, tum intra cranium; nonnulli recta quoque descendunt uſque ad aortæ caudicem, cumque illa ad cordis ſubſtantiam procedunt. Alii aortam quoque deſcendentem ſub exteriore membrana quaquaverſum comitantur. Illudque admodum ſpectabile eſt, nervos a primo hoc, & a ſecundo Ganglio prodeuntes multiplici nexu cum arterias axillares, tum aortam complecti, indeque recurrere, atque adeo cum aliis arteriis permisceri, ut ſi perſtinaci diligentia illos perſequamur, ſpectare liceat, eoſdem nervulos ad uſque fines arteriarum, earumque inſertiones in muſculos, & venarum principia infernorum etiam artuum diſſundi, ac propagari.

Notabilis pariter eſt nervus, licet obliquo ductu procedens, qui a ſuperiori hoc Ganglio deſcendit ad inferius, locatum ſuper ſeptimam colli vertebram: quinimo ſi dixerimus, ab utroque Gan-



Ganglio nervos proserpere in singulas fere nostri corporis musculares partes, forsitan a veritate non aberrabimus.

Non exiguus quoque nervus a superiori Ganglio profectus, postquam in Thoracem penetravit, inter mediastinum, & pericardium ad cor ipsum pergit. Admirabile porro est intueri myriadem, ac rete illud, quod efformant nervi a duobus hisce Gangliis exorti cum nervis cervicalibus, paris vagi, intercostalibus a dorso vertebrae prodeuntibus, ac demum cum tenuibus fibrillis a phrenico derivatis, quod quidem mirificum rete suo loco delineatum in libris nostris de motu cordis exhibituros pollicemur.

Sed ut eo revertamur, unde digressi sumus, elixatum, & adamussim a tunicarum involucro spoliatum, denudatumque Ganglium exhibuit nobis pervidendum externa in facie rete quoddam nervosum suis cum membranis tenaciter implicatum. Vide Figuram Tertiam.

Sub hoc autem rete cernuntur eleganti ordine a summo ad imum Ganglii verticem protensae fibrae carneae, quae sic dispositae sunt, ut perbelle peponis corticem, sulcis in aequalia segmenta divisum referre videantur; quemadmodum eadem Figura observare licet. Neque interim illud est hic praetereundum, scilicet ab intermediis fibrarum commissuris innumeras fibrillas emergere, cumque interiori tunica conjungi, atque implicari, quae quidem fibrillae, quoties Ganglium a membranis per vim liberatur, retegiturque, necessario dividuntur, ac discinduntur.

Et quoniam dubitabamus olim, an in Ganglio fibrae carneae eundem interius ordinem servarent, quo exterius procedunt; idem propterea longa coctione elixatum unguibus eatenus utrinque leniter diducere, ac laxare coepimus, quatenus paulatim ad centrum usque perveniremus: quo sane in experimento interna Ganglii substantia se se nobis ostendit compacta ex tenuissimis fibris, iisque nudam aciem pene effugientibus, quae tamen per microscopium evidentius apparent carneae, eaque proficisci ab albo quodam tendine per centrum recta instar axis a superiori ad inferiorem verticem protenso. Hae autem fibrae a memorato tendine tanquam a pinnae costa non utrinque solum, verum etiam quaquaversum, seu radiatim ad universam superficiem nonnihil inferius inclinatae feruntur. Quapropter, si rem ad myologicas regulas referre velimus, universum Ganglii corpus dicendum est compingi ex duobus potissimum tendinibus, & duplici carnearum fibrarum serie, ac directione: primus enim tendo externus est, atque conflatus ex duabus extimis membranis, nervulisque per easdem diffusis, & excurrentibus: quo quidem tota Ganglii moles non regitur tantum, sed ad muscularem vim exercendam, ut dicemus, munitur etiam, ac roboratur. Alter vero tendo per medullarium, perinde ut axis, descendens ille est, a quo pinniformes fibrae oriri videntur, aut saltem alligari.

De fibris autem carneis longum hic sermonem instituere superfedemus, cum supra de iis fuisse jam a nobis actum fuerit, easque in Figuris Tertia, & Quarta quam diligentissime licuit, delineandas studuerimus.

Hae porro, quae hactenus, experientia duce, de Gangliorum structura exposuimus, iter, puto, nobis munient, ad eorundem vim, actionemque assequendam. Duo tamen hic ante omnia tanquam Lemmata assumimus. Primum, exploratum apud Anatomicos esse, partes omnes, quae musculari textura donatae, simul etiam vaginali tunica involvuntur (quemadmodum e.g. sunt testes, & cor) agi motu contractionis, atque elevationis, itidemque laxationis, & concidentiae.

Secundum, eodem contractionis motu quidquid

liquidi in illarum partium tubulos, loculos, meatus, ac poros influxerit, ulterius permisceri, atque in obvios canales juxta oeconomiae naturalis indigentiam extrudi.

Hinc haud absolum Tibi, Morgagni doctissime, forsitan videbitur, si Gangliorum actionem, & vim esse, statuamus, ut eadem pro animalium motuum opportunitate plus minus contracta, tum canales sanguineos, quibus alligantur, parum elevent; tum liquidum nervorum vehementius extrudant. Etenim primo loco, cum tendi, contrahi, erigique non possit fibrosum aliquod corpus, quin, dum contrahitur, seu quasi in systole versatur, brevius evadat, ut in allatis tum testium, tum cordis exemplis passim spectamus; consequens erit, ut muscularia Gangliorum corpora, quotiescunque contrahuntur, atque eriguntur, paululum decurtentur, atque ad se se adducant suos tendines tam supra, & e regione, quam infra positos, ac distributos: contra vero eisdem tendines produci, seu elongari, cum ipsum Ganglium laxatur, & quasi in diastolem cedit.

Deinde cum sit compertissimum, per naturalem fibrarum contractionem contenta liquida (modo dehiscences, ac liberos tubulos inveniant) vehementius propelli, atque extrudi, profecto non dubitamus, quin a Ganglii corpore animales spiritus per ipsam contractionis vim ad velociorem cursum promoveantur.

Neque vero de ratione, ac modo, quibus Ganglium in ipsa tensione erigitur, ac decurtatur, haesitandum esse videtur: cum enim fibrae carneae, quae Ganglii substantiam compingunt, atque contextunt, sint, ut dictum est, duplicis ordinis, externae videlicet a superno ad infernum verticem recta protensae; & internae a tendineo axe oblique deorsum, & quaquaversum ad tendineum involucrum desinentes, necessario fieri debet, ut, dum uterque fibrarum ordo ob recens inductam in singulis vel crispationem, vel intumescentiam tenditur, brevior evadat; ac propterea vertices ad invicem non modice accedant, seu quod eodem recidit, ut Ganglium a figura sphaeroide ad sphaeram magis appropinquet. Cum vero in hujusmodi contractionis, seu decurtationis motu fieri nequeat, ut superior vertex admodum descendat versus inferiorem, quoniam ille stabilibus ossium fulcris, tum vertebrarum, tum cranii per nervos, & membranas valide alligetur; necesse est, ut inferior vertex magis ascendat versus superiorem, secumque trahat suos tendines, partesque, quibus iidem tendines vinciuntur, & colligantur.

Expectabis forsitan, Morgagni dulcissime, ut Ganglii vim ad attollenda vasa, & membranas, quibus ejusdem nervei tendines alligantur, adamussim expendam, eamque ad certam Staticae regulam, normamque quam accuratissime redigam.

Quis autem tam felix, tam oculatus, tam perspicax fuerit, qui hanc implicatissima, penitusque sepulta Naturae arcana expedire, atque eruere possit? Satis itaque mihi erit ex pneumatostatica memorare, minimam vim aeris per tenuem cylindrum in vesicam (\*) impulsam, lateribus ejus distentis, ac longitudine contracta, pondus plerumque librarum sexaginta, vel septuaginta attollere, ac sustinere. Hinc porro colligi potest, non modicam, aut exiguam esse vim Gangliorum, quippe quae ex tenuiori, magisque actiuo fluido, quam sit nudus aer, in elegantiore machinam, quam sit simplex vesica, influente consurgit.

Quod vero attinet ad motricem vim contenta liquida impellendi, eam luculenter nobis ostendit mirificus cordis, & urinariae vesicae mechanismus, quo docemur, pene immensum cordi, & maximum vesicae in propellendis sanguine, & lotio, vir-

(\*) Vide experimentum, ejusque rationes apud Joannem Wallis. in sua Mechanica cap. 13. prop. 3.



virtutis momentum inesse; ac propterea non exiguis viribus Ganglia quoque pollere, probabilissimum est, tum ad partes annexas attollendas, tum ad contenta fluida extrudenda.

Nunc autem ad Gangliorum usum, quantum obscuritas, novitasque rei patitur, accedamus. Quod ut præstare possimus, nonnulla hic postulata nobis concedenda abs Te petimus. Primum, nervos, qui sensibus ancillantur, ut olfactorios, opticos, auditorios, aliosque, nullis Gangliis munitos esse. Id vero Tu, Vir præstantissime, haud frustra Naturam molitam esse, intelligis; siquidem cum organa sensuum excipiendis externis pulsibus æque semper exposita esse debeant, ut non tam ad agendum, quam ad patiendum sint comparata, par erat, ut spiritus animales, & quidquid cum iisdem fluitat, per apertos obviorum nervorum ductus æquabili, tenore influerent. Sunt enim vero *sensus in corpore quasi quadam viæ*, ut Tullius ait, *ad oculos, ad aures, ad nares a sede animi perforatæ*: nulla idcirco in iis aut repagula, aut incitamenta addenda, vel interponenda erant.

Alterum postulatam, scilicet ex animalium motibus alios esse omnino involuntarios, ut vocant, ad quos tonici etiam referuntur, alios voluntarios, alios denique mixtos, nimirum in quibus voluntarii involuntarios moderantur: quos quidem Tibi Anatomicorum celeberrimo innuisse plus satis erit.

Tertium, ex nervis, qui ad organa motus feruntur, nonnullos sine Gangliis occurrere, multos iisdem instructos esse.

Ex iis vero, quæ a nobis postulata sunt, perspicis, Morgagni præclarissime, Gangliorum usum (tamen alii quoque inferioris notæ considerari possint) præcipuum esse, ut eadem nervis admotæ, atque intertexta sint veluti Moderatores, Rectoresque eorum animalium motuum, qui vel arbitrio obsecundant, vel ipso arbitrio celerius moveri, aut retardari debent. Hujus autem rei non levem conjecturam capimus ex ea necessitate, quam habent organa voluntariis quomodocunque motibus proxime subservientia, ut influxus liquidorum, quæ musculares fibras supra vim tonicam tendere debent, uno magis, quam alio tempore, nimirum cum vult animal, copiosius in illas dirigatur, & subsistat. In hoc enim motus tonicos a superadditis differre, arbitramur, quod illi a continuo, perennique influxu liquidorum musculares lacertos, villosque tendentium oriantur; hi secus a temporaria immisione, vel saltem ab aucto nuper influxu eorundem liquidorum excitentur, ac tandiu perdurent, donec idem recens additus influxus perseveraverit. Hoc sane in singulis artefactis machinis, quæ per decursum, impetumque aquarum statis temporibus moventur, usu venire, comperimus: in chartariis enim, aliisque hydraulicis certum quoddam sufflamen præsto est, cujus contrariis motibus laticum illapsus artificis arbitrio, pro ut res postulat, promoveri, vel prohiberi solet.

Cum itaque non videam in animalium corporibus aliud instrumentum, quod concinnius paratum, aptumque sit ad moderandum superadditum influxum tum sanguinis, tum spirituum animalium in musculares partes, quæ voluntarie moventur, ipso Gangliorum apparatu, consentaneum erit asserere, eadem Ganglia per actionem se se elevandi, animalesque spiritus velocius exprimendi, de qua supra egimus, operi admodum necessario dirigendi, ac moderandi motum, influxumque tum sanguinis, tum spirituum inservire.

Quod si autem meditatam hunc Gangliorum usum vero proximum Tu, Vir optime, judicaveris, jam puto, mecum affirmare haud hæsitabis, Ganglia in somno (qui tamen a vehementibus insomniis non sit perturbatus) vel penitus, vel pene saltem otiosi: contra in vigilia ad suos quæque usus prompta, parataque esse, scilicet ad excitandas voluntarias motiones tum artuum, tum

viscerum, præsertim vero præcordiorum, in animi potissimum perturbationibus vim omnem, ac facultatem exerere, atque explicare. Quamobrem perpendenti olim mihi detectam structuram, mentemque conceptum officium Gangliorum, subit animo suspicari, an eadem in cerebri subsidium ita sint comparata, ut appellari possint exigua quædam, ac peculiaria cerebella, voluntariis tamen, ac superadditis dumtaxat motibus excitandis hic, illic extra calvariam per corpus dispersa, ac distributa, veluti militares quædam stationes ad subitos hostium incursus collocatæ. Nam quemadmodum Natura glandulas cum intertexto rete fibroso, ac muscolari ubique fere locorum fabricata est, ut cordi in promovendis motibus per se fatiscentibus liquidorum, quæ secundaria vocantur, subsidio venirent, ac propterea ipse ego cum sex, ac viginti ante annis in Romano Lyceo Præfationem quandam de Glandulis haberein, easdem tanquam corcula (phrasim hanc pro sua humanitate laudante, qui tum auditor aderat, Magno nostro Malpighio) hic illic construktas, ac dispersas consideravi; ita profecto Ganglia potiori jure quædam veluti cerebella extra cranium locata dici posse mihi videntur: cum cerebrum molliusculæ texturæ, tametsi ab arteriis, atque adeo a dura, piaque matre prematur; imbecilliores tamen habeat vires impellentes, quam cor, quod musculorum fortissimum appellavit Hippocrates. Siquidem Ganglia robustiores habent fibras, firmiorique earum contextura donantur, quibus certo quodam actionis genere convenientes, & consentaneos motus ad animalium æconomiam necessarios, tanquam adminicula, & administri, repente, atque ad libitum edere, ac promovere possunt, qui cæteroqui a solo cerebro repeti nequeunt. Itaque, ut rem hanc explicatius persequar, cum motus tonici sint sensibus analogi, videlicet per continuum, æquabilem, nec unquam interruptum spirituum appulsum in antagonistas musculos, vel musculares membranas excitentur, eorum nervi intermedio Gangliorum officio minime egebant. Motus vero, qui a voluntate proficiscuntur, vel temperantur; quoniam longe majorem vim ad superandum antagonistarum renitum exerere debebant; novo artificio roborandi, augendique erant. Hinc patet, cur nervi, qui ad motus organa feruntur, partim cum, partim sine Gangliis occurrant.

Sed cum hæc de Gangliorum usu in genere a me investigata fuerint, haud ita rigidum Te exactorem, Morgagni humanissime, futurum existimo, ut abditiora requiras, nempe ut sigillatim quoslibet, magisque peculiare Gangliorum motus, tum quoad tensionum tempora, & vices modo in hos, modo in illos nerveos tendines, tum quoad earundem ferias, & remissiones, etiam hic, atque medullitus enucleem: in hæc enim opera quo profundius intueor, ac penetro, eoluculentius mihi affulget ingens varietas Naturæ operum, mentisque meæ aciem perstringit, meque cogit, ut eadem plane nescire fatear; nisi quod ab Hippocrate didici, motiones animalium a necessitate, oblectamento, aut fuga doloris, atque incommodi ut plurimum inchoari, deinceps vero ab utilitate percepta, & ab inducta assuetudine confirmari. Et quidem ut Citharista sexcentis plane, iisque variis semper digitorum motibus fides pulsatur, lyræque nervos scalpit, & uti saltator pedibus qua flexis, qua erectis, qua oblique deductis, non sine peculiari harmonia solum percutit, aeremque scindit, ac verberat; ita putare forte liceret, animam tendineos cujusque Ganglii nervos nunc seorsim aliquos, nunc simul omnes ad ordinatum motum sensim, ac sine sensu, partim necessitate cogente, partim utilitate, ac delectatione alliciente per assuetudinem dirigere, atque intendere.

Cave tamen Morgagni ornatissime, credas, me censere, animales spiritus per Gangliorum nervos, nisi cum eadem tenduntur, non excurrere; ac proin-



proinde in illorum, ut ajunt, flaccescencia iisdem spiritibus vias obstructas esse: liquidem semper per eorum semitas spiritus, quemadmodum per alios nervos Gangliis destitutos, leniter moveri, arbitror; ea tamen proposita lege, ut ubi opus fuerit ad excitandum peculiarem, novumque motum in determinatis musculis, tunc per Gangliorum tensionem uberius huc, aut illuc exprimantur: unde varie eriguntur, & constringuntur sanguinea vasa, quæ propterea contentum liquidum nova directione, novoque impetu donant, quibus musculorum fibræ plus solito roborantur; non absimili forsitan ratione, qua spiritus in tibias multiforas influens secundum varios pressionis gradus tum adnexi utris, tum foraminum adeo varia sonorum genera elicit, ut jucundam illam descriptionem a Luciano in Harmonide inductam mihi revocet in memoriam; „ Docuisti me, inquit, jam exacte adaptare tibiam, atque in ejus „ ligulam inspirare tenue quoddam, ac modulatum; tum commodum, facilique contactu submittere digitos in crebra sublatione, ac demissione vocis: ad hæc ad numerum ingredi, & „ ut modi congruant ad chorum: præterea quod „ cuique harmoniæ generi proprium est, observare, Phrygiæ divinum impetum, Lydiæ Baccicum furorem, Doricæ gravitatem, ac modestiam, Jonicæ jucunditatem. „ Ignosce interim, amabo, Vir optime, quod me non puduerit, tametsi senem, per hæc puerilia ab eo, quod mihi propositum fuerat, digredi. Sed ars, quæ Naturam, docente Hippocrate, imitatur, eandem interdum explicat, detegitque.

Quæ pro mea tenuitate de Gangliorum structura, viribus, actione, usuque dicenda habueram, tuos ante oculos, Morgagni doctissime, jam, ut vides, constitui; nunc, ut tecum fidem meam penitus liberem, ea, quæ de præcipuis eorum morbis diuturno experimento animadverti, percurras precor; quanquam probe intelligo, Gangliorum non Physiologiam solum, sed Pathologiam quoque fere omnes Medicinæ Scriptores, exceptis Viris Clarissimis Willisio, & Vieussenio, ancipiti, tecto, cæcoque itinere, ut Poetæ de labyrintho finxerunt, huc usque deterruisse. At quoniam Ganglia nihil aliud esse,prehendimus, quam muscularia sui generis corpora, quæ tendineis nervis sanguinea præsertim vasa, & musculorum fibras veluti claviculis sic apprehendunt, ut ad dirigendum, moderandumque animalis arbitrio liquidorum in illas influxum comparata fuisse videantur; idcirco non dubitamus asserere, quin Ganglia triplici malorum genere, quibus musculares partes ut plurimum tentari solent, ipsa quoque obnoxia esse possint; nimirum Primo Convulsioni clonicæ, seu convulsivo motui, Secundo Convulsioni tonicæ, Tertio Semiparalyfi, aut veræ Paralyfi.

Frequentissime autem Gangliis accidit convulsio clonica, seu motus convulsivus, præsertim apud mulieres hystericas, rarius apud Viros asthmaticos, & hypochondriacos, in quibus illæso plerumque, aut saltem ab insidentibus, sive essentialibus morbis immuni cerebro, ac spinali medulla, ichor salinus, & mordicans, refluus ab utero, hypochondriis, vel aliunde, sanguini, aut liquido nervorum admiscetur, atque in tendineas Gangliorum, vel plexuum membranas, muscularesque fibras immittitur, ac penetrat, ibidemque quacunque ratione hos, vel illos eorum tendines inæqualiter vellicat, & irritat, cogitque, ut unum potius, quam aliud membrum, modo videlicet thorax cum diaphragmate, modo pulmones cum corde, modo abdomen, aut artus aliqui concutiantur, dum interim reliquæ partes sanæ, atque integræ jussui voluntatis obtemperant. Cum vero interea temporis acris humor, si mole sit exiguus, facili negotio per motum ipsum convulsivum excutitur, ac resolvatur (unde Hippocrates in Muliere hysterica sternutationem laudavit) vel sensim per sua quæque vascula refluat,

cæterisque liquidis permisceatur, leniaturque, inde fit, ut cessante in Ganglio irritatione, convulsivus quoque motus sedetur: ad quod sane præstandum oleosa, & anthysterica, cum opiatissimum opere conducunt.

At si, quod non raro accidit, hujusmodi ichores vel mole aucti, vel admixtione aliterius liquidi paulo crassiores, acritudine non imminuta, evadant; facile contingit, ut unum, alterumve, immo omnes simul tendines ejusdem Ganglii incessanter stimulent, fodientque: quamobrem causa convulsivæ nunquam amota, perpetuo quoque, ac tonico spasmus iisdem tendines afficiantur, simulque partes, quarum usui destinati sunt, simili pertinaci convulsione laborent.

Nolim tamen putes, mi Morgagni, me opinari, convulsivos motus, qui infonte cerebro, aut extra magnam culpam, in particularibus locis accidunt, nonnisi a Gangliorum irritatione pendere. Nam, ut mihi quidem videtur, cum non modo convulsiva, sed etiam paralytica mala oriri possint, ac soleant a causa, quæ sita sit vel in cerebro, ejusque appendice, vel in Gangliis, vel demum ea in parte, in qua morbus se se exerit; fieri hinc poterit, ut bene primum valentibus cerebro, & Gangliis, membrum aliquod afficiatur. Quod sane, de convulsivis ægrotationibus loquendo, tunc accidit, cum ichores acres ab arteriis, vel nervis in fibrarum muscularium spatia suffusi, atque intercepti fibrillas proxime vellicant, & convulsivos subsultus plerumque cum dolore inducunt.

Hoc autem contingere aperte demonstratur tum a qualibet nervi punctura, tum etiam ab infusione spiritus acidi per venam jugularem vivicanis; in illo enim, intactis penitus Gangliis, cor statim in spasmos adigitur. Sed quoniam ex naturali structura, & actione jam conjecimus, Ganglia spasmis quandoque commoveri posse; ideo ea quæ proposuimus, obtingere nullo labore existimamus.

Et quidem hoc ipsum repetitis cadaverum sectionibus adamussim confirmatum spectavimus. Nam pluries animadvertimus, in hystericis, quæ post diros convulsivos motus tonica brachii, vel cruris convulsione diu vexatæ tandem diem suum obierunt, Ganglia affectis partibus respondentia ampliora reddi, hydatidibusque obfusa. Quare subit hic studiosos Artis admonere, ut Gangliorum ad affecta loca pertinentium anatomen in similibus morbis diligenter instituant: confido enim futurum, ut semper vitium haud ablimile in iisdemprehendant.

Denique putamus, Ganglia semiparalyfi, aut perfecta interdum corripì posse, quo in casu membra, quibus Gangliorum tendines inserviunt, eadem affectione quoquo modo, salvo tamen sensu, occupari necessum est. Id vero censemus accidere, quotiescunque heterogenea materies vel diuturna mora lentorem adipiscitur, atque ita obstruit reducetes tubulos, quod plerumque fit in ætate decrepitis; vel per admixtionem cogentium corpusculorum (quod etiam in juvenibus) tenax, & glutinosa reddita meatus, atque interstitia Gangliorum partim occludit, & infarcit, partim urget, & comprimit; unde muscularis eorum machina ad propriæ contractionis officium inepta plus, minusve redditur.

Fortasse haud inutile penitus existimabis, Morgagni amicissime, si hoc loco narrationem adjecero Nob. cujusdam Adolescentulæ fervidi temperamentum, quæ cum nondum variolarum debitum perfolvisset, Juveni desponsata fuit: vix autem a confectis nuptiis pauci præterierant menses, cum variolis confluentibus corripitur, quæ magnum in ejus corpore æstum, pruritumque etiam post crustarum casum reliquerunt, ad quem sane temperandum jejuna hausit per aliquot dies libr. IV. frigidæ aquæ Nucerinæ, cujus paulatim usu a calore alleviari quidem visa est; sed, cum semel e lecto in pedes surgere vellet, sine ulla prævia capitis, aut spinalis medullæ molestia dextro tum cru-



crure, tum femore se ita captam deprehendit, ut neque stare amplius, neque ambulare potuerit, nullo interim comitante affectarum partium vel dolore, vel spasmo; sensu tamen, ac nutritione in iisdem superstite. Itaque Medicis in consilium adhibitis, variaque tam de morbi natura, sedeque affecta, quam de curationis methodo inter se differentibus, hanc ipse de ægrotationis indole sententiam tuli; scilicet ea in Juvencula substantiam illius plexus, seu Ganglii, quod in regione iliaca prope uterum nervos intercostales cum cruralibus colligat, & moderatur, infarctam fuisse a morbillari fermento, quod forte fortuna per contactum, admixtionemque Nucerinæ lymphæ, ejusque boli, fixatum, ut ajunt, coactumque fuit: quamobrem Ganglii paralysis paresim coxæ, crurisque induxerat, ad quam tollendam pharmaca non quidem ad cerebrum, spinalem medullam, aut femur, verum ad ipsum obstruatum Ganglium esse dirigenda. Laudavi propterea, ut Ægra duccia ex minerali sulphurea aqua supra regionem illam dextram usque ad inguen uteretur: qua so-

la mollitis, ut arbitror, solutisque in Ganglio humoribus, pristina valetudini ocysime restituta fuit.

Sed vitio dabit aliquis, fufius a me, subtiliusque, quam oportebat, de Gangliis, minutulis nempe humani corporis partibus, disputatum, atque ad te scriptum fuisse: Verum, cum animalium organa longe elegantiora in minimis, quam in maximis cernamus, admiremurque, tuæ peritiæ, ac solertiæ committo, ut decernas, an ipse dicendo plus justo prolixior; an dum brevis esse laboravi, obscurus fuerim, simul etiam in quo a vero aberraverim. Cum enim in rebus Anatomicis oculus patiens, ac diligens sit dux cultri; & microscopii; Mentis autem ductor, atque imperator sit ipsa sapientia cum veritatis amore conjuncta (quæ humanarum omnium virtutum est Regina) minime vereor, ut Morgagnius, qui in se cuncta hæc mire colligit, ac perstringit, hujus lucubrationis æquissimus judex futurus sit. Vale.

## DISSERTATIONUM FINIS.





# FIGURARUM EXPLICATIO.



Um duæ Figuræ quæ ad hæc V. Adversaria pertinent, ut in proximorum IV. Adversariorum Tabula sunt exhibitæ, sic cum Figuris cæteris illius Tabulæ sint

explicatæ; hic nihil aliud relinquitur nisi ut duarum Tabularum quas una cum superioribus Dissertationibus ab Amplissimo Lancisio accepimus, Explicationes ab ipso pariter missas subdamus.

## T A B U L A I.

Spectans potissimum ad Dissertationem de Vena Sine Pari,

**E**xprimit posteriorem internam Thoracis partem cum Vena Azyga, peculiari Nervo implicita, suisque ramis quaquaversum diffusis, & trunco in superiorem præsertim Cavam aperto, quemadmodum in hominibus plerunque observatur.

- A. Cor sinistrorsum de industria reclinatum.
- B. Truncus venæ cavæ superioris.
- C. C. Eiusdem truncus inferior utrinque scissus.
- D. Pericardii abscissi portio, Cavæ præsertim ad-hærescens.
- E. Auricula dextera ob cordis a naturali situ remotionem pene latens.
- F. Arteriæ magnæ portio.
- G. Trachea.
- H. Ramus dexter bronchiorum abscissus.
- I. I. I. &c. Vertebrae colli.
- K. K. K. &c. Costæ.
- 1. 2. 3. usque ad 9. Vertebrae dorso.
- L. Truncus venæ Azygæ.
- M. Anastomosis venæ Azygæ in Cavam superiorem.
- N. N. N. &c. Decem ejusdem Azygæ rami in latere dextero.
- O. O. Duo superiores Azygæ ramuli in primum ramum influentes.
- P. P. P. &c. Rami Sinistri Azygæ, quorum alii in ipsum truncum influunt; alii in majores ramos.
- Q. Q. Ramusculus Azygæ in sinistram spermaticam venam dehiscens.
- R. Dexter ejusdem Azygæ ramus, seu idem truncus in apicem pene desinens, quandoque in emulgentem dexteram prope Cavam, quandoque in Cavam ipsam apertus.

- S. S. S. Ramus Azygæ sub bronchio dextero, atque arteria magna ad sinistram thoracis partem proserpens, qui supergrediens
- T. arteriam axillarem, tandem in sinistram venam axillarem Z. immittitur.
- V. V. V. &c. Insignis nervus intercostalis posterior, qui auctus nervis tum a cerebro, tum a spinali medulla extra cranium prodeuntibus, magnam partem infra septimam colli vertebra utrinque oritur, atque in singulos quosque tam ramos venæ Azygæ, quam ramusculos nervorum dorsalium immittitur. Est autem hic Lector monendus, cum quædam alia ab Artificibus in hac Tabula minus servata proportionem sint expressa, tum Nervum hunc crassiorem quam par sit, exhibitum esse.
- X. Ramus ejusdem nervi, in locum anastomosis Azygæ penetrans.
- Y. Ganglium hujus nervi prope septimam vertebra.
- Z. Vena axillaris sinistra.
- a. Fasciculus nervorum a cerebro prodeuntium, de quibus in nostra de Gangliis Dissertatione fuse agimus.
- b. Superius Ganglium plerunque inter secundam, & tertiam Cervicis vertebra prædictos ramos colligans.
- c. c. Rami e Superiori Ganglio prodeuntes, extra situm, quorum alter ad præcordia; alter ad internas Carotides præsertim, & laryngem tendit.
- d. Ramus nervi a cerebro prodiens: qui arteriam cervicalem comitatus, in Ganglium immittitur.
- e. e. Bini nervorum ramusculi in Ganglium inferius descendentes, quorum unus e spinali medulla inter quintam, & sextam colli vertebra, alter inter sextam, & septimam egreditur.
- \* \* Insignis ramus e Ganglio superiori in inferius Ganglium desinens.

## T A B U L A II.

Pertinens ad Dissertationem de Gangliis Nervorum,

**E**xhibet situm, figuram, ac structuram Ganglii Superioris in sinistro colli latere.

### FIGURA I.

- A. A. Vena jugularis.
- a. a. a. a. Eiusdem rami per faciem distributi.
- b. Insignis ramus sublingualis.
- B. B. Carotis Interna.
- C. Eadem prope ganglium, quæ, licet natura sua recto itinere sursum feratur, tamen in cadavere, ex quo extracta fuit, deprehensa est cum notabili flexura, & quasi aneurysmatico vitio.
- D. D. Carotis externa.
- d. d. d. d. d. Eius rami faciem perreptantes.
- e. Conspicuus ejusdem ramus ad linguam delatus.
- E. Nervus paris vagi candicans.
- f. f. Eius ramusculus linguam subiens.
- g. g. g. Major ramus per collum in thoracem descendens.
- H. Ganglium superius juxta secundam, & tertiam

- colli vertebra conflatum ex multiplici complexione nervorum,
- h. h. h. qui a cerebro cum interno carotidis ramo proficiscuntur, & intercostales audiunt.
- i. i. Fibrillæ paris vagi in ganglium immissæ.
- K. Alter ramusculus subobscurior, qui a ganglio prodire, atque in inferiorem paris vagi ramum inferi videtur.
- l. Ramus ab interna carotide in ganglium digestus.
- m. Venarum ramusculi a ganglio in internam jugularem influentes.
- I. I. I. Notabilior nervi ramus a ganglio proficiscens, qui & a carotide paululum diductus, variisque ramusculis distinctus, tandem per arteriam potissimum magnam usque ad præcordia diffunditur.

FIGURA II. repræsentat equinum Ganglium finistrum suis membranis inclusum.

- A. Præcipuus nervus, qui per cranii foramen ex cere-



cerebro secundum carotidis cursum per collum ex-  
porrigitur, appellaturque intercostalis.

- B. Ganglium superius suis membranis obvolutum.  
a. a. a. &c. Diversi nervi seu tendines nervosi, qui  
a ganglio, perforatis ejus membranis, egrediun-  
tur, variosque musculos, & arterias penetrant.  
C. Exortus ab inferiori parte ganglii principalio-  
rum ramorum, qui tum intra, tum extra tho-  
racem feruntur.  
D. Major ramus ad præcordia excurrent.  
E. Ramus ad inferius ganglium, quod intercosta-  
lem nervum amplectitur, diffusus.  
F. Ramus laryngem ejusque musculos præ cæteris  
pervadens.

FIGURA III. delineat equinum Ganglium suis  
membranis denudatum.

- A. Externa Ganglii superficies variis nervis inter-  
texta, prout diductis membranis occurrit.  
B. B. Membrana laxior, seu vaginalis.  
C. C. Membrana media ganglium arctius complectens,  
D. D. Interior magisque nervea, & tendinosa mem-  
brana.  
a. a. a. a. Facies ganglii denudati, quæ longitudina-

libus fere carneis fibris contexta est.

- b. b. b. b. &c. Tendines nervosi, qui in Figura se-  
cunda lit. a. a. a. &c. indigitantur, in præsentem  
ostenduntur, quomodo trajectis, perforatisque  
membranis a muscularibus Ganglii fibris profici-  
scuntur.

FIGURA IV. repræsentat Ganglium elixatum, un-  
guibusque per longum apertum, & micro-  
scopio animadversum.

- A. Nervus intercostalis, qui in ganglium recta in-  
greditur, quique tendineæ indolis apparet.  
B. B. B. B. Membrana Ganglii, quæ expansa, ex-  
ternique tendinis speciem refert.  
C. C. C. Tendo, qui tanquam axis per centrum  
ganglii excurrit, & a quo  
D. D. fibræ carneæ exortæ in externum tendinem  
B. B. B. B. oblique, & quaquaversum feruntur.  
E. Nervus major, qui ab inferiori ganglii apice  
ortus naturam tendinis servare videtur.  
F. F. Laterales nervi ab eodem inferno angulo pro-  
ficiscentes, qui de musculari pariter, ac tendi-  
nea totius ganglii natura participant.

F I N I S





JO. BAPTISTÆ  
MORGAGNI  
ADVERSARIA  
ANATOMICA SEXTA.  
OBSERVATIONES COMPLECTUNTUR  
DISTRIBUTAS  
IN C. ANIMADVERSIONES  
*AD LIBRUM IV.*

THEATRI ANATOMICI  
CL. V. JOANNIS JACOBI MANGETI

SERENISS. REGIS PRUSSIÆ ARCHIATRI.



VENETIIS,

MDCCLXII.

~~~~~

EX TYPOGRAPHIA REMONDINIANA.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

FOR BAPTIST
MOR GAGNI
ADVERSARIA

A N A T O M I C A S E X T A
OBSERVATIONS CONCERNING THE

D I S T R I C T

I N C A N I M A D V E R S I O N E S

A D V E R S A R I A

T H E A T T A C H M E N T

C L A S S I F I C A T I O N

OF THE



A D V E R S A R I A

D I S T R I C T

OF THE
BY THE
OF THE

ILLUSTRISSIMIS, ET NOBILISSIMIS VIRIS
 BARTHOLOMÆO
 CASTELLINO
 J. U. D.
 VEXILLIFERO,
 ACCÆTERIS FOROLIVI
 CONSERVATORIBUS,
 OMNIQUE
 SENATUI FOROLIVIENSI

Joannes Baptista Morgagnus S. P. D.



SIQUIS Vestrum, PATRES ILLUSTRISSIMI, est forte miratus, me qui ita medicinam in Patria facerem, ut adolescenti adhuc neque magna ab Dei O. M. benignitate felicitas, neque a Civium omnium humanitate incredibilis quædam benevolentia deesset, repente huc ad profitendum venisse; is si mei consilii causam rationemque cognoverit, non dubito quin sit meum illud factum continuo, & facile probaturus. Est autem mihi altius ordiendum, & Majorum nostrorum memoria primum ex præclaro Historiæ Instauratore Blondo nostro repetenda. Hic igitur de sua, nostraque Patria verba faciens in iis qui Italiæ Illustratæ inscribuntur, libris, „ fuit, inquit, ea Civitas (quod procul a vanitate mendacii de Patria „ nostra sit dictum) „ viris præstantissimis, præsertim litteratis fecunda: quæ præ „ ter Gallum poetam, habuit Guidonem Bonattum astrologorum principem, habuitque Morgagni Adversaria Anat. VI. N. „ Rai-

„ Rainerium Arsendum iureconsultum celebrem , Bartholi Soxoferrantensis præceptorem ,
 „ & per eadem ferme tempora Checco Rubeo , & Nereo Morando viris doctissimis ,
 „ & Francisco Petrarchæ , sicut ipse in epistolis sæpe memorat , amicis ornata fuit .
 „ Excelluit vero per ætatem nostram Jacobus de Turre Forlivienſis cunctos philoso-
 „ phiam , medicinamque professos ; & Jacobi Allegretti Forlivienſis bucolicum car-
 „ men extare videmus , cæteris post Virgilianum eo in genere scriptis carminibus
 „ facile , ut periti iudicant , præponendum . Quid quod Ugolinus cognomine Urbeveta-
 „ nus Forlivii genitus , & nutritus omnes ætatis nostræ muscos sine contradictione su-
 „ perat , editusque ab eo de musica liber haud secus omnium qui ante se scripserunt ,
 „ labores obscurabit , quam Bonatti opera vetustissimorum scripta astrologorum seponi
 „ faciunt . Obiitque nuper Ludovicus Forlivienſis & episcopus , & civis , philosopho-
 „ rum ætatis nostræ , theologorumque facile princeps . Rei autem bellicæ gnaros , & in
 „ eo munere claros habuit Patria nostra Joannem Ordelaſsum , Brandolinum , & Tiber-
 „ tum Brandulos , ac Mostardam . Quæ etiam nunc ornata est Nicolao Hasteo Rea-
 „ natenſi ac Maceratenſi episcopo litteris , moribus , & bonitate conspicuo , pariterque
 „ ejus pronepote Stephano Nardino Camera Apostolicæ clerico doctrina , virtutibusque de-
 „ corato . Magnam item spem Dei Munere constitutam videmus in quinque Blondis na-
 „ tis nostris , qui litteris omnes pro ætate sunt pleni . „ Et hæc ille quidem eo tem-
 „ pore , qui si alterum tantummodo decennium vixisset , Nardinum in Amplissimum Colle-
 „ gium S. R. E. Cardinalium cooptatum vidisset : in quod sane iisdem de causis ut plu-
 „ res alii nostrorum Civium , inprimisque Azo Orgoliosus , mox vero Albertus , & Gre-
 „ gorius Theodoli ante Nardinum , ita post hunc primum Christophorus Numajus adscri-
 „ ptus est , uni-versæ Franciscanæ Familiæ (quod nemini præterea unquam contigit) Mi-
 „ nister Generalis ; in cujus ego Doctissimi Viri memoriam nunquam incurro , quin grato animo
 „ prosequar ejus immortalia , & certissimis documentis testata erga Abavum meum Augustinum
 „ Morgagnum Promerita , hic enim a Forlivienſi Senatu , Leone X. Pont. Max. suis
 „ id litteris ratum habente , auctore apud utrumque Christophoro , civitate donatus est .

Numajum autem ut meritis , sic pari Dignitate consecuti sunt Marius Theodolus , Fran-
 „ ciscus Pauluccius , Stephanus Augustinus , & quos ut nunc pariter vivere lætamur ,
 „ sic diu esse superstites , non modo nos qui utrique plurimum debemus , sed ob eo-
 „ rum eximias , & domi , forisque in maximis Muneribus , & Legationibus spectatissi-
 „ mas Virtutes boni omnes nobiscum optant , FABRICIUS PAULUCCIUS , &
 „ JULIUS PIAZZA . Sed neque post Blondum Docti alii Forlivienſes & Epi-
 „ scopi , & Cives defuere , & in his Thomas Hasteus , Petrus Joannes , & Simon A-
 „ leotti , & hoc quoque ipso tempore Thomas Taurellus : cujus non sanguine magis , quam
 „ doctrina , & virtute Fratrem Cosmum , Camertum Pontificem esse renunciatum , hæc
 „ dum scriberem , accepi . Præter quem , & duos quos nuperrime laudavi , Cardinales
 „ Amplissimos alterum Albanensis , alterum Faventina Ecclesiæ Antistites , & Fabricium
 „ Augustinum Amasæ Archiepiscopum , cum ego nondum annos octo & triginta natus ,
 „ Camillum etiam Piazza , C. S. Off. Assessorem , Draconiensis , Bernardinum Marchesium
 „ Sarfinatis , Petrum Gaddum Spoletinæ , Simonem Paulum Aleottum Civitatis Castel-
 „ lanæ , atque Hortanæ , Verulanæ autem Laurentium Tartagnum Præsules viderim ; hinc
 „ proclive est intelligere , quot tandem omni tempore aliis Ecclesiis doctos probatosque Episco-
 „ pos nostra dederit : quos inter singulari memoria dignus est Fabricius Pauluccius primus Ci-
 „ vitatis Plebis Antistes , qui sacros Libros tribus editis luculentis voluminibus explicavit .
 „ Juris autem consultissimos Viros ab Arsendi illius quem Blondus celebravit , temporibus ad
 „ hanc usque ætatem quot porro Urbs nostra protulerit , nemo facile memoraverit . Illud dicere
 „ satis est , eorum quos hætenus laudavimus , Præsulum in ea quoque scientia plerosque omnes
 „ excelluisse . His tamen nominatim addendi sunt Clemens S. R. Rot. Dec. , & Mercurialis
 „ Merlini (quorum immortalia vestigia magno nunc animo , ingenioque persequitur Camillus
 „ Mer-

Merlinus ab honore Sacr. Cubic. ac utr. Sign. Referendarius) Andreas Fachineus, Antonius Merenda, & denique ii quos ego vidi, Peregrinus Maserius Sign. Grat. & Justit. Dec. & Josephus Urceolus Magn. Etr. Duc. Aud. editis omnes celebratissimis Scriptis longe clarissimi. Quod nisi me Tua, VEXILLIFER ILLUSTRISIME, atque alterius Juris Prudentia, & Moribus Præstantis Viri spectatissima Modestia, cui gravis esse minime volo, cohiberet; Vestra etiam Scripta justis laudibus celebrarem. Verum quod ego ob istam causam prætermitto, a Posteris cumulatissime præstabitur. Hi pariter large supplebunt quod a me in præsentia eadem de causa omittitur, ut eruditissima scripta laudem tum aliorum Civium, tum Cl. inprimis Virorum qui in nostra Inclita Philergitarum Academia de Re Poetica, & de Italicae linguae proprietatibus docte, ingenioseque hac ætate disseruerunt. Superioribus autem sæculis ista ipsa studia Cives nostri maximopere coluere. Faustus enim Anderlinus, quem Ludovicus XII. Gallia Rex corona poetica donavit, Lutetia Parisiorum in celeberrima illa Academia eandem facultatem magna cum laude professus est. Multo quoque in honore a Maximiliano I. Cæsare, aliisque Principibus Viris ob eam, & oratoriam facultatem Joannes Franciscus Bertus habitus est is qui ob divitiarum contemptum a Præceptore Pomponio Læto Codri cognomen est nactus, Vir græce, latineque doctissimus. Palmerius autem his non contentus, Hebræorum quoque, Chaldaeorum, atque Arabum litteras mirifice calluit. Verum ut ad linguam nostram redeam; Italorum certe perpauci æque de ipsa ac M. Antonius Mambellus e Soc. Jesu, cognomento Cinonius, meriti sunt. Dies me citius deficeret, quam Civium nomina, qui excellenti aliqua laude floruerunt. Itaque ut eos omittam qui eximia aut Rei Militaris virtute, aut Architecturae peritia, aut pingendi scientia claruere, quo in genere Vir omnium qui nostra tempestate inprimis laudantur, summa cunctarum gentium consensione princeps Carolus Cignanus Eq. & Com. haud magis Bononiam, ubi natus est, quam Forum Livii, ubi diutius vivendo consenuit, & in Præstantissimum Ordinem jure meritoque est cooptatus, suam Patriam agnoscit, & vocat; ut hos, inquam, aliosque omittam, & de Claris dumtaxat Medicis pauca subjiciam; cum Majores nostri veteri, præclaroque instituto vel Summos Civitatis Honores Medicis patere, voluerint; minime propterea mirandum est, quod hæc omni tempore Viros in ea Scientia nobilissimos tulerit, & in his Gaddos, qui Pontificibus Maximis, & Lombardinos, ac Paduanos, qui Cæsaribus Medici assedere. Quinimo ex una ista Paduanorum Familia, tanquam ex equo Trojano, complures Viri sane lectissimi extiterunt. Nam præter P. Antonium, & Angelum, ac Franciscum, atque Alexandrum, quorum Scripta eruditissima adhuc in pluteis delitescent, perutilibus certe libris emissis jam diu apud omnes Fabricius, & ante hunc Helidæus Medicus longe Experientissimus inclaruere. Nec sua item laude aut Blasii Bernardi, Magni Etruriae Ducis Archiatri, aut Hieronymi Perlini Opuscula, aut Meldulensis quidem, sed tamen nostri quoque & incolæ, & Civis Vincentii Baronii, inscripti de Pleuripneumonia Libri caruerunt. Hieronymi autem Mercurialis nomen quis tandem, non dico Medicus, sed mediocriter litteratus ignorat? qui cum summa Rei Medicæ peritia tantam humaniorum quoque litterarum, totiusque antiquitatis notitiam conjunxit, ut cum tot aliorum Veterum Medicorum laudes quodammodo senuerint, ipsius fama adhuc floreat, & nunquam esse intermoritura videatur. Horum ego quos hætenus laudavi, Illustrium Virorum cum & nomina, & res gestas, & gloriam, quam non sibi magis quam Patriæ pepererunt, ab ineunte usque ætate dies noctesque mecum admirarer atque suspicerem, & in ipsos tanquam in domesticum quoddam speculum intuerer, cæpi in animum inducere ut promea virili experirer, tentaremque omnia, si forte quos ingenio assequi non possem, labore saltem, industriaque subsequerer. Cum igitur mea me natura ad Philosophica, & Medica studia potissimum traheret; in his autem Scientiis intelligerem ea subtilitate, peritia, diligentia, eruditione a nostris esse Majoribus elaboratum, ut si easdem vias insisterem, non nisi longissimo intervallo sequi possem; vidi facile, nihil aliud mihi esse reliqui, nisi ut siquam forte illi semitam intentatam reliquissent, hac ipse ingredi, eamque aperire in posterum nostris Civibus conarer. Occurrit igitur Rei Philosophicæ, & Medicæ Pars multo nobilissima

atque utilissima Anatomia, quæ ut certatim omni ferme tempore, & nostra præsertim, ac Patrum ætate, a cunctis propemodum Nationibus, imprimisque Italica diu, multumque, nec sine maxima gloria, exculta, ita, nescio quo fato, ab nemine, quod sciam, nostrorum Civium aut publice tradita, aut scriptis unquam est pertractata. Cujus ego, ut Bononiæ mature facere institueram, assiduo studio colendæ cum haud magnam in Patria facultatem invenirem; propterea libentius obtemperavi Immortali VENETORUM REIPUBLICÆ, quæ mihi in suum hoc Celeberrimum Gymnasium honestissimo Senatus Consulto, ante hos fere octo annos evocato, moxque Honoribus, & Præmiis liberaliter aucto Primariam hanc Anatomie Sedem concredidit. Qua in sparta, sive docendo, sive scribendo, pro meo modulo exornanda etsi fateor, nihil a me adhuc præstitum esse quod meis votis, nostræque Civitatis amplitudini respondeat; tamen si bonorum omnium largitor Deus vitam, viresque suffecerit, olim fortasse erunt qui dicant: quid? si alii ex eadem Urbe ingenio solertiaque præstantes Viri iisdem se Anatomie studiis dedissent; cum homo qui nihil ad Anatomem, nisi diligentiam laboremque attulit, nonnihil tamen egisse, nec postremus omnium fuisse videatur. Interea Vos omnes, PATRES ILLUSTRISSIMI, rogo atque obtestor, ut si me igitur a Patria corpore quidem, sed non animo & charitate disjunctum esse, intelligitis; Adversaria hæc Sexta quæ Vestris Inclytis Nominibus sacra esse, volui, tanquam meæ erga Civitatem nostram exiguum certe, sed tamen quo majus hoc tempore dare non possum, constantissimæ pietatis testimonium, eodem quo me semper vultu, eademque Benignitate excipiat. Valete.

D. Patavii Idibus Maji MDCCXIX.










Fig. IV.





JO. BAPTISTÆ MORGAGNI ADVERSARIA ANATOMICA

S E X T A

A D V. C L.

JO. JACOBUM MANGETUM

M. D. & Sereniss. Regis Prussiae Archiatrum.

ANIMADVERSIO I.



D postremum denique tui Operis Librum, V. Cl. ventum est; in quo si diligentius singula persequamur, verendum est nobis, ne vel propter ejus longitudinem, vel ob rerum dignitatem nullum propemodum scribendi finem reperi-

periamus. Itaque omnino videndum est, ut ex omnibus seligantur nonnulla, plura omittantur.

Et in primo quidem Capite nihil aliud a te peto, nisi ut ex iis quæ de Sinibus Duræ Meningis proposuisti, quædam mecum pro communi veri studio recognoscas. De Sinu Longitudinali minore, sive inferiore ita scribis, quasi non minus quam Superior & Laterales, semper occurreret, auctorem secutus (ut ex ejus pluribus de Dura Meninge verbis conjicio, quæ tua inter facile agnosco) Verheyenium. Sed etsi illo de Sinu hic idem credere videatur; nihil tamen esse tibi facilius potest, sive cæteros Anatomicos, sive (quod præstat) ipsam anatomen consulenti, quam sæpe abesse istum inferiorem Sinum, cognoscere. Quod autem addis: „Sinus Late-

„rales nihil aliud esse quam continuationem bifurcatam Sinus Longitudinalis, tam superioris, quam inferioris: eorumque alterum a bifurcationis prædictæ termino ad usque cranii prope basim descendendo in Venam Jugularem internam dextram aperiri; alterum vero in ejusdem nominis venam sinistram; „nimirum si ego contra dicam primum, aut istud prope redundare, aut aliquid errore Operarum omissum esse; quin tu ipse continuo annuas, nequaquam dubito; præclare enim nosti, Laterales Sinus non modo ad cranii basim usque descendere, sed inde mediam versus basim ulterius pergere. Pariter si dicam, Laterales Sinus haud satis recte „continuationem Sinus Longitudinalis inferioris „censeri; neminem repugnaturum esse, puto; constat enim, hunc Sinum, cum adest, non in superioris Longitudinalis finem, sed longe ab hoc in quartum influere solere. At si dicam, ne illud quidem satis tuto affirmari posse: „Sinus „Laterales nihil aliud esse quam continuationem „bifurcatam Sinus Longitudinalis Superioris; „etsi verum dicam, non tamen mirabor, si tu forte, & plerique alii haud ita facile assentimini; propterea quia tot inter Anatomicorum seu De-

scriptiones vix ulla, seu Figuras nulla; quod meminim; invenitur, quæ tibi non faveat, mihi autem non adversetur. Attamen ex quatuordecim quæ continenter secui, cadaveribus, quatuor, haud amplius, fuere, in quibus Laterales Sinus essent *continuatio bifurcata Sinus Longitudinalis superioris*; in reliquis autem decem tantum aberat, ut is bifariam, æqualiterque in Laterales divideretur; jam supra *Torcular* in alterum latum evidentissime deflectebat, totusque adeo ejusdem lateris Sinui continuabatur. Quocum Sinu quæ ratione Lateralis alter communicaret, eo libentius adscribam, quo minus aliquem legisse memin, qui rem, alioqui usque adeo sæpe, atque in tam nobili membro occurrentem, descripserit. Sed illud primum habendum est, observatum esse a nobis, eum Sinum in quem Longitudinalis totus producit, frequentissime esse dexterum; nam ex decem illis cadaveribus unum modo fuit, in quo is produceretur in sinistram. Igitur in sinistro pariete Sinus dexteri, ab Longitudinali jam deflectentis, orificium habebat in aliis angustius, in aliis latius, in nonnullis duplex etiam, vel triplex, sed inæquale, in plerisque autem circumjecta, a tergo potissimum, substantia crassa firmatum, eaque non pauca, atque ita densa, firmaque, ut ex tendineis, carneisque fibris inter se arctissime implexis compacta esse videretur. Id orificium sinistri Sinus initium erat. Eiusdem tamen substantiæ firmitudine, & viribus posticam præsertim *Torcularis* partem instructam vidi, etiam cum hoc ea ratione se haberet, qua vulgo credunt semper esse dispositum, hoc est cum Longitudinalis Sinus bifariam in Laterales divideretur. Quinimo cum in duobus cadaveribus infra eam divisionem Lateralis uterque Sinus per canalem transversum communicarent, memoria teneo, in primo quidquid inter ejus divisionis locum, & hunc canalem spatii erat, in altero canalisi parietem posteriorem ejusmodi substantia instructum fuisse. In medio autem transversu hujusce canalisi, Sinus quartus in altero uno, in altero gemino orificio desinebat, quem uno alioqui plerumque vidi in sinistro Laterali Sinu prope hujus initium desinentem; neque enim semper, quod tu, Vir Cl. cum cæteris Anatomicis credere videris, imo ne ut plurimum quidem, *in extremitate Longitudinalis apertum* observavi.

*De fine
QuarriSi-
nis.*

TOM. II.
pag.
267.

L. I. tr. 4.
c. 4.

268

*De Sinuum
Later-
alium ini-
tio, & in-
ter se com-
municatio-
ne.*

Morgagni Adversaria Anat. VI.

N 3

ANI-

ANIMADVERSIO II.

Sinus Posterior.

Cæterum in pluribus cadaveribus, quocunque desineret Sinus quartus, prope hunc pariter desinentem inveni alium Sinum, ab nemine; quod sciam; descriptum, a me vero ob eamquam obtinet, sedem, *Posteriorem* nuncupatum. In ipsa enim media & posteriore cranii parte a *Torculari* ad magnum ossis occipitis foramen processus osseus assurgit, quem Dura Meninx succingens, inde & ipsa in processum introrsum curvatur, in aliis magis, in aliis autem minus antrorsum dilatatum, atque extantem, quo cerebellum in duo quasi hemisphæria dirimitur. Per hunc igitur membranofum processum Posterior ille Sinus ascendit, eo quo dictum est, influens; in vicinia autem magni occipitis foraminis initium capiens, & ex venis quæ ad ea, & superiora deinceps loca pertinent, cruorem adducens. Unius loco, & alterutrum quidem latus illius processus haud raro tenentis, duos aliquando Sinus, singulos per singula ejus latera pergentes observavi. Etsi vero de septendecim capitibus in quibus hunc Sinum perquisivi, quinque fuerunt, in quibus nihil ipsius, nisi exigua intra *Torcular* orificia, eaque non ita alte specillum admittentia, & quatuor item, in quibus ne hæc quidem orificia conspexi; quoniam tamen in reliquis octo longe ipse conspicuus fuit, non vidi profecto, cur hujus descriptionem omitterem, quando Longitudinalis Inferior Sinus passim ab Anatomicis celebratur, qui neque, ut dixi, perpetuus, & magna ex parte hoc Posterior est angustior. Accedit conformationis certa ratio; nostri enim Sinus cavitatem, non a conica superficie, sed ab lateribus inter se ad angulos conjunctis sæpe vidimus comprehendere, atque adeo interdum etiam a membranofis quibusdam ligamentis e transverso extantibus, qualia in majoribus Sinibus (quamvis non ita semper crebra, & insignia, ut plerique credere videntur) extare solent, communiri. Quæ quidem addere volumus, ne dubitare quis posset, nos forte communem aliquam venam pro Sinu peculiari proposuisse.

ANIMADVERSIO III.

De aliis Sinibus.

Prope hunc Sinum duos quoque alios vidi in *Torcular* influentes, qui per Transversum Meningis Duræ Processum ferebantur. Quos etsi pariter describendos esse, nequaquam censeo, quippe quos non pluries conspexi; veros tamen Sinus fuisse, non dubito cum aliis de causis, tum quia transversæ eorum sectiones minime erant circulares, sed ea prorsus figura quam in sectionibus aliorum Sinuum Cl. Valsalva esse, monuit. Quod quidem monitum aut in tua ista de Sinibus tractatione, aut in Explicationibus Tabulæ huic respondentis XCII. commemorare potuisses. Sed & alterum Solertissimi Viri monitum de figura *Specuum* GG, quas in memoratæ Tabulæ Figura 1. repræsentas, ibi erat pariter indicandum. Quo de Iconismo quoniam verba facere forte cœpimus; vide, quæso, quid in eo describendo a tuo Scalptore sit omissum. Præclare nosti, Doctissimum ejus Iconismi Auctorem in ea sententia esse (jure, an secus, in præsentia non disquirō) quam in Explicatione etiam exponit, videlicet Arteriarum Crassæ Meningis KKKK *propagines aliquas in Sinum Longitudinalem aperiri*. Id ejus Archetypus luculenter monstrat, ut in quo eæ propagines ad puncta ad utrumque Sinus Longitudinalis limbum posita, eumque ingressum indicantia pertingunt. Tuus autem Scalptor neque omnes earum ramusculos describit, & quos describit, eos procul ab iis limbis finitos ostendit. Porro si Cl. Pacchionus Figuram 3. & 4. cum Archetypis suis elaboratissimis comparcet, quantum ab horum non modo elegantia, verum etiam perspicuitate, & quod gravius est, verita-

te distent, prima statim inspectione intelliget; nonnullas enim deesse glandulas, chordarum autem alias deesse, alias crassiores, alias contra tenuiores ostendi, perspiciet. Quod si istas Explicationes cum autographo suo conferat, erit etiam aliquid quod omissum, mutatumve compertiet.

ANIMADVERSIO IV.

Pura tamen, fateor, nec levis sæpe momenti sunt, quæ in Ridleyi Opere omissa, ac mutata esse, video. Nam; ut de ista primum ipsius Figuræ 2. Explicatione verba faciam; ex te, Ornatissime Vir, quæro, addiderit Ridleyus, an non ad explicationem litterarum *l l*. iudicium quoddam anatomicum in hanc ferme sententiam: „contra quam se habet Vasorum conformatio „quam memorat Vieussenius in tertia sua Tabula HH. „Si ipse non addidit; cur verba hæc in Bibliotheca tua Anatomica posueras? Si verò addidit; cur in Theatro nunc omittuntur? At eorum etiam, quos laudat, vel impugnat, Auctorum libros, & paginas certe Vir eruditissimus passim in libri sui ora magno Lectorum commodo, ipse, ut opinor, adscripserat. Hæc tamen, atque alia ejusmodi omnia in Theatro frustra perquirimus. Quot vero Ridleyi loca aliter istic, quam in Bibliotheca Anatomica, legantur, tuum hoc utrumque Opus hac in parte, atque adeo vel in ista solum Explicatione conferentibus proclive erit intelligere. Et malim quidem existimare, hæc mutata esse in Theatro loca, ut ad Auctoris mentem sententiamque propius accedant. Attamen facilius crediderim, Ridleyum in hanc sententiam scripsisse: „quapropter „etiam confugere cogitur ad exiguos illos Venarum „ramulos qui ramos comitantur quos emittit Arteria Carotis, antequam Duram Matrem perforaret, cum Opticis Nervis: „ut in Bibliotheca lego, quam: „sed pro hac sanguinis eliminatione adhibet exiguos illos Venarum stolonos „quos emittit Arteria Carotis, antequam Duram Matrem perforaret, quique Opticos Nervos comitantur: „ut lego in Theatro. Illud quoque difficile in animum induco, Ridleyum censuisse, de quatuor Sinibus equinæ sellæ adjacentibus „duos priores *eo quod* longiores & angustiores sint, Superiores vocari; „hæc tamen verba pariter & ad eundem prorsus modum in Bibliotheca, atque in Theatro comperio. Cætera quibus plus est temporis, atque otii, indagabunt; mihi autem pro veri studio, & suscepti operis lege hæc indicasse satis erit, ut hinc Lectores admoniti istam præsertim Theatri partem cautius legant, & siqua forte minus probent, diligenter videant, atque ex illis etiam, qui non carent anglico Ridleyi autographo (quod ipse adhuc videre non potui) sciscitentur, an sæpe ii potius, qui vel latine reddiderunt, vel typis descripserunt, quam doctissimus Auctor culpandus sit.

303

302

ANIMADVERSIO V.

Neque dissimili ratione ea loca examinari ante, volumus, in quibus nos aliquid notabimus, velut hunc: Arteriarum Carotidum *curvum* per cranium *trajectum* in Figura Doct. Willis optime *exprimi*. Ego enim; ut alia nunc mittam; haud sane video, quomodo quæ Figura Arteriæ Carotidis curvaturas dumtaxat exhibet, quæ secundum lineam quæ ad perpendicularum est, contingunt, ea curvaturas illius arteriæ optime exprimat. Est enim illa arteria, dum cranii substantiam trajicit, etiam in transversum curvata: quod Lowerus altera Figura quæ ipsam, non ut Willisius a latere, verum a tergo spectandam præbet, repræsentandum curavit; quanquam neque hæc certe optima est. Et hæc quidem de utraque Carotide. Ambæ autem Vertebrales Arteriæ postquam in unum truncum convenere, a Cl. Vieussenio Arteriam Cervicalem dictum, & sic

300.
De Arteriarum Carotidum in cranii trajectu curvaturis.

Tract. de Corde.

301

Tab. 24.
Fig. 4.
De ipsarum
cum ramu-
lis Cervi-
calis com-
municatio-
ne.

Nevrogr.
l. 1. c. 6.

sic per Annularem Processum excurrere, „ exin-
„ de hæc Arteria dicitur duos emittere ramos,
„ seu potius eos accipere a Carotide. „ Si Willisii
delineatio quam multi sequuntur, & in his et-
iam Verheyenius, quamque adeo tu ipse postea
affers Tab. XCVI. Fig. 1. si illa, inquam, deli-
neatio probanda esset, nihil verius dici potuerat.
At ego ita observare soleo, ut tu idem in Tab.
XCIX. Fig. 1. ex Diligentissimo Ruyſchio deli-
neas, videlicet duos illos ramusculos nequaquam
ab ipso cervicalis arteriæ trunco, sed ab duobus
anterioribus hujus ramis proficisci, hisce ipsiste-
nujores. Quæ cum Ridleyus non ignoraret,
ut ejus Figura ostendit, quæ tibi 1. est in Tab.
XCVIII., mirari profecto subit, quomodo in hac
descriptione longe minus Vieussenio diligens esse
potuerit. At certe nec magnam illam, & iis
qui Willisii, aut Verheyenii Iconismis utun-
tur, pene incredibilem, eorundem ramusculorum
angustiam ignorabat, ut quam paulo infra, at-
que alibi etiam inculcat. Attamen quasi iidem
ramusculi non minores essent iis quos Willisius
delineat; per hos (utinam saltem addidisset, in
ejusmodi casibus sensim dilatatos) absolute con-
tingere, affirmat, ut quamvis etiam tres ex qua-
„ tuor majoribus Arteriis quæ Cerebro sangui-
„ nem suppeditant, totaliter obstruerentur, via
„ nihilominus superesset ad sanguinis competen-
„ tem subministrationem ab alia quarta quæ sine
„ obstructione servaretur. „ Ceterum Ridleyi ju-
dicio prorsus digna sunt, quæ continuo subji-
ciuntur: hos ramos *peffime depictos esse in Bidloi
Tabula nona; sed scitissime in Vieussenii quarta.*
Quo in loco dabis mihi hanc veniam, Vir Do-
ctissime, ut eos qui Theatro tuo sunt usuri, can-
dide, admoneam, hanc quam Auctor merito re-
prehendit, Bidloi Figuram istam ipsam esse, quam
tu in Tabula XCVI. num. 3. producis; hanc ve-
ro, quam pari jure vicissim laudat, Figuram
Vieussenii istam quidem esse, quæ num. 1. in tua
Tab. XCVII. exhibetur; verum in ea ipsa re,
propter quam laudatur, usque adeo a Scalptori-
bus depravatam, ut ii de quibus loquimur, ra-
muli ad litteras *bb* picti, non modo exilitatem
eorum quos Cl. Vieussenius proposuerat, sed &
amplitudinem superent illorum (*ee*) qui his
emissis, utrinque ad latera ulterius pergunt, quan-
quam illos iidem Scalptores ita amplificaverint,
ut in eorum explicatione id fortasse omittere po-
tuissem, quod Vieussenius monuerat: eosdem *hic
paulo majores quam par sit, representari.* Sed &
locus, unde ramusculum præsertim dextrum emit-
tunt, non parum sane mutatus est. Verum
nunc quidem ad Ridleyum redeamus.

ANIMADVERSI O VI.

302

De Rece-
ptaculis ad
Sellam E-
quinam.

Anthro-
pogr. l. 4.
cap. 2.

303

Hist. Part.
Diff. 20.

Permirum est, si revera Anatomico non modo
tam solerti, verum etiam tam erudito illud
excidit: „ quod attinet ad Vieussenii Receptacu-
„ la, certum est ea nusquam existere in Cerebris
„ humanis, prout ipse eadem describit. „ Nam
quod addit: „ ipsam quoque totam Duram Ma-
„ trem - in illa regione arcte adhærere Basi sub-
„ jacentis Ossis; „ nimirum veteres etiam Ana-
tomici hoc a vero alienum esse, sciebant, ut osten-
dit Riolanus, quem in illa regione agnovisse Re-
ceptacula, animadverto, quæ *Fossulas* nuncupavit.
„ *Discissa*, inquit, *ac revulsa dura meninge, quæ
circumdat sellam equinam, fossulas invenies innu-
meris arteriis refertas, quæ Retis Mirabilis na-
turam præ se ferunt.* Quod autem Ridleyus
subjicit: „ in plurimis injectionibus quas adhi-
„ buit ad Partium usum investigandum, ne gut-
„ tulam quidem tinctorum liquorum unquam de-
„ prehensisse in illo Carotidis Arteriæ latere in
„ quo Receptaculorum istorum situm designavit
„ *Vieussenius*; „ contra Ortobius, cera viridi
in Sinus injecta, singulos ibi in singulis lateribus
magnos quosdam Sinus, quos ego ex ejus Figura
conjicio, ipsa fuisse Receptacula, implevit.
Morgagni Adversaria Anat. VI.

Sed ne Eximium Virum, ipsius autographo non
inspecto, quasi indicta causa, damnare videamur;
juvat potius quædam alia quæ de Sinuum usu
consequuntur, nostris observationibus confirmare.
„ Cæcæ Sinus Longitudinalis Cavitates seu Di-
„ verticula inservire dicuntur moderando nimium
„ veloci seu violento sanguinis motui. „ Eodem
ego pertinere censeo, etiam Cavitates alias quas-
dam apertas. Observavi namque in Sinibus qui-
busdam Longitudinalibus, nonnunquam in pluri-
bus, alias in uno dumtaxat loco, addito intrin-
secus ad alterutrum latus pariete peculiari per tra-
ctum, vel duorum interdum transversorum digi-
torum duplicari Sinum: quod quidem semel et-
iam in Sinu quarto conspexisse, memini. Ad-
ditur, eundem sanguinis motum „ etiam multo
„ magis retardari in supino Corporis situ - con-
„ currente Sinuum Lateralium structura, quæ ta-
„ lis est ut in prædicta positura sanguis cogatur
„ sursum ascendere antequam devenire possit ad lo-
„ cum descensus sui in Venam Jugularem. „ Sane
in erecto quoque corporis situ aliquid sanguini
objectum est, quo minus possit ex Sinibus Late-
ralibus rapidiore cursu in eum locum devolvi;
nam priusquam huc deveniat, ascendere cogitur
per extremam eorundem Sinuum partem, quæ vi-
delicet, ut pars calvariae subjecta, est acclivis, ve-
lut a Cl. Valsalva pictum est.

303.

Sinuum
Duplica-
tiones.

304

Tabula
CVII.
Fig. 2.

ANIMADVERSI O VII.

Porro Auctor cum Peritissimis tum superio-
rum, tum hujus ætatis Anatomicis nequa-
quam dubitat, veras Glandulas Plexui Choroidi
esse interjectas. At „ secundum Clariss. Rhuyf-
„ chium; „ ut tu, Eruditissime Vir, adnotas;
„ Plexus Choroidæus nullis donatur glandulis; sed
„ quidquid sub glandulositate apparentia aliquibus
„ imposuit, oritur a contorsione vasorum, „ quæ
videlicet; ut Diligentissimi Actorum Eruditorum
Scriptores in hac ejus exponenda sententia loquun-
tur; „ propter gyrulos anfractuosos glandulas
„ mentiuntur. - Hydatides namque sæpe in ple-
„ xu choroideo obviæ non nisi vascula sunt san-
„ guinea sero turgida. „ Ego quidem adversus
Eximii Professoris sententiam nihil hic statuam.
Memini tamen, cum ejusdem Plexus particulam
ex sanissimo capite desumptam lumini objecissem,
& microscopio adjutus spectassem, elegantissimas
vidisse variæ magnitudinis vesiculas in racemos
quasi quosdam collectas, easque a sanguiferis, quæ
circum repebant, tenuissimis vasculis satis distin-
ctas. Eadem alii quoque ex Venetis Amicis per-
spexere. Tu igitur, V. Cl. judicabis, num
veri similis sit, hydatides istas vascula esse
sanguifera sero turgida, an quasdam ex iis vesicu-
lis, seu mavis glandulis ab incluso humore dila-
tatas. Dispicies quoque, cur earundem hyda-
tidum maximæ sæpius, & præcipue; ut mihi qui-
dem observare contigit; in ea Plexuum parte oc-
currant, quæ in postrema lateralium Ventriculo-
rum concameratione delitescit.

De Glandulis
Plexus Cho-
roidis.

305

A. 1699.
M. Nov.

ANIMADVERSI O VIII.

Quæ autem de Retis Mirabilis origine, & in
humanis capitibus existentia a Ridleyo sub-
jiciuntur, vide, obsecro, ut ab iis discre-
pent, quæ in Bibliotheca Anatomica ex eodem
proposita sunt initio Capitis VIII. qui locus vi-
delicet huic loco respondet. Ibi enim de Retis
existentia primum, tum de origine verba facit;
hic autem contra: & quod gravius est, ibi „ Non
„ obstantibus, inquit, opinionibus cum Recen-
„ tiorum Wepferi, Willis, & Vieussenii simili-
„ ter - tum etiam fere Veterum omnis, scilicet Ve-
„ salium, Columbi &c. Ego contra hujusmodi Re-
„ te nec ab ullo homine abesse, nec ulla difficul-
„ tate laborare manifestationem illius, unquam
„ deprehendi. „ hic vero „ Nullo non tempore,
N 4 „ in-

305.

„ inquit, & quidem absque difficultate in hominibus semper inveni, quamquam recentiores, „ Wepferus, Willisius, & Vieussenius, una cum „ veteribus Anatomicis omnibus, ut Vesalio, „ Columbo &c. contrarium asserant. „ Mihi sane multo verisimilius videtur ab Doctissimo Viro scriptum esse, fere Veterum omnes, quam veteres Anatomicos omnes contrarium asseruisse. Nam ut locum Riolani, quem produximus supra, minime vidisset, num loca etiam Nicolai Massæ, & Jacobi Sylvii (ut alios nunc omitam) qui idem Rete in homine extare, & qua ratione inquiri debeat, tradidere, hominem eruditissimum ignorasse, censebimus? Et hæc quidem, cum anglico Ridleyi exemplari caream, non nisi per conjecturam attingo. In ea vero, quæ de Glandula Pituitaria ex Præclaro Anatomico Littrio in Adnotatione quadam subjicis, non ego modo, sed quicumque Commentarium illius consulent, affirmare non dubitabunt, quædam ab Auctoris sententia aliena vitio eorum irrepsisse, quorum opera in illius verbis latine reddendis usus es. Neque enim credere unquam possim, te linguæ gallicæ peritissimum non intellexisse, quæ laudatissimus Auctor scribit de parte, seu mavis lamina Duræ Meningis inferiore Sellam Equinam investiente, ad hunc fere modum verti debuisse: „ Inferior cavitatem investit, inferna facie ossi adhæret, superna fossulam efficit, atque intra suam crassitiem, ad cavitatis medium, Sinum efformat quinque lineas longum, unam latum, in transversum; si spectes capitis figuram; positum, quem propterea transversalem nuncupabo. Fossula autem in posteriore sellæ parte sita est: ejus marginum latera pluribus foraminulis pertunduntur, atque ipsa aliquando per unum, vel alterum aliud foraminulum cum Duræ Matris Sinu communicat, qui pone apophysim clinoidem posteriorem est situs. „ Hæc autem in tua ista Adnotatione sic reddita sunt: „ Inferior cavitatis prædictæ fundum investit & in propria sua crassitie, secundum ejusce cavitatis medium, fossulam transversaliter efformat, in qua elevatur Sinus quinque lineas longus, ac unam latus, cujus latera pluribus foraminibus pertunduntur, per quorum quædam cum alio Sinu pone Apophysim Clinoidem sito communicat. „ At si ille Sinus in fossula elevatur; quomodo infra Auctor scribat de cinerea & posteriore Glandulæ Pituitariæ parte, „ intra eam fossulam sita est de qua supra diximus: „ membrana autem eam fossulam efformans, in hac cineream portionem firmiter annexam retinet, eamque a rubea altera portione ex parte separat, se se inter utramque insinuando; „ neque enim ipse non parum separare dixit. Verum hoc, atque alia quædam ejusmodi prætermittamus.

ANIMADVERSIO IX.

309 **Q**UOD autem in proxima Adnotatione memoras, observasse te, Glandulam Pinealem in cervis quidem esse cavam, & e multis minutissimis glandulis conflata; an vero in aliis etiam animalibus, te præ experimentorum defectu dubium adhuc habere: ego sane ut tuam in observando sedulitatem, ita in judicio suspendendo prudentiam laudo. Vidi tamen anno superiore in mulieris cerebro, in quo ea glandula æquo major, firmior, & substantia cerebri corticali, cui sæpius ferme similem conspexi, longe albidior erat, vidi, inquam, intra ipsam quosdam quasi loculos, substantiam autem ejusmodi, ut manifeste glandulosa esse videretur. Porro tres calculi quos in eadem reperisse, addis, Celeberrimum Ruyschium, ut in Thesauro habet Anatomico quinto; sive calculi revera fuerint, ut ab aliis habiti erant (fuerant enim Ruyschio dono dati) sive, ut ipse mavult, officula; illud certum est, & adnotatione dignum, intra hanc glandulam exiguum corpus durum, subflavum, & nonnihil asperum

Vid. etiam apud Riolan. loc. cit.

307 Mémoires de l'Acad. R. des Sc. A. 1707.

De Glandula Pineali.

sapissime reperiri, ut Exercitatissimus Vieussenius observavit, & nos quoque pluries invenimus, qui præterea in viro quodam Bononiensi totam fere glandulam ex flava, duriuscula, sed friabili materia constantem deprehendimus. Aqua vero turgidam non ipsi modo pluries vidimus, sed in Patavino etiam Theatro aliquoties ostendimus sic ut comparata cum proximis Plexus Choroidis (ut plerisque, & fortasse recte, vocare diximus) Glandulis, quæ in iisdem cerebris aqua pariter distentæ erant, nulla ab iis ratione differret. Cui rei si addas arctam illam quam cum eodem Plexu ipsa habet connexionem, propter quam fit, ut eum elevando ipsa quoque elevari soleat, admiratione dignam censebis Caspari Bauhini sententiam, qui cum Pinealem glandularum hujus Plexus maximam dixerit, vel ea ætate de conditione hujus glandulæ idem sensisse videri potest, quod nostra Ridleyus: non differre scilicet a conditione cæterarum quæ in Plexu Choroide occurrunt. Cæterum nequaquam me fugit quam peculiari ratione Pinealis Glandula ei potissimum tractui medullari qui transversus ducitur ante Nativiformes Protuberantias, continetur. Itaque de ejus natura, & quod consequitur, officio amplius quærendum esse, puto.

Nevrogr. l. 1. c. 11.

Institut. Anatomic.

ANIMADVERSIO X.

JAM vero ut ad Ridleyum redeamus; quod hic docet, Septum Lucidum esse intermedium Corpori Calloso & subjacenti Fornici, id quidem verum est; sed tamen etiam qua Fornix non substernitur, antrorsum aliquantum procurrit. Magis autem hæreo in proximo quodam loco in quo de nervorum opticorum Thalamis scribit: eorum „ Summitates seu Juga conjungi, ut recte „ adnotavit Vieussenius, in hoc Willisio contrarius cujus Figuræ quoad partem istam falsissimæ sunt. „ Non hic quæram, cur tamen istas ipsas Willisii Figuras tuis Lectoribus proponas; illud potius inquiram, quid sibi iis verbis Ridleyus voluerit. Igitur Willisius „ Medullæ oblongatæ crura hic loci in homine ut plurimum, „ inquit, esse prorsus distincta, & ab invicem dehiscentia, aperturam declivem quæ ad infundibulum transitus est, relinquere. „ Cl. autem Vieussenius de iisdem scribit: „ medullaris ipsis „ interjecti tractus, & tertii ventriculi lacunaris „ interventu, in homine semper conjuncta reperiri asseremus, cum bona venia Cl. Willisii, „ qui Anatomes cerebri c. 2. ipsa ut plurimum dehiscentia, & prorsus distincta esse dicit. „ Si igitur Ridleyus adversus Willisium hac in re Vieussenio adstipulatur; necesse est, ut eadem medullaris ipsis interjecti tractus, & tertii ventriculi lacunaris, vel certe alterutrius interventu conjuncta esse, agnoscat. At supra, per eum medullarem tractum conjungi, non obscure negavit, ubi hæc scripsit: „ A Vieussenio vocatur Tractus Medullaris Nervorum Opticorum Thalamis interjectus „ quasi unicus is esset, ut etiam sic ab ipso delinatus est; sed re vera geminus est, unus scilicet in utroque latere. „ Hic autem nullum tertii ventriculi lacunar videtur agnoscere; nam neque describit, & quo in loco ipsum a Vieussenio statuitur, paulo ante esse, dixit, „ Rimam quæ „ a Fornice tegitur, & dividit Crura Medullæ „ Oblongatæ, & tertium facit Ventriculum. „ In hac tanta Vieussenii a Willisio, & Ridleyi, ut videtur, a se ipso discrepantia necessarium prorsus esse, duxi, ut quid hac de re habendum esset, per anatomen inquirerem; & nisi omnia me fefellerunt, deprehendere tandem visus sum, Naturam ipsam hac in re sibi non constare. Quod antequam exponam, juvabit hic pauca Vieussenii verba describere, ne cum apud te neque lacunaris tertii ventriculi descriptio, neque aut ejusdem ulla, aut ipsius tertii ventriculi perspicua imago in proximis quas addis, Tabulis occurrat, Lectorum multi forte hæreant, & qua de re hic disputemus, haud satis assequan-

315

315.

Cerebri. Anat. c. 2.

Nevrogr. l. 1. c. 11.

309.

314.

loc. cit. quantur. „ Tertius ventriculus, inquit Cl. Vieuss-
 „ senius, est cavitas rimæ majusculæ æmula, ner-
 „ vorum opticorum thalamis seu medullæ oblon-
 „ gatae cruribus intermedia, cujus supernam par-
 „ tem cinerea mollisque substantia lacunaris adin-
 „ star obtegit; proindeque ipsam lacunaris nomi-
 „ ne donamus. Cinerea vero hujusmodi substan-
 „ tia, cui supra descriptus tractus medullaris in-
 „ cumbit, & unitur: ubi nervorum opticorum
 „ thalami, qui scilicet ipsius interventu simul
 „ uniuntur, ab invicem sejunguntur: præ nimia
 „ mollitie facillime divellitur, ejusque divulsæ
 „ partes in utroque tertii ventriculi latere, adeo
 „ in semetipsas contrahuntur, ut vix appareant. „
 De Lacunari Ventriculi tertii. Ego igitur istud Lacunar quod Diligentissimus Vir
 describit, pluries conspexi ab summis thalamo-
 rum, quos conjungebat, lateribus deorsum pau-
 lulum incurvatum: quinimo aliquando duo vidi,
 alterum alteri subjectum, quorum superius cum
 tractum medullarem esse, credidissim, nisi hunc
 lacunari incumbere, & uniri, dixisset, illud ve-
 ro a subjecto prorsus sejunctum apparuisset. Et
 quando duplex hoc lacunar memoravi, addam,
 me sub eo proximo meatu quem vocant transitum
 ad quartum ventriculum, meatum aliquando al-
 terum conspexisse. Verum qui id lacunar & plu-
 ries, & duplex interdum vidisse me, fateor,
 idem ajo, in quibusdam cerebris vix transversam
 laminam cineream, lacunari multo brevior, non
 summa thalamorum latera, sed mediam, se-
 cundum altitudinem tertii ventriculi, horum par-
 tem connectentem, quam nemo; quod sciam;
 memoravit; in nonnullis autem nec volam, nec
 vestigium aut lacunaris, aut descriptæ transversæ
 laminæ ullo pacto a me videri potuisse. Ne ve-
 ro ob allata Vieusseni verba de facillima partium
 lacunaris divulsione, ac divulsarum in se contra-
 ctione, ut vix postea appareant, aliquis forte
 suspicaretur, me in cerebris præ nimia partium
 mollitie, & laxitate diffluentibus, dum ea depo-
 nerem, & versarem, id lacunar ante divulsisse,
 quam ad ipsum inquirendum pervenirem; haud
 alienum erit monere, id mihi vel in cerebris con-
 tigisse, quæ cum per se optime constituta erant,
 & satis consistentia, tum a me lenta suspensaque
 manu in sua ipsa sede incidebantur. Consuevi
 enim Cerebrum in sede plerumque sua dissecare
 propterea quia animadverti, ipso depositi cerebri
 pondere, ac coincidentia plures ejus partes ab eo
 quem secundum naturam habebant, positu dimo-
 veri, velut ipsos de quibus loquimur, nervorum
 opticorum Thalamos, & Corpora Striata. Scili-
 cet hæ Protuberantiæ, cerebro intra cranii latera
 adhuc coercito, non ut in plerisque videmus Fi-
 guris, quæ nimirum cerebro extra suam sedem
 evulso descriptæ sunt, non, inquam, basim dum-
 taxat anteriorum ventriculorum, verum & latera
 magna ex parte constituunt. Quo fit, ut iidem
 ventriculi multo revera angustiores sint, quam in
 deposito cerebro apparent, & siquid in ipsis re-
 dundat humoris, majori utrinque per eorum la-
 tera, & basim declivitate ad tertium ventricu-
 lum defluat.

ANIMADVERSI O XI.

317.

Porro quod Ridleyus de Cerebello conscribit,
 videlicet „ a Cerebro in corticali sua stru-
 „ ctura differre, quandoquidem ejus interstitia
 „ sunt elliptica, seu imperfectorum Circulorum
 „ segmenta; „ id quidem est verum. Illud tamen
 addendum est, si leniter immisso in ea interstitia
 scalpelli manubriolo Circuli a Circulis diducan-
 tur, horum alios ad plus minusve exiguum spa-
 tium, alios vero altissime intra ipsam Cerebelli
 molem productos inveniri. Eorum autem, qui
 altissime producuntur, si ea facies inspiciatur,
 quæ proximi Circuli faciem respicit, eam pari-
 ter universam in plura aliorum quasi Circulorum,
 alibi quod parallela sint, alibi quod mirifice in-
 ter se conferta, aut ab una earum facierum in

alteram producta, haud inelegantia segmenta as-
 surgere sic ut qui hæc profundiora interstitia non
 diducunt, ii minimam tantum eorum Circulo-
 rum partem videant, in quos tota Cerebelli su-
 perficies est distributa, atque adeo longe maxi-
 mam, atque incredibilem ejusdem superficiei, &
 quod consequitur, corticalis Cerebelli substantiæ
 extensionem ignorent. Porro intra singulos hosce
 corticales Circulos, singuli, sed longe tenuiores,
 medullares Circuli sunt inclusi: qui cum eadem
 ratione atque corticales illi disponantur; ex hoc
 structuræ modo efficitur, ut Cerebello per me-
 dium, ad perpendicularum secto, medullarium qui-
 dem Circulorum sectiones illam candidarum ar-
 buscularum similitudinem efficiant, sectiones au-
 tem corticalium circumjecta iisdem arbusculis
 quasi folia æmulentur. Hæc cum scripsissem,
 Observationem legi de admiranda Cerebelli stru-
 ctura ab Solertissimo Viro Laurentio Heistero
 nuperrime editam, in qua has potissimum, de
 quibus modo dictum est, sectiones attendens,
 quæ nos folia, ipse lobulos vocat, & qui nobis
 essent ultimi arbuscularum ramusculi, ipse ad
 Malpighii normam tanquam ductulos excretorios
 singulis lobulis inservientes esse, indicat. Sectio-
 nes autem Circulorum altiorum una cum sectio-
 nibus aliorum Circulorum in quos ab lateribus
 assurgunt, spectatas, lobos appellat: hujusque
 structuræ usum assignat. Tum sectiones hæc
 omnes elegantissima Figura ostendit, & modum
 præterea edocet, quo intra noctis ferme spatium
 Cerebellum ita præparari possit, ut ejus inter-
 stitia omnia per se diducantur. Quod quidem
 artificium etsi ob facilitatem summopere laudan-
 dum est; mei tamen Auditores probe norunt,
 quoties superiore tempore ea omnia quæ supra
 descripsi, vel sine eo adjumento sic satis ipsis de-
 monstraverim.

ANIMADVERSI O XII.

Vagi Nervorum Paris exortum Ridleyus con-
 stituit „ præcise in illa regione quadante-
 „ nus cava quæ Olivari Corpori, & Restiformi
 „ Processui interjacet: „ ejusdemque Paris Fibras
 prope suum exortum sibi continuas esse, dicit.

Ego vero in duobus saltem, quæ non ita pri-
 dem secui, cadaveribus, plures ejus fibras poste-
 riores vidi ex ipsis Olivarium Corporum lateri-
 bus prodeuntes, easque tum ab anterioribus, tum
 inter se valde sejunctas. De anterioribus autem
 reliquis quod addam, id in omnibus in quibus
 adhuc quæsi, cadaveribus inveni. Una vel al-
 tera ex prioribus, non eodem quo cæteræ, fora-
 mine extra cranii, vel certe Duræ Meningis ca-
 veam egrediuntur, sed inter has, atque illas te-
 nue quasi septum intercedit, quod sæpe quidem
 osseum, alias autem, & in mulieribus præser-
 tim, potius membraneum esse, dissecando intel-
 lexi. Hoc addere propterea volui, quia tametsi
 Diligentissimus Professor Ruyschius in capite in-
 fantis, quod asseruat, notandum esse, scripse-
 rit, „ Nervos vagos in utroque latere duobus in
 „ locis Cranium perforare, exigua portione os-
 „ sea interpolata; „ qua ratione tamen id fiat, &
 num eo in capite sit peculiare, an cæteris etiam
 commune, non indicavit. Sed de Nervorum ori-
 gine, atque egressu alia postea fortasse adjicie-
 mus. Nunc de subtiliore Partium Cerebri ana-
 tome, quam Ridleyus postremo loco perpendit,
 Cl. autem Vieussenius pluribus Tabulis, a te præ-
 termisiss, & præsertim XIV. XV. & XVI. com-
 plexus est, unum dicamus. Negat ille pri-
 mum, „ se potuisse, quantumvis accurato scru-
 „ tinio facere conatus fuerit, ullam detegere
 „ ejusmodi actualement Partium configurationem,
 „ qualem adeo formaliter delineatam deprehen-
 „ dimus - præsertim a Vieussenio. „ Deinde quod
 ad Medullares speciatim Tractus attinet; „ o-
 „ mnes illi, inquit, quos per sedulissimam dis-
 „ quisitionem reperire potui, fuerunt illi tantum
 „ quos

Ephem.
 N. C.
 Cent. V.
 Obs. 12.

319.
 De Vago
 Nervorum Pa-
 ri.

Thef.
 Anat. I.

Nevrogr.
 l. I.

329.

330

De stru-
 ctura Ce-
 rebelli.

De duobus
Oblongatæ
Medullæ
Tractibus
Medullæ-
ribus.

Tract.
dell.
Apopl.

cap. 6.

De Cerebri
Fibris.

„ quos in præcedentibus paginis notavimus ; „
hos deinde omnes enumerat. Non est mihi in ani-
mo hæc omnia figillatim expendere ; illud tan-
tum dicam, mirari me, quod inter istos quos
enumerat, Tractus Medullares ii speciatim omit-
tantur, qui in memoratarum Tabularum postre-
ma litteris FF. indicati sunt. Certe enim nihil
mihi in plerisque cadaveribus facilius est, quam
Corporum Pyramidalium summam partem, imam
autem Annularis Frotuberantiæ, aut lente, pau-
latimque abradendo, aut nonnunquam sine ulla
etiam abrasione suspensa manu hanc ab illa distra-
hendo, cæteris nexibus dissolutis, duos intus me-
dullares insignes fascies secundum Oblongatæ Me-
dullæ longitudinem porrectos, adhuc persistentes
ostendere : quos sursum, deorsumque persequendo,
ex eorum crassitie, loco, positu sæpe comperi,
non differre ab iis qui in ea Vieussenii Tabula
medii inter litteras HH. & GG. secundum lon-
gitudinem feruntur. Hos eosdem esse con-
jicissim atque illos, quos Dominicus Mistichellius
in Figura sua I. ad litt. ee. delineavit, nisi ipse
suos non intus esse, sed in ipsa Medullæ superfi-
cie, neque ex veris medullaribus fibris constare,
sed potius ad investientes membranas pertinere,
tradidisset. Erat enim in ea opinione, nihil nisi
mucosum quiddam, ac informem totam Cerebri,
Medullæque substantiam esse, neque ullam ejus
partem reapse in fibras conformari. Equidem ipse
non contenderim, quoscunque in Cerebro tractus
Anatomici describant, eos omnes nativos, ger-
manosque esse, neque eorum ullos aut scalpellis,
aut incumbentium partium ponderi, aut vicinis
pulsantibus arteriis, aut ipsis etiam arcte suc-
cingentibus membranis deberi ; at nullas prorsus
fibras in Cerebro esse, quis facile credat, qui
Striata inprimis Corpora abraferit, quorum cine-
reæ substantiæ albi tractus non modo interjecti
spectantur ; sed interdum etiam, dum pars abra-
leniter elevatur, atque reflectitur, hanc nonnulli
eorum a circumjecta substantia extricati, & prorsus
liberi filorum instar sequuntur. Attamen
utcunque de ejus opinione censendum est ; ejus
poteras Figuras exhibere ; ut de observata ab ipso
tum in eadem Oblongatæ Medullæ parte, tum in
proxima Spinali, certa fibrarum implicatione ju-
diciū a cæteris Anatomicis ferri posset.

ANIMADVERSIO XIII.

DE ipsa autem Spinali Medulla, vide, quæ-
so, V. Cl. num satis, & satis accurate tuo
in Theatro traditum sit. Nam Ridleyus, ut tu-
te confiteris, *nihil, aut parum admodum de ipsa
habet*. Supra autem in Tabulis, ad quas videli-
cet remittis, de Nervis, nonnulla de illius Invo-
lucris, & Structura desiderari, ex his quæ pro-
tinus attingentur, intelligi poterit. Nam quod
denique, subungere te, ais, quæ de illa pau-
cis accurate tradit Cl. Verheyen in sua Ana-
tomia ; primum quidem tertiam eorum quæ
ab ipso tradita sunt, partem, de illius videlicet
Ductibus Venosis, & Usibus, omittis ; deinde
quæ affers reliqua, non ita accurate ab ipso tra-
dita videntur. Quod enim scribit : illius substan-
tiam ei, quæ modullam oblongatam & corpus
callosum constituit, valde similem esse ; non-
nihil tamen duriores, magisque fibrosam ; con-
jungendum nempe erat cum iis quæ addit Di-
ligentissimus Vieussenius : „ At si medulla spina-
lis, una cum cerebro noctu aeri exposita re-
linquatur, multo molliorem evadere quam ce-
rebrum ; adeo ut veluti dissolvatur, & præ ni-
mia mollitie, fere adinstar calidæ pulcullæ
plano cuidam corpori affusæ diffusetur : quod al-
bas, quibus constat, fibrillas, medullaris cere-
bri substantiæ fibrillis tenuiores, ac teneriores
esse indicare videtur : „ quod quidem & nos
accidere, observavimus, quotiescunque Medullam
Spinalem dissecto, & diducto ad latera illo dum-
taxat ex propriis ipsius Involucris, quod Duræ

Nevrogr.
l. 2. c. 3.
De Me-
dulla Spi-
nali, ejus-
que Invo-
lucris.

Meningi continuatur, sic multas horas reliqui-
mus. Habet autem Medulla Spinalis præter In-
volucra propria, sive interiora, exterius alterum,
Galeno ipsi non incognitum, a quo *tunica me-
ninges spinalis medullæ ambiens* vocatum est,
quemadmodum Cl. Vieussenius animadvertit, qui
illud etsi Tabulis non exhibuit, descriptione ta-
men complexus est, & primum, seu commune
ejusdem Medullæ Involucrum nuncupavit propte-
rea quia etiam, vertebrarum spondylis circa po-
steriora colligandis quadantenus inservire vide-
tur. Hoc sane Involucrum, Vertebrarum pa-
rietes intrinsecus succingens, earumque cartilagi-
neis ligamentis firmius adhærens, validum qui-
dem, & trahenti resistens, proxima tamen Duræ
Meninge tenuius esse, observavimus. Idem Vieus-
senius, utrumque hoc Involucrum oleaginoso,
sive etiam, ut alibi indicavimus, mucilaginoso
humore obliniri, non omisit : carnosas præterea
fibras supremæ partis Duræ Meningis, & quibus
in locis Medullam hæc laxè ambiat, atque adeo
circum ipsam attolli, & subsidere alterne possit,
commemoravit. Ex hisce intelligitur, num ac-
curate Spinalem Medullam descripserit Verhey-
enius, qui nihil videlicet horum attigit, imo in-
volvi hanc medullam iisdem integumentis, eodem-
que ordine, ac cerebrum, scripsit. Hanc ipsam
Verheyenii hallucinationem notavit nuper Cl. Heiste-
rus, *Medullæ*, inquit, *spinalis tegumenta exte-
riora omittit* ; illud videlicet primum, & tuni-
cam præterea cellulosa, sive adiposa, quam
inter id, & Duram Meningem Heisterus agno-
scit.

Ibid. c. 1.

331.

Compen.
Anat.
Præfat. &
n. 213.

ANIMADVERSIO XIV.

Idem quoque Vir Eruditissimus alios Verhey-
enii errores in Cerebri historia, multiplici ra-
tione indicavit, de quorum plerisque etsi nos et-
iam Auditores nostros monueramus ; attamen, ut
in aliis pariter Adversariis factum est, sic neque
in hisce multa a nobis verba fient, ne post Ho-
merum, quod ajunt, Iliadem scribere videamur.
Itaque hæc tantum præter ea, quæ ex iis, quæ
alibi attigimus, intelligi satis possunt, addemus :
Verheyenium insertiones Processuum Duræ Cerebri
Meningis, & utilitatem Falcis in Cerebro suspen-
dendo, ne Ventriculi anteriores concidant, omi-
sisse : transversas Chordas in Lateralibus Sinibus
nullas agnovisse : tertium Ventriculum longe ali-
ter atque oportebat, exposuisse : Oblongatæ Me-
dullæ Nervos *simplices ab utrolibet latere esse*,
oblitos videlicet eo in loco geminæ Portionis
Paris septimi, docuisse : in Olfactoriorum me-
dio cavitatem cum Ventriculis communicantem
in homine etiam sine ulla dubitatione posuisse :
Corpora Striata, duas esse eminentias lentifor-
mes : & potissimum inservire tamquam colu-
mnas, quibus tota ventriculorum concameratio
incumbat, tradidisse : & ne ab ipsa Medulla
Spinali, de qua facere verba cœperam, longius
digrediar, neque ejus insignem illam, & longe
alius structuræ partem, quam Caudam Equinam
vocamus, descripsisse, & cum de Cavitate, aut
saltem de Fissuris quæ in superiore præsertim
ejus parte observantur, dicendum fuisset, hoc
tantum, idque cum jam de Involucris verba fa-
ceret, dixisse : „ Piam matrem secundum longi-
tudinem, per ejus medium excurrentem, saltem
in principio, partem dexteram a sinistra omni-
no distinguere. „ Quibus sane ex verbis alii plus
quam opus sit, alii autem ne quantum quidem
fatis sit, istam Medullæ *distinctionem* intelligent.
Nam præter Fissuram anteriorem, altera quoque
a tergo occurrit, in quam ipse *Calamus*, ut vo-
cant, *Scriptorius* deorsum producit. Et alia qui-
dem cadavera has Fissuras longiores, altiores,
& facilius diducendas exhibent ; alia contra ; alia
autem sunt rursus, in quibus præter has, exigua
Cavea, secundum longitudinem intra mediam su-
premæ Medullæ substantiam insculpta, nullo ne-
gotio

l. 1. tr. 4.
c. 4.

cap. 5.

cap. 6.

cap. 8.

cap. 9.

De Spina-
lis Medul-
læ Fissu-
ris, &
Cavitate.

gotio deprehenditur: quale inprimis Piscatoris Veneti cadaver fuit, cujus Spinalem Medullam transversa sectione ab Oblongata dividendo, cum Cl. Santorino observavimus Caveam, quæ minimi digiti apicem propemodum admittebat, quinque autem transversorum digitorum spatium, & fortasse etiam longius (siquis tunc otium habuisset ulteriorem Medullam e vertebri eximendi) ad inferiora producebatur. Et Medullæ quidem medium, nisi quod posteriori parti propior erat, occupabat; Fissuræ tamen; quod manifeste videre potuerim; ad ipsam caveam non pertingebant. Cæterum hujus superficies, & vicina huic substantia erat cinerea; nec quidquam prorsus fuit, quod non secundum naturam esse, censuerim præter ejus cavæ magnitudinem. Neque enim alias tantam, aut quæ huic accederet, vidi; quapropter ejus descriptionem prætermittendam non putavi.

ANIMADVERSI O XV.

DE pluribus quos addis, Cerebri Iconismis perpaucis dicere satis est, tum quia nonnulla eorum vitia in superioribus Animadversionibus indicata sunt, tum quia quod ad Willisianos speciatim attinet, eorum censura apud Stenonem legi potest. His vitiis alia addidit Operarum negligentia, ut ex. gr. (nam singula notare longius esset) cum in Tab. XCIV. Fig. 1. litteras O O, indices Portionis Protuberantiæ Annularis, Processibus II, Testes inter, & Cerebellum ductis inscripserunt, vel cum in Fig. 2. litteras duas G G omiserunt, alia in ea vicinia non satis fideliter expresserunt; in Explicatione autem ad litt. Q Q *Cerebrum* pro *Cerebello* scripserunt. Hæc Tironibus in rebus alioqui non facillimis recte percipiendis impedimento sunt, quemadmodum in Fig. 5. Processus *i* dexteri non absoluta delineatio ad litteram *l*: quo in loco etiam ve reor, ne pro *Origine Processus* ejusdem, Origo potius mollis rami septimi Nervi fuisset indicanda. Sed & in ejusdem Ridleyi Figura proxima, quæ prima est in Tab. XCV. cum quædam ad litteras K K, & R non satis absoluta esse, video, tum dubito, ne litterarum g g, & T T Explicatio aliter ab Auctore conscripta sit. Utcunque idest, Truncos illos Arteriarum *iiiiiii* ab iis diligenter inspicere, velim, qui forte ejus quem supra memoravimus, Mistichellii opinionibus faverent, illud inter cætera urgentis, Vasa Cerebri sanguifera intra meninges subsistere, & siquid rubri inter dissecandum illius substantiam appareat, id vel morbi, vel injectionum violentiæ meatus nimium dilatanti acceptum esse referendum. Neque enim hic, ut in proxima Cl. Vieussenii Figura, puncta quædam dumtaxat; aut guttæ sanguineæ conspiciuntur, sed veræ ramificationes, & veri trunculi arteriarum, quos, tametsi cera injecta sit, vis tamen injectionis certe producere non potuerit: quanquam vel nulla adhibita injectione nihil nobis inter dissecandum Cerebrum frequentius contingit, præsertim si cultro obtusiore de industria utamur, quam præter sanguinea puncta, ipsa quoque vascula sanguifera hic illic ostendere substantiam medullarem permeantia.

ANIMADVERSI O XVI.

Verum ut in Tabula etiam XCVI. quædam notemus, & de Vasis tamen sanguiferis perperam, ut supra indicatum est, in 1. & 3. Figura pictis, ac de multorum Nervorum, & præsertim Sexti origine, & de Quinto, atque Octavo Pari recte in neutra, ut XCVIII. Tabula convincit, delineatis, deque aliis ejusmodi fileamus; quis in Figura eadem 3. binarum, quæ exiguæ, & pone Infundibulum adstare deberent, Prominentiarum F F istam magnitudinem, sedemque non improbet? aut in Explicatione cum tot

alia quæ mihi otium non est sigillatim persequendi, tum illud inprimis ferat, a quo Tirones possunt in summam perturbationem adduci, quod recepta nunc passim Nervorum enumeratio, & vocabula ipsa commutentur, & dum nova Nervorum Paria ex Intercoastalibus, & Accessoriis componuntur, interea verum Par Nonum sine ullis peculiaribus litteris in Figura relinquatur, & illa omnia ita istuc tradantur, quasi nihil quidquam a communi consuetudine alienum induceretur; cum tamen ipse quidem ejus Explicationis Auctor id esset in illius saltem sine confessus. Nec desunt alii, Operarum videlicet, errores in Tabula XCVII. De cujus Figura 1. cum quidpiam supra indicaverimus; nunc de 2. addemus, in Cl. Vieussenii archetypo neque ad litteras *a a* abscissi illius arteriosi Canalis portionem omitti, neque Prominentias K K ita graciles delineari, neque sulci qui sub ipsis per mediam Annularem Protuberantiam est insculptus, initium ea ratione effingi, ut omnia potius quam quod revera est, esse videatur, neque litterarum *bb*, & *dd* loca inter se perperam commutari, neque demum; ut alia omittam; Patheticos Nervos *ff* ita crassos pingi: quem quidem errorem in iisdem Nervis in plerisque aliis Tabulis describendis tuos Scalptores erravisse, animadverti. Porro in Tabula XCVIII. de postremis saltem duabus Figuris non est omittendum, perperam in 3. Medullæ basim utrinque integram ostendi, quando illius *divisio intermedia per longitudinem facta* esse dicitur: qui quidem error ipsius Bidloi est; in 4. autem Explicatione ad litteram F haud recte indicari *Medullæ Spinalis Fissuras*, cum Bidlous scripserit: *Fissuræ F. & Vasorum G vestigia*, ad alterutram scilicet Fissuram respiciens ex iis duabus quas ego supra commemoravi. Et de istis quidem Figuris ita rem se habere, facilius omnes intelligent, qui mecum animadverterint, easdem Bidlous ex totidem Blasii Figuris quadantenus descripsisse, & hæc quales sint, & quomodo explicatæ, cognoverint. Essent alia, quæ in Tabulis XCIX. & C. notari possent, & in hac præsertim, ut quæ Figuram 2. nobis exhibet usque adeo Ridleyani archetypi dissimilem, ut Sinus Laterales C C, Opticos Nervos *pp*, Carotides Arterias *qq*, aliaque ejusmodi vix, ac ne vix quidem dignoscamus.

ANIMADVERSI O XVII.

Sed præstat hisce omissis ad proximæ Tabulæ *extra ordinem* V. Figuram 1. properare. Vel enim quia post quinque & triginta Figuras ad Cerebrum pertinentes, hanc tibi extra ordinem addendam censuisti, vel quia hujus unius Explicatio prolixitate fere certat cum illarum universis Explicationibus, decet profecto, ut eam nos quoque libentius, diligentiusque inspiciamus. Accedit Tironum utilitas, quos nimirum permoveri atque allici posse video tum ab his quæ modo attigimus, tum a præfixa a te, Vir Doctissime, isti uni Figuræ singulari inscriptione: ipsam videlicet „ in nova, eaque sane elaboratissima, „ Basis Cerebri, seu potius Cranii descriptione „ versari, „ tum denique ab iis quæ Auctor ipse Cl. pluries in hanc fere sententiam præmonuit. Nam memini primum quandam ejus *præliminarem Exercitationem* legisse, in qua *plurima ad basim Cerebri detecta* pollicebatur; deinde in tui Theatri Libro I. animadverti ipsum de „ Sinus Sellæ „ turcicæ, aliorumque compositione, concursibus, & usu, exacta cum iconibus sedaturum „ promittentem; nunc denique in ista *de Sinibus Basis Cerebri - Demonstratione* aggredientem video circa „ Partes quasdam ad Cerebri basim locatas, visibiles satis, & cultri investigationibus „ facillimas, præterquam quod ab antiquis, a „ modernis etiam descriptionibus distortas a veritate sua, aut nimium obnubilatas, nec hucusque ad legitimam habitudinis suæ descriptionem „ nem

335.
336

338.

Anat.
Medull.
Spin. Fig.
10. & 11.

342.

195

De Cerebri Anat. Diss.

332

332.

333

333.

De veris intra Cerebri substantiam Vasis sanguiferis. Aggiunta al Tratt. dell'Apopl. c. 1. 6.

„nem conciliatas; præcipue quæ circa sellam
 „Turcicam, & glandulam pituitariam distribu-
 „tæ sunt; ubi scilicet ex Cerebri Descriptori-
 „bus præcipuis Willisus sufficientem elucidatio-
 „nem non præbuit: Ridleyus Sinum circularem
 „quendam, variaque in glandula pituitaria, ali-
 „bique commenta perperam effinxit: Vieussenius,
 „licet hisce duobus Palmam præripuerit in ha-
 „rumce rerum Descriptione, non eas tamen ex-
 „plete demonstrabat; „aggredientem, inquam,
 „video circa istas ipsas Partes observationes suas in
 343 *epilogum coarctatas* proponere. Quid igitur osten-
 dat, quid doceat, & quam *nova* ista sint, *exa-
 cta*, non *obnubilata*, *expleta*, pro communi veri
 studio, & Tironum eruditione, atque utilitate
 videamus. Ait primum, se „unicam tantum fi-
 „guram paravisse, quæ totam Cerebri basim
 „eodem videndam intuitu complecteretur. „
 Mox per eandem Figuram dicit „exhiberi basim
 „Cranii interiorem. „Videlicet hæc causa est,
 cur tu in inscriptione recte dixeris, hanc Figu-
 ram „in Basis Cerebri, seu potius Cranii de-
 „scriptione versari; „nam certe non id quod
 Anatomici Basim Cerebri, sed quod Basim Cra-
 nii vocitant, repræsentat. Per eandem quoque
 exponi dicit „foramina per quæ egrediuntur e
 „calvaria illæ nervorum conjugationes, quæ ibi-
 „dem desiderantur. „Ego tamen ossis cribrosi
 foramina haud video, per quæ videlicet prima
conjugatio in filamenta divisa e calvaria egredi-
 tur. Quod autem ait, istam Figuram „ob
 „majorem claritatem in ambitu suo, & præci-
 „pue in partibus centro, seu sellæ equinæ ad-
 „jacentibus, ultra naturalem grandiore ali-
 „qualiter repræsentari; „laudo quidem quod
 majoris perspicuitatis causa id fecerit; sed magis
 laudarem, si omnes pariter Figuræ partes pro ra-
 ta portione grandiores pinxisset. Neque enim; ut
 de totius Cranii proportionibus fileam; glandu-
 lam ex. gr. pituitariam, abnormi, si cum par-
 tibus etiam nonnullis quæ ad centrum sunt, com-
 paretur, amplitudine effecisset; sed omnia in-
 gentia quidem, ut libuisset, in ea tamen artifi-
 ciosa magnitudine, sua sibi singula naturali pro-
 portione respondentia reliquisset. Verum a te
 recte factum, quod istam Figuram Tabulæ C.
 continuo adjeceris, ex qua Tirones intelligent,
 num glandula pituitaria istic naturali grandior
 tantum *aliqua* repræsentetur. Recte quoque
 ab ipso factum, quod istam cranii basim „dura
 „Meninge eidem fortiter adnata coopertam ef-
 „se, „monuerit; difficile enim erat id intelli-
 gere, cum vasa videlicet deessent per eam menin-
 gem repentina, aut hujus ex cranii ora conciden-
 tis (neque enim ita fortiter ubique adnascitur)
 complicationes, quibus nempe indicibus in eadem
 Tabula C. illos Cerebri Descriptores præcipuos
 usos videmus & ad eam meningem, & ad natu-
 ralem ejus habitudinem repræsentandam.

ANIMADVERSIO XVIII.

Verum his missis ad singularum Figuræ par-
 tium Explicationem pergamus. Et primum
 ad litteras *a a*. „Duplicaturas ostendit Duræ Me-
 „ningis, apertas, & ad latera revolutas: „quas
 videlicet olim ostenderat Cl. Vieussenius in su-
 perioris Tabulæ Fig. 3. ad **, & laudabilis
 quidem, ut postea docebo. Atenim, inquit,
 eas Vieussenius *Crassam Meningem* esse, dixit,
 non hujus *Duplicaturas*, vel certe earum latitu-
 dinem *quinque*, aut *sex linearum* esse, non do-
 cuit. Primum quid, obsecro te, si quis mallet
 cum Cl. Littrio easdem pro superiore lamina Du-
 ræ Meningis, quam pro *nova* hujus *productione*,
 seu duplicatura habere? Deinde ipse Vieussenius
 in Receptaculorum descriptione, quæ quidem
 nihil sunt aliud nisi istæ ipsæ laterales cavæ *ff*,
 diserte tradidit: „crassam meningem, qua par-
 „te calvariæ basi arctissime adhæret, circum sel-
 „lam equinam, quam undiquaque interius obdu-

„cit, ita in semetipsam *complicari*, ut in duas
 „veluti specus abeat. „Quod si hujus compli-
 cationis latitudinem non definivit, nempe haud
 fecisse, existimaverim, ne ignorare videretur,
 aliam in aliis cadaveribus invenire. At idem,
 inquit, tertiam illam productionem *d* posterio-
 rem, & transversalem, & quod consequitur, ca-
 veam *uu* cum lateralibus illis *ff* communican-
 tem haud novit. Novit vero hanc caveam, &
 delineavit Ortlobius, eandemque Sinuum sellæ
 equinæ adjacentium „communicationem ad sel-
 „læ turcicæ processum posticum esse, dixit,
 „quæ productio, inquit, non incongrue tran-
 „versalis, aut conciliatoris sinus nomine vocan-
 „da est. „Quod si forte quæras, cur hanc
 Vieussenius non memoraverit, neque docuerit,
 caveas quæ ab lateribus, & a tergo sellam am-
 biunt, si universæ apertæ inspiciantur, „repræ-
 „sentare inversam litteram Græcam majusculam,
 „Pi, π; „hoc a me responsum habebis: plu-
 ries fortasse accidisse Exercitatissimo Viro id quod
 mihi brevi temporis spatio in duobus cadaveri-
 bus contigit, ut videret scilicet posteriorem istam
 caveam *uu* alias nullam prorsus esse, alias autem
 ita parvam, aut etiam a spongiosa ossea substan-
 tia processus postici sellæ equinæ (quod vidi in
 capite hominis annos quinquaginta nati) sic im-
 peditam, ut cum Receptaculis pariter describen-
 dam, ponendamque esse, non censuerit. Utcun-
 que id est; cum omnia quæ hæcenus in Figura,
 & Explicatione ista vidimus, aliis non ignota
 fuisse, constet, illud unum relinquitur, ut quæ-
 ramus, num ab ullo etiam scriptum fuerit: ab
 istis Duræ Matris productionibus „notabilem
 „sacci speciem efformari, in quo sella tota cum
 „processibus quatuor suis, & in medio glandu-
 „la pituitaria libere comprehenduntur, & re-
 „conduntur. „Equidem haud difficile esset osten-
 dere, colligi id posse ex verbis Solertissimi Lit-
 trii; nisi quod hic docet, ac recte sane, ipsam
 glandulam „a superiori Duræ Matris lamina,
 „cui agglutinata est, suspendi; „hancque ipsam
 laminam, sellæ „apophysibus clinoidibus fir-
 „miter adhærere; „non vero sellam totam cum
 processibus quatuor suis, & in medio glandulam
 pituitariam sub Duræ Matris productionibus li-
 bere comprehendi atque recondi.

ANIMADVERSIO XIX.

Subjicitur gravior illa in Illustrem Doctissimæ
 Anglicæ Nationis Medicum, & Anatomicum
 Ridleyum animadversio. Hic ille est de quo su-
 pra dictum fuerat, „Sinum circularem quen-
 „dam, variaque in glandula pituitaria, alibique
 „commenta perperam effinxisse. „Hic iterum
 dicitur „absurda alia quamplurima spargere &
 „sustinere non tam insequentibus, quam in to-
 „to tractatu hoc suo. „At me movet magis
 tum Eximii Anatomici Cowperi, tum tui ipsius,
 Vir Cl. de Ridleyo, ejusque hoc Opere judi-
 cium. Neque enim aut ille tanti Ridleyum, ejus-
 que observationes fecisset, ut ejus Iconismos sua
 manu delinearet, aut tu ipsum in tuo Theatro
 prioribus Cerebri Scriptoribus nihilominus præ-
 tulisses, nisi illi quidem Viri fides, & diligentia,
 tibi autem id quodais, perspectum fuisset: „ce-
 „rebralem historiam ab ipso magna cum accura-
 „tione perfectam esse. „Quod si quis dicat: quid
 ergo? an non tu ipse in superioribus Animadver-
 sionibus pluries a Ridleyi sententia discessisti?
 aut de isto de quo hic potissimum quæritur,
 Circulari Sinu roget quid sentiam; is primum
 animadvertat, velim, me tamen pluries, idque
 diserte, monuisse, ut siqua minus a me probaren-
 tur, ea ne quis ante Eruditissimo Viro imputa-
 ret, quam latinam versionem cum anglico ejus
 autographo collatam, ea in parte non discrepa-
 re, comperisset. Quid enim aliud a me dici oport-
 erat, præsertim cum primam illam versionem
 qua in Bibliotheca Anatomica usus esses, pluri-
 mis

Et Posti-
co.Hist.
Part.
Diff. 20.
S. 6.

343.

308

294

De Receptaculis
ad Sellam
equinam
Lateralibus.

307

Neurogr.
l. i. c. 2.

De Sinu
Circulari.

mis in locis nunc in Theatro inlonge aliam mutata esse, aut cum his quæ Ridleyus alibi tradit, neutram convenire, deprehenderem? Itaque de ista ipsa Circularis Sinus descriptione sive ex Bibliotheca, sive etiam (perinde enim est) ex Theatro tuo deprompta siquis sententiam requirat meam; versionem quidem obscuram, & si mavis, *obscurissimam* esse, confitebor; ipsa autem Ridleyi descriptio obscura, an perspicua sit, ignorare me, dicam. Quod enim interdum audivi a Viris latine, angliceque doctissimis de Boylæi scriptis affirmari, esse hæc quibusdam in locis versionis latinæ perobscura quæ tamen in respondentibus anglici autographi locis sint maxime clara, cur idem infortunium Ridleyi quoque scriptis contingere potuisse, non credam? Ac nisi prius hac de re certior fiam, multo minus asseverabo: *demonstrasse me commentitium esse, & mere imaginarium circularem hunc Ridleyi Sinum*, imo ne tum quidem. Primum namque veri similis, & æquius esset hallucinationem potius quam in Spectatissimo Viro agnoscere. Deinde fieri posset, ut ex aliqua saltem parte veram descriptionem proposuisset, ex. gr. ubi vel in ista versione docet, Sinum illum, in orbem ferri, circa pituitariam glandulam, - & a figura sua, non incongrue circularem Sinum appellari posse, se. Causas autem cur id fieri posse, credam, sic habe. Primum animadverto, Amplissimum Brunnerum ante hos ferme triginta annos scripsisse: se in capitis humani anatome injecisse ope, siphonis ceram rubicundam in alterutram jugularium, ligata altera; ceram autem penetrasse splendide usque ad glandulam pituitariam, quam *instar coronæ*, inquit, *anterius ambivit*. Secundo certum est, velut ante commemoravimus, Circularem Sinum 2.2. in Ridleyi Iconismo quem in superiore Tabula n.2. exhibuisti, manu ipsius Cowperi esse delineatum; quis autem facile existimet, tam sagacem, veracemque Anatomicum aut quod vidit, non cognovisse, aut quod non vidit, delineasse. Accedit, eundem Cowperum in sua ad Anatomen humani corporis Appendice eodem (nisi me prorsus memoria fallit) Iconismo usum esse, & Sinum Circularem, seu Venam ambientem glandulam pituitariam diserte posuisse. Adde his alium Clarum in primis Anatomicum Littrium, qui intra crassitiem laminæ superioris Duræ Meningis Sellam desuper obducentis Sinum (non, ut in tua illa Adnotatione redditum est, *Sinulum*) figuræ ovalis observari, scribit, quo glandulæ pituitariæ pars superior circumcingitur, & in quem, ut paulo inferius docet, pars venarum ejusdem glandulæ corripitur. Num igitur, tot Solertissimos Anatomicos hallucinosos esse, credemus, & cum ita inter se consentiant, nullum tamen sanguiferum vasculum (seu Sinum illud, seu Venam appellitare malimus) revera conspexisse quod circum pituitariam glandulam in orbem commearat? Mihi quidem non fit verisimile, præsertim cum ipse quoque antequam Duram Meningem a qua ea glandula operitur, amoverem, non obscuram annularis vasculi adumbrationem, sanguineo colore per illam Meningis partem circum glandulæ superiorem ambitum translucere, perspexerim, idque ita sæpe, ut de novem capitibus vix duo fuerint in quibus videre non potuerim. Erat autem aliquanto minore ambitu quam in Ridleyi Iconismo, cætera simile, nisi quod semel ad ellipticam peripheriam magis accedere videbatur. Quod si prius humorem aliquem in jugulares internas venas injecissem, fortasse & luculentius, & in omnibus conspexissem. Injecissem autem non modo humorem aliquem, sed & ceram, si istum Ridleyi Sinum publico scripto sic arguere instituissem: quod ab Explicationis Auctore minime tentatum esse, miror, præsertim cum ille dicat, se suum Circularem Sinum *injecit prius in venas cera* detexisse. Ille autem tantum abest, ut id fecerit; Apage, inquit, nescit Ridley

Diff. de
Gland.
Pituit.
c. 6.Memoi-
res de l'
Acad. R.
des Sc.
A. 1707.

308

„ ubi collocet Sinum circularem hunc suum, „ quem ideo nunquam demonstrabit, injiciat jam „ ceram suam, aut non injiciat in venas. „ Cæterum istud heu nimis verum est: Ridleyum nunquam amplius id esse demonstraturum, quippe qui multo ante quam ista scriberentur, diem suum obierat: quæ videlicet causa fuit, ut aliquanto plura in Viri de Re nostra Anatomica egregie meriti aut defensionem, aut certe excusationem hic adderemus.

ANIMADVERSI O XX.

Nunc ut ad eas de quibus iterum verba fiunt, Duræ Meningis Duplicaturas revertamur, atque ea tamen passim (quod & infra faciemus) quæ vel levioris momenti, vel notiora jam sunt, omittamus; ad litteras quidem e e ostenditur „ Densitas, & crassities major dictarum productionum lateralium aa ad earum regionem „ quæ summa est, & tanquam fornix subjectarum „ cavitatum lateralium, seu nova ibidem in duplicaturis hujusmodi Duræ Matris tanquam duplicatura; ut scilicet hoc loco valida ab iisdem „ productionibus efformetur vagina, & involu- „ crum pro excipiendis, tuendis, & ducendis, „ tertio oculorum pari seu motorio, & quarto, „ seu pathetico. „ Equidem hoc mihi novum non accidit quod de utriusque istius Nervorum Paris involucre dicitur; quando ipse Ridleyus „ par „ nervorum tertium & quartum - totidem distinctis parvis capsulis, seu involucribus a Dura Matre propagatis involuta esse, tradidit, durante „ illorum transitu per eam cranii Basis partem, „ quæ a Vieussenio nomine Receptaculorum insin- „ gnitur. „ Illud vero novum accidit: vaginam istam esse ita validam, & densitatem, ac crassitiem majorem in summo Receptaculorum fornice propterea institui, sive, ut paulo ante dictum est, hoc solum exequi, ut nervum patheticum, & motorium oculi investiat. Nam quod iste vocat densitatem, & crassitiem majorem, neque ad nervos istos, qui alioqui eidem subjiciuntur, neque ad Receptacula potissimum pertinet; quippe quæ (ut omnes intelligent qui ipsam non super Receptacula dumtaxat spectabunt, sed citra hæc per Duræ Meningis Interceptum horizontale persequuntur) anterior pars est, seu productio, & expansio limbi illius valde firmi, atque tendinosi, quem obtinet foramen imperfecte ovale ejusdem Intercepti, cujus videlicet extremitas supra sellam sphenoidis elongatur; ut verbis utar Solertissimi Pachioni, cujus præclaris observationibus factum est, ne tantæ „ sint adhuc circa Cerebri tegmina, „ num fabricas cimmeriæ quaquaversum caliginis, „ ut cui potissimum usui ista major eo in loco densitas, & crassities inserviat, assequi nequeamus. Igitur illi quidem Nervi tendineis istis, & validis subsunt Duræ Meningis expansionibus; non tamen ipsorum vagina densa est, & valida: sed ut multis in capitibus observavi, tegmen est rubrum, & sanguinolentum per quod Duræ Matri adherent, usque adeo tenue, ut primum an verum tegmen esset, sæpius etiam, membranula, an reticulum quoddam esset, dubitaverim. Sed de his Nervis etiam infra verba faciemus.

344.

De quadam
Nervorum 3.
& 4. Paris
Vagina.

302.

344

274

De Dura
Meninge
c. 3.

342.

ANIMADVERSI O XXI.

Nunc ad Nervos quinti Paris transeamus: „ qui „ statim ac egressi sunt a parte utrinque „ laterali interna protuberantiarum annularium „ Medullæ Oblongatæ, facere fibrarum, inter „ se se distinctarum, notabile glomeramen „ dicuntur. Ego vero quid sit in homine protuberantia annularis, scio; quid autem protuberantiæ annulares, nescio, quando is qui primus id nominis imposuit, Willisius plures protuberantias annulares in plerisque brutis animalibus, non item in homine esse, voluit, quod & Cl. Vieussenius adnotavit. Distinctas etiam inter se fibras, non in trun-

De quinto
Nervorum
Paris.Cerebri
Anat. c. 3.
Nevrogr.
l. 1, c. 12.

344

Ibid. 1, 3.
cap. 3.

345
De sexto
Pari, &
Sinibus
Sellæ ad-
jacentibus.

Vid. &
confer in
Tabul.
add.
Theatr.
VI. F. 8.
9. 10. 11.
12.

342.

in trunco tantum, sed & in primis Paris istius ramis invenire soleo, sed in fascis, non vero in glomeraminis modum statim ac sunt egressæ dispositas. Porro quæ de ejus Plexus notabilis Ganglioformis alligatione, arteriis, venulis, & textura naturam tanquam carneam mentiente subjiciuntur, hæc omnia satis a Vieussenio tradita fuerant, quamquam, ut verum fatear, cum hæc in plurimis cadaveribus perquirerem, in non paucis eorum accidit, ut neque usque adeo notabilem & peculiarem istius Plexus crassitudinem, neque texturam adeo implicitam, & compactam, neque demum naturam istam tanquam carnem observare possem. Cæterum quod ad istius nervorum Paris picturam attinet, naturalis, opinor, tum proportio postulasset, ut inter 1, & 3. minus spatii interjectum esset, tum figura, ut inferius latus fere ad modum trium ferræ dentium esset dispositum; nos sane ita observare consuevimus. Sed quæ subjiciuntur de sexto Pari videamus. „ Egre ditur, „ inquit, ab ima parte medullæ inter protuberantias annulares, & olivares. „ Quomodo ab ima parte medullæ, si dumtaxat inter protuberantias annulares, & olivares? & quomodo rursus inter protuberantias annulares, & olivares, quando omnes quas tu supra, Vir Doctissime, proposuisti, Diligentissimorum Anatomicorum Figuræ aut ab ima annularis protuberantiæ parte e regione corporum pyramidalium, aut prope hæc, aut ex horum summa parte, nulla vero inter olivares, & annularem protuberantiam egrediens ostendit? Ut cunque id est (nam etsi me sic non memini; sic tamen ex parte observasse Eustachium, animadverto) quod porro addit: sicuti Par sextum Receptacula ingrediens, „ incumbit principio Sinus „ brevioris, & majoris (ex adjacentibus videlicet „ Sellæ equinæ) sic & quintum Par super prin- „ cipia Sinus majoris, & longioris in ingressu „ suo pertransire: seque harum omnium habitu- „ dinum causas in dissertatione esse elucidatu- „ rum; „ etiam atque etiam rogandus est, ut priusquam id sibi laborisumat, observationes illas sæpius iteret. Nam ut a postrema incipiam; ego certe in septem continenter sectis capitibus luculentissime observavi, non Par quintum super principium Sinus longioris, sed contra principium Sinus longioris super truncum Paris quinti transire. Sed & Vir in primis Diligens Vieussenius idem prorsus delineat in superioris Tabulæ Fig. 3. ad litt. KK, & oo: quem propterea supra dixi apertas Duræ Meningis laterales Duplicaturas laudabilius ostendisse; neque enim iis operuit partem illorum Sinuum, ut hic fecit in ea (quod est gravius) Figura quam De Sinibus Basis Cerebri - Demonstrationem Anatomicam inscripsit. Idem Vieussenius illud quoque recte fecit, quod Par sextum qq ab latere externo breviorum Sinuum LL, non, ut hic, ab interno appinxit. Hoc unum optassem, ut secundum idem externum latus & intra ipsorum Sinuum alveum exceptum Par sextum, & sic aliquantum progrediens pinxisset: quod ego in multis capitibus vidi. Hinc liquet, quid de eo quoque sentiam, quod supra positum est: Par sextum principio Sinuum breviorum incumbere.

ANIMADVERSIO XXII.

Quæ autem adduntur: „ Hæc cæterum præcipue super alias omnes, quæ vigeant in „ animali, conjugationes nervorum, seu „ par quintum, & sextum - in hisce cavitatibus „ sacci Meningei acceptantur, reconduntur, in- „ volvuntur, & custodiuntur; ne nude, & im- „ mediate sub basi Cerebri jacentia hæc sensuum „ instrumenta principalia, ab incumbente ejusdem „ visceris mole vastissima comprimantur, & hebe- „ tentur; ne insuper in tenella nimis hic loci eorum substantia impressæ per sensoria externa leviores etiam concussiones, præcipue quæ ab oculis veniunt, interrumpantur in progressu suo „ usque ad regiam interni sensus, aut aliter al-

„ terentur; „ de his ego quidem ita sentio: ista videlicet omnia, ut & quæ de tertio, & quarto Pari in eandem sententiam subduntur, cum brevius, tum laudabilius a Cl. Vieussenio tradita esse. Neque enim dixit, Par quintum, & sextum sensuum esse instrumenta principalia, qui nimirum probe sciret, magnam præsertim Sexti partem in oculorum musculos desinere; neque dixit, intra Receptacula Par illud utrumque excipi, „ ne in „ tenella nimis hic loci eorum substantia impressæ per sensoria externa leviores etiam concussiones, præcipue quæ ab oculis veniunt, „ alterentur; „ quasi vero his nervis idem quod Opticis officium esset tribuendum. Sed præterea rogare aliquis potest, cur nervorum Par Olfactorium intra aliquem ejusmodi saccum Meningeum a superincumbentibus anterioribus cerebri lobis non defendatur, præsertim cum illius substantia præ Pari quinto, & sexto tanto mollior sit? An quia Suspensorium, ut ita dicam, Cerebri Ligamentum Falx, an vero etiam quia basis cranii ad illius Paris latera utrinque prominens id satis vetat? Sed num vis Falcis suspensoria prioribus tantum cerebri lobis tota inservit; an vero est aliquid in universa cranii basi quod magis promineat, quam Sella equina? Denique num, & quantum huic etiam defensionis officio collimare possit vagina tertium, & quartum Par nervorum involvens, ex iis quæ supra de illius tenuitate diximus, intelligitur. Contra satis clare non intelligitur, quomodo quod hic dicitur: duo hæc Paria in cavitatibus lateralibus immediate suscipi, recondi, unaque cum quinto, & sexto pari trajici: quomodo, inquam, hoc cohæreat cum iis quæ supra dicta sunt: tertium, & quartum Par nervorum non ingredi in easdem laterales cavitates, ut quintum, & sextum, sed desuper & exterius prorepere. Sed de Nervis etiam postea. Nunc vero; ut ejus servemus ordinem; quæ proponit de Truncis Arteriarum Carotidum, videamus.

ANIMADVERSIO XXIII.

Carotidum Truncos „ ad latera sellæ Turcicæ „ inflecti „ quidem ait, sed delineatione haud monstrat. Num autem illi „ cum vertebralis arteriis, ac producto ab eisdem trunco „ cervicali coire ad Cerebri basim „ recte dicantur, id vero ex una superiorum Animadversionum intelligi potest. Cæterum quæ de harum Arteriarum, Nervorumque in Receptaculis positu subduntur, ea tum manca sunt, tum ab iis quæ pluries, diligenterque observavi, admodum discrepant. Primum sunt manca, Neque enim erat omittendum, Par tertium, & ad hujus externum latus una pergens Par quartum summæ & posteriori arteriæ parti, nulla re intermedia, insistere, nisi illa tenuissima vaginula de qua supra dictum est. Deinde ego, & pluries quidem, non id modo observavi, verum etiam Par sextum externo arteriæ lateri appositum, eandemque ad longiorem tractum, quam Par tertium, & quartum, nulla re interjecta contingens, ut propterea neque in Figura probare queam istum positum quem a parte capitis præsertim dextera Par sextum habere, video, neque in Explicatione laudare possim quæ continuo subjiciuntur: „ Nervi tamen a „ truncis arteriarum sequestrantur per novam „ quamdam, eamque summe tendineam, expansionem Duræ Matris, in formam claustrum; ne „ carotidum pulsationibus continuo percussi nervorum hujusmodi funiculi in levissimis vibrationibus suis, ab externis sensoriis ad intima „ Cerebri transmittendis impediuntur. „ Hoc autem claustrum, five septum etsi transversale mox appellatur, & transversaliter produci dicitur, ex descriptione tamen constat, non in transversum per Receptacula, sed secundum horum longitudinem disponi, neque ascendere usque ad eorum summitatem, sed solum ad medietatem, & in pluribus denique osseum observari, sed Duræ Meningis

Nevrogr.
l. 1. c. 34

344.

345.

De memo-
ratorum
Nervorum
in
Recepta-
culis dis-
positione.

De quon-
dam in
Recepta-
culis Se-
pto.

346

ningis productione cooperiri. Equidem nos etiam in nonnullis capitibus sepimentum quoddam vidimus, interdum osseum: alias ferme tendineum; in pluribus tamen aut nullum invenimus, aut certe usque adeo humile, & exiguum, ut ipsi neque ejusmodi usus, neque ista descriptio aptari posset. Si quidem ad latus externum foraminis per quod Arteria Receptaculum subibat, ipsa foraminis ora addita substantia inter ligamentum, & tendinem media aliquantum elevabatur, & antrorsum producebatur, sed ita; ut verum fatear; parum, ut non modo sexto Pari, sed ne quinti quidem maximæ parti discludentis, defendentisque Sepimenti officium præstare posset.

ANIMADVERSI O XXIV.

Hic fortasse quæres, quid fieri ergo possit, ut a contigua Arteria istorum Nervorum munera non turbentur? Et ego vicissim ex te quæram, quid fieri posset, ut in Veneta muliere, quam cum Amicis dissecuimus, cum arteriæ subclaviæ sinistræ superiores posticque parietes in Aneurysma expansi duos tresve nervos ex iis qui ab inferioribus cervicis vertebra ad brachium descendunt, nulla prorsus interposita re contingerent, quid fieri, inquam, posset, ut nulla tamen debilitas, nullus torpor in eo brachio fuerit animadversus. Atque adeo ne a nervis qui ad Receptacula pertinent, ipsoque naturali statu longius digrediamur; quid sit, obsecro, ut Nervus Intercostalis, quemadmodum in ista Explicatione mox habemus, ab ejus origine claustrum membranosum prædictum supercandens, deferatur in con-, sequens in contiguitatem carotidis; neque tamen ejus nervi munera ab assidua hujus pulsatione turbentur, præsertim cum is nervus, non ut priores, possit cedere, sed communis ipsi, & arteriæ ossei foraminis parietibus allidatur. Itaque hic præstat, opinor, ut potius quam obscuris, ac longis de Nervorum officiis, & agendi modo quæstionibus implicemur, in eorundem Nervorum historia caute diligenterque tradenda studium operamque collochemus, ne forte quæ incerta adhuc sunt, ea pro exploratis compertisque tradamus, velut de eo quem modo memoravimus, Nervo Intercostali. Et ego quidem ab interno latere sexti Paris per Receptacula transeuntis plures sæpe fibras abscedentes vidi, interdum unam tantum, sed notabilem, atque adeo semel fasciculum potius ad parvæ institæ modum, quam fibram; hæc autem vidi inter externum Arteriæ latus, ejusque oram foraminis se se demittere. Fuit etiam cum duas tantum a dextris fibras, & hoc quidem modo descendentes, a sinistris autem tres viderem, quarum una per posticam egredientis in Receptaculum Arteriæ partem, reliquæ per anticam repentes in ejus foramen se se immittebant. Fibras autem quæ ex quinto Pari his socias se adderent, non facile memini satis luculenter vidisse: idemque censeo contigisse Diligentissimo Eustachio, ut qui Intercostalis Nervi originem a Pari tantum sexto delineavit. Quin etiam memini, Eximium alterum Anatomicum Cowperum de certa & constanti origine ejusdem Nervi nihil affirmare voluisse. Neque hæc tamen ita accipi volo, quasi id quod ego nondum luculenter vidi, alii Anatomici non viderint; sed eo tantum dixi, ut constaret, quamquam & vulgo tradatur, & in ista Explicatione iteretur: Intercostalem Nervum *efformatum esse ex ramusculo sexti paris, & duobus quinti*; plura tamen esse cadavera in quibus quæ istic sine ulla dubitatione affirmantur, non ita prorsus, eodemque numero comperiuntur, præsertim cum Willisius ipse *surculum modo unum, modo duos* a quinto Pari ad initium Nervi Intercostalis pertinere, scripserit. Cæterum cur Arteriæ Carotides ex Receptaculis ad Cerebri basim egredientes ista dumtaxat crassitudine pingantur, cum sint. ex, partibus centro seu sellæ equinæ adja-

centibus quæ præcipue ultra naturalem grandiores, delineari dicuntur, & cur Sella equina vestibulum quoddam vocetur, ignorare me, fateor.

ANIMADVERSI O XXV.

E Numerat deinde quæcunque alias expositorum est de Glandula Pituitaria, & in iis, facilius laticum contentorum expressionem a punctis omnibus ejusdem superficiei, tanquam a totidem osculis excretoriis, per levem quamcumque contrectantium digitorum pressuram. Mihi vero nondum contigit, nisi qua forte ejus glandulæ involucrum læsum fuerat, id videre; quanquam sæpe digitorum pressionem paulatim ita auxerim, ut denique ipsius substantiæ pars albi liquaminis forma per annexum infundibuli truncum prodiret. Sed quamvis id præclare, & sine hallucinationis ullius periculo vidissem; quod tamen eodem recidit: hujusce glandulæ humorem, per rarissimam qua obducitur, membranam transfluere, & sic in duo sellæ turcicæ appositæ receptacula illabi, jam a Cl. Vieussenio fuisse traditum, sciebam, Viris tamen aliis Præstantissimis Brunnero, Littrio, Ridleyo minime probantibus, hoc etiam falsius impugnante, & idem quod ego, diserte testante: maximo, inquit, conatu glandulam hanc suo integumento vestitam digitis comprimentes ac collidentes, impossibile sumus experti vel minimum humiditatis specimen per illius prædictum involucrum, seu integumenta extrudere. Sed Nolter, inquit, Vieussenii sententiam confirmabit, exponens, usum præcipue adjacentium carotidum, pressuram glandulæ laterum per assiduas pulsationes respicientium; quasi vero hæc omnia olim aut non exposuisset Cl. Brunnerus, qui glandulam pituitariam scripsit, arteriarum carotidum flexuoso tractui accumbere, & ad harum pulsationes non posse non succuti & exagitari; atque iterum: carotidum vicinia tum calefaciendo, tum pulsando ejus excretionem apte promoveri posse; aut cum hæc exponeret, hanc excretionem sic per involucri ejus poros, non per lymphæ ductus promoveri, maluisset. Quapropter ex istis omnibus quæ exponenda promittuntur, illud potissimum, quippe novum atque inauditum, expecto, ut videlicet exponat, simplicitatem substantiæ glandulæ pituitariæ, non autem complicationem partis albæ, & subrubræ, ut vult Ridley. Willisius namque; ut ab ipso incipiam; hanc glandulam, revera e substantia, quæ duplicis generis est, conflare, docuit. Vieussenius, eam corpus esse, dixit, subalbo-cinereum. Brunnerus, parte, inquit, anteriore, sed depressiore, rubicunda, compactior, & duriuscula; posteriore autem & elatiore, quæ illi adnascitur, albicans, pulposa & mollicella existit. Littrius denique, ut tute supra retulisti, duabus illam Partibus, quarum substantia prorsus est diversa, componi, docuit, alia scilicet cinerei coloris, alia multo rubicundior; quarum singularum peculiarem sedem, intimæque structuræ discrimina exposuit. Et, ne ex commentario tantum sapere videamur, nunquam ipsi Pituitariam Glandulam secuimus; secuimus autem sæpissime; quin ex duplici substantia constantem luculenter tum nos videremus, tum aliis ostenderemus. Ejus enim posterior pars, & ut sic dicam, Appendix, qua ipsa glandula quasi in minoris sphaeræ segmentum excrescit, & quæ in Vieussenii Figura 4. in superiore Tabula non est omissa; ea, inquam, pars revera cinerea, & mollior, reliqua autem subdura substantia vel tota, vel ex parte albidior, aut ex subrubro albicans inventa est. Quæ cum ita sint, vides, Ornatissime Mangete, quantam iste expectationem concitaverit, dum contra non Ridleyum modo, sed tot Summos Anatomicos, atque adeo contra atque omnes conspiciere nullo negotio possunt, simplicitatem substantiæ

De Glandula Pituitaria.

Nevrogr. l. 1. c. 9.

387.

Diff. de Gland. Pituit. c. 1.

cap. 5.

Cerebri Anat. c. 4.

loc. cit.

Ibid. c. 1.

30

De Glandula Pituitaria Appendice.

De Nervi Intercostalis origine.

Tab. add. Theatr. VI. F. 9.

Cerebr. Anat. cap. 22.

substantiæ Glandulæ Pituitariæ se promissit esse ostensurum.

ANIMADVERSIO XXVI.

Quod cum ostendet, quædam quoque alia, opinor, clarius exponet. Nam supra, ut a nobis est notatum, hanc glandulam dixit in sacco Meningeo libere comprehendî; hic autem quod ab aliis traditum est, ipse quoque agnoscit, „immediatam videlicet, arctamque glandulæ connexionem cum fornice, seu parte suprema ejusdem sacci. „Similiter paulo ante dixit: eandem glandulam, sedere immediate super sellam Turcicam, eamque totam occupare; „mox autem id quod alii, & in his Cl. Littrius, docuere, proponit, scilicet glandulam inter, & sellam intervallum aliquod relinqui per quod communicant Receptacula. Quod tamen dum Noster exponit, miror sic describere, „inter glandulam, & dorsum sellæ, seu processum clivoidum posteriorum anteriorem faciem; siquidem hoc loco, inquit, glandula non adeo immediate connectitur cum osseo receptaculo suo. „Nimirum semper magis eo adducor, ut credam, non animadversam ab eo fuisse illam Glandulæ partem quam paulo ante ejus Appendicem nuncupavimus. Ut enim duplicem Glandulæ substantiam cognovisset, sic arctam illius Appendicis cohesionem, quam etiam indicat Solertissimus Littrius, cum anteriori facie Parietis Sellæ posterioris facile vidisset, cujus cohesionis causa sit, ut tametsi inter basim posteriorem Glandulæ, & imam Sellæ, ac memorati ipsius Parietis partem spatium aliquod relinquatur per quod Receptacula inter se communicant, ea tamen communicatio nulla prorsus sit; ubi ab ima illa parte ad sellæ dorsum aliquantum ascenderis; tantum enim abest, ut, hoc loco glandula non adeo immediate connectatur cum osseo receptaculo suo; „convexa illius Appendix se se immitit in concavam hujus superficiem, in cujus propterea medio haud raro etiam excavata est quasi hemisphærica foveola, Appendici adamussim respondens, ipsamque excipiens. Quod si Appendicem hanc ex molliore substantia constare, animadverterimus, haud difficile erit conjicere, quamobrem in ejusmodi foveola, aut certe in concavo isto posteriore Sellæ pariete ab Natura posita, & quasi abscondita sit, præsertim cum præeat nobis Doctissimus Brunnerus, qui eam potissimum Glandulæ partem, utpote molliorem, „sub processu sellæ posteriori, qui sinuatur, reconditam esse, scribit, ut ab incumbente mole cerebri, neque comprimi, neque urgeri aliunde aut violari possit. „Atque hæc quidem istic poterant quam paucissimis verbis indicari, præsertim cum tot verba etiam iterato fiant de notissimis basis cranii partibus, aliisque ejusmodi rebus, neque tamen semper satis perspicue, aut vere, veluti cum *alarum sphenoidis* nomine non ii processus hujus ossis quos Anatomici solent cum alis comparare, designantur, sed laterales illæ, atque oblongæ ejus partes quæ inter ossa temporum, & frontis ascendunt, quas quidem *Alarum Sphenoidis* nomine nemo intelligat, nisi si: quemadmodum Verheyenio placet: addideris; aut cum tertium ejusdem ossis foramen per quod Rami anterioris Paris quinti Ramus, ut Vieussenius appellat, minor inferior e cranii basi certe egreditur, *basim Cranii non perforare*, asseverat.

ANIMADVERSIO XXVII.

Nam quæ de Nervorum originibus Vir Cl. subinde interfert, eorum pleraque aut magis accurate tradi, aut in ista Explicatione, ad quam alioqui non pertinent, debuisse omitti videntur; nam vel

-- gratas inter mensas symphonia discors,
Et crassum unguentum, & sardo cum mellè papaver
Offendunt, poterat duci quia cæna sine istis.

Et alia quidem supra notavimus. Hic autem addemus: tertium Par nervorum, quod ipse „nasci, inquit, ex lateribus inferioribus medullæ oblongatæ, „nos videre consuevisse emergens ex internis, postremis, & fere imis lateribus Crurum ejusdem Medullæ. Septimum autem Par, quod ostendere se, dicit „recisum a latere posteriori protuberantiarum annularium medullæ oblongatæ, „ego non ejus protuberantiæ lateri, sed postremæ parti summa versus olivaria corpora jam inclinanti, adhærens soleo invenire, sic tamen ut non inde, aut ex vicinia totum pronascatur, sed ex parte erumpat a posteriori medullæ cerebri parte - ubi excavatus est calamus scriptorius; ut verbis utar Archangeli Piccolhomini, qui id videtur adumbrasse quod postea a Willisio indicatum, ab Ridleyo autem luculentissime ostensum est. Porro quod adjicitur: istud Par septimum in Figura ostendi „in partibus suis, „molli superiori, & dura inferiori, adhuc indivisum: „istam ego neque ostensionem, neque explicationem satis utilem esse, video. Non ostensionem, quia usque adeo laxè cohærent duæ illæ partes, ut perraro contingat, ut in elevando, eximendoque Cerebro, manifesto se junctæ non appareant. Non explicationem, quia una erat explicandum, quid superioris, & inferioris vocabulis intelligeretur, ut Lectores pro certo scire possent, adversaretur, an non Vieussenio, & Ridleyo, qui e contrario mollem hujus Nervi partem inferiorem & posteriorem; duram superiorem & priorem esse, Eustachii etiam delineationibus non obscurò indicio consentientibus, docuere. Sed quando hoc de Nervo sermo erat instituendus, præstabat fortasse, & ad præcipuum istius Explicationis institutum magis certe pertinebat, aliquid de illius surculis dicere qui intra cranii caveam revertuntur, atque adeo ad Receptacula ipsa subrepunt. Nam si evidens esse creditum est, foramina omnia pro nervorum egressu Receptaculis subjecta, comprehendî in cavitatibus hujusmodi, & propterea singula, quamvis notissima, descripta sunt; quanto magis de nervis, præsertim non ita apud omnes vulgatis, nec satis adhuc descriptis, id credere, & facere decebat? Hi autem de quibus loquimur, nervei surculi sæpe duo, alias plures, interdum unus, ex anteriore facie erumpunt processus petrosi ex adverso ejus foraminis quod ambas Auditorii Nervi Portiones admittit; & ossis superficiei arcte insistentes sub Dura Meninge eo usque repunt dum ad proximi Receptaculi posticam partem aut addant se comites majori, & posteriori Paris quinti ramo; nam sæpius vidi ab latere hujus rami interno pergentes, per idem eum eo foramen descendere; aut, quod novissime vidi, per longe minus foramen, inter hoc de quo modo dictum est, ac illud per quod arteria carotis Receptaculum subit, insculptum, hac etiam ratione e cranii cavea rursus exeant.

ANIMADVERSIO XXVIII.

Sequuntur de Sinibus multa: in quibus nihil tamen est quod alii; si vera fateri volumus; etiam melius non proposuerint. Nos autem quæ supra attigimus, non iterabimus; sed alia ejus rei exempla afferemus. De Sinu basis Longiore, Superiore, Minore, sive Angustiore (tot enim nomina ex idoneis, opinor, Auditoribus Vieussenio, & Ridleyo habemus, quibus hunc, & totidem opposita quibus Sinum proximum nuncupemus, ut non opus sit novis nos, iisque obscurioribus, & ex parte longioribus appellationibus onerare Sinus anguli posterioris sacci, & Sinus Crurum sellæ) de Sinu igitur Longiore scribitur: in processu petroso, foveam ejus tractui correspondentem insculpi. „At Solertissimus Vieussenius cautius, & verius scripserat: ejus „vestigia petrosi ossibus - ut plurimum leviter insculpta cerni. „Idem Sinus Brevioris „vestigia binis ossibus, petroso nempe, & cuneiformi

De Nervorum 3. & 7. Partis originibus.

Anat. Prælect. l. 6. lect. 5. 319.

337 loc. indic.

Tab. add. Theatro VI. F. 6. 9.

345

De quibusdam Surculis Paris 7. intra craniam redeuntibus.

Nervogr. lib. I. c. 2.

De Sinibus Sellæ adjacentibus.

Epist. in Eustachii Tab. Theatr. add. p. xii.

loc. cit.

„ mi paulo profundius incisa esse, „ dixit, neque ullam nobis „ articulationem ossis sphæroidis cum „ processu petroso „ memoravit; nam ubi nullus est motus, ibi jam diu plerique Anatomici desiere articulationem agnoscere. Idem cum „ Terminum, & concursum Sinus superioris, & longioris in lateralem Sinum „ in superioris Tabulæ Figura 3. delinearet, non modo in eo diligentior fuit, quod Venæ S in eundem Lateralem Sinum confluxum haud procul ab eo loco non omisit; qua de Vena præter id quod alibi attigimus, quæ ejus utilitas sit in medicina facienda, fortasse infra memorabimus; verum etiam id Vieussenius cavit, ne Sinus illius Superioris inferius extremum proxima ipsius parte latius proponeret, quod ab Nostro in sinistri Sinus delineatione haud est observatum. Atenim, inquires, in eo fortasse capite ex quo istam suam Figuram descripsit, ita latius erat. Quanquam sibi ad istam excusationem aditum præclusit, cum in nostris Figuris redarguendis id non attendit; latius, ut vis, fuerit. Ego tamen in sex quæ continenter inspexi, capitibus videre latius non potui, nisi in uno Sinu, idque assurgentibus quibusdam fibrillarum quasi retibus ex parte impeditum; in quinque autem non modo, ut in aliis multis, non latius, sed evidenter angustius inveni, imo in horum duobus finem ipsum cæcum, inferiorem autem extremum parietem Laterali Sinui incumbentem in uno binis exiguis orificiis, in altero uno tantum, sed paulo majore pertusum comperi; ea sanguini in Lateralem Sinum via erat: qua ratione suspicor fortasse etiam rem se habuisse, cum Doctissimus Vieussenius unum illorum Sinuum in eodem extremo *impervium* reperit, quod *semel tantum* sibi accidisse, confitetur.

ANIMADVERSI O XXIX.

JAm vero quæ, ubi de termino Sinuum Brevioris, & Lateralis, proponuntur, ea non modo delineatione (id quod evidens est, atque ultro conceditur) sed ne verbis quidem satis indicantur. Quis enim ista satis intelligat: „ Sinus „ lateralis in quamdam prius lacunam dilatatur, „ - mox ad posteriora venam utrinque vertebralem, specus vertebrales subituram, emittit e „ Sinu suo laterali posteriori. „ Num ibi Sinus lateralis Sinum alterum habet quem Anatomici appellitent Sinum ejus lateralem posteriorem, & ex quo venam istam vertebralem, non transversos, opinor, cervicis vertebrarum processus, sed specus dumtaxat vertebrales subituram, emittat? At hæc, inquit, „ videri poterunt in iconibus „ Willisii, & Vieussenii de Cerebro, & Amicis, „ simi Valsalvæ in tractatu de aure humana. „ Inspicient ergo Tirones hos Iconismos, explicationem aliquam istius Explicationis quærentes; sed num inventuri sint, vehementer dubito; imo vereor ne postquam eos omnes inspexerint, ipsis Terentianum illud contingat, ut *incertiores sint multo, quam dudum*. Nam primus quidem Willisii Iconismus nullam vertebralem venam ostendit; alter cum vertebralem sinum, non venam cum Diverticulo, seu Specu rotunda (sic enim Willisius quoque ante Vieussenium rem a Fallopio etiam nostro olim descriptam, appellavit) communicantem monstrat, tum in Specus illius figura a priore discrepat. Sed ab ipso multo magis discrepat Figura huic respondens Cl. Vieussenii, quæ præterea adjectam Specum non habet; duæ autem reliquæ Vieussenii Figuræ, quæ Willisii primæ respondent, illæ quidem cum Specu & Vertebralem Venam, & Sinum Breviorem ostendunt; sed errore, opinor, Typographorum, qui neque in tua Bibliotheca, neque in tuo Theatro sublati sunt, earum Explicationes ita secum invicem pugnant, ut quod in prima Vertebralis Vena esse dicitur, idem in altera pro Inferiore, seu Breviore Sinu ostendatur, & vicissim. Iconismus restat Cl. Valsalvæ multum ille quidem laudandus Morgagni *Adversaria Anat. VI.*

dus, quippe qui; ut alia nunc omittam quæ in ista Explicatione desiderantur; illud etiam quod in ipsa legimus de Sinu Laterali, præmonstraverat: „ inflecti videlicet non longe a loco signato „ 13. & ascendere. „ Attamen neque unde oriatur Vertebralis Vena, satis ostendit, nec mirum, quando id sibi Solertissimus Auctor non proposuerat, & Specus, sive Diverticuli longe aliam ac Willisii, & Vieussenii Iconismi, figuram monstrat. Quæ cum ita sint, aut ego quidem plurimum fallor, aut Tirones ad hos universos Iconismos inspiciendos generatim remissi, cui potissimum credant, nescient, & quod caput est, quomodo istam Explicationem satis intelligant, non habebunt.

ANIMADVERSI O XXX.

IN iis quæ porro de Rete Mirabili scribuntur, id ultro, libensque probo, atque agnosco, augeri ejus vasculosa filamenta solidis multis quasi lacertulis, qui ab Dura potissimum Meninge Receptaculorum parietes aut efficiente, aut investiente producuntur. Hac de causa credo Spiegelium quoque nostrum id Rete *plexum membranosum* esse, dixisse, atque ante ipsum, Jacobum Berengarium, qui testatur, se „ plusquam centies „ anatomizavisse capita humana quasi solum propter hoc Rete, „ & ad latera glandulæ pituitariæ „ a dextris, & a sinistris versus posterius „ sub dura matre sæpe vidisse, & tetigisse aliquid, quod irretitum, & simul intricatum, & ita „ etiam sub dura matre post foramen nuchæ in „ parte versus os laude supra os basilare; „ mox addidisse: „ sed quia Galenus, ubi supra, dicit, „ quod Rete mirabile est in substantia duræ matris „ saltem pro parte, ego credo, quod non possit „ videri totum Rete mirabile; quia dura mater „ cum eo est intricata taliter, quod unum non „ distinguitur alio. „ Et quamvis post hunc Nicolaus Massa quod ex eo Rete interdum apparet in *modum subtilissimorum villorum*, processus arteriarum subtilissimarum esse, docuerit, Willisius autem fibras nervosas in eodem posuerit; egregie tamen a Cl. istius Explicationis Auctore factum est, quod veros villos, & fibras, proprie loquendo, haud nervosas hic agnoverit: veri enim villi, & fibræ tendineæ, ac lacertosæ, naturæ Crassæ Meningis, a qua, ut dicebam, hæc propagantur, conveniunt. Utinam vero probare æque possem quod de eodem Rete mirabili affirmavit, videlicet *non minus in homine, quam in animalibus quibuscumque aliis perpetuo affidere*. Neque hoc eo tantum dico, quod ego semper ultro fateri, & præ me ferre consueverim, me animalia quæcunque non dissecuisse, ac propterea quomodo hæc res in quibuscumque animalibus se habeat, ignorem; verum ob id etiam dico, quod animadverterim, nullum ferme esse Anatomicum ex iis ipsis qui Rete Mirabile in homine agnoscunt, qui minus insigne in hoc esse, quam in multis quæ enumerant, brutis, non docuerit, atque ego in nonnullis humanis capitibus, vix levia quædam ejusdem Retis vestigia observaverim, quod & aliis pluribus Anatomicis sæpe video contigisse.

ANIMADVERSI O XXXI.

Porro si quis istam dumtaxat Explicationem attendat, ipsos etiam Sinus Frontales cunctis in hominibus esse, credet: quod a vero abesse, alias a nobis traditum est. Et si quis pariter istam tantummodo inspiciat Figuram, esse in omnibus existimabit in ipso processu, seu mavis „ spina „ in medio faciei internæ ossis coronalis eminentem, te „ pertenuem fissuram secundum ejus spinæ longitudinem „ insculptam pro receptione apicis, cis falcis messoriæ: „ cujusmodi tamen fissuram vix quidem bis, aut ter vidi; alias enim transversam vidi, & non ita tenuem, alias instar circularis foraminis, quinimo ut plurimum nullam

De Rete Mirabili.

De hum. corp. fab. l. 10. c. 4. In Mundin. Commen. 35.

Anat. lib. introduct. c. 39.

348. Advers. I. n. 28. De Cranii Basi, & Falce nonnulla.

348

Cerebr. Anat. c. 8. F. 4. Tab. 13. Fig. 2. Obs. Anat.

Theatr. Tab. 44. Fig. 1. Tab. 92. F. 1. Tab. 97. F. 1.

Tab. 107. Fig. 2.

nullam comperi in eo processu, sed in interstitio quod inter ipsum, & Cristam, ut vocant, galli interjectum erat (perperam istic, ut ipsa quoque Crista, delineato) foramen circulare, nonnunquam quadrangulare, nec minimæ sane magnitudinis, conspexi: quas quidem res ad vasa potius sanguifera transmittenda, quam ad *receptionem apicis falcis messoriae* Natura instituit. Nam etsi ejus particula sæpe in exigui conii modum conformata foramen subit, facile tamen & sine ulla vi inde evellitur, cum reliqua pars initii ejusdem Falcis tum Cristæ ipsi, tum ossæ laminæ in quam hæc retrorsum producit, satis arcte adhæreat; neque enim in apicem perangustum ad basim cranii Falx contrahitur; imo in nonnullis ita adhuc ampla est, ut insignis, firmique septi instar haud brevem ad tractum dirimat Olfactorios Nervos, & Hemisphæriorum Cerebri partem anteriorem.

349

Quod autem Cl. Auctor mox pollicetur, se nervorum opticorum, originem a thalamis, opticorum dictis, sat distitam suo loco demonstraturum; ibi etiam ab ipso demonstrari, vellem, *Foramina pro exitu eorundem nervorum esse inter os coronale, & basilare*: quæ nempe Foramina in Craniis omnibus quæ ego in præsentia bene multa ante oculos habeo, tota intra unum os *basilare* manifesto apparent insculpta. Nam sive ab orbita, sive a cranii cavea inspectes, futuram vides per quam *basilaris* ossis pars anterior quæ illa Foramina undequaque complectitur, a postica ossis frontis parte evidentissime sejuncta est. Hæc futura, quæ a Bucetio omissa non est in eo Iconismo quo basim internam cranii ostendit, ad nonnulla quæ paulo ante dicta sunt, intelligenda perutili; hæc, inquam, futura illud quoque indicat: productiones istas falcatas *q q* non totas ex *clinoidibus anterioribus processibus venire*; quippe quæ ex parte non exigua pertinent ad os frontis. Num autem istæ productiones falcatæ, am-

Ad Spig.
l. 2. Tab.
5. Fig. 1.

347

bo Cerebri hemisphæria ad eorum basim intersecantes, in duos ulterius limbos utrinque distincte subdividunt; & num super proram capitis jaceat utrinque limbus anterior utriusque hemisphærii Cerebri: & denique num sedeat ad mediam utrinque basis cranii cavitatem adimplendam limbus posterior utriusque hemisphærii cerebri, me fateor ignorare; nam quid anteriores, & posteriores Cerebri lobi sint, scio; quid *limbi* autem sint, in his videlicet locis, nescio.

ANIMADVERSIO XXXII.

348

Multoque etiam magis nescio, qua unquam ratione docere Cl. Auctor possit: per foramen magnum occipitis 25. *egredi-venas vertebrales*, præsertim qui supra docuerit: Sinum lateralem - descendente tandem, & egredientem, e calvaria per amplum utrinque foramen 13. - mox ad posteriora venam utrinque vertebralem - emittere. Quid vero dicam de duobus Foraminibus 26. per quæ exit a cerebro (ut ipse loquitur) nona conjugatio? Nihil sane aliud, nisi ipsum aut has res satis non observasse, aut; quod malim credere; esse oblitum, se istam cranii basim exhibere *dura Meninge coopertam*. Fibra enim istud Par Nervorum effecturæ ita raro singulis, quemadmodum pingit, foraminibus in singulis lateribus Duram Meningem pertundunt, ut in præsentia vix meminerim, me ullum caput secuisse in quo ab altero saltem latere binis distinctis foraminibus eandem non pervaderent. Et id quidem etiam Virorum Solertissimorum Willisii, & Vieussenii delineationes, in superiore Tabula exhibitæ, ab utroque latere ostendunt.

De nona
Pari Ner-
vorum.

343

Quod autem hos nervos, ortum trahere, inquit, a parte posteriori corporum olivarium, & pyramidalium; ego vero ex illo interstitio quod inter ea corpora intercedit, videre soleo emergentes ea quidem ratione, ut non raro a postrema interstitii parte nullæ ipsorum fibræ

exoriantur. Atque ut tandem aliquando istam Explicationem dimittamus; quod de Nervorum Pari decimo subjicitur: „ad regionem primæ, vertebræ emergere a lateribus medullæ oblongatæ, forsitan jam in spinalem conversæ; ego quidem hac de re minus dubitandum esse, judico, ubi semel constituerimus, eam unde nervi hi prodeunt, Medullæ partem extra cranii caveam censendam esse, quamvis in ea quæ inter disseccandum fit, Nervorum ostensione cranii basi incumbere videatur. Hoc autem propterea videtur, quia cum ante eam disseccationem, ne forte quidpiam eorum quæ sunt ostendenda, vitietur, summæ aliquot cervicis vertebræ una cum cranio relinquantur; hinc efficitur, ut anterior paries cavæ primæ vertebræ, ut est alioqui leniter declivis, & eadem Dura Meninge qua basis cranii, coopertus, facile pro parte basis cranii, sive anteriore maximi ejus foraminis margine perperam habeatur. Nec tamen propterea cum iis libenter facio qui decimum Par pro Cervicalium primo connumerant, tum ne receptam hac ætate docendi consuetudinem turbem, tum etiam quia non, ut Spinalia, antico, posticoque principio id Par nervorum instructum est.

De Pari
decimo:
& de
Medullæ
Oblongatæ
Basisq.
Cranii
finibus.

ANIMADVERSIO XXXIII.

Reliquas Tabulæ istius Figuras, novam etiam, iam & accuratissimam (ut tu quidem ais) Ductus Lacrymalis explicationem continentes, ubi tu, veluti promittis, indicaveris, ibi & nos commodius perpendemus. Nunc quæ de exterioribus Oculi Partibus ipse scribis, vel potius magnam partem ex Verheyenio describis, inspiciamus. Et primum, ut quod de Palpebrarum structura in eo reprehendit Cl. Heisterus, id tibi, atque alia condonemus, velut hoc quod cum Verheyenio omittas non postremum Ciliorum usum, in eo videlicet positum ut in nimio lumine magnam radiorum partem arceant; at quæ de proximis habes Glandulis, ab nemine certe, multoque minus a me possunt dissimulari. Ego enim quo primum tempore Anatomes studio me dedi, cum ex variis admodum, & inter se discrepantibus Anatomicorum traditionibus nihil certi de Lacrymalibus Glandulis, & Ductibus colligere possem, ad optimum Anatomes librum, hominis videlicet, ac brutorum disseccationem me contuli, ex quo cum multa alia didici quæ postea commemorabo, tum illud præcipue cognovi, plerosque passim Recentiores Anatomicos in eo potissimum lapsos esse, quod non modo eas glandulas, earumque canaliculos eadem in nobis atque in brutis ratione esse tradidissent, verum etiam glandulam horum interiorum, quæ in nobis omnino deest, & lacrymalem carunculam, quæ neque proprie glandula est, & brutis, atque hominibus est communis, idem prorsus esse, credidissent. Hæc cum in I. Adversariis monuissem; Verheyenius, qui cum cæteris jam erraverat in lacrymalis carunculæ historia, docens: „Ex hac glandula duos, vel tres lymphæ-ductus in palpebræ superficiem dehiscere oculi globum aqueo humore irrigantes; in altera Anatomes suæ editione hunc locum satis emendatum fore, credidit, si ita scriberet: „Hujus ductus excretorii in bove inveniuntur duo, aliquando plures. - Credendum est, iis non omnino destitui oculum humanum, quamquam ibidem, ob tenuitatem, ut reor, non observentur; illud enim proxime ante hæc posuerat: „duarum Oculi Glandularum - minorem *Carunculam lacrymalem* vocatam - in homine exiguum esse, at cum pro portione multo majorem in pecudibus. Sed quamvis id quod de iis ductibus velut certum atque exploratum sine ulla primum hæsitazione docuerat, nunc ceu credibile tantum proponat; in hoc ipso tamen errorem præcipuum, atque adeo primi erroris causam retinet. Neque enim intelligit, carun-

342.

349.

Comp.
Anatom.
Præf.

351

De Carun-
cula, &
Glandula
(ut pu-
tant.) La-
crymali.

num. 22.

l. 1. tr. 4.
cap. 14.

De Innominatae
Glandulae
Ductibus.

Advers. I.
num. 22.

carunculam lacrymalem non modo in homine, sed ne in ipso quidem bove esse glandulam, atque duos illos bovis ductus excretorios, non ad ejus carunculam, sed ad peculiarem, hac interiorē, & longe majorem, glandulam pertinere, quæ quidem glandula, non exigua, sed nulla prorsus in homine occurrit. Quæ cum ita sint, quam bene in iis omnibus Verheyenium secutus sis, tute videris, Maugete Ornatissime; ego autem vicissim videro, cui usui destinem fibrillas istas nerveas per Innominatam Glandulam subterlabentes, atque adeo instar exilium rectorumque canaliculorum palpebram versus contendentes, quas in homine ab nonnullis Anatomicis pro ejusdem Glandulae ductibus nimis facile acceptas esse, & alias suspicatus sum, & nunc magis cogor suspicari.

ANIMADVERSI O XXXIV.

351. **I**stas videlicet fibrillas dico quas tu, Præstantissime Vir, commemoras, ubi te Innominatæ Glandulae humorem per ejus ductuum orificia, in hominibus non semel stillantem vidisse, testatus; quamvis, inquis, ejusmodi ductus Clarissimo Morgagni, in suis Adversariis Anatomicis Primis, pro meris habeantur nerveis fibrillis, nescio cui demum usui a tanto Viro destinatis. Equidem non modo Humanitati, verum etiam sedulitati tuæ multum in hoc loco debere me, fateor, quod suspicionem istam meam dignam censueris quam memorares, & cui duplici ratione occurreres: eoque magis id fateor, quod Verheyenium eandem prorsus dissimulavit. Cum enim ipsi qui de hujus quoque glandulae ductibus non minori securitate primum scripserat, eam confessionem extorsissent: ipsos, in homine, multum exiliores esse, & vix ad oculum demonstrari posse illorum cavitatem; sive ne id me admonente, fassus esse videretur, sive ne eorum rectorum nervulorum mentione tantummodo injecta, quid essent suæ illæ a glandula deductæ lineæ, jure optimo in dubium vocare cogeretur; diligenter cavit, ne aut me, aut meam, observationi innixam, suspicionem memoraret, vel indicaret; imo adversus eos dumtaxat qui temere, & sine ulla ejusmodi causa, istas lineas ductus esse, dubitarent, suam de his sententiam munivit. Sed quoniam tu contra, Vir Cl. pro tuo candore, & pro veri studio neque nostram suspicionem dissimulandam, & ipsi occurrendum censuisti; æqui etiam bonique consules quæ pro ipsa reponemus. Nescire te, inquis, cui demum usui nerveas istas fibrillas destinem. Primum; ne de creberrimo palpebrarum motu quidquam dicam; tu certe ipse paulo ante ex Cl. Ruyschii observatione docuisti, interiorē ipsarum tunicam, nerveis papillis conspersam esse, atque in, de exquisito gaudere sensu. Deinde fac, me omnem istorum nervulorum usum ignorare; num propterea non essent; quos certe ex orbita ad glandulam, & ex hac ad palpebram, quemadmodum descripsi, tendentes & ipse in plurimis oculis vidi, & tu, quandocunque libeat, videre potes? Igitur mihi concedas necesse est, & istos ibi esse nervulos, & quod consequitur, nonnullis imponere incautioribus, ut dixi, Anatomicis potuisse, præsertim cum tot alios manifestos eorundem errores in hisce Partibus deprehenderim, cumque quos illi Innominatæ Glandulae ductus in homine sine ulla dubitatione describunt, & pingunt, eos vel diligentius inquirentibus haud ita uti in brutis proclive sit attingere, ut iisdem verbis utar quibus vel ante Verheyenii confessionem sum usus.

ANIMADVERSI O XXXV.

AT nos, inquis, humorem aqueum per prædicta orificia in hominibus non semel stillantem vidimus. Per quamnam, obsecro, orificia? Per ea videlicet de quibus paulo superius hæc scripseras: Glandula Innominata ad suum Morgagni Adversaria Anat. VI.

„periores palpebram pertinet, & in ea ab uno „prope angulo in alium extenditur. - In plures „quali lobos dividitur, e quorum singulis ductus „ad extremam usque palpebræ superioris oram „progrediuntur. Unde per orificia in bobus setam „facile admittentia; in hominibus vero minus „patula, aqueus perpetim suffunditur humor. „Pari candore tecum agam, Vir Cl. Tuam istam descriptionem neque cum humana, neque cum bovina anatome convenire, crediderim; quarum cum neutra convenire certe scio Figuram istam 5. Bidloii, quam respicias necesse est, cum postmodum ais: in proxima Tabula „illa omnia quæ hætenus circa oculi exteriora delibasti, abunde enarrata, ac accurate delineata reperiri. „Ut enim reliqua prætermittam, Glandulam dumtaxat Lacrymalem I, ejusque Ductus L. versus Nasum tendentes, illam quidem in homine, hos vero ipso vel in bove ostendi mihi, sane velim: quod si nemo præstare potest, quo loco ista Figura habenda sit, nemo non videt. Sed faciamus tamen, in illa esse accurate, ut ais, delineata quæ ad Innominatam Glandulam pertinent; quid tum, quæso, de tua hujus glandulae descriptione censebimus? Hanc tu ab uno prope angulo in alium extendi, scribis. At Figura, in hoc sane haud reprehendenda, ab interno angulo distantem exhibet. Tu e glandulae lobis singulis ductus ad extremam usque palpebræ superioris oram progredi, tradis, Verheyenium secutus, qui sequi ipse non videtur suam illam qua alioqui, ut solet, innititur, cum bobus comparationem, quippe quibus, ut Illustris Anatomici Stenonis Iconismi ostendunt, primum non ex lobis, sed ex loborum interstitiis, deinde pauciores, rarioresque (& ex glandula quidem multo ampliore) ductus erumpunt, quam ipse, & tanto magis quam Bidloius in homine delineent, novissime intervallo non ita exiguo ab extrema palpebræ superficie, sive orahiantes. Contra & Figura ista Bidloii, & quod magis mirandum est, Icon etiam Verheyenii & hujus, & tuæ descriptioni in eo apertissime adversantur, quod illorum ductuum fines, ad extremam usque palpebræ superioris oram, non protendunt. In hac tanta vestrum inter vos, imo tui a te ipso discrepantia dabis mihi veniam, Vir Cl. ut quando in definiendo orificiorum istorum loco incertus adhuc esse videaris necesse est, in dubium ipse vocem, non illud quidem, an aqueum humorem ex superiore hominum palpebra non semel stillantem videris, præsertim cum Bidloius tuus glandulas alias hisce ductibus intersitas vel in homine delineet, sed hoc tantum, an ille quem vidisti, humor per ipsa horum ductuum orificia reapse destillaverit. Quæ tamen omnia sic a te, cæterisque Anatomicis accipi velim, ut eorum memineritis quæ, cum suspicionem illam meam proposui, continuo subjeci: Attamen, etsi est vero plurimum simile, nos iis ductibus non destitui, de iis adhuc plus quam censent, aliqui, in humanis oculis quærendum puto. Scilicet donec Anatomicos legero aut ita de his ductibus verba facientes, quasi haud minus in nobis quam in bobus, ovibusque eos passim ostendere proclive esset, aut in eorum historia sibi ipsis adversantes, pergam facere quod tunc institui, Tirones videlicet monere, ut quæ descriptiones non satis certæ, ac manifestæ observationi, sed illi potius brutorum, atque hominum similitudini innixæ sunt, quæ quam sæpe fallax sit, cum alias a nobis, tum modo in Lacrymali Glandula ostensum est, iis ne temere fidem habeant; quid enim, si Glandula Innominatæ canaliculi longe aliter in homine, atque in bobus, dispositi tantummodo essent, ac distributi? Quod si contra, & constantem descriptionem legero, & in quibus potissimum cadaveribus, & qua ratione sine ullo fallaciæ periculo istos ductus perspicue monstrare liceat, expositum videro; tum mihi ipse magis quam ad hoc tempus feci, in eorum perquisitione satisfaciam, tum aliis, ut maximam tribuant fidem, auctor ero.

376.

Observ.
de Gland.
Oculor.

Tab. 27.
Fig. 3.

Advers. I.
num. 16.

In cæteris quæ de Palpebris a te adduntur, optassem, ut si non utri Palpebræ inserviat Musculus Attollens, at certe ad quosnam Carotidum, & Jugularium ramos illarum vascula pertineant, docuisses, ut & quodnam sit illud *tertium par* a quo *potissimum* nervulos Palpebris immitti, scribis; nam si cum Antiquis loqueris, & quintum Par innuis, qua ratione Tirones intelligant, quos in superiore Capite de Cerebro longe aliter loqui docuisti? Sin autem hic quoque Recentiores sequeris, vide, num verum sit, a tertio potissimum horum Pari nervulos ad Palpebras mitti. Illud quoque optassem, ut quot in *utraque* Palpebra sint Puncta Lacrymalia dicta, tradidisses, & quanta demum hæc sint, quæ *satis ampla* esse, dicis; illud quidem, ne forte errores, alias a me confutati, de Punctis Lacrymalibus etiam externis Tironum animos rursus invaderent, hoc vero, ne quis tanta ipsa crederet, quanta in Tabulæ extra ordinem V. Figuris quibusdam pinguntur. Sed quoniam hæc omnia quæ ad Lacrymales Ductus pertinent, in subiecta Dissertatione *illustrata* esse, tuis Lectoribus affirmas, & *novis multis, ac vere utilis cumulat*; idcirco istam, & respondentem ipsi memoratas Figuras inspiciamus.

ANIMADVERSIO XXXVI.

Dissertationis in-
scriptæ:
Ductus
Lacryma-
les Novi:
Examen.

ET si Dissertationis inscriptio Ductuum Lacrymalium *Morbos* etiam, ac *Curationes* promittit; nos tamen de his haud multa attingemus tum ne hæc Adversaria præter superiorum modum valde excrescant, tum quia inaudivimus, Cl. Anellium, quem potissimum Dissertatio impetit, illa diligenter esse expensurum; quanquam vel ea quæ de eorum ductuum *Ufibus*, ac præsertim *Anatome* perstringemus, satis fortasse cautiore cuique Lectori indicabunt quid de reliqua illa Dissertationis parte censendum sit. Sive *Ductus Lacrymales Novi*, ut Auctor scripsit, sive *De Ductuum Lacrymalium Novorum*, ut tu edis, hujusce Dissertationis inscriptio est, diserte sane Ductus aliquos Lacrymales *Novos* in ea descriptos pollicetur. At vero dolendum est, quod hac tanta spe confestim excidamus. Fatetur namque Cl. Auctor, se, titulo *Ductuum lacrymalium novorum* specioso eosdem insignivisse, tanquam editione naturali habitudinis suæ primâ vice donatos. Factum bene quod *speciosis* ejusmodi *titulis* Anatomie Professores sibi opus esse, non crediderint; certe multas Dissertationes de Novis Pulmonibus, de Novis Auribus, & si Diis placet, etiam de Cerebro, & de Corde Novo *speciose* inscriptas legissemus. Neque egomet mihi defuisset, sed pro Adversariis Anatomicis Primis, Laryngis ex. gr. Novæ, & Organorum Generationis Novorum Observationes emissem. Et ne longius ab hisce ipsis Ductibus, & Glandulis Lacrymalibus abeamus, cum ego incidissem in ea tempora quibus Anatomici plerique omnes in harum Partium Anatome vel multa etiam manifesta, & per se obvia omittebant, vel multa a vero evidentissime aliena, & inter se discrepantia tradebant, vel ex parte etiam, ut Cl. Heisteri testimonio utar, *succincti nimis* erant, *vel obscuri*, prout, inquit, *tum exempla ab Anello in epistola responsoria ad Morgagnium allata, tum innumera alia evincunt*; cum in ea ergo tempora incidissem, & quid brutorum, quid hominis peculiare esset, quid verum, quid non, improbo labore perspexissem, cumque eas tenebras brevi quidem, sed pro instituto satis perspicua, atque, ut Heisterus idem vocat, *accuratiore* descriptione, novisque additis observationibus, & primo omnium lacrymalium ductuum Iconismo, discussissem; potuissem, opinor, idque aliquanto potiori jure ipsos, ut *Novos*, proponere. Verum enimvero non modo id faciendum non putavi; sed Præcorum Inventorum causam ita feci meam, ut is quem sæpius suo merito laudo, Heisterus, facile, ajat, concedi-
mus celeberrimo Morgagno, Galeno jam tum,

„ Berengario, & Falloppio nota fuisse non solum „ puncta lacrymalia, sed & eos in quos produ- „ cuntur, meatus; „ usque adeo abest, ut id fecissem, si de re nuper ab aliis tum Iconismis, tum iteratis descriptionibus illustrata scripsissem. Atenim hic, inquires, „ tandem ad veram eorum „ dem ductuum fabricam explorandam pervenit, ab „ hucusque descripta notabiliter diffitam, - ejusque „ vivam, sanioeremque imaginem deprompsit; „ quasi vero etsi rem perfecisset, ea quæ aliis, vel quæ nos invenimus, aut illustravimus, primus invenisset. Verum ne perfecit quidem; sed, ut postea ostendemus, quæ præcipuis in locis *vera* esse, credidit, ea non magis ab nostris descriptionibus, quam a vero sunt *notabiliter diffita*: neque *vivam, sanioeremque imaginem* ipse dedit; sed ei prorsus contigit quod infra innuit: „ Descriptio, „ inquit, hujusmodi anatomica, quæ forsitan ha- „ ætenu expleta non satis fuerat, nec forsitan mihi „ pro voto successerit sat faulta, ob nimie operum opus, lacrymales hujusmodi partes flaccidas, minutas, profundas, ab attiguis membranis, pinguedineis, ossibus, implicantibus „ ideo, confundentibus, occultantibus, separandi, & exhibendi. „ Quod cum jure optimo vereretur, mirari satis non possum, cur duo pariter non sit veritus, alterum, cum hanc sibi honestam excusationem pararet, aliorum contra „ nullam hucusque, ut vocat, imperfectamque inspectionem præcipiti forsitan dissecandi modo imputandam „ dixisse; alterum, ne qui victa subinde aliqua ejusmodi difficultatum, aliquid subinde, ut sit, inventis adderent, ii singuli eodem exemplo *speciosum* eundem *titulum* quærent, & sic quotannis, si Diis placet, *Ductus Lacrymales Novos* haberemus. Quæ tamen omnia in eam partem accipias velim, Mangere Ornatisime, ut non carpendi studio, a quo longissime absum, dicta putes (si enim id spectassem; quo primum tempore ista Dissertatio prodiit, hæc scripsissem) sed ea dumtaxat de causa, ut intelligeres, primum tuarum fuisse partium Adnotatione aliqua Lectores admonere, non usque adeo parum ad hoc tempus in hac parte Anatomies fuisse elaboratum, ut Ductus Lacrymales appellari possint *Novi*; deinde quo jure ad me pertineat hic tecum de tot istis *novis* rebus quas iis Ductibus additas pronuncias, pro veri studio disputare.

ANIMADVERSIO XXXVII.

Quod antequam facio, illud iterum juvat tibi in memoriam redigere, meam Lacrymalium Ductuum descriptionem ob id potissimum institutam fuisse, ut ea in quibus tunc versabamur, tenebræ discuterentur: quod sanè consilium, & brevitatis præterea ab initio promissa, non omnia quæ alioqui potuissem, proponere patiebantur. Igitur quæ satis esse tunc credidi, ea scripsi, vel potius, ut eadem qua eo tempore, utar voce, *perstrinxi*; Figuram vero, ut alia etiam quæ in posteriore Palpebrarum parte inspicienda erat, conspicerentur, Ductuum una cum Palpebris a sua sede amotorum (quod pro eo instituto satis erat) exhibui. Quæ cum ita sint, æquis rerum æstimatoribus constare potest, siqua forte, ex nostra aut descriptione, aut Figura non satis intelligantur, haud continuo nos esse, quasi ea prorsus ignoraremus, redarguendos. Sed tamen quot demum, & quænam reapse videri possint aut omissa, aut perperam exposita a nobis esse quæ Dissertationis Auctor Cl. aut ipse addiderit, aut emendaverit, videamus. Utrumque Punctum lacrymale „ non est, inquit, insculptum in ipso „ corpore tarfi, sed ad oram ejusdem intimam; „ ut optime etiam advertit Ornatisimus Morgagni. „ Hoc igitur primum unde ipse incipit, non omisi, imo (quod ipse non præstitit) Figura etiam indicavi. Deinde „ occurrunt, inquit, ea Puncta hinc atque hinc ad carunculam. utrisque palpebris intermediam. „ Neque id a nobis omisum est,

357

352.

352.

Vid.
Adv. I.
num. 22.

Diff. de
n. m. f.
Fist. lacr.
c. 2.

Advers. I.
num. 1.

num. 227

De Punctis
Lacrymalibus.

loc. cit.

est, qui inter bina foramina carunculam fere interpositam esse, scripsimus; at quantum illa ab hac distent, quâ sciri posset, satis docuimus, cum ad has res, ceteroqui ob aliam in aliis oculorum magnitudinem haud ita certis dimensionibus definiendas, in obvio quocunque homine observandas remisimus. Pergit: „Hæc Puncta „licet in subiecto multo minorem apparenter „aperturam præ se ferant, quam figura deferat, „dilatabilia tamen sunt usque ad demonstratam „amplitudinem, & ultra, non tam in mortuis, „quam multo magis in vivis, per insinuationem „facillimam setæ suillæ, specillorum, &c. „Hæc certe ego non docueram; sed nec docere sane poteram. Cum enim sapius expertus sim, specilla tubulis in quos ea puncta aditum præbent, exacte congruentia, si a tubulis puncta versus promoveantur, ubi ad hæc pervenerint, subsistere, ac per ipsa puncta, quantumvis antea per setas, & minora specilla (quoad ejus sine vi, & distractione fieri potuit) dilatata, traduci non posse quin horum margo disrumpatur; quâ docere unquam potuissem, ipsa puncta ad parem iisdem tubulis amplitudinem (tantam enim 2. ista Figura demonstrat) & ultra esse dilatabilia? Itaque & multo, ut revera sunt, angustiora delineavi, & valde miror, usque adeo distracta, & dilatata exhiberi in ista Figura cujus argumentum diserte promittit *vasa omnia lacrymalia ab oculo ad narem, in statu, & mensura naturali*; quando præsertim non modo in hominibus, ut dixi, valde minora, sed in bobus etiam, atque ovibus, ut observasse memini, aliquanto angustiora iis tubulis Natura efformaverit. Verum pergamus: „Jacent, inquit, hæc puncta supra emittentiam quamdam ad palpebras utrasque locata, tam. „Neque hoc omiseram; imo exactius scripseram: *in palpebrarum limbo interiore, ubi prominentia exigua est, & (quod ipse nequaquam fecit) in Figura delineaveram.* „Annulo cœterum cartilagineo tenuissimo sepiuntur, inquit, „punctorum oscula; cujus præsentia, & rigiditate apertio eisdem perpetua servatur. „Etsi cum docui, hæc puncta *ad tarsorum internos limites insculpta esse*, illud satis innuisse videri possum; siquis tamen tenuissimum istum annulum, adscriptumque huic usum diserte ab aliis antea traditum videre cupit, is Cl. Anellii Descriptionem Ductus Lacrymalis inspiciat: quod idcirco admoneo, quia cum Dissertationis Auctor me vix aliquando, Anellium autem, per cujus observationes pariter profecit, nunquam nominet; hinc factum esse, animadverto, ut exteri Scriptores Doctissimi quorum spectata æquitas nempe facit, ut satis intelligam, nondum in eorum manus Anellii Descriptionem eo tempore pervenisse, „inter nova anatomica Nostri observata annulum cartilagineum punctorum lacrymalium, retulerint.

ANIMADVERSI O XXXVIII.

352

Sequitur Anatomica Administratio, cujus tradendæ cum *munus indeclinabile* (quod tamen plures Summi Anatomici minime videntur censuisse) cujus, inquam, Administrationis tradendæ cum *munus indeclinabile esse*, dixerit, *Anatomici, qui primus partem aliquam demonstrat, aut prævias saltem demonstrationes emendat*; non sane video, cur propterea hunc sibi laborem summat qui nec primus hæc demonstrat, neque, ut ostendemus, aliorum demonstrationes emendat, neque demum in ipsa Administratione monitum ullum peculiare, aut quidquam revera ignotum memorat. Nam quod *frænulum, seu ligamentum, quod orbicularis musculi tendo est, ac palpebras utrasque oculi, ad canthum internum connectit*, ejusque productiones - cur non memorent *Anatomici*, - *videre se*, negat; nimirum hæc memorant tum inter Veteres qui *acuta principia* illius musculi ad eundem angulum ponunt, tum ex Recentioribus sive qui tradunt, ejusdem musculi *ge-Morgagni Adversaria Anat. VI.*

minos tendines circa exortum unitos quasi appare-re, sive qui monent, ut in lacrymalis fistulæ curatione *ligamenti palpebrarum læsio* vitetur. Sequuntur post hanc Administrationem non novæ res, sed *nova nomina*, ut voce utar Gravissimorum Virorum qui Acta Eruditorum conscribunt. Quos enim tubulos ego post Falloppium *Meatus*, Anellius autem *Limacis Cornua* appellavit, Dissertationis Auctor, oblitus, ut opinor, etiam Saccum de quo mox dicet, lateralem canalem esse, *ipse*, inquit, *canales lacrymales laterales nuncupo*. At tria quæ de his Meatibus subjicit, res sunt quarum primam non satis intelligere me, fateor. Quid enim est istud *conferre*? „Eorum, inquit, „latitudinem si specillo introducto tentamus, „cum delineata in Figura *conferre* animadvertimus. „Alteram a vero esse alienam, mox docebo. Tertia quæ vera est, illa nimirum ipsa est quæ a me quoque tradita fuerat, nam *tarsum* (quod ipse dicit) *ad utrumque punctum lacrymale desinere videri*, idem est, atque *puncta lacrymalia* (quod ego dixi) *ad internos tarsorum limites insculpta esse*. Porro de iis quæ super lacrymali caruncula interjicit, quid censendum sit, tum ex illis quæ cum de eadem rursus verba faciet, scribemus, tum ex his intelligetur quæ de *sacco lacrymali communiter appellato* protinus afferentur. „Inchoat, inquit, saccus a „basi carunculæ; - *Definit ad e. idest ad contactum, & connexionem ossis lacrymalis, seu unguis vulgo dicti, ac processus superioris tertii paris ossium superioris mandibulæ.* „Addit alia de duobus hisce ossibus, efformataque ab ipsis sede lacrymalium viarum, quæ cum aliunde, & nominatim ex Descriptione etiam Anellii colligi possint, prætermitemus: at quæ de *Sacco lacrymali communiter appellato* scribit, examinabimus.

A. 1716.
M. Oct.

353

loc. cit.

ANIMADVERSI O XXXIX.

ET primum inchoare saccum a basi carunculæ, negamus. Ab illo quidem carunculæ extremo quod nasum respicit, quodque ipse basim vocat, incipiunt se se contingere duo Meatus qui a punctis lacrymalibus veniunt; sed tamen ab hoc eorum contactu saccus non incipit, quemadmodum ipse credit, & in Figuris delineat. Scilicet antequam illi meatus in unam communem caveam aperiantur, & confluant, tanto spatio pergunt, extrinsecus quidem se contingentes, sed intrinsecus omnino, velut antea, divisi, ut dimensionibus accurate habitis in plurimis cadaveribus, longitudinem illius communis caveæ, sive distantiam a confluxu ad Majorem Ductum Lacrymalem subtripulam sæpius, non raro & subquintuplam compererim ad distantiam quæ ab eodem confluxu ad punctum quodque lacrymale intercedit; cum illam ipse in 2. præsertim Figura non subquintuplam, non subtripulam, sed subdupla majorem exhibeat. Jam autem a vero alienum esse id quoque intelligitur quod supra de Meatibus illis scripserat: „eorum videlicet tractum supra membraneum palpebrarum marginem esse, usque ad „concursum in sacco; „nam membraneus palpebrarum margo usque huc revera non pertingit. Hactenus sacci longitudinem nimis oculum versus extendisse, monstravimus; nunc & nasum versus nimium protraxisse ostendetur. Igitur qui, hisce omnibus Partibus sua in sede servatis, primum duos illos meatus a punctis lacrymalibus usque ad communem caveam, tum hanc, & denique Ductum in quem hæc influit, Majorem secundum longitudinem aperuerit, cum ea quæ hactenus docuimus, aspiciet, tum animadvertet alia quæ in plurimis pariter cadaveribus continenter sectis observavimus, Majoris videlicet hujus Ductus partem superiorem communi illa Meatum cavea latiore esse, & præterea ad posteriora multum expandi sic ut ejus sectio transversa non circulum, sed ellipsim repræsentet

De Sacco, ut vocant, Lacrymali.

De Majoris Ductus Lacrymalis figura.

cujus major axis ab anteriore ad posticam partem porrigitur. Quæ cum ita sint, ipsa inspectio continuo demonstrabit, summum Ductum Majorem in cuius latus, idque ab anteriore parte, communis cavea, ipso angustior, influit, cum hac confundere, & uno Sacci nomine accipere propemodum perinde esse ac si quis imum Coli intestini tubum influentis in ipsum Ilei partem esse, diceret, & uno Ilei nomine appellaret. Si igitur, ut in Colo facimus, extremam illam Majoris Ductus partem, non cum minore & laterali cavea perperam confundemus, sed potius, ut par est, ab eo in quem manifeste producit, tubo nequaquam distinguemus, Saccum non modo eo quo Cl. Auctor tradidit, non extendi, sed exiguum prorsus esse caveam, intelligemus. Ex his, Mangete Ornatissime, primum colliges, cur istiusmodi, exiguum videlicet, caveam Meatibus, & Majori Ductui interjectam in mea illa perbrevis descriptione sigillatim memorandam esse, non crediderim: quam tamen mihi ignotam non fuisse, iis qui veram ipsius exiguitatem noverint, mea tum verba, infra opportunius expendenda, tum Figura; quamvis in hac Partes & clausæ adhuc, & extra suam sedem amotæ, & caruncula nominatim retrorsum revoluta ex parte obstant; sic satis poterunt indicare. Deinde colliges, quid de duobus angulis, ac præsertim superiore, & quid de dimensionibus Sacci censendum sit quæ istic operose adeo, sed perperam, ut ex iis quæ diximus, apparet, ac repugnante præterea ipsa Figura 3. describuntur: hæc enim eos angulos acutos, non autem utrisque angulis optimam rotunditatis speciem insculptam ostendit.

353.

ANIMADVERSIO XL.

Varia autem ista ligamentula - ex ossium superficie nascentia, & saccum, ut Cl. Auctor vocat, hisce alligantia, si Perioestii ossa memorata obtegentis propagationes judicabat, cur, quæso, digna censuit quæ ceu peculiaria describeret, imo & Figura demonstraret? Sane quicumque Partes perioestio adhærentes ab hoc sensim distrahunt, ejusmodi connectentes fibrillas passim observant: & ne hinc longius recedamus; qui inter avellendam narium membranam, cuius hi lacrymales ductus productiones sunt, non omnino negligenter inspiciet, tum innumera istiusmodi ligamentula videbit, tum his continuatam leviusculam expansionem tendinosam comperiet. Novam postremo, non rem, sed nomenclaturam proponit. Quem enim Ductum ego Majorem appellaveram, longitudinalem nuncupare ipsi placet. Quod autem dicit, „perpendicularem se fuisse vocaturum, nisi contigisset statim eundem non longe ab exortu suo - notabili ad posteriora obliquitate inclinatum animadvertere; „hoc quidem cum eo convenit quod paulo ante dixerat, eundem videlicet „lineam in principio suo perpendicularem servare; „sed neutrum convenit cum Figuris, quæ ne in illo quidem principio perpendicularem ostendunt. Cæterum notabilem istam ad posteriora obliquitatem quam sibi contigisse, dicit, animadvertere, Verheyenius ante ipsum delineaverat; ego autem vel priusquam I. Adversaria emitterem, Ductum hunc Majorem non ad posteriora modo, verum etiam ad latus externum obliquatum esse, observaveram: quod demum a Cl. Heistero (in cuius Iconismis quid probem, quid, præter majores ductuum dimensiones, desiderem, ex hisce Animadversionibus intelligi poterit) egregie est delineatum. Illud tamen haud est reticendum, me in plerisque cadaveribus minus ad posteriora obliquatum, quam ab Auctore Dissertationis in 3. præsertim Figura pingitur, hunc Ductum invenisse, imo aliquando ad lineam fere descendente iis qui mihi dissecanti aderant, monstrasse.

ANIMADVERSIO XLI.

Altera consequitur anatomica manuductio, de qua non id modo quod de priore administratione, dicimus, verum insuper hæc addimus. Pri-

imum Majorem, seu mavis longitudinalem Ductum perperam dici sepultum in osse faciei majori, tum quia revera magna ex parte non est, tum quia etiam si nobis placeret faciei vocabulum cum Aristotele, & Julio Polluce sic accipere, ut os frontis inter ejus ossa non poneremus; os tamen inferioris maxillæ nullo modo possemus aut ex faciei ossibus ejicere, aut quovis osse alterius maxillæ minus reputare. Deinde quando ista manuductio suscepta est, non satis est docere: „re, „serandam esse viam usque ad sinum pituitarium „in maxillari osse comprehensum; „quasi vero continuo tunc appareret tota ossea vagina quæ inspiciendas Partes complectitur; nam auferenda porro est ossea lamina quæ inter sinus illius caveam, vaginæque partem intercedit, ut prorsus „conducatur inspectio usque ad vaginam osseam specialem. „Præterea quæ de vaginæ, seu canalis istius ossei densitate, ac soliditate speciali inculcantur, usque adeo passim ab Anatomicis in aliis etiam ossibus canalibus observari solent, ut hic certe aut omitti, aut vix attingi potuissent. Tandem ista quæ ad totam Majoris Ductus habitudinem relegendam pertinet, manuductio cum ultra ejus vaginæ, & proximorum ossium disruptionem haud procedat, non tantum manca est, sed & gravissimæ hallucinationis ita facilem occasionem præbet, ut vel Cl. ipse Manuductionis Auctor eam ob causam tum in descriptione, tum in Figuris maximum omnium qui in tota ista Dissertatione occurrunt, erravisse errorem videatur. Cum enim iis ossibus disruptis una cum Ductu in conspectum veniat pars quædam ipsi continuatæ narium membranæ quæ ad ejus finem recessum quandam investit cavearum nasi, conum, aut inversum, sed compressum, figura æmulantem, nihil proclivius est iis qui proposita administratione contenti, rem extrinsecus contemplantur, quam summam illius recessus partem pro extremo ipso Ductu accipere, atque adeo hujus finem in pelvis formam expandi judicare: quod quidem ab ipso videtur esse factum. Qui vero priusquam aliquid hac de re pronuncient, propositæ administrationi illud addent, ut eam narium membranæ partem ad memorati recessus basim, ejusque latera incidant, & extrorsum elevent, ii continuo exterioris inspectionis fallaciam deprehendent. Ductus enim extremum finem atque orificium non in summo illius recessus vertice, sed infra hunc in eo ipso quem extrorsum elevarint, pariete invenient: ex quo ejus orificii loco, & singulari præterea de qua mox dicemus, ejusdem angustia protinus intelligent, illam pelvisformem expansionem, non ad Ductum, sed ad narium caveam ita pertinere, ut Duodeni intestini expansio, non ad biliarium Ductum pertinet; qui in ejus laterali pariete definit; sed ad caveam intestinorum. Quod si quis in plurimis, ut a nobis factum est, cadaveribus hæc diligenter inquireret, aliquando etiam extrinsecus intuendo, id quod docuimus, satis perspiciet. Sunt enim capita in quibus Ductus ne extrinsecus quidem cum pelvisformis illius recessus summo vertice, ut in 2. ista Figura, confunditur, sed manifeste sejunctus per illius externum latus descendit.

ANIMADVERSIO XLII.

Hic tibi fortasse mirum videbitur, potuisse Dissertationis Auctorem Cl. in tam manifestam re tam graviter hallucinari. At si id non concedis, atque adeo si contendis, illius recessus verticem cum Ductus fine haudquaquam ab ipso esse confusum, & ad totius Ductus dimensiones provocas, nos haud pertinaciter obistemus; sed ut tu voles, ita rem se habere, hoc quidem in loco ponemus, id unum monentes, ut vicissim tu videas, quam aliam igitur, jam non dicimus defensionem (neque enim ulla, ut mox intelligetur, parari possit) sed excusationem ejus descriptioni, atque Iconismis excogites, per quam videlicet

De Ductus
ejusdem
finem
non pel-
visformi.

Finis
ejusdem
ubi fit.

De Ductus
ejusdem
obliquitate.

Tab. 28.
Fig. 9.

Diff. de n.
m. c. Fift.
Lacr. Tab.
1.

Rursus de
Ductus
ejusdem
figura, &
diametris.

354

Tab. 28.
Fig. 9.

delicet æque ac per id quod nos dicebamus, appareat, facilem ipsum, atque ideo venia dignissimam errandi occasionem habuisse. Hæc autem ejus descriptio est, cujus ne ullam partem omittere videamur, non modo quid de extremi, sed etiam quid de reliqui Ductus figura, & diametris exponat, servato ejus, ut hætenus factum est, ordine, inspicendum est. Ductus *extensio*, inquit, „cylindrica non est, ut creditum, imo etiam delineatum hucusque fuit, sed varias in „segmentis suis diametros servat. „At Verheyenius certe conicum potius quam *cylindricum* videtur delineasse. Anellius autem *cylindricum* profecto non credidit, cum in Descriptione sua superiorem Ductus partem amplam admodum esse, docuit, inferiorem valde contractam, intermediam autem sensim decrecentem. Non igitur video, quæ scribi potuerit: Ductum *cylindricum creditum*, imo etiam *delineatum hucusque fuisse*; tamen id ego ante eos ambos Auctores credidissim, imo etiam delineassem. Quid vero, si me id credidisse, scire non potuit? Neque enim in descriptione quidquam dixi unde id possit intelligi; in Figura autem etsi quicunque obiter inspiciet, me *cylindricum* tubum delineasse, putabit, qui tamen diligentius metientur, ad conicum potius, sive ad sensim decrecentem accedere, comperient, tum qui cautius rem perpendent, quæ reapse figura delineatus a me tubus censendus sit, cum transversam hujus sectionem nullam pinxerim, pro certo sciri posse, negabunt. Et sane eam sectionem, non circulem, sed ellipticam pinxissem in superiore Ductus parte; sic enim, velut ante dictum est, in plurimis cadaveribus observavi, quinimo in pluribus saltem, etiam in magna reliqui Ductus parte vel qua vaginam osseam hic subit, idem conspexi. Sed quid ille qui *hucusque credita*, imo etiam *delineata* redarguit, ipse demum invenerit, atque observaverit, videamus. „Canalis, inquit, hujusmodi longitudinis, quousque in solo osseo semicanali jacet, „- ampla satis potitur diametro. „Imo aliquando etiam ampliore quam ipse delineat. Id tamen ab Anellio, qui partem hanc Ductus Infundibulum vocat, satis profecto expositum fuerat. Sed „ad introitum primum suum in canalem introgre osseum, videlicet ad regionem *f.* - insigniter, inquit, angustatur: Ansa hinc apud Scrip- „tores plurimos nata est, ut in hoc ductu notabilis quædam stabiliretur angustia; quod ut „verissimum laudo. Error interim fuit, quod „angustia in introitu *h.* ad narium cavernas describatur; ubi ex opposito canalis cavitas, quæ „superata regione *f.* jam ad regionem *g.* ampliari rursus inchoaverat, majorem tandem ampliationem suam præ se fert; ut ideo attingens ad „regionem *i* nasi cavum inchoantem, cum ea facile confundatur: „quod ab ipso quidem factum esse, supra indicavi, hic autem ita confirmabo, ut qui hæc legerint, & cum anatome sæpius contulerint, idem mecum omnino judicent, necesse sit. Quicunque enim conicum illum de quo supra dictum est, nasi cavæ recessum intrinsecus spectabit, hunc quidem ab ipso statim vertice *ampliari inchoantem*, & *majorem tandem ampliationem suam* cum reliquo nasi cavo *confundentem* perspiciet, at vero ipsum Ductus finem quem infra ejus recessus verticem in ipsius laterali exteriori pariete inveniet, tantum aberit, ut „pelviformem appellare possit a forma vasis „illius communis: quod a basi usque ad oram „suam totam, magis magisque ampliatur; „evidenter comperiet proxima superiore Ductus parte angustio-rem.

ANIMADVERSI O XLIII.

Quæ angustia, figura, & positum extremum ejusdem orificium sit.

Atque ut omnes jam nunc possint intelligere, quam longe a vero in hac præsertim parte aberrant istius Dissertationis cum verba, tum respondentes Figuræ amplissimum istud, & ferme horizontale Ductus orificium exhibentes; addo, hoc Morgagni *Adversaria Anat. VI.*

orificium ita a me plerumque inventum esse, ut ellipsum referret non in transversum positam, sed a perpendiculo aliquantum in latus inclinatam, ea autem non modo in ima parte, qua sæpe videlicet ista ellipsis angustior erat, verum etiam in totum parvitate, ut haud raro iis qui propius inspectabant, interdum mihi quoque ipsi non ante appareret, quam demissum per Ductum specillum orificium ipsum indicaret. Non dissimulabo, illud quoque causæ fuisse, cur non facile appareret, quod cum hic ita res se haberet ut in Ureterum fine, nimirum ut orificium maximam partem in pariete Ductus interiore apertum esset, parietes autem sint multo hic quam in Ureterum fine tenuiores, atque molliores, orificii margo cum exteriori Ductus pariete a quo ob coloris, substantiæque similitudinem haud facile discerneretur, unum idemque planum efficere videbatur. Attamen & hæc ipsa res ut parietis utriusque magnam proximitatem, ita magnam extremi Ductus ostendit angustiam, & ipsius orificii exiguitas per se ipsa tanta est, ut cum id in magno cadaverum numero perquisiverim, in nonnullis haud majus viderim quam lacrymalia puncta in 2. ista Figura ostendantur, in nullis autem unquam viderim tantum, ut subduplum esset istius quod in eadem Figura indicatur; in plerisque autem ejusmodi invenerim, ut cum inter hæc eorum quæ viderim maxima, atque illa minima intermedium esset, minimorum tamen quam maximorum diametris propius accederet. Atque hæc de naturalibus istius orificii diametris habenda sunt (neque enim ignoro, crassiusculis specillis sæpius immisis, & vi agitatæ ad majorem amplitudinem posse deduci) ex quibus etsi illud recte colligetur, eas aliquanto alias in aliis esse; nec mirum, cum haud raro easdem in utroque ejusdem capitis Ductu non invenerim; id tamen pro certo est ponendum, me in omnibus ad hoc usque tempus illud constans atque perpetuum observasse quod in I. Adversariis proposui, & ab Natura ipsa requiri, boum, aliorumque præterea brutorum inspectione confirmavi: ut iste videlicet Ductus *ipso suo extremo fine & orificio contrahatur*: quod & editus a me Iconismus ostendit. Ac quamvis ea quæ hætenus dicta sunt, perspicue ostendunt, mihi ad hanc in extremo Ductu angustiam ponendam minime *ansam* datam esse ab superiore ista *insigni* angustia quam Dissertationis Auctor „ad introitum primum Ductus in canalem integre osseum „constituit; attamen ne cui id amplius in mentem venire possit, non reticebo, me haud raro in cadavera incidisse in quibus ista de qua ipse dicit, *insignis* angustia nulla prorsus erat; in quibus autem vidi, præterquam quod haud erat „ad introitum primum Ductus in eum canalem; „sed paulo infra, non ita *insignem* apparuisse vel quia revera in quibusdam minor erat quam in Figura 2. pingatur, vel quia cum subjecti Ductus proxima pars in nonnullis cadaveribus haud iterum dilataretur, in aliis autem rursus quidem usque ad orificii viciniam dilataretur, sed longe minus quam in eadem Figura ostendatur, non tanta certe quanta istuc videri poterat. His si addideris, in nonnullis Ductibus in quibus intrinsecus revera aliqua est, nullam extrinsecus apparere; non modo intelliges quantum hæc ab ea angustia discrepet quam ego proposui, verum etiam cur his sæpe variantibus, nonnunquam absentibus Ductus proprietatibus tum in mea descriptione, tum in externa quam exhibui, Ductus Figura prætermisiss, eam quæ perpetua est, angustiam potissimum describendam, pingendamque mihi esse, existimaverim.

ANIMADVERSI O XLIV.

Jam vero quid de Valvula habendum sit qualem ipse in Figura 2. adumbrat vel extrinsecus discernendam ab oculo, ego vero ne intrinsecus quidem esse, ostendam, infra patebit. Nam quid, de novo isto *angulo acuto*, & quid de plerisque in Figura 3. delineatis censendum sit, ex iis quæ de varia Ductus obliquitate, & de plerisque respondentibus in Figura 2. partibus, supra dicta sunt, intel-

Rursus de
ejusdem
Ductus fi-
gura, &
diame-
tris.

De Mem-
brana in-
terni ocu-
lorum an-
guli Semi-
lunari.

Advers. I.
num. 22.

Quorum
facile
Morbo-
rum sit
sedes.

ad vocem
Onyx.

De re
Med. 1.6.
c. 18.
Tetr. 2.
Serm. 3.
c. 68.
De Re
Med. 1.7.
c. 7.
De Tum.
tr. 1. c. 1.
Exerc.
Anatom.
Dec. 2.
Exerc. 2.

intelligi satis potest. Nunc igitur quid de Lacrymali Caruncula doceat, vidamus: „Ablata, „inquit, aut diducta membrana illa semilunari „rubella, quæ eidem carunculæ supersternitur, „ac proprie ex duplicatura tunica palpebrarum „internæ efformatur, compareret statim illius cor- „pus. „Ego quidem in descriptione mea unde pleraque istorum verborum petita sunt, posueram: „locatam esse in nobis carunculam inter, „& oculum rubellam quandam, & semilunarem „membranam, quæ ex duplicata interiore pal- „pebrarum tunica constructa est. „Hanc autem membranam eidem carunculæ supersterni, & illa ablata, aut diducta, hujus corpus statim compare- re, non posueram; nec mirum, quando hoc mi- nime necessarium esse, nemo ignorat qui vel obiter in obvio quocunque homine carunculam viderit; illud vero ejusmodi est ut post diligentem, ac pluries iteratam perquisitionem pro certo adhuc affirmare non possim. Cæterum hujus membranæ semilunaris, & a vasculis quibus irrigatur, rubentis descriptionem omittendam non credidi, tum ut constaret, quid in angulo humani oculi interno glandulæ, & cartilagini in multis animantibus positæ responderet, tum ut Chirurgis occasio præberetur videndi, an illius oculi affectionis quæ πτερυγιον Græcis, unguis autem nostris dicitur, sedes, & origo in hac plerunque membrana nimium excrecente ponenda sit. Etsi enim quæ in Medico Castelli Lexico habemus: esse unguem, excrecentiam aliquam carneam, „vel membranaceam albidam adnatam, quæ in „unguis similitudinem nascentis, vel crescentis „Lunæ cornibus respondens paulatim sumit au- „gmentum, Cœl. Aurelian. l. 2. acut. c. 32. - De „hoc affectu legatur Aquap. tr. de oper. Chir. „c. h. tit. „etsi, inquam, hæc non undequaque probare possum, cum Cælius ibi maculam quæ in Cardiacis perniciosum est signum, Fabricius autem hic „membranam describat nervo- „sam, fibrosamque in magno potissimum oculi „angulo obortam, & supra oculi album usque „ad corneam productam, - quæ augetur per ve- „nulas in membranulam discurrentes, - & quæ „si inveteravit, jamque ei crassitudo quoque ac- „cessit, excindi debet; „Attamen hoc ipsum non leve est, quod in magno potissimum angulo oriri dicatur: quod & Paulus, & Aetius ante adnotaverant, & Cornelius quoque Celsus, qui ut interdum etiam a temporum, ita sæpius a narium parte nasci, docuit. Num vero quod Arabes Sebel, Barbari autem alii Medici Pannum vocitant, Unguis sit, eodemque modo explicandum, an potius, ut Ingrassiæ, Bidloo, aliisque placet, genere tantum cum eo conveniat, alii viderint; nobis enim ad ea quæ de lacrymali caruncula Dissertationis Auctor scribit, est redeundum.

ANIMADVERSIO XLV.

354.

353

De sub-
stantia
Lacryma-
lis Carun-
cula.

IN his tria protinus notanda sunt. Primum est: Carunculæ corpus ram in 2. quam in 3. Figura „ultra statum in vivente naturalem elongatum, „ut ipse Auctor confitetur, ostendi: quod etsi „variis illis abscissis retinaculis, quæ „idem lateraliter alligant, ac in molem brevior, rem coarctant, „ista, ut supra dixit, longitudine, mole, & configuratione apparere posse, non negamus; Lectores tamen optabunt, ut in una saltem Figura quale secundum naturam est, delineasset. Alterum est quod scribit: „car- „neam esse, eamque satis compactam carunculæ „hujusmodi substantiam, ut jam dicebat Gale- „nus cap. 11. lib. 10. de usu partium; sui tamen „peculiariter generis, ac ab alia quacunque car- „ne distinctam. Discriminari apprime ab inti- „ma palpebrarum membrana: Perperam igitur, „ut rem ab ejusdem membranæ duplicatione, & „conglobatione constructam, ab aliquibus de- „scribi. „Istum quidem ipsum Galeni locum in quo carunculam carneum, vel carnosum corpus

appellat, in I. Adversariis produxeram; quoniam tamen neque vere carneum per anatonem id inveneram, neque agnosci hac nostra ætate ab Anatomicis sciebam peculiare aliquod genus veræ carnis ab alia quacunque carne distinctum; contra autem non ignorabam, esse Anatomicos inter Gallos non ignobiles qui docerent, Carunculam nihil aliud esse, nisi duplicaturam, & conglobationem quandam internæ palpebrarum membranæ, idque ipse etsi in majoribus animantibus sic satis mihi videbar conspexisse, in homine tamen pariter videre non potueram; idcirco ut hac in re Clarorum Hominum auctoritati aperte refragari, sic ex iis esse nolui qui aut hanc membranæ, aut illam carneam substantiam carunculæ pro certo describerent. Itaque his verbis usus sum: Caruncula „nihil aliud nisi tuberculum quoddam „oblongum est ex substantia quasi densæ com- „pactæque carnis; facileque ex duplicata con- „tractaque palpebrarum interiore membrana fa- „ctum est. „Atque ea quidem eo tempore. Nunc autem si quis rogaret, ex qua substantia humanæ carunculæ corpus compingi, credam; fretus posterioribus, iisque in pluribus, & continenter inspectis carunculis institutis observationibus, utramque illam substantiam facile negarem; atque ex subflava quadam, & oculorum judicio quasi adiposa constare, responderem. Quod si idem instaret, & rursus quæreretur, an id igitur prorsus confirmem quod apud Ortlobium affirmat Verneyus: carunculam in homine vix præter tantillum pinguedinis esse; mihi quasdam adhuc esse causas, responderem, propter quas hac de re judicium cohibeam. Hæc tamen non de ipsa carunculæ superficie accipi velim, quippe quæ revera, ut in iisdem Adversariis exposui, „qui- „busdam tuberculis inæqualis est - osculum ex- „cretorium in medio habentibus, unde sebaceam „materiam aliquando in fila formatam pluries „memini expressisse. „Cujus quidem observa- tionis parte Dissertationis Auctor utitur; partem autem repudiat. „Ad dorsum, inquit, ejusdem „carunculæ in homine, ope præcipue microscopii, acinulos glandulares quamplurimos observavi; ex quorum equicem præsentia exasperatur nonnihil superficies ejusdem, & inæqualis „redditur: Oscula tamen in eisdem excretoria „patentia, qualia ab aliquibus perhibentur, observari non possunt. „At hoc ipsum tertium est eorum quæ istic primum notanda esse, dixi. Ea enim oscula non modo observari possunt; sed ut postea ostendam, revera observantur. Verum antequam ultra pergo; ut omnes intelligant, tum hoc, tum propugnatam in caruncula substantiam carneam, tum exhibitam ejusmodi ipsius figuram non injuria a me esse notata. operæ pretium est hic verba describere quibus Viri Aequissimi, & ab aliorum reprehensionibus alienissimi Actorum Eruditorum Scriptores usi sunt, dum istius Dissertationis Excerptum ederent. „Quoniam, „inquiunt, caruncula lacrymalis dicta, in duabus prioribus Figuris aliquanto longior deli- „neatur, ac insuper cum Galeno pro peculiari „carne venditatur, quæ in dorso saltem quam „plurimos acinos glandulosos gerat, microscopio quidem lustrandos, sed omnibus oculis „excretoriis destitutos, per commodum visum fuit „in Lectoris gratiam excellere. Ruyschii Anat. „II. Tabula prima mutuari simul Figuram Ter- „tiam, hancque propter dictæ carunculæ - cum „figuram naturalem, tum oscula varia, per quæ „ex illa compressa humor exstillat loco Figuræ „4. reliquis adjungere. „Itaque illam ipsam Figuram quam tu, Vir Doctissime, infra in Tab. CIII. ad num. 22. exhibes, istius Dissertationis Figuris interjicere,

ANIMADVERSIO XLVI.

VERum hic fortasse miraberis, quod in quo loco Dissertationis Auctor Cl. me, quasi hic saltem

num. 22.

Hist.
Part.
Diff. 30.

num. 22.

A. 1715.
M. O&.

saltem non dissentiret, tandem aliquando iterum nominat, in eo ipso loco eundem mihi, imo Anatomiae adversari, contendam. Ista enim excretoria oscula in acinulis glandularibus lacrymalis hominum carunculæ ita observari posse, negat, ut continuo addat; „ licet sensibilia sint satis super carunculas Boum, aliorumque Brutorum; quod præter inspectionem meam, ex D. Verheyenio famigeratissimo, amicissimo Morgagnio, aliisque Anatomicis habeo. „ Videlicet prorsus confundit (ut quæ Verheyenius de caruncula tradit, atque etiam quæ ipse mox subjicit, magis ostendunt) primum haud modicam internam glandulam lacrymalem eorum brutorum propriam, & lacrymalem longe minorem, exterioremque, de qua hic loquimur, carunculam ipsis, atque hominibus communem, deinde oscula excretoria minima, & multa eorum acinulorum qui humanæ, bovinæque carunculæ exteriorem superficiem occupant, sebaceam materiam (qui est secundarius carunculæ usus), „ ad lenem, vicinarum partium, assidue inter se attritarum, „ inunctionem, „ ut verisimile est, præbentia, & orificia satis conspicua, ac bina memoratæ glandulæ bovinæ, quæ non exterior superficies, sed ea facies exhibet adjectæ cartilaginis quæ oculum contingit, aqueum laticem ad humectandum oculum, & partes appositæ (qui est primarius ejus glandulæ usus) effundentia. Hæc, inquam, omnia inter se, atque adeo me ipsum qui in his rebus omnino, ut anatome postulat, discernendis elaboravi, in hac ipsa parte cum Verheyenio confundit, primum a me de his rebus admonito, deinde errores adhuc præcipuos retinente, ut in superiore XXXIII. Animadversione ostensum est.

ANIMADVERSI O XLVII.

Q Uæ cum ita sint, haud difficile sane fero, quod in iis duobus quæ de eadem caruncula postremo scripsit, quanquam hæc in I. quoque Adversariis meis legantur, me tamen minime nominaverit. Nam multo a me illud accuratius, hoc cautius, quam ab ipso conscripta sunt. Atque ut eorum alterum omittam, videlicet a me scriptam esse: „ quod autem caruncula „ operimenti usum præstet ei meatui qui a proximo osse incipiens ad nares introrsum pertinet, uti est a plurimis existimatum; id vero „ tam a veritate alienum est, quam quod alienissimum; „ ab ipso autem ita scribi: „ est prorsus dissonum, quod ab aliquibus non tantum „ antiquis, quam modernis asseritur; carunculam „ sacco lacrymali, tanquam ejusdem operimentum, opitulari; „ alterum certe omittere non possum. „ Pili, inquit, ex strato hujusmodi carunculæ glanduloso emergentes in brutis, in homine locum non habent. „ Ego quidem ita scripseram: „ Ab iisdem tuberculorum (carunculæ) osculis nonnulli prominent pili, qui, „ ut exigui, tenuissimique sint, in nullis tamen „ quæ quidem ego secuerim, brutis a Natura „ prætermittuntur. „ Hæc vero ita a me esse scripta, ut ostenderem, eo minus istos pilos, eorumque usum esse negligendum, quo magis in illis carunculæ addendis ipsa Natura in aliis etiam animantium generibus constans fuisset, non ut docerem, eos pilos in brutis quidem extare, in homine autem locum haud habere, non eorum dumtaxat usum homini, brutisque communis, imo homini conveniens potissimum, a me assignatus, sed & ipsorum in caruncula humana delineatio, atque explicatio a me addita, satis commostrant. Quid verbis opus est? quando non modo ipse testari possum, ex quo rei anatomicae studio me addixi, nullam perlustrasse humanam carunculam secundum naturam se habentem, quin pilos aliquot ex ipsius acinulis prostantes perspexerim, quorum quidem acinulorum cum duos, vel tres ad ipsum inferius carunculæ latus, sed ab hac tamen prorsus sejunctos nuper viderim, ex iis quo-

que similiter extantes pilos conspexi; sed præterea omnes sciunt qui nostris publicis, privatissime harum partium demonstrationibus affuere, se eisdem, me ostendente, semper vidisse. Quapropter mirari satis nequeo, Dissertationis Auctorem, qui „ ope præcipue microscopii acinulos „ glandulares „ humanæ carunculæ agnovit, prominentes ex ipsis pilos non conspexisse; ego enim ad horum ostensionem microscopio nunquam sum usus, sed caruncula inter inspecturi oculum, & lumen oblata, ut ejus superficiem, non desuper, sed e transverso inspiceret, monui; itaque eos cuncti videre. Hac quoque ratione postquam ipse conspexerit, sat scio, & in humana caruncula locum illos habere, concessurum, & hujus acinulorum oscula, per quæ videlicet, ut in aliis multis sebaceis glandulis, ipsi pili prodeunt, non amplius negaturum.

ANIMADVERSI O XLVIII.

P OST carunculæ perquisitionem ingrediens „ jam in ductus lacrymales laterales, & eorundem concursum, seu saccum, ductumque „ inde ad nares elongatum, intimos eorum „ omnium parietes exquisitè rubescentes observare se, dicit, seu retibus vascularibus refertissimos; præcipue in sacco, & longitudinali ductu, quibus insuper fibroso-musculares notabiliter insunt; peculiari ulterius substantia spongiosa-glandulosa in sacco præditi. „ Ego vero primum quod ad carneas fibras attinet, etsi omnes prorsus haud facile negaverim; tot certe, & tam manifestas esse, non video, ut propterea istos parietes fibroso-musculares notabiliter esse, dicerem. De reliquis autem in I. Adversariis ut jam tum observaveram, ita scripsi: Duo meatus in quos ea foramina (hoc est puncta lacrymalia) producantur, - postquam carunculam lacrymalem inter se mediam fere excipientes (sunt enim ipsa paulo exteriores) ad canalem qui in subiecto osse insculpitur, accessere; brevitatis enim studium uno vocabulo, & semicanalem, & canalem, uno quoque utrumque os ex parte a latere, & a tergo suppositum, ex parte infra circumpositum complecti me coegit præsertim hæc ex osteologia, atque adeo ex ipsa facili, atque obvia ossium inspectione satis nota & perspecta scientem; de industria autem scripsi accessere, non pervenire, ut cum brevitati inserviens exiguam sacci caveam sigillatim non memorarem, eam tamen me non latuisse, ii qui postea hæc inquirerent, intelligere ex eo possent, quod album in viis lacrymalibus amitti colorem, ibi vidissem ubi, non amplius alba, sacci cavea incipit: quæ idcirco hic adnotavi, quoniam mea ista verba supra pollicitus eram, expolitum me esse; neque enim de hoc admodum laboro tum propter veram sacci parvitatem, tum quia Cl. ipse Anellius satis habuit verbo indicare, tum quia denique ad eum in quem ingressus eram, sermonem, utrolibet accipias modo, perinde est. Ad eum igitur revertens, ajo, in I. Adversariis hæc scripta esse: Duo illi Meatus postquam - ad canalem qui in subiecto osse insculpitur, accessere, albo quasi nervæ membranæ amisso colore, in ampliorem confluunt tubum crebris sanguineis vasculis, & fortasse etiam glandulosa substantia rubescentem. Quod ergo Major Ductus crebris sanguineis vasculis abundet, atque hac de causa rubescat, jam tum fuerat a me observatum, quem propterea Cl. Heisterus, ubi eam rem attigit, memorare non omisit. Quod vero duo etiam Meatus exquisitè rubescant, neque tum observaveram, neque ad hoc tempus observare potui, cum semper vel albos, vel ex albo languide subrubros, ac sine memorabilibus vasorum retibus intus viderim. Quinimo hæc sæpe frustra in vero sacco perquisivi, ut quem sæpe, non ut Meatus quidem, albidum, longe tamen minus quam superiorem Majoris Ductus partem, rubescentem inveni; nam inferiorem quoque

num. 22.

num. 22.

Pili ex humana etiam caruncula prominentes.

num. 12.

De canalium omnium lacrymalium colore, & substantia.

Diff. cit. cap. 3.

que hujus partem pluries ex albo cineream esse, vidi. An autem glandulosa substantia Ductus parietibus addatur, etsi ut in productionibus membranæ narium facile credebam, tamen cum manifeste satis, constanterque non perspicerem, haud censui pro re comperta atque explorata id esse ponendum. Videram sane, quod & posterioribus annis vidi; exigua quasi grana in superiore præsertim Ductus parte intus extantia; verum hæc cum sæpe invenire non potui, tum etsi semper invenissem, non continuo tamen glandulas esse, statuissem. Quæ omnia de ipso quoque sacco dicta putato, in quo dumtaxat cum Dissertationis Auctor ponat substantiam glandulosam, mox cum probare deberet, satis esse credit memorare, „ minutulas quasdam extantias „ aggerimas, folliculos per sinum duræ menin- „ gis longitudinalem dispersos emulantes; quas „ ideo non aliter quam glandulares concipere „ se, „ dicit, oblitus, opinor, eorum quæ alibi recte quidem, sed tamen ut adversus Sebaceas Glandulas, longe alia a nobis ratione constitutas, immerito, scribit; *quantumvis granulosa quadam copiose corpora - animadvertantur; non per hoc statim statuenda esse glandulosa.* Quod autem ex „ densius agglomeratis extantiis, & ex duplicata „ ibidem fortiter tunica sacci interiore fieri for- „ san - , addit notabilem quandam, aliisque sat „ majorem extantiam - signatam in figura tertia „ per litt. s. quam ipsi Rostrum sacci appellare „ lubet; quo mediante dejecta in saccum perdu- „ ctus laterales liquida, non illico immiscuntur „ invicem; per tractum potius adhuc aliquem „ disjuncta fluunt, aut remanent; „ nimirum ex iis quæ supra a nobis de sacci cavea scripta sunt, perspicuum est, magnam ejus *notabilis extantiæ* s. partem non ad saccum, sed ad duos Meatus jam se contingentes, & mox in saccum influxuros, ceu parietes ipsorum quibus adhuc prorsus distinguuntur, pertinere; reliquum autem quod vere ad saccum pertineret, in plurimis cadaveribus frustra quæsi, cum alioqui corpus præsertim ita crassum, ut pictum video, non facile inquirentis oculos posset effugere.

ANIMADVERSIO XLIX.

Advers. I.
num. 22.De aditu a
naribus in
majorem
ductum
lacryma-
lem.

ANtequam hanc, & proximam Animadversionem addamus, proponere juvat Descriptionis nostræ partem in qua de Majori Ductu hæc scripsimus: „ Priusquam narium tunicæ con- „ tinuetur, ipso suo extremo fine & orificio con- „ trahi solet: sicque hæc quæ ad nasum a pun- „ ctis lacrymalibus via est, in utroque extremo „ coarctatur: quod pariter in bobus, aliisque „ brutis servatum invenio. Nullaque præterea „ valvula est qua sursum deorsumve permeans „ quodpiam fluidum impediatur. Quamobrem „ videlicet possunt & medicamenta oculis adhibi- „ ta non multo post inunctionem emungi, aut et- „ iam exspui, quod a Galeno observatum est, „ & vicissim exceptus ore aliquis fumus, obstru- „ ctis postmodum naribus, ipsoque ore, ad pal- „ pebras usque compelli, indeque, ut in quibus- „ dam videmus tabacisugis, emitti. „ Nunc Dis- „ sertationis Auctor, „ non tantum in tabaci- „ sugis plurimis - ascendere tabaci fumum „ e naribus ad oculos per istas vias, conscribit; „ sed „ & liquores varios a naribus ad oculos urgeri „ facillime posse, affirmat, imo (quod infra ad- „ dit) per duo exempla sibi prorsus constitisse: „ - copiosum tabaci pulverem e naribus internis „ usque ad oculos elevatum, necnon per puncta „ lacrymalia expressum esse; & denique Stylus „ ipse, inquit, ex naribus extimis in pelvim du- „ ctus longitudinalis - facillime introducitur; „ necnon ulterius ascenderet versus saccum, si non „ vetaretur ab anguli obstaculo; quem a concur- „ su longitudinalis ductus, & narium cavitatis „ acute productum superius descripsimus. „ E-

quidem horum aliqua posse aliquando fieri, pertinaciter non negabo; etiamsi quantum in hisce hallucinari quis possit, probe sciam; quod autem fieri *facillime* queat, ut *liquoresarii a naribus ad oculos urgeantur*, & ut stylus ipse ex naribus extimis in pelvim ductus longitudinalis introducatur, non facillime ego quidem concedam, nisi si pro *ductus pelvi* recessus ille caveæ narium accipiatur, in quem stylum nullo negotio sic introduci posse, fateor. At vero ex illo recessu in ipsum de quo hic loquimur, Ductum aut liquores varios *facillime* urgeri, aut stylum ex naribus extimis *facillime* introduci, nemo eorum fatebitur qui toties, me ostendente, viderunt, extremum illius Ductus orificium ea esse angustia, ut quemadmodum supra scriptum est, vel eo recessu aperto prima inspectione, & specillo nondum per superiorem Ductus partem ad orificium demisso, hoc haud raro non appareret.

ANIMADVERSIO L.

Verum enimvero is ipse qui tam facilem aditum a naribus in Ductum agnoscit, non dubitat, „ Valvulam ad hujus terminum esse ap- „ positam, - quæ figuram instar aliarum gran- „ diorum omnium, semilunarem ducat: ut ideo „ semilunaribus Aortæ, aut Sigmoideis pulmo- „ naris arteriæ, æquata proportionem molis, „ æquiparari consulto possit, - & quæ quidem nasi „ cavum per crepidinem suæ expansionis respi- „ ciat; „ hoc est ita posita sit, ut rebus a naribus in Ductum ascensuris apta sit potius adversari, quam obsequi. Verum tibi fatebor, Mangete Cl. nunquam expectassem, ut qui Terraneo a me dissentienti usque adeo est adstipulatus, eidem mecum facienti tam aperte refragaretur; nostri enim, in prima Terranei Epistola ad Anellium cum cætera quæ de his Partibus observaveram, aut admonueram, fere omnia, meo, ut is solebat, dissimulato nomine, probari, tum illud speciatim: „ in hisce canalibus nullam esse val- „ vulam, nullum impedimentum. „ Neque item expectassem, ut qui insignem illam intestinorum Valvulam pernegaret, idem hic valvulam agnosceret, præsertim cum hanc „ mediocrem, - te- „ nuem, - angustam insuper & brevem, ad in- „ tum canalis parietem dumtaxat locatam „ fateatur, & quamvis infra doceat: „ in variis „ validiorem esse, ut ideo licet sola, nec ab uno „ latere ad aliud appositum extensilis, stylo ta- „ men trajectum disputet; „ hic tamen affirmet: „ in nullis casibus occludere canalem posse inter- „ ventu suo. „ Quibus verbis, si hujusmodi defensionibus egerem, uti quidem possem ad meam Descriptionem tuendam; neque enim diserte exposui, an quamcunque, atque adeo etiam ejusmodi negligendam valvulam negarem, imo hoc tantum dixi: *nullam valvulam esse qua sursum deorsumve permeans quodpiam fluidum impediatur*: quod quidem in valvulam non cadit quæ in *nullis casibus occludere canalem possit interventu suo*. Sed hujusmodi defensionibus haudquaquam ego qui tot, & tam diligenter, & sub ipsis Auditorum meorum oculis institutis dissectionibus fretus, non modo istiusmodi valvulam fidenter nego; sed valde etiam miror, uni, haud amplius, ostensioni tantum istic tribui, ut scribatur: „ Valvulæ cæterum hujusmodi existentiam, adeo „ ut imposterum tota circa ejusdem præsentiam, „ apud nonnullos controversam, adimi dubietas „ possit, demonstrabam in subjecto muliebri menti, se Februarii fluentis anni. „ Atenim; inquires, etiam altera memorata modo fuerat demonstratio habita *menfe Novembris elapsi anni in subjecto laqueato*. Scilicet qua illud ostensum est, Valvulam *stylo trajectum disputasse*: quæ res quibus potius causis tribui fortasse posset, ex iis quæ supra dixi, intelligitur. Verum, ut ad pauca redeam, aut quod *sedere hæc valvula dicitur ad finem expansionis pelviformis*, ita accipiendum est, ut non

Ad ejus
Ductus fi-
nem Val-
vulam non
esse.Lettres
Divers.

ut non ipsi Ductui, sed recessui illi caveæ narium de quo sæpius diximus, apponi concipiamus; aut ita accipere debemus, ut ipsius Ductus orificio inesse, intelligamus. Si primum; ut a me nunquam pars caveæ narium cum Ductu ipso confusa est, sic neque valvula; si modo valvula est; quæ non ad Ductum de quo loquebar, sed ad narium caveam pertineat, erat attendenda. Si alterum; diserte rursus confirmo: nullam istiusmodi valvulam in subjectis prope innumeris a me diligenter inspectis, dissecisque fuisse. Istiusmodi, inquam, valvulam. Nam siquis, ut in vesica urinaria ad ureterum finem, interiorum eorum vesicæque parietem extenuatum nonnulli valvulam appellitant, ita interiorum extremi Ductus, & continuatæ membranæ narium parietem non absimili modo attenuatum valvulam diceret, aut siquis ipsam observatam a nobis extremi Ductus angustiam, & contractionem valvulæ quadantenus fungi munere, contenderet propterea quia demissum a superiore Ductus parte tenue specillum, nisi per axem, ut Mathematici loquuntur, ipsius Ductus demittatur, solet ad latera subsistere; neutri sane eorum vehementer repugnarem; sed tamen ambo mihi vicissim concederent, istiusmodi res nequaquam esse valvulas *semilunares*, hic etiam confiteretur, ingressui potius a Ductu in nares, quam a naribus in Ductum obsistere. Denique ne quidquam prorsus eorum quæ hic a me sunt visa, dissimulem; ex tot cadaveribus tria, haud amplius, fuere, in quorum uno adejus Ductus orificium in ipso pariete interiore membranulam tenuissimam, pellucidam, semilunarem; in altero, in pariete exteriori, in tertio, in utriusque parietis ad anteriora concursu levem quandam tunicæ quasi duplicaturam quodammodo semilunarem, appressi a superiore parte tenuissimi specilli ope animadvertere potuerim. Hæ tamen duplicaturæ præterquam quod in pariete interiore non erant, valde erant breviores, membranula autem illa vix subtripla erat ad ejus valvulæ longitudinem quæ in 3. ista Figura delineatur: & quod rei caput est, in eam erant omnes partem conversæ, ut non ascendenti, sed descendenti per ductum specillo, si secundum eum parietem demitteretur, obsisterent, ideoque illi prorsus quæ istic describitur, contrariæ. Vere igitur dixi, in tot a me incisis subjectis valvulam istiusmodi nullam fuisse.

ANIMADVERSIOL.

Quo in loco
ejus Ductus
finis sit.

355.

DE loco cavearum nasi in quem memoratus Ductus influit, satis ego quidem habui illorum erratum redarguere qui hunc ad narium extremitatem pertingere, tradiderunt. Itaque scripti: *desinere ipsum in nasi cavitate non exiguo sane ab extremis naribus intervallo*. Cæterum intervallum hoc nolui definire propterea quia in nonnullis transversus auricularis digiti apicem, in aliis transversum digitum, in quibusdam plus etiam osseam narium anteriorem extremam oram e regione distare ab Ductus fine, deprehenderam. Noster autem hunc, quasi per viæ trientem viciniorum esse ad extimas partes, quam ad faucium confinia, docet, idque facile in figura, tertia animadverti posse, conferendo invicem distantiam insertionis k. ad l. ubi narium apertura sedet, cum alia a k ad m, ubi inchoant faucibus. Verum nec faucium confinia exacte definire facile est, & lineam a k ad m cum linea a k ad l perductam siquis in ista ipsa Figura contulerit, illam non quasi triente; sed quadrante hac majorem comperiet. Porro quæ de magno antro nasali, de ossibus turbinatis, & de illius cavitatibus seu vere, sive apparenter sejunctis prolixo sermone Cl. Auctor subicit, tum quia subicit non modica, ut ipse confitetur, ultra institutum divagatione, tum quia, ut Plautinus, opinor, Epidicus loquitur,

„ Mihi istic nec seritur, nec metitur; ,

non ea quidem omnia figillatim expendam, sed de nonnullis tantum perpauca dicam. Et primum quod, magnum antrum nasale protensum esse, inquit, horizontaliter ab extremis naribus usque ad fauces; imo quod in Fig. 3. ad litt. o. o., exquisitam ejusdem antri horizontalitatem, & productionem a naribus, ad fauces, utrisque Palati ossibus accumbentem, ostendit; mihi quidem in capitibus ita collocatis ut neque antrorsum, neque retrorsum inclinarant, sed recta confisterent, basis ipsa nasi ad posteriora declivis potius aliquantum, quam horizontalis semper est visa; deinde illud certum est, prope, extremitatem l cavitatis nasalis maxillæ, ad extremas nares protensam, non esse eam basim ita planam, ut eadem Figura monstrat, nam citra Stenonis Foramina ad palatum transitum præsentia, assurgere statim solet, mox autem declivis fieri atque descendere in ipsa externa narium foramina, ut quæ eadem basi inferiora sunt: quod cum ita sit, atque adeo cum elevatio illa sit in ipsa ossea basi, haud satis intelligo, quæ Steno ejus transitus locum in extremo naso indicans, esse dixerit, ubi supra, tertii maxillæ ossis supercilium exsurgens cartilago allabentem humorem, ne extrorsum profluat, remoratur.

De basi caveæ narium
350

Append.
de Nar.
Vas.

ANIMADVERSIOL.

Porro quod in limitibus, & parietibus Antri Nasalis definiendis, limitatum hoc dicitur superius a fornice ossis cribrosi, lateraliter a faciebus internis ossium maxillarium, unguis, & plani; haud video, cur non modo inferiores ossei parietes hic omittantur, sed in iis ipsis qui proponuntur, supernis videlicet, ac lateralibus, anterieus quidem prætermittatur illud par ossiculorum quod longe magis ad Nasum cuius supremam partem constituit, quam ad superiorem cui passim tribuunt, Maxillam pertinet, posterius vero ipsum os sphenoides, & quæ cum hoc committitur, ossis vomeris pars crassissima: cuius quidem partis etiam mox videtur Noster oblitus, cum videlicet interjectum dextræ, & sinistræ caveæ, claustrum nasale esse, inquit, factum inferius ab osse azygos, seu vomeris, superius a proprio septo narium. Idem Claustrum in postico quidem nasi Antro non inferius modo ab osse vomeris factum est, sed etiam superius, ab ea videlicet quam dixi, hujus ossis parte: quæ quo magis ad os sphenoides accedit, cum eo magis & explicetur, & ad posteriora porrigatur; hac quidem ratione efficitur, ut osseus nasalis antri fornix ejusdem basi ossea longior sit, illa autem expansio, & præterea ossis sphenoidis crassities, & locus faciunt, ut nasalis Antri altitudo ad posteriora minor sit (non sic tamen, ut ejus foramen utrumvis parvi tantum digiti, nam hoc tantum Verheyenius alicubi ait; capax sit; quippe vel extremum pollicem in recenti, & nondum purgato capite admittit) quemadmodum anterieus quoque ob illud quod memoravi, par ossiculorum osseus ejusdem antri fornix longior est basi, & propter maxillaria ossa ad se se magis utrinque accedentia Antrum ipsum multo quam interius, angustius est. Et hæc quidem de ipso Antro Nasali.

De ejusdem caveæ limitibus & dimensionibus quibusdam.

l. 1. tr. 4.
cap. 20.

ANIMADVERSIOL.

DE majoribus autem Protuberantiis (Spongiosa, & Turbinata ossa vocant) quæ in singulis ejusdem Antri caveis geminæ occurrunt, Ambæ, inquit, oblongæ satis: ab anteriori alveorum nasalium usque ad posterius, non longe a faucibus, horizontaliter percurrentes, sed non ita ab anteriori alveorum illorum parte os spongiosum superius incipit, ut inferius: & præterea si ambo desinunt non longe a faucibus; quomodo os idem superius mox dicitur, neci

356

„necti per extremitatem posticam cum basi Sphenoidis, in medio cavitatis faucium? „ Post eorum ossium descriptionem, quandam suam ad Figuram 3. *animadversionem* addit: „ Si, inquit, „ visum fuit in priori figura, tantam esse longitudinem sacci, quanta ad alterutrum ex ductibus lateralibus venit; jam ad figuram hanc alteram per plurimum subjectorum examen observabamus, tantam esse extensionis mensuram; „ ab apice, seu angulo sacci *e*, per ductum longitudinalem *f*, usque ad basim narium super palatum *u*, quanta est ab externarum narium introitu *l*. usque ad ora faucium *m*. „ Verum si ut illa prior æqualitas constet, pars suprema Ductus, ut supra ostendimus, cum sacco est confundenda; sane hic necesse non est, monstremus, ut hæc altera æqualitas habeatur, Ductui illam partem cavæ nasi quæ inter ejus finem, & hujus basim intercedit, addendam esse. At si quod lubet cuilibet rei addamus, aut cum ea confundamus; nihil non alteri erit æquale, & sic ejusmodi animadversionum magna repente in quacunque corporis parte copia proveniet. Quid? quod cum narium basis utrinque ab lateribus in medium ab anteriori præsertim parte, hoc est qua Ductui subest, declivis sit, demissumque ideo per Ductum ad dimetiendum specillum alias magis, alias autem minus, medium versus basis, facillime delabatur, vix quidquam certi vel in ejusmodi dimensione haberi potest.

ANIMADVERSIO LIV.

AD ea tandem venit quæ postrema Figura monstrat: quibus haud absimilem superiorum anatomicam administrationem præmittit. In hac illud peculiariter est notandum præceptum: „ ab ossibus inferioribus cunctis, & lateralibus „ variis narium cavernas nudabis. „ Non hoc certe erat quod Tirones ab ista Administratione expectabant; sed quænam sint *lateralia* illa *varia ossa*, quæ auferre expediat, & præterea quatenus auferre, ne si plus æquo auferant, pars antri nasalis concidat; hæc nempe, atque alia ejusmodi expectabant. Quæ autem continuo subjicit; „ In „ spicies illico jucunde nasi pituitariam tunicam, „ cavitates omnes prædictas, pro basi, fulcietem; ibidem tamen tenuiorem satis, quam in „ cavernis altioribus, sicciorem & ideo longe, „ ac prope instar vitri pellucidam. Eandem in „ super in medio divisam intueberis a basi-ossis „ vomeris; „ hoc quidem vel non admoniti necessario sciebant quicumque interiora nasi in duas caveas per interjectum os divisa esse penitus, sciebant; illud vero quod tenuior, & pellucida magis ea tunica sit in basi, quam in summo narium fornice; si capita omnia ita quidem sunt facta, ut plura quæ nuper ego continenter dissectui, vel admoniti non facile inspicient. Num vero postremæ istius Figuræ delineatione alterutrum eorum satis præstiterit quæ pollicitus, opinatusque est, haud difficile est judicare. Primum namque pollicitus erat ab initio, *ex partibus ab oculo usque ad antra nasalia lacrymalibus* eas in hac Figura naturaliter representaturum se esse quæ sedem ineunt in interioribus narium. At quasnam, obsecro, ex istis partibus lacrymalibus hic ostendit? Portionem Ductus longitudinalis tum sinistri, tum dextri. Sed ut omittam, utramque esse *extra situm*, ut ipse confitetur, illamque præterea ita cum tunica nasalis cavæ *implicatam*, hanc vero tam angusta diametro, ut agnosci vix queant; neutra certe sedem init in interioribus narium, ut vel ipsa Figura satis demonstrat. Atenim, inquires, hæc „ imam partem, & habitudinem insertionis ductus longitudinalis cum „ antro nasali ostendit. „ Hoc vero est, Mangete Cl. quod in ista Figura & frustra perquiro, & monstrari, nego. Locum quidem *b*, ubi, ut inquit, *se se insertum vadit pelvis ductus*, conspicio; sed insertionem istam, aut quo in pariete

352

350.

Ibid.

ejus loci hæc fiat, & quo, quantoque orificio fiat, non video. Neque sane faciunt, ut magis videam, aut saltem intelligam, quæ de ista Figura scribuntur: „ In partiali cavitae *a*. profunditate *b*. animadvertis, ubi ab alto ductus longitudinalis descripta pelvis accedit, inseritur, „ dilatatur, fluidaque attingenda inferius, ac per „ antrum nasale totum æqualiter corrivanda devehit. „ Imo ubi istam *profunditatem* animadverto, & huc ab alto Ductus pelvim accedere, inferi, dilatari, lego, nihil aliud intelligere mihi videor, nisi quod supra confutavi, recessus istius cavæ narium quem *profunditatem* hic appellat, summum verticem pro pelvi Ductus, non se in ipsum verticem sanè expandentis, sed contracto orificio per exteriorem ejus recessus parietem infra verticem se inferentis, pro pelvi; inquam, ductus quæ nusquam est, acceptum fuisse.

357

ANIMADVERSIO LV.

Alterum vero cujus causa prolixam istam in nasum, ejusque ossa, & caveas *divagationem* supra instituit, & quod hic, suscepto de hac Figura sermone, tot verbis inculcat, & *quoad factum anatomicum concludere, & stabilire se*, dicit, *nullitatem* videlicet *canalis*, aut *specialis alvei* inter os spongiosum inferius, & nasi exteriorem parietem prorsus conclusi, etsi res certissima est, & quam ignorare nemo potest nisi qui nesciat, os illud ad nasi basim non pertingere; tamen ut non a superiore 3. sic neque ab hac 4. Figura satis ostenditur. Nam ut illam inspiciendo, pro certo dignoscere non possis, inferius latius ejus ossis ad basim ipsam pertingat, necne; ita quæ obsecro, ex Figura hac discas, in qua a sinistris cum basis sit, hanc ab eo discernere haud potes; a dextris autem cum basis amota sit, num ab illo osse naturaliter contingantur, an non, multo minus videre licet. Præstitisset sane in hoc loco Lectores ad Verheyenium remittere (quantum qui Cl. Virorum Palfynii, & Drakii libris non carent, ad hos fortasse valent) ex cujus videlicet Tab. 31. Fig. 3. id prima statim inspectione cognovissent. Quod reliquum est, nomina quidem eorum recenset qui suis de hisce Partibus Exercitationibus adfuere. Sed ut omittam, ex iisdem Ornatissimis Viris plures, & quidem ex præcipuis, Anellio pariter, Descriptionem suam per dissectionem confirmanti adfuisse; profecto hæc anatome ejusmodi est, ut non modo adesse, sed propius, læpius, ac diutius inspicere, & ex parte etiam tangere, & specillum, scalpellumque per se aliquando admovere necesse sit. Quæ cum ita sint, haud satis mihi erit dicere, meis de iisdem Partibus Exercitationibus, earumque Ostensionibus cum meis in ædibus, & in Nosocomio pluries, tum in Amplissimo hoc Theatro ter habitis Nationum omnium studiosos Juvenes, Doctoresque, & professores Celeberrimos, imo semel cum Senatoribus Venetis Præstantissimis, & domi, forisque Spectatissimis Andrea Legio Prætor, ac Joanne Pisauo Equite, & Præfecto totam pene hanc Litteratissimam Civitatem adfuisse; verum illud quod in hac anatomes parte etiam atque etiam attendendum est, addam, me plurimis in capitibus, ita diligenter, aperteque ea quæ supra scripta sunt, omnia sub ipsis oculis Lectissimorum quos alias nominavi, meorum Auditorum dissectuisse, atque ostendisse, ut hi quoque in aliis capitibus eadem per se retegere, & demonstrare potuerint, ac possint: quorum quidem summam in observando sedulitatem, & fidem me novis hic laudibus cumulare necesse non est, quando eorum alter quotannis egregie publicas administrando dissectiones, alter editis nuper, ac diligentissime descriptis inventarum a se Plantarum & partium Cicadæ observationibus, satis per se sibi laudum, mihi etiam qui ipsos in filiorum loco diligo, lætitiâ incredibilem peperere.

357.

ANI.

ANIMADVERSI O LVI.

Advers. I. Præf. num. 22. De Partium hæc tenus memoratum Ufibus.

„ **P**Arte hæcenus anatomica perfunctus, venit
 „ ad partium descriptarum usum. „ Quem
 „ et si ego satis habueram ex parte aliqua indicare,
 „ ut qui non *cogitata*, sed observationes promissif-
 „ sem; operæ tamen pretium est quæ ea de re atti-
 „ gi, hic describere. „ Humor qui oculum, &
 „ palpebras alluit, - assidua palpebræ inferioris
 „ contractione, crebroque superioris motu, an-
 „ gulum internum versus continenter adigitur ea-
 „ dem ratione qua extrinsecus in oculos illapsa ad
 „ eum angulum propelluntur. Itaque ne illic ag-
 „ gestus turpiter per eum angulum redundet in
 „ genam, sed lacrymalibus exceptus punctis, in
 „ nares, fortasse ad mucis dissolutionem, corrive-
 „ tur, propterea in ipso extremi anguli hiatu,
 „ interque ea puncta carunculam lacrymalem po-
 „ sitam judico. Ea namque effluxurus humor non
 „ modo continetur, verum proximis utrinque pun-
 „ ctis quasi sistitur, atque ingeritur, dum hæc
 „ palpebrarum frequenti motu, carunculam versus
 „ apprimuntur. Quam carunculam, aut saltem
 „ eam oculi partem quæ carunculæ continens est,
 „ ut tanto facilius attingerent, in ea quam dixi,
 „ prominentia puncta lacrymalia insculpta sunt.
 „ Neque forsitan diversa admodum Galeno mens
 „ erat, dum - hæc conscribebat: *Ne igitur per*
 „ *angulos &c.* „ Hæc autem quæ olim ipse in
 „ I. Adversariis attigeram, cur operæ pretium fue-
 „ rit hic describere, intelligent omnes qui in ista
 „ Dissertatione legent: „ Usu suo perfunctas lym-
 „ phas lenes hujusmodi, lacrymales dictas, - ne
 „ turpiter, & incommode ad genas diffuerent,
 „ assiduis palpebrarum motibus, & contractio-
 „ num modis - versus internum angulum necessa-
 „ rio dirigi: - idque evidenter constaret ex eo
 „ quod corpuscula etiam extranea, & solida, in-
 „ ter bulbum, & palpebras casu quocumque in-
 „ troducta, per ictus ciliorum assiduos omnia
 „ tandem ad canthum internum pelluntur. - Car-
 „ runculam autem, Lacrymalem dictam, liquida
 „ lacrymalia ex sinu canthi interni ad puncta us-
 „ que lacrymalia faciliter repellere, & dirigere.
 „ - Cui certe directioni foveat viæ a dictæ ca-
 „ runculæ lateribus ad puncta prædicta super pal-
 „ pebras eminentia productæ dispositio horizon-
 „ talis, habita in quocumque ciliorum ictu. -
 „ Copiosas autem in naturali statu per nasum,
 „ & fauces excretiones ordinario mucosas deberi
 „ præcipue lacrymarum copiæ, mucos eidem di-
 „ luendo, liquandoque, in narium Meandros con-
 „ cidentium. Denique usum carunculæ lacryma-
 „ lis expositum suis etiam temporibus meditatam
 „ esse Galenum, eumque expressisse *lib. 10. cap.*
 „ *11. sub illis verbis, quæ quoque celebratissi-*
 „ *mus, inquit, & semper amicissimus meus D.*
 „ *Morgagni in aureis suis adversariis primis ana-*
 „ *tomicis apponit. Ne igitur per angulos &c.* „
 „ Bene factum quod Vir Cl. in hoc saltem postre-
 „ mo loco nomen haud reticuit meum; ut si qui
 „ Lectores ea forte verba in Galeni voluminibus
 „ velint perquirere, indicati libri inscriptionem in
 „ meis possint Adversariis invenire. Scripsit enim
 „ Galenus & de Methodo Medendi, & de Simpli-
 „ cium Medicamentorum Facultatibus, & de Com-
 „ positione Medicamentorum Localium, & de Ufu
 „ Partium librum decimum, ut nisi inscriptionem
 „ addas Operis, divinent Lectores, necesse sit. Ita-
 „ que cum a nobis post verba illa Galeni: „ Ne
 „ igitur per angulos excrementum effluat, neve
 „ assidue lacrymemus, prædictis meatibus corpo-
 „ ra hæc carnosa fuerunt apposita, quæ prohibe-
 „ rent quidem, ne oculorum excrementa per an-
 „ gulos vacuentur, ad proprios autem meatus
 „ impellerent: „ cum, inquam, post verba illa
 „ addi a nobis videbunt: *& cætera quæ libro de*
 „ *usu partium decimo, undecimo autem capite licet*
 „ *reperire;* „ tum illam inscriptionem non igno-
 „ rabunt, tum non ignorasse nos, scient quæ Dis-

sertationis Auctor de Galeno continuo subji-
 cit: „ Et melius eodem *cap. & lib.* significare
 „ procuravit, loquens de Medicis oculariis im-
 „ peritis: *Alii vero, inquit, in ecanthidon, id-*
 „ *est carnis in majore angulo excrecentia, cura-*
 „ *tione chirurgica plus æquo de caruncula re-*
 „ *scindentes, effluxum excrementis ea parte ape-*
 „ *ruerunt, quem affectum ποιάδα quidem appel-*
 „ *larunt.*

ANIMADVERSI O LVII.

Hunc tamen locum, quem ipse ad Galeni
 sententiam de vero carunculæ usu exponen-
 dam *meliozem* judicat, si ego pro illo altero pro-
 duxissem; næ multi, longe alium omnino carun-
 culæ usum, ut proximum videlicet meatum ope-
 rirer, Galeno unice placuisse, ex eo dum-
 taxat loco judicassent, quando non Galenus mo-
 do in eodem capite hunc quoque usum propo-
 suit, sed & Cellius, monens, ne in Unguis ocu-
 li curatione caruncula abscindatur, ante illum sic
 docuerat: „ si abscissa est, patescit foramen, per
 „ quod postea semper humor descendit, *ποιάδα*
 „ Græci vocant. „ Qua quidem ratione cum
 Veterum Affeculæ affectionem hanc explicandam
 esse, non dubitent; permirum est, Dissertationis
 Auctorem adversus eosdem hæc præfatum: „ Vi-
 „ dimus cæterum in Praxi, usum Carunculæ mox
 „ indicatum abunde patescere, ut nulla amplius
 „ superesse possit circa eundem dubietas; „ ejus-
 „ demmodi affectionis exemplum (qualia omnibus
 etiam medicinam non facientibus passim exempla
 occurrunt) in medium asserere: ex quo ut ali-
 quid in rem suam certi erueret adversus Veterum
 Sectatores, necesse profecto erat, ut quæ causæ
 carunculam eroderant, eas ipsis quidem demon-
 strare potuisset sive per accuratam anatomen, sive
 etiam per injectiones ne minimum quidem no-
 vum foraminulum ad lacrymales usque ductus
 aperuisse. Quod si tunc non poterat, præstabat
 sane ejusmodi exempla ab omni ævo omnibus no-
 ta prætermittere; alia autem recentiora de carun-
 culæ utilitatibus, & de lacrymalibus ductibus co-
 gitata perpendere, ut puta an veri aliquid nos
 viderimus, quando carunculam scripsimus ob eam
 fortasse causam tenuibus pilis instructam esse,
 „ ut nimirum quidquid visceris ad angulum in-
 „ ternum compellitur, aut abstergendo, aut cer-
 „ te implicitum retinendo, prohibeat, ne exi-
 „ gua adeo puncta lacrymalia obstruantur; „
 præsertim cum de sola etiam ipsius carunculæ
 inæqualitate idem postea Vir Gravissimus Boe-
 rhaavius confirmaverit, docens, humorum ocu-
 lum, palpebrasque alluentium, „ crassiorem par-
 „ tem affixam, & collectam ad scabritiem ca-
 „ runculæ, in lemas siccitam averri. Perpende-
 re etiam poterat, an, & quatenus probanda in-
 dicaverit Thomas Bartholinus, cum sibi ductus
 lacrymales ostendente Stenone, „ expeditam viam
 „ visum esse sibi videre, inquit, qua ex oculis
 „ non solum ad irrigationem membranæ narium
 „ humor defluat continuo, sed, si acrius serum,
 „ in sternutatione irritet. Hinc compresso angu-
 „ lo oculi sternutationem inhiberi, non quod ca-
 „ lore frictione concitato calor discutiatur, ut
 „ differit in Problem. Aristoteles, sed quod con-
 „ stricti canaliculi impendant acris lymphæ de-
 „ scensum. „

ANIMADVERSI O LVIII.

Verum quæ Noster prætermisit, & nos in
 hoc loco prætereamus; eorum autem quæ
 posuit, perpauca, & hæc quidem cursim, note-
 mus. „ Præsupponit - in regionibus - oculi in-
 „ ternis immixta lacrymarum. „ Ego autem
 novi plurimos qui hæc ostendi, quam præsuppo-
 ni, maluissent. Angulum internum externo ma-
 gis esse declivem, ideoque ad illum potius lacry-
 malem humorem confluere, plures quidem Au-
 ctore

De Re
Med. 1.7.
cap. 71

Advers. I
num. 22.

Institut.
Med. n.
513.

Anatom.
quart. re-
nov. 1. 3.
cap. 8.

357.

- 358 flores docuere: At „ certum esse, datam angulo „ interno super alios omnes oculorum terminos, „ declivitatem majorem fuisse: - & in dormien- „ tibus - lacrymas leniter ex se se, & paulatim „ in canthi majoris declivitatem effluere: „ hæc vero neque aliquem docuisse, memini, neque vi- deo, qui docere potuisset, cum inferioris palpe- bræ infimam, internamque partem inter omnes oculi terminos constet maxime esse depressam; & in iis qui in alterutrum, ut plerunque, latus de- cumbentes dormiunt, alterutrum angulum inter- num nullam declivitatem habere, necesse sit.
358. *Ovales* cordis ventriculorum *cavitates* esse, dicit; Num ergo etiam dexteri? Eorundem quoque ventriculorum, non sanguinis, systolem dicere consuevimus; Quid ergo iste dicit: „ non aliud „ esse ictum in oculo ciliorum quemcumque, „ præter *systolem* lacrymarum? „ Huc adde quod „ viæ, inquit, a carunculæ lateribus ad „ puncta *lacrymalia* - productæ dispositionem „ horizontalem haberi in quocumque ciliorum „ ictu, non solum super inferiorem, sed *superio- rem & palpebram*. - Ex succis lacrymalibus - „ super planos *palpebrarum* margines retro excur- „ rentibus, partem multam - in lacrymalium „ punctorum aperturas forberi, & *decidere*: „ & paulo post iterum, in *puncta decidere*: quæ qui- dem ab nemine, nisi qui positus superioris palpe- bræ, insculptique in hac puncti obliviscatur, conscribi possunt. Ab eo autem qui supra tra- diderit: „ viæ sensibilem in sacco relinqui cavi- „ tatem; ut satis sit, quod duæ alveorum spe- „ cies remaneant, duorum ductuum lateralium in- „ gressibus correspondentes; „ qua, obsecro, ra- tione scribi potest: „ in sacci majorem supra „ ductuum lateralium alveum effusos liquores ul- „ terius ad retardationem componi, ex legibus „ mechanices habemus: Ut ideo evidenter con- „ stet, saccum hujusmodi respectu ad acceptos „ lacrymales latices non minus recipientis, quam „ ductus officio perfungi. „ Porro ad illam retardationem, siue „ ad hanc servandam liquidis „ oculo interfluentibus lentitudinem exitus, & „ cursus, ut ideo - non tanta exigatur in scate- „ bris lacrymalibus moles, & secretionum uber- „ tas; „ cum multæ causæ commemorentur, & in his „ ad intimam sacci faciem asperitates de- „ scriptæ, non minus ac prominentia illa major „ veluti glandularis, sita ad ejusdem medium; „ quid de harum existentia, & (quod consequitur) hoc usu habendum sit, ex superiore XLVIII. Animadversione intelligi potest: cumque inter eas- dem causas diserte referatur *angustia in medio lon- gitudinalis ductus*; tanto majorem, tantoque evi- dentiore lacrymalium punctorum angustiam di- serte non referri, mirum est.

ANIMADVERSIO LIX.

- 357 Quid autem de eo dicemus quod supra posi- tum est: Ductum longitudinalem „ fluida- „ per antrum nasale totum æqualiter corri- „ vanda devehere; „ cum hic „ obliquitas ejus- „ dem Ductus notabilis ad fauces - hunc insuper „ usum habere posse dicatur, ut decedentes lacry- „ mas aliquantulum potius versus fauces, quam ex- „ ternas nares disponat; „ atque hoc per inje- ctiones probetur. Nam quod ejusdem ductus extremum in pelvis formam dilatari dicitur „ ne „ ad concursum hunc suum facile obstructions „ fierent, per facilem implicationem lacrymalis „ succi cum muco, antri nasalis incola: „ & quod ad ipsius pelvis vestibulum posita Valvu- la esse traditur „ ne per occasiones varias mucus „ hujusmodi - hiatum hunc ductus, quantumvis „ ampliatus, impeteret tam facile, & occupa- „ ret, præcipue in pronationibus capitis; „ quid de his videlicet censendum sit, tum ex eo con- stat, quod neque eam ductus pelvim, neque istiusmodi Valvulam reapse inveniri, ostensum est, tum inde etiam colligitur, quod cum Pitui-

tiorum Sinuum orificia, imo in ipsa infima na- rium basi insculpta Stenonis Foramina, & in his omnibus multo angustiora Cl. Vieussenii vasa mucifera, etiam si neque in tantam pelvim expan- dantur, neque valvulis instructa sint, suo se ta- men quæque, ac nasi humore adversus mucosos infarctus, & obstructions tueantur; multo ma- gis perennis, ac peculiaris per illum Ductum la- crymalis humoris descensus, rebus secundum na- turam se habentibus, tueri, ac servare ipsum pos- se videatur. Ipsius autem lacrymalis humoris natura, haud satis video, cur „ excrementitia „ absolute, seu post usum in oculo emeritum, „ ulli inde in vivente ulterius non destinata „ pronuncietur, præsertim cum Doctissimi Viri, & in his Bohnius, atque Ortlobius nulli dubitent, quin is humor ab naribus ad hos, faucesque de- ductus, utilissimi succi, hoc est salivæ ipsius pars sit, atque ante ipsos Steno docuerit: illum quo- que humorem „ per œsophagum in ventriculum „ descendente, & in vasa sanguinea per chyli „ lymphæque ductus viam affectantem, peculiarem „ suo modo circuitum absolvere; „ nec sane, si Anatonem ipsam spectemus, injuria; neque enim Natura Ductum lacrymale ad nasi interiora de- duxisset; imo ab ejus Ductus fine Foramina illa ejusdem Stenonis magis removisset, si lacrymalis humor *excrementitius absolute* esset. Longum nimis, atque adeo Lectorum multis minus etiam gratum facerem, si turpes illas guttas quæ vel brutis persæpe, vel hominibus pronum caput ge- rentibus, hyeme præsertim, ab extremo naso pro- pendent, ostenderem, haud recte *lacrymales gut- tulas* ita vocari, & credi, quasi nihil tale eo tunc fluere, aut ab nasi glandulis, aut a Pituitariis Sinibus, aut ab Eustachiana utraque Tuba etiam posset. Mitto alterum Galeni locum a me pa- riter ante observatum: & quæ de specillo „ per „ nares extimas introducto, statim usque ad pel- „ vim ductus longitudinalis facile, & immédia- „ te - traducto „ iterum subduntur, ea quoque mitto.

ANIMADVERSIO LX.

AT quod mittere ipse poterat, quippe, ut confitetur, *quandam olens ab opere digressio- nem*, ut ossium *turbinatorum* usum exponeret; num in eo saltem peculiaris, & recte constituta protulerit, videamus. Et primum quod „ U- „ sum ossium hujusmodi Primarium non solum „ esse, doceat, in spatio modico magnam consti- „ tuere extensionem, & superficiem membra- „ næ - investienti, prolatori hinc usu odoratus, & „ secretionis mucosæ narium; sed insuper eandem „ membranam, cui odoratus sensorium insidet, „ ad congruam illam cum occurribus odororum „ corporum situationem componere, quam exigit „ odoratus exercitium; „ vera hæc quidem sunt; sed illa vulgo notissima, hoc antea ab nonnullis, & nominatim a Cl. Boerhaavio indicatum. „ Fit, „ inquit Doctissimus Vir, olfactus; dum odora „ effluvia, aere contenta, motu inspirationis per „ nares adducta satis fortiter, ea vi applicantur „ ad fibrillas olfactorias nasi figura, *officulorum* „ *positu, eis oppositas*, sic agunt in eas, &c. „ Et quanquam idem non ignoraret, quod Claris- simi etiam quos paulo ante laudavimus, Viri, Bohnius, & Ortlobius, alique commemorave- runt: „ quæ brutorum species artificiosa, magis „ numero, anfractuositatibus, & mole ossium tur- „ binatorum structura donantur, easdem etiam ol- „ factu exquisitiori pollere; „ mox enim hæc subdidit: „ Hinc rursus poterimus intellige- „ re: - quomodo animalia, quibus rostra, nares „ longissima: ossicula spongiosa maxima; acutio- „ rem odoratum nanciscantur; „ non illud tamen usque adeo inculcandum esse, credidit, & multo minus, „ imputandum esse ossium hujusmodi ar- „ tificiosæ habitudini *totum* odoratus negotium, „ pronuntiavit. Quod cum a Dissertationis Aucto- re

360.

Circ.
Anatom.
Prog. 9.
Hist. Part.
Diff. 15.
Append.
de Nar.
Val.

361

Instit.
Medic.
nu. 506.

libr. cit.
Prog. 25.
Diff. 28.

361.

362 re factum sit; haud sane expectassem, ut paulo post, hæc scriberet: „ Quoniam autem odora-
 „ menta ab aeris vehiculo introducta in nares,
 „ per insitam volatilitatem, & levitatem suam
 „ semper ad ascensum inhiant, sicque in eorum
 „ ingressu ad partes altiores nasi copiosius accu-
 „ mulantur, sic ad easdem nasi sublimiores re-
 „ giones densior notabiliter est succingens tunica,
 „ papillisque numerosioribus nerveis obsita, quam
 „ sit ad imas ejusdem cavitatis partes. „ Nam
 ut illam odoramentis *insitam levitatem*, per quam
 semper ad ascensum inhiant, prætereamus, si to-
 tum odoratus negotium turbinatis ossibus est im-
 putandum; cur ad nasi sublimiores regiones, hoc
 est ad ipsum quoque os cribriforme, quod sane
 turbinatis omnibus ossiculis sublimius est, papil-
 læ nerveæ esse dicuntur *numerosiores*?

ANIMADVERSI O LXI.

libr. cit. num. 507. num. 497. 362. 361. 352. **S**ed & ea quæ de aliis eorundem ossium usibus
 subjiciuntur, non admodum profecto sunt fir-
 ma. Nam quod nasi mucus „ grandius ideo de-
 „ poscat organum secretorium suum, „ quia est
substantiæ lentissimæ, non certe ab omnibus pro-
 bari potest. Idem enim Præstantissimus Boerhaa-
 vius, non modo quærendum judicat: *An mucus*
in initio dum generatur, crassus? an postea talis
fiat? sed diserte docet: a glandulis membranæ na-
 rium excerni humorem - fluidum: - hunc eundem
quiescentem, stagnantem, collectum, inspissatum,
 avolante videlicet, aut defluente aquosiore parte,
 agnoscit. Pariter tantam istam secretionem
 muci omnibus narium parietibus illiti usque adeo,
 irretiendo odoriferas particulas, utilem esse, ut
 quod „ ablato a vicinia narium odoroso corpore,
 „ non linquamus, quin per tempus aliquod im-
 „ pressum antea odorem adhuc sentiamus, id
 „ nonnisi a coacta quadam immediate super orga-
 „ num halituum odorosorum adhæsiōe, auspi-
 „ candum veniat; „ credent fortasse qui nun-
 quam animadverterint, in aliis etiam sensuum
 organis id contingere, non sane quia mu-
 cus objectorum particulas irretitas detineat,
 sed quia sublato objecto, communicati ab
 hoc motus præsertim vividiores non conti-
 nuo in nerveis fibrillis conquiescunt. Ne-
 que cum diserte memoraretur, largam istam
 muci secretionem, eosdem nasi membraneos
 parietes humectando, „ impedire, ne isti
 „ ab aeris perenniter trajicientis subtilitate, mo-
 „ tuque corrugentur, & exsiccantur, cum magno
 „ *respirationis incommodo*; id quod ad istud or-
 ganum præcipue attinet: cum magno olfactus in-
 comodo: erat omittendum. Denique cum „ ad-
 „ dere se posse, inquit, turbinatum os inferius
 „ proprio interventu operari, ne lacrymæ ex du-
 „ ctu longitudinali deciduæ, cito nimis, & assi-
 „ due ad narium pinnas effluant; „ non jam di-
 cam, oblitum aliquibus videri posse eorum quæ
 alibi scripserat: „ ossis turbinati inferioris inter-
 „ positionem parum conducere ad lacrymas ab ex-
 „ timis naribus avertendas; „ sed illud tantum
 dicam: lacrymalem humorem ex sui Ductus ori-
 ficio sensim in nares destillantem, per exteriorē
 in quo id orificium esse, diximus, conici illius
 recessus narium parietem, intacto interiore ad
 istud os pertinente, sensim delabi in subjectam,
 declivemque narium basim, ex ejus ima parte
 ne assidue per nares extimas effluere possit, tum
 interjectis Stenonis Foraminibus, tum assurgentis
 plerumque ab anteriore horum parte ossis repagulo
 satis efficitur.

ANIMADVERSI O LXII.

352 **V**entum est tandem ad eam Dissertationis
 Partem quæ est de Lacrymalium Ductuum
 Morbis, & Curationibus, ad quam unice vel a
 principio Cl. Auctor „ reputavit inspectionem
 „ anatomicam quamcunque, aut physiologicam

„ disquisitionem reportandam, „ & in cujus fi-
 ne haud dubitat; ut „ re ad umbilicum perdu-
 „ ctæ; sedulis expositionibus, quoad emissario-
 „ rum lacrymalium structuras, usus, & succes-
 „ siones morborum, tantam præbuisse faciem; ut
 „ Chirurgi practicas operationes suas queant sat
 „ melius impolterum, tutiusque ad easdem partes
 „ apponere. „ Ego vero etsi ejus conatus ultro
 laudo, atque commendo, minime tamen dubito
 quin meis superioribus Animadversionibus, eodem
 tum veritatis amore, tum juvandi homines studio
 conscriptis, longe aliud pluries ostensum sit.
 Quid enim? Sacci caveam valde quam revera sit,
 longiorem, & usque ad carunculam quam mini-
 me attingit, pertinentem descripsisse num faciem
 accendere exultimabimus ad sacci ipsius chirur-
 giam *melius, tutiusque* administrandam? Et ne
 singula persequamur: quod in hac ipsa Disserta-
 tionis Parte constituit: „ Focus itaque infar-
 „ ctuum major, in *obstructione* longitudinalis du-
 „ ctus, non venit ad ejus terminum in nasum,
 „ ut creditum hucusque fuerat, seu ad ejus pel-
 „ vim, quæ cavitas est ejusdem amplissima, ut
 „ alibi demonstravimus; „ id, inquam, tantum
 est utile Chirurgis, quantum est verum, tantum
 autem est verum, quantum hoc postremum ve-
 rum est, Ductus illius terminum instar
 pelvis dilatari, & sic *cavitatem esse ejus-*
dem amplissimam: quod quidem tam a ve-
 ro abesse quam quod maxime, secundum ea
 quæ supra docuimus, ipsa demonstrat Anatomia.
 Sed quoniam, ut ab initio dictum est, inaudivi-
 mus, Experientissimum Anellium hanc potissi-
 mum Dissertationis istius Partem esse expensurum,
 cætera illi ad quem sane maxime pertinent, re-
 linquemus. Quanquam enim, ut Cl. Actorum
 Eruditorum Scriptores semel, iterumque animad-
 verterunt, „ ab Auctore ne nominatus quidem
 „ fuit; „ qui tamen ipsius Scripta percurrerint,
 quot, & qualia ex his in istam Partem Disserta-
 tionis translata fuerint, non difficile agnoscent.
 Ut enim quæ ad causas, naturamque istiusmodi
 Morborum spectant, non attingam; „ introductio
 „ specillorum ea arte, & subtilitate constructo-
 „ rum, ut commode, & indolenter in puncto-
 „ rum lacrymalium, ductuumque appensorum an-
 „ gustias introeant, & excurrant: - Congruæ in-
 „ super injectiones, per aptos etiam ad has du-
 „ ctuum exilitates siphunculos elicita: - Ex pun-
 „ cti lacrymalis superioris elevatione per digi-
 „ tum, optimam ad saccum, & ultra saccum in-
 „ troducto corpori apponi declivitatem: - Cor-
 „ pus summe flexile, & molle, ut v. g. est se-
 „ ta, - introductum, ut carens resistentia, &
 „ consistentia - momentum servare ullum non
 „ posse, quo satis in ductus hujusmodi, quoties
 „ obstructi fuerint, impingeret, & vim face-
 „ ret; multo minus penetraret, & trajiceret. -
 „ In simplici ductuum lacrymalium excoriatio-
 „ ne, quæ fistulæ adhuc naturam non sapit, -
 „ utilissimas reputare injectiones. - Imo & in
 „ quibusdam casibus, qui medii sunt inter ob-
 „ structionem simplicem, & fistulosam, - factis
 „ per aperturam (sponte exterius factam) oppor-
 „ tunis injectionibus, exulcerationem, & callosi-
 „ tatem præcaveri, & integre sanari affectio-
 „ nem. - Os lacrymale si caries jam occupat,
 „ - diffractum in partes ad nasi cavum dejicien-
 „ dum. - Fistulam in longitudinali ductu, cui
 „ nec vitium ossis *unguis*, nec antiqua callositas
 „ sedeat, curari facile posse; si per factam vel a
 „ natura per viam tumoris - aperturam idoneam
 „ congruas injectiones instituimus; „ hæc certe
 omnia antea ab Anellio aut indicata, aut com-
 mendata invenientur.

ANIMADVERSI O LXIII.

A Tenim, inquit, Mangete Ornatissime, cum
 hæc ita Anellius proposuisset, ut multa alia
 pariter commendaret; illa quidem alia Noster re-
 je-

366.
De Lacry-
malium
Ductuum
Morbis, &
Curationi-
bus.

363.

A. 1716.
M. Oct.
A. 1718.
M. Janu.

365.

366

366.

jecit, hanc vero dumtaxat partem suo judicio, selectuque confirmavit, ut ex. gr. cum introductionem istam specillorum, aut istas in lacrymalia puncta injectiones non modo in proximorum Meatum, & sacci, sed & in Majoris Ductus remotioribus affectionibus Anellius commendasset, Noster vicissim in illis quadantenus probavit; in his autem, allatis rationibus, rejecit. Nam quod ad specilla attinet; hæc, vel ultra angulos fac-
 364 „ ci descendere - detrusa non posse, vel si adhuc „ descenderent, ad obicem leviores quemcunque „ fisti, pronunciavit, non ideo ipse videns cur „ obstructions adimere, aut ultra eas transmi- „ grare possint: videns cæterum angustis, angu- „ lisque per hæc partes non leviter irritandis, „ exasperandisque potestatem secum non paucam „ deferre instrumenta hujusmodi, per minutas, „ tenerasque tam alte partes intimius adacta. - „ Ab injectionibus autem in anguli Sacci occur- „ su, & resistantia amitti prorsus adimendæ ob- „ structionis vim potissimam, & debitam. „ Denique quod una ad specilla, & ad injectiones attinet; quid opis hæc afferre queant in fistulosa ob-
 365 „ structione etiam in solo sacco supposita deter- „ minandum Hominibus judicio, ultra suum, luci- „ diori saturis reliquit, hoc addens: Bene esset, „ quod faustus aliquis hujusmodi administrationum „ effectus totam hanc veritatem elucidasset. Ad hæc „ ego, Mangete Doctissime, aliter ab Anellio, ali- „ ter a me responderi posse, video. Ille enim „ præter cætera, non illud modo ex sui ipsius Ter- „ ranei Epistola priore, alias a nobis memorata, „ objiciet: „ Stylum urges in canalem nasalem „ „ Magnus, inquit, profecto ausus: at potius „ „ magnus, & nimis inexpertorum objectantium „ „ timor; „ non modo tot aliorum Medicorum „ Taurinensium testimonia opponet ex quibus con- „ stet, specilla non per primos tantum meatus in „ pluribus, sed ad Majoris usque Ductus finem in „ viro quodam immissa, ne leviter quidem irritas- „ se, aut exasperasse; verum ad duas ab ipso Dis- „ sertationis Auctore ad se scriptas, editasque Epi- „ stolas provocabit, in quarum prima asseveratur: „ specilla, & injectiones „ introduci ab ipso Anel- „ „ lio quotidie, & sic afferri sanationem sine pe- „ „ riculo, sine dolore, sine ruptura, & intra bre- „ „ vissimum tempus; „ in altera autem (in qua „ præterea nostra nominatim, & Anellii Descriptio „ structuræ, & positus Lacrymalis Ductus non vul- „ gari laude ornatur) operationes istæ utilissimæ nun- „ cupantur. Quæ tanta ejusdem hominis in iisdem „ rebus intra eundem prope annum a se ipso dissen- „ sio cum permira omnibus est visa (neque enim „ adhuc in Adversaria quoque nostra quæ nempe „ in ista ipsa Dissertatione aurea appellat, ejus Ani- „ madversiones prodierant) tum Gravissimis iis Vi- „ ris qui Eruditorum Acta conscribunt, digna „ omnino visa est de qua in Excerpto Librorum „ Anellii Lectores monerent. „ Postremo, ajunt, „ adhuc monemus, in his libris etiam contineri „ „ aliquot epistolas Clar. Bianchi ad Autorem no- „ „ strum scriptas, in quibus ipsum contra Signo- „ „ rottum defendit, inventum ejus novum admi- „ „ ratur, & propugnat; in dissertatione vero sua „ „ de ductibus novis, sicut jam superiori anno „ „ monuimus, ubi de ea sermonem fecimus, „ „ Anelli non tantum nullam mentionem facit, et- „ „ iam occasione hujus novæ methodi disserta- „ „ tionem illam conscripsit: verum etiam inven- „ „ tionis gloriam jam Anellio adimere videtur, „ „ & (quod superiori illo anno pariter narraverant) „ ejusdem inventum „ in ductus longitudinalis ob- „ „ structione, & in fistulæ lacrymalis medela re- „ „ spuit. „ Hæc igitur tanto magis ipse Anellius „ per se urgebit; nos autem ne illa quidem memo- „ rabimus, quam diversa eorundem Doctissimorum „ Virorum sententia esse videatur, aut quam dispar „ Cl. quem hi merito collaudant, Heisteri de iis „ ipsis quæ Dissertationis Auctor rejecit, judicium „ sit; neque, ut possemus, testabimur, specilla mo- „ dice incurvata, per superius lacrymale punctum „

immissa, in duobus in quibus id tentavimus, ca- daveribus nulla vi facta, nullaue inducta læsio- ne, paulatim, dextereque agendo, per ductus Majoris orificium intra nares descendisse; sed hæc omnia quæ rejecta sunt, ipsi Anellio relinquen- tes, illud unum respondebimus, cætera illa quæ a Dissertationis Auctore selecta sunt, & probata, non ideo quia a rejectis illis secreta sunt, Anel- lii esse maximam partem delisse, ut propterea, ne ipso quidem nominato, sic proponi, & tradi debuerint.

ANIMADVERSI O LXIV.

N Equè enim puto, te Virum Eruditissimum „ ex iis esse a quibus „ credi interim possit, „ modum specilla per hæc partes inducendi nec „ Veteribus fuisse ignotum, quia legimus in Pli- „ nii lib. 7. *Cajus Julius Medicus specillum per „ oculos trahens*. „ Tu enim qui locum istum „ præclare noveris (est autem in Plinii majoris; „ nam junior quoque Plinius librum scripsit septi- „ mum; lib. 7. cap. 53. quod est de Mortibus re- „ pentinis) ita scriptum esse, non ignoras: *Super „ omnes C. Julius medicus, dum inungit, specillum „ per oculos trahens*: hoc est dum specillo super „ oculos collyria induceret, expiravit. Sive enim „ huc pertinet quod Langius admonuit: specilla „ quoque pro penicillis usurpari; sive hic specil- „ lum *aversum* est accipiendum, quod quantum ab „ *adverso* differat, docuit Rhodius; sive denique est „ & *specillum instrumentum quo oculos inungimus*, „ ut vel in vulgatissimo Dictionario Octolingui ha- „ bemus, cujus Auctores ad hanc significationem „ confirmandam istum ipsum Plinii locum de C. „ Julio Medico inprimis subjiciunt; quo etiam, ac „ quidem aliquanto, ut opinor, melius, quam ad „ conspicienda, credere poterant spectare verba illa „ Varronis: *hinc quo oculos inungimus, quibus spe- „ cimus, specillum*; præsertim cum legant, quod & „ Rhodius, *inungimus*, non ut Aldus edidit, *jun- „ gimus*; utcunque, inquam, id est accipiendum; „ illud certum est, Latinos Medicos *specillum* vo- „ cavisse illud instrumentum quo sive ad id pecu- „ liari, sive ad alia etiam communi medicamenta „ oculis admovebant, ut luculentus Auctor docet „ C. Celsus. Hic enim in eo libro quem laudati „ etiam Scriptores ad eam quam tertio loco memo- „ ravimus, Specilli significationem comprobendam „ indicavere, capite autem 6. „ super inungi, in- „ „ quit, oculi debent, sic ut croci quantum tri- „ „ bus digitis comprehendi potest, sumatur: myr- „ „ rhæ ad fabæ, papaveris lacrymæ ad lenticulæ „ „ magnitudinem, eaque cum passo conterantur, „ „ & *specillo super oculum inducantur*. „ Cajus „ igitur ille Julius dum *specillum per oculos trahere- „ ret*, si (quod Plinius inquit, Dissertationis au- „ tem Scriptor omittit) *inungebat*; super oculos „ ipsos, aut palpebras instrumentum aliquod, ut „ ex iis etiam quæ cum Rhodio adnotavimus, ve- „ rissimè est, aliquanto latius ducebat; certe haud „ Anellii specilla tenuissima; quæ vix ipsa, nedum, „ ut opus esset ad inungendum, cum justa addita „ medicamenti portione, puncta lacrymalia fubeunt; „ per hæc immittebat. At, vero inquit, id alii „ ante Anellium Augustæ Taurinorum in *majori „ Urbis Nosocomio*, & crebro quidem fecere. „ Primi cæterum, qui in obstructionibus sacci, „ „ & summitatis longitudinalis ductus congrua per „ „ lacrymalia puncta attulere feliciter specilla, „ „ fuerunt, inquit, Eruditissimus b. m. & fami- „ „ geratissimus Jo. Bapt. Fantonus, - Præclarissi- „ „ mus insuper, & Experientissimus D. Franciscus „ „ Anglesius. „ Ego vero hic illud tantum ani- „ madvertam. In superiore pagina cum de eodem „ præsidii genere in eodem sacci ejusdem morbo „ verba faceret, non sine hæsitatione scripsit: *spe- „ cillis*, „ offerciens materia abrumpi forsan, & ab „ „ implicationibus divelli posset, ut prior in hisce „ „ partibus referaretur via; „ hic autem sine ulla „ dubitatione affirmat: id *feliciter* factum esse. Et „

364.
Num ea
Operario
Veteribus
nota.

Natural.
Histor.

l. 3. Ep. 5.

Ad Scri-
bon. Comp.
39.

De ling.
lat. l. 5.
loc. cit.
Comp. 10.

De Re
Med. l. 6.

365.

Lettres
Divers.

Ibid.

Ibid.

Suite de
la N. Me-
thode &c.

A. 1718.
M. Janu.

A. 1716.
M. Oct.

Diff. de n.
M. c. Fift.
Lacr.
De Specil-
lorum in
Lacrymales
Ductus im-
missione.

sane ejusmodi Viros memorat quos non modo hæc, sed longe majora feliciter & excogitare, & præstare potuisse, libens fateor. Utrum vero id de quo videlicet hic sermo est, unquam præstiterint, an qui hac de re Dissertationis Auctori narraverunt, eam fortasse non satis compertam, & exploratam habuerint, hoc quoque Anellio ipsi inquirendum relinquo. Permirum tamen esset, Virum Cl. nostrique amicissimum Joannem Fantonum cum ea sit in Parentem Optimum pietate quam hujus semel, atque iterum ab ipso editæ, & Scholiis doctissimis ornatæ præclaræ Observationes ostendunt, hoc illi neque antea, neque per se egregium Inventum asseruisse; Anglesium autem Præstantissimum in ea quam primo Anellii Libro, Augustæ Taurinorum emissio, adscripsit Approbatione esse ultro, diserteque testatum, istas Anellii in lacrymalia puncta specillorum immisiones, operationes esse quæ ad illud, tempus institutæ sint nunquam. Quid? quod idem quem modo laudabam, Joannes Fantonus in ea Epistola quæ in altero Anellii libro edita est, candide fatetur, se pluries in cadaverum lacrymalia puncta specillum immittentem, non modo an id antea in viventibus ad Chirurgiæ usum, sed an in cadaveribus ipsis ad usum Anatomæ factum esset, ignoravisse: atque adeo diserte testatur, & cæteros Taurinenses Medicos, & se ipsum jure meritoque fecisse quod Anellii Medico, novam censuerint, & pronunciaverint, propterea quia revera nunquam de ipsa cogitaverant, & ab nemine, nisi ab Anellio ipso, didicerant. Hæc eadem Præstantissimorum ejusdem Urbis Medicorum edita iisdem in libris testimonia confirmant: quos veri simile non est, de Operatione sæpe adeo in *majori Urbis Nosocomio* instituta nunquam aliquid audivisse, aut si audivissent, dissimulatos fuisse, quando Terraneus in ea quam sæpius memoravimus, Epistola non reticuit, te Virum Doctissimum in Laufanensi Matrona, etsi pus per lacrymale punctum prodiret, Fistulam tamen, ut Anellius postea fecerat, esse censuisse Lacrymalem: in quo ut Terranei candorem laudo, ita eruditionem desidero. Non modo enim Joannes Baptista Carcanus; cujus raris apud nos Opusculis ne diutius carerem, Viri Cl. Humanissimi Bartholomæi Curtii liberalitate factum est; abhinc annos prope centum & quadraginta scripserat: Hæc foramina (lacrymalia) ea sunt, per quæ materia nunc aquosa, nunc saniosa in fistulis dictis lacrymalibus, si digitis pars fuerit compressa, exilit; quod pro venit; quia materia illa in meatibus illis est, coacervata, cujus merito partes illæ abscedunt, sicque magis, magisque in ipsis colligitur materia: & rursus infra: Præterea etiam duo foramina, quæ lacrymalia dicuntur, & in quibus fiunt fistulæ lacrymales dictæ, recte examinabis. Hac siquidem ratione & fistulæ lacrymalis cognitioni, ejusque veræ non parum nostra hæc de oculo Anatome proderit curationi; sed & Præceptor Carcani Falloppius illud ante ipsum animadverterat, ut a Cl. Heistero adnotatum est: qui si addidit, Amplissimum Stahlium ante Anellium in punctum lacrymale, chordam chelyos cera in apice imbutam, immisisse; non id tamen ad viam referendam fecisse, admonuit.

ANIMADVERSIOLXV.

Verum, ut dixi, specillorum in ea puncta immittendorum Inventum sibine, an aliis adscribendum sit, Anellius ipse disquireret. At medicamentorum per ea puncta siphone injiciendorum Inventum ipsi acceptum referendum esse, ego satis adversus Auctorem Dissertationis defendam. Nam, fortasse, inquit, artificialis liquorum traductio per lacrymalia puncta casu saltem habita, Veteribus pariter, si non directe, indirecte innotuit. Cedo qua ratione? Quia Morgagni *Adversaria Anat. VI.*

Platerus, inquit, refert in Virgine post Ægyptem fistula lacrymali affecta, post injectiones, semper portionem lixivii compositi in nares descendisse. Sed quid, obsecro, ad rem nostram faciunt injectiones, non in ea puncta, verum in ipsam *fistulam*, ut Platerus ipse exponit, instituta, & in eam quidem fistulam, ut post injectiones, portio ossis maxillæ superioris, in oculi angulo ad nares cum magna parte carnis putridæ foetidissimæ per nasum in palatum eruperit. At, Rulandum, inquit, fertur, habuisse aquam, qua majori oculi angulo illita, & inuncta, seu instillata, alvus est commota; apparet quia descendebat per ductus lacrymales ad fauces, ventriculum, &c. Ita Rolfinchius. Alii referunt, ægrotum ab applicito collyrio albo, Rasis sarcocollæ amaritudinem in ore sensisse, &c. Huic autem elucidandæ veritati sensus meos, judiciis castigatioribus subicio; ne mihi in præsens oggeratur, novatoris titulum modernis quibusdam invidere. Nihil melius quam hæc postrema hæsitatio. Nam quod ad superiora attinet; si propterea Rulandus, si Rolfinchius, si alii quidquam novisse censendi essent quod ad præripendum Anellio Inventoris titulum sufficeret; Inventorem ejus Injectionum ipsum, si Diis placet, Aristotelem laudare oporteret, quem videlicet scripsisse, animadverti: secundarum mulierum probationem fieri, etiam illitu, ut colores oculis impositi salivam colorent oris; nam nasi, inquit, hæc ita fiant, meatus corporis per quos excrementum decedit, confusos, obseptos, & obcæcatos esse, significatur. Sed cum illa usque adeo, ut ipse fatetur, *indirecta* congereret, mirabuntur plures, cur id ne memoraverit quidem quod aliquanto magis *directe* indicatum a me fuerat. Cum enim, tradidissem, præter extremorum angustias nullam valvulam esse qua per hanc omnem quæ a punctis lacrymalibus ad nasum est, viam sursum deorsumve permeantia impediuntur, quæmobrem videlicet observatio, nem Galeni de collyriis emunctis, aut exscretis, aliamque de tabacifugis explicavi; hoc statim adjeci monitum: *quarum rerum meminisse haud omnino inutile fortasse erit his qui earum viarum affectionibus medicinam facere studuerint*; quamquam mei hujus moniti, ab nemine, quod sciam, ante propositi; ut ego ad Anellium ipsum ultro scripsi, nisi hic solertia, & dexteritate singularem exemplo primus prævisset, exiguum, vel nullum futurum usum fuisse, confiteor. Verum his missis; quid, si Cl. Dissertationis Auctori Vegetii locus innotuisset: *per siphonem ei in oculum defundes?* Si ex superioribus conjectura ducenda est; fortasse quamvis huc minime pertinentem, non minus tamen quam illum alterum Plinii: *specillum per oculos trahens*: produxisset.

ANIMADVERSIOLXVI.

Cæterum quando ipse parum feliciter conatus est, Injectionum Anellii modum Veteribus non ignotum ostendere; nunc vicissim videamus, an novum quem ipse indicat, modum Antiquis cognitum fuisse, perfacile demonstrare possimus. Ipse igitur nobis injectiones indicat, non per lacrymalia puncta, sed per latiore ductus longitudinalis partem, quæ nasum respicit, seu pelvim suam. Addit, se ostendisse amicis viciniam hanc maximam, rectamque amplioris alvei, seu pelvis longitudinalis ductus cum externis naribus, faciles ideo, rectosque aditus huic injectionum generi permittentem; quod etiam per facillimam specillorum introductionem demonstrabat. Solum repugnare obeundo huic muneri ejusdem ductus declinationem ad fauces notabilem. Hoc certum esse interim, & Practicorum omnium observationibus suffultum; in oculorum affectibus hujusmodi, aliisque prodesse nasalibus magnopere. Hæc ipse. Ego vero cum *Practicorum omnium* observationes me legisse,

Obs. 1.2.

De Generat. Animal. lib. 2. cap. 5.

Advers. I. num. 22. & Epist. ad Anell. Suite &c.

Ibid.

Art. Veterin. 1.2. cap. 20.

De Injectionibus per sinem Ductus Lacrymalis.

366

Lettres Diverses in fin.

Suite &c.

Lettres Diverses.

Anat. 1.2.

Obs. Anat.

Diff. cit. cap. 3. cap. 5.

Num Injectiones per Lacrym. Puncta instituta ante Anellium nota fuerint.

Animad.
Med. l. 6.
Analest.
in Septal.
l. 3. & 6.

gisse, non credam, de postremis hisce verbis nihil dicam; tametsi memini, Septalium monere: „si oculi imbecilles sunt, & fluxionibus obnoxii, xii, errhina - fugienda esse: „& Rhodium (ut alios nunc omittam) ex Heurnii, & Dureti auctoritate negare, errhina „convenire iis, qui „ophthalmiæ obnoxii sunt, - aut fluente materia. „Non dicam, *viciniam* finis illius Ductus cum externis naribus neque esse *maximam*, neque esse *rectam*; quorum alterum vel ipsius Figuræ demonstrant, alterum non modo ista Ductus *declinatio ad fauces notabilis*, sed & magis a latere constitutus ipsius finis ita ostendunt, ut aditum illuc ab externis naribus omnino obliquum esse constet. Non dicam, pelvim istam Ductus esse nullam, & quæ supra de difficili in hujus angustum orificium specilli immisione memoravi, prætermittam. Quid multis opus est? ita rem se in homine habere, ut in quibusdam brutis, faciamus, omnemque istam dubitationem: *si per latiore Ductus partem daretur injectiones instituere*: Auctori eximamus. Non tamen concedemus, ipsi primum istum injiciendi modum innotuisse. Neque probationibus ejusdem generis, atque ipse, utemur: & ne id quidem admonebimus: jam tum a nobis cum monitum illud nostrum proposuimus, diserte indicatum esse, nihil in lacrymalibus esse viis quo *sursum deorsumve permeans quodpiam fluidum impediatur*. Hæc omnia prætermitemus; & Vegetii perbreve Caput, quod est de *Suffusione curanda per naves*, hic describemus: „Aliqui aures, thores dixerunt, si dexter (animalis) oculus „suffusionem susceperit, vel album incurrit, „dextram partem naris, si sinister, sinistram diligenter inspiciet: in ipsa callositate narium foramina subtilissima inveniet, quibus tenuis inserenda est fistula, per quam ille qui curare debet, os plenum vino insufflet, ut merum per foramen illud penetret. Quo facto oculus incipiet lacrymare. Velocius autem proficiet, quia „per interiores venas meri virtus ad oculum penetrat. Vides ut rem clarissime probaverimus. Siquis tamen (ut aliqui interdum sunt qui nodum in scirpo quærunt) hoc Vegetii Caput ea qua nos accipimus, ratione intelligendum esse, dubitaret; auctoritatem adderemus Thomæ Bartholini, quem plurimum nuper lætati sumus nobiscum invenire consentientem in ea Epistola quam de Oculorum Suffusione scripsit ad Burrhum. Postquam enim Vegetii verba protulit, in iisque pro callositate narium, *cavitate narium* legit, hæc subjicit: „Foramina illa accuratius deinde detecta, & descripta fuerunt a Stenonio nostro in Obs. Anat., ut judicio Viri Rei Anatomiciæ juxta ac Philologicæ Consultissimi omnino constet, eadem qua nos censemus, ratione hunc Vegetii locum esse accipiendum.

ANIMADVERSIO LXVII.

Cætera quæ ad *Curationem lacrymalis fistulæ post expositas* adversus Anellii Methodum *difficultates*, ipse tandem Dissertationis Auctor, *sententiam suam aperiendo*, proponit, ejusmodi sunt, ut partim, quemadmodum supra indicatum est, ab ipso quoque Anellio commendata sint, reliqua in pervulgatis Chirurgorum libris inveniuntur: ut „Apertio - in fistula exterius „ex se non aperta per ferrum, aut potentiale „cauterium „instituenda: ut monitum „declinandi præcipue palpebrarum ligamentum; „quod Vauguionus, & Clericus, aliique inculcaverunt: ut „quæ fistulæ aperturam ex se se jam „deferunt - non amplam satis, „eas hujus dilatationem *exigere*: ut „Fistulam in sacco, si „simplex est, non rupta, recensque absque ossis „læsione, sola, aptaque compressione emendari „posse; „quod post Fabricium nostrum Verducus, Dionisius, Palfynius docuere: & ne singula persequar; quod obiter innuit: „Aerem „ipsum tenelli ossis lacrymalis exfolians non

Apud
Heister.
Diff. cit.
cap. 5.
336.

Ibid.

„infimum esse; „hoc quoque ex Charrerio: „Ibid. ex quo & illud sumpsit, quod „actuale cauterium a fistulæ lacrymalis administratione proscribat. „Illa tamen habet præ Anellio, & cæteris peculiaria, ut in lacrymalis fistulæ curatione internorum remediorum ne mentionem quidem injiciat: & cum posuerit, eandem fistulam „ab obstructione semper esse indivisam, ac vel „ab eadem ortum trahere, vel eidem ortum deferre; „minus tamen sollicitus videatur (ut puta cum *Fistulam* curare docet *sola compressione*, vel cum „relictum ab ossis unguis ablatione „locum-carne nova facillime impleri „gaudet) minus, inquam, de ea re sollicitus videatur quam Cl. Heisterus etiam atque etiam inculcat, videlicet: „quamvis apertura fuerit facta, exulceratio mundata, & sanata, caries vel medicamentis, vel ferro sublata, nulla vero via in naves facta, necessario, vel saltem ut plurimum „rediturum esse malum: - & omnes Veterum methodos, ut sectionem, rasionem, perforationem, aut aduersionem ossis, compressiones, & cathæreticorum usus, ubi canalis nasalis obstructus erat, non sufficere potuisse, nisi „perforatio nasi accederet, & hinc tam sæpe eas „frustra adhibitas fuisse. „Verum illa omnia, atque alia præterea quæ consulto in tota hac postrema Dissertationis Parte prætermisimus, Anellius excutiet. Idem testis erit luculentissimus, num hoc sit studiis, & scientiis infaustum per Italiam sæculum. Denique ejusdem erit ostendere, num recentior anatomia fructus inde alios, curis forsitan minoribus, collegerit. Quod ad me attinebat, illud præstitisse satis videor, ut his perlectis Animadversionibus, intelligere possis, Vir Cl. num Lacrymalium Ductuum Structuram, & Morbos usque adeo ista Dissertatio illustraverit, - ac aliquot tantum paginis nova multa, ac vere utilia cumulaverit, ut jure illa, meritoque, quasi nihil ferme ad hoc usque tempus in hac re ab aliis esset elaboratum; *Ductus Lacrymales Novi* inscribi potuerit.

364.

Ibid. c. 6.

cap. 5.

367

352

351.

ANIMADVERSIO LXVIII.

Antequam Briggsii Ophthalmographiam exhiberes, poteras, opinor, excusationem istam omittere, te ideo inter Partes oculi exteriores Nuckianam „Glandulam ad canthum minorem „positam, cujus vas ad os usque porrigitur, „non proponere, quia de ea „in sequentibus, Capite de Ore, fusius differendi dabitur locus; „quando neque ipsum Nuckium, neque alium Solertem Anatomicum meminisse eam glandulam in humano corpore invenisse. Quod autem ad Briggsium attinet, miror, cum alia, tum ea imprimis ipsius loca a te sine ulla animadversione edita esse, in quibus & Musculos Rectos „a fundo „do Oculi oriundos, - & verisimile esse, dicit, „eosdem simul contractos oculum complanare, „sive humorem crystallinum in visione objecti „propinqui (quum penicillus opticus brevior existit) retinæ adducere: obliquos e contra simul „agentes oculum elongare, sive humorem crystallinum, in visione objecti remotioris, a retina „protrudere; ne aliter apex coni refracti ultra „retinam protendatur. „Ut enim ex Anatomicis constet, Rectos Musculos a fundo orbitæ enasci; ita ex Opticis liquet, in visione objecti propioris penicillum opticum longiorem esse, ideoque (nisi res potius per mutatam crystallini humoris figuram explicanda est) oculum quoque tunc elongari, sive crystallinum a retina magis abduci oportere, & vicissim. Cæterum et si Musculorum imprimis Obliquorum historia valde istis manca est; Trochlea autem per quam eorum alter trajicitur, fere tantum nominatur; quoniam tamen plenior ipsorum descriptionem in proximæ Tabulæ Explicationibus promittis, idcirco cum ad eas ventum fuerit, tunc a nobis videbitur. Nunc de Oculi Tunicis quod Auctor scribit, Corneam „ni-

368

368.

„ nihil aliud sibi videri esse, quam diversas fibras
 „ motrices e sclerode transeuntes quæ (sicut pel-
 „ lucidi muscutorum tendines) apte sibi invicem
 „ appositæ radios lucis facile transmittunt, -
 „ imo corneam e tribus tendinibus seu lamel-
 „ lis constare; „ id commodè acceptum, fortas-
 „ se veri aliquid involvit. At vicissim quod Cry-
 „ stallinam negat „ nec sane, inquit, humor cry-
 „ stallinus, nisi aeri diutius expositus, vel leni-
 „ ter coctus (instar lactis) cuticulam acquirit;
 „ quæ vero improprie tunica aranea dicitur, cum
 „ sit tantum adventitia; ut in Oculo bovis recens
 „ execto appareat; „ id eo magis diserte erat no-
 „ tandum, quod cum Verheyenius quoque ejusdem
 „ tunicæ existentiam sibi non esse satis evidentem,
 „ scripserit; Tirones propterea revocare in dubium
 „ facile possent tunicam quæ alioqui haud ita dif-
 „ ficile vel in recens exsectis humanis oculis, nulla
 „ prævia præparatione, ostendi potest, & quæ adeo
 „ antiquis etiam temporibus cognita fuit, ut Ruffus
 „ Ephesius sic eam descripserit: „ Quarta mem-
 „ branula guttam quandam humoris *κρυσταλλοειδῆ*
 „ includit. Hæc antiquitus nomine caruit: a
 „ posteris *φακοειδῆς*, quasi dicas lenticularis,
 „ ob figuram; *κρυσταλλοειδῆς* vero a contento hu-
 „ more cognominata est. „ Tu vero ambi-
 „ guis, aut certe non satis perspicuis verbis uteris:
 „ Tunica, inquit, Oculi a Præcl. Ruyschio sex
 „ numerantur, omittis etiam Vitrea, & Crystal-
 „ lina, in quibus nullo hæctenus artificio vasa
 „ sanguinea demonstrare potuit: „ cui præterea
 „ loco quodammodo repugnat tuæ proximæ Tabu-
 „ læ CIII. Figura 27. ut quæ in Crystallina saltem
 „ Vituli plurimas ab eodem Præstantissimo Ruyschio
 „ repletas arteriolas monstrat.

ANIMADVERSIOLXIX.

De Uveæ
 structura
 diligentius
 a Medicis
 necessario
 inquiren-
 da.

Quod autem super Oculi Tunicis, eaque
 nominatim Choroideæ parte „ anteriori, &
 „ in sui medio perforata - Uveæ nomen
 „ maxime promerente, cui ligamentum, seu ve-
 „ rus musculus adnascitur Ciliaris, „ quod, in-
 „ quam, super hac parte Lectores remittis ad ean-
 „ dem Tabulam CIII., equidem fateor, ipsius
 „ structuram non modo ex musculosis fibris, ha-
 „ rumque tendinibus pupillam versus quasi ad cen-
 „ trum undequaque tendentibus, eandemque propte-
 „ rea dilatare valentibus, sed ex fibris etiam circu-
 „ laribus, sive annularibus *Pupillæ constrictioni de-*
 „ *stinatis* in illa ipsa Tabula expositam, qua ele-
 „ gantia, qua in rebus explicandis novitate haud
 „ parvi profecto faciendam esse. Illud unum opta-
 „ rem, ut ab omnibus diligentioribus Anatomicis
 „ eadem agnita, & accepta esset; nam (quod
 „ te fugere, non opinor) Solertissimus Me-
 „ rryus, cum annis aliquot post eam propositam stru-
 „ cturam, Motuum Iridis rationem inquireret, ul-
 „ las circulares fibras in Iride ad pupillam constri-
 „ gendam animadverti, diserte negavit; illas autem
 „ alias fibras ab irruentium spirituum copia elon-
 „ gatas huic muneri addixit, quas & contrarium of-
 „ ficiū præstare, credidit, ubi, deficientibus spi-
 „ ritibus, sua se vi elastica priori brevitati resti-
 „ tuant. Quæ etsi ipse ingeniose ostendere adnixus
 „ est; quoniam tamen cum iis quæ in cæterarum
 „ musculosarum fibrarum actione observantur, con-
 „ venire non videntur, idcirco Viri alii pariter Do-
 „ cti, & plerique adhuc quos nos quidem novimus,
 „ Medici ita de istarum quas tum ipse, tum Cl.
 „ Ruyschius, tum ante hos Drelincurtius, cujus ver-
 „ ba profero, rectas Iridis fibras agnoscunt, ita, in-
 „ quam, malunt de istarum motibus existimare, ut
 „ ab ipsarum contractione naturalem, ab ipsarum
 „ convulsione morbosam Pupillæ dilatationem, & con-
 „ tra ab ipsarum remissione naturalem, ab ipsarum
 „ paralyfi morbosam Pupillæ constrictionem cum
 „ eodem Drelincurtio deducant. At vero si annula-
 „ res præterea fibræ instar exigui sphincteris in
 „ Morgagni Adversaria Anat. VI.

Iride sunt agnoscendæ; cum naturalium, tum
 morbosarum ejusmodi Pupillæ constitutionum cau-
 sas ita mutare, atque augere necesse est, ut quod
 antea convulsioni, id interdum paralyfi, & quod
 paralyfi, id interdum convulsioni sit tribuendum.
 Quæ cum ita sint, apparet, nisi hanc Ruyschii,
 & Meryi circa annulares Iridis fibras dissensio-
 nem subtilior Anatome, quæ a nonnullis Rei Me-
 dicæ inutilis esse dicitur, planissime dirimat, ne
 curativas quidem, quas vocant, eorum Affe-
 ctuum Indicationes posse constitui. Cæterum ex
 his quæ modo attigi, licet intelligere; si forte
 annulares eæ fibræ non inveniuntur, rem multo
 expeditiorem esse futuram; contra vero, si con-
 firmentur. Cum enim ex oppositis omnino
 causis idem ex. gr. nimix Dilatationis affectus ha-
 beri posset, videlicet aut ex annularium fibrarum
 paralyfi, aut ex rectarum convulsione; relinque-
 retur, ut Medicus per ea quæ affectionem comi-
 tarentur, aut præcessissent, solerter inquireret,
 utra causa esset ponenda: quæ quidem *Cautione*
 interim prudentiores quique Medici uti poterunt,
 dum ea dissensio dirimatur.

ANIMADVERSIOLXX.

Nunc vero ad Briggsum redeamus. „ Pars
 „ altera, inquit, tunicæ uveæ e fibris mo-
 „ tricibus pectinatim dispositis constans; dicitur
 „ *ligamentum ciliare*; quod humori crystallino in-
 „ cumbens eum (pro re nata) dilatat, vel con-
 „ stringit. „ Hoc quoniam tu qua ratione expli-
 „ cari queat, non doces; id ego facere conabor.
 Principio fibras istas ligamenti ciliaris (eodem
 namque hic nomine quo Briggsum utemur) nigri
 pigmenti quo anterioris partis Uveæ postica fa-
 cies inficitur, reliquias non esse, quasdam quasi
 fibras mentientes, ut ab nonnullis scriptum est,
 sed veras esse fibras in tunicam crystallini humo-
 ris infixas, & iis proximis quæ ad eandem posticam
 Iridis faciem describuntur, neque minus cras-
 sas, neque minus facile ostendendas, affirmo.
 Quamobrem qui illas Iridis pro motricibus fibris
 agnoscunt, has agnoscant pariter, necesse est;
 quinimo cum ipsa Choroidis substantia ex fibris
 haud ita absimilibus compingatur, verisimile est,
 has pariter esse motrices. His ita positis, quo-
 niam ex Opticis Doctrinis, velut etiam supra in-
 dicatum est, constat, pro varia rerum videnda-
 rum distantia, crystallinum humorem aut magis,
 minusve ab retina distare, aut magis, minusve
 protuberare, aut simul accidere utrumque, oportere;
 quod ad majorem illam, minoremve ab re-
 tina distantiam attinet, id alii per eam de qua
 supra dictum est, muscutorum oculi contractionem,
 alii vero per fibras ligamenti ciliaris expli-
 cavere. Has enim id præstare posse, non dubita-
 runt, vel crystallini corpustrahendo, remittendo-
 ve, vel etiam extantem circum ipsum, anteriorem
 vitrei humoris limbum magis, minusve premendo,
 qua videlicet ratione quantum in hoc limbo
 compressus vitreus cedit, tantum in medio qua
 crystallinum excipit, turgere, atque hunc a reti-
 na dimoveat, & vicissim: quod quidem eo faci-
 lius fieri posse, crediderim, si eodem tempore fi-
 bræ Choroidis circum omnem reliquum vitrei am-
 bitum contrahantur. Verum de hac parte expli-
 cationis in præsentia non laboramus. Neque enim
 Briggsum de crystallino humore dimovendo, sed
 de ejus figura immutanda locutus est, cum id
 quod nos explicandum suscepimus, „ ligamentum
 „ ciliare, scripsit, humori crystallino incumbens,
 „ eum pro re nata dilatare, vel constringere. „
 Fuere igitur qui existimarent, crystallini cor-
 pus ut ligamento ciliari quasi quodam annulo
 circumcirca ambitur, ita hujus contractione pres-
 sum, turgere, eaque vicissim contractione re-
 mittente, ad pristinam figuram redire. Quod
 quidem haud improbari fortasse posset, si ejus-
 dem ligamenti fibræ instar cujusdam sphincteris
 disponerentur. Verum ipsæ instar radiorum ad
 P 2 cry-

De Ciliari-
 bus, &
 Choroidis
 Fibris, &
 mutatione
 distantia,
 figuræque
 Crystalli-
 ni.

Memoir.
 del'Acad.
 R. des Sc.
 A. 1704.

crystallinum quasi ad centrum quoddam contententium disposita sunt, & in ejus tunicam, quam ego pro earum tendinea expansione habere ferme soleo, inserta. Quapropter constrictionem, sive subsiditiam crystallini multo rectius explicari censeo per illarum contractionem; contra vero turgentiam, per remissionem.

ANIMADVERSIO LXXI.

De diversa
diversa-
rum par-
tium Cry-
stallini
consisten-
tia, hujus-
que utili-
tate.

Nam quod doctissimi quidam Viri objiciunt, crystallinum ex multo durioribus lamellis compingi, quam aut ejus figura mutari, aut certe sine productis in superficie rugis, trajicientes radios perturbaturis, mutari possit; nimirum hoc cum utrique explicationi adversatur, tum vero nonnullis infirmari potest observationibus. Primum namque in majoribus piscibus observatum est, crystallini substantiam quo exterior est, eo esse molliorem; quinimo in minoribus quoque piscibus, & nominatim in eo quem latine Fabrum, seu Gallum Marinum vocari, accipio, & in quo maxillam superiorem mobilem deprehendi, incisa tunica crystalloide idem memini observasse. Deinde eadem tunica in vitulis etiam, bobusque sive recens, sive non ita recens occisis perforata, pluries animadverti, illico humorem quendam aqueum prodire: quod & in homine observare visus sum, atque adeo credidi, hujus humoris secretionem prohibita, crystallinum siccum, & opacum fieri fere ut in extracto, exsiccatoque crystallino contingit. Et quanquam alias neque in iisdem, neque in multis præterea animantibus humorem hunc aqueum, quem ab aliis in piscibus majoribus animadversum esse, video, observare potuerim; illud tamen constantius observare consuevi, non modo in piscibus, ut paulo ante dictum est, verum etiam in cæteris animalibus crystallini corpus quo magis ab interiore medio nucleo recedit, eo magis, magisque mollescere; quod & in reficcato lamellæ ostendunt eo magis friabiles, quo exteriores, & in recenti, substantia exterior gelatinam quasi quandam, & interdum vitrei humoris consistentiam æmulans, quod neque intermediæ, & multo minus intimæ substantiæ convenit, plane confirmat. Hanc diversam in diversis crystallini partibus densitatem, certoque ordine decrecentem etsi Viri quidam Ingeniosissimi, mei que Amicissimi qui suas mecum super oculo, ac visione observationes, & multa, atque egregia nova cogitata quæ merito typis destinant, communicarunt, etiam alio pertinere, non dubitent; mihi tamen in præsentia cum illis facere satis est qui ante me docuere, istam crystallini exteriorem molliitudinem ejus figuræ mutationem multo faciliorem reddere. Igitur proximæ tunicæ crystalloidi nunc a ciliari ligamento contractæ, nunc vicissim sua se vi elastica, & interiorum lamellarum, restituenti cum sive iste crystallini aqueus humor, sive ista aquosior, molliorque substantia non promptissime obsequi, & se se, velut opus est, non conformare non possit; haud video sane, quæ plicæ illæ & corrugationes in crystallini superficie tunc adeo facile produci queant.

ANIMADVERSIO LXXII.

Ad ea autem quæ ex Briggii Ophthalmographia sequuntur, adnotare profecto multa poteris, quorum nos quædam indicabimus. Ubi enim Auctor, certissimum esse, scribit, quod in omnibus Oculis humanis (quos saltem ipsi disseccare contigit) nervus Opticus pupillæ, e diametro opponatur; monendi erant Lectores, a Verheyenio tamen, aliisque Recentioribus non idem esse observatum. Quod autem de Picardi Experimento continuo censuit, & quod item adversus Mariottum defendit; istum sane Briggii locum nominatim excussit Vir in observando, cogitandoque Solertissimus Victorius

Stancarius, qui superioribus annis immatura mortem præreptus cum toti Academia Bononiensi, tum mihi, cæterisque Amicis incredibile sui desiderium reliquit. Cum vero ad ea quæ de humore Aqueo a Briggio scribuntur, detectum a Nuckio ductum memores, eundem humorem oculo sufficientem; non tamen memoras, ejusmodi ductus a nonnullis Anatomicis, non sine rationibus, & experimentis, pro Vasis Sanguiferis esse habitos; nonnullos autem, in quibus est Verheyenius, ea de re judicium cohibuisse; nonnullos denique veros ejusdem humoris fontes intra ipsos oculos sibi adhuc quærendos credidisse, quos inter clarus inprimis est Meryus, cujus sane observatio digna saltem erat, ut non minus quam isti alii canaliculi eundem humorem aqueum - referentes, proponeretur, atque ulteriori Anatomicorum examini commendaretur.

loc. cit.

Mém. de l'Acad. R. des Sc. A. 1707.

ANIMADVERSIO LXXIII.

Verum his, atque aliis ejusmodi interim sepositis, quid Auctor sentiat de ea luce quæ ab oculi pressione in tenebris præsertim elicitur, videamus. Recte ille quidem negat, elici, a pressione crystallini (ut opinatur Schei-nerus) - nam observatu, inquit, dignum est, quod pressio illa versus Oculi fundum, si, vel ultra humoris crystallini regionem fieri debet; quo melius prædicta lucula appareat. Certe ipse quoque expertus sum pluries, si cornea prematur, lucem nullam; si regio quæ propius corneam est, lucem instar dimidiati annuli; si paulo ultra, instar annuli; si duæ eodem tempore regiones, gemini instar annuli apparere. Rursus, si non summus tantum digiti apex, sed & proxima pars digiti apprimatur, lucem apparere instar annuli elliptici; si pro digito corpus aliquod multo minus, & subrotundum, ut acus capitulum, instar annuli multo minoris apparere; semper tamen in adversa pressioni parte. Quæ commemorare omnia volui, ut intelligeretur, mihi etiam idem quod Auctori, probabile videri, scilicet, phænomenon prædictum a contorsione, fibrarum tunicæ retiformis potissimum oriri; unde spiritus animales a nova hac & vivida vibratione, sicut a lucis radiis, afficiantur. Nam quod Keplerus asseruit, spiritus animales, hoc ritu ex Iridis filamentis attritis eodem modo elici, quo per frictionem e felium dorsis hirsutis excutiuntur; neque ego ei sententiæ possum adstipulari tum propter ea quæ ex modo allatis experimentis deducere proclive est, tum etiam (ut opticam demonstrationem, atque alia hic omittam) propter alterum experimentum quod ante viginti annos institui in Bononiensi Academia. Scilicet oculum ita per anatomen præparavi, ut quod intus accideret, conspici posset; corneam vero, & iridem ita dempsi, ut crystallinus tamen humor, & quæ post ipsum sunt reliqua, locum quæque servarent suum. Chartam præterea sic denigravi, ut annularem ejus portionem, figura, & magnitudine demptam iridem repræsentantem, & intactam relinquerem, & pellucentem. Tum chartam hanc, faciem inter, & præparatum oculum posui: & ostendi quidem, donec chartacea illa iris luminosa certo quodam spatio quod hic definire necesse non est, ab oculo distabat, luminosi annuli imaginem in retina effingi; at cum ita illa iris crystallino humori admota est, ut demptæ iridis teneret locum, tum vero nulla amplius annularis imago in retina apparuit, indicio manifestissimo, iridem ad propositum phænomenon haudquaquam pertinere. Nam quamvis ejus postica facies sive ipsa lumen emitteret, ut placet Keplero, sive emissum a crystallino reflecteret, ut mavult Schei-nerus, lucis quidem imaginem excitare in retina posset; annularis autem lucis; sit ipsa licet annularis; non posset. Hactenus igitur Auctoris nostri sententiam confirmo. Quod autem subjicit: ea-

372
Circa lucis
que presso
oculo ap-
paret, se-
dem & na-
turam ex-
perimenta.

„ eadem forsan ratione felium oculos in tenebris
 „ a magna spirituum quantitate & motu rapidio-
 „ re lucere; „ hoc vero confirmare non possum.
 Lux enim ista felium vera lux est; illa autem al-
 tera de qua supra verba fecimus, unum est ex iis
 multis a quibus fallimur, videlicet, ut præclare
 ait Lucretius,

De Rer.
 Nat. l. 4.

*Propter opinatus animi, quos addimus ipsi,
 Pro visis ut sint, quæ non sunt sensibus visa.*

Nam & hoc ipse expertus sum, ut dum mihi ocu-
 lum proposita ratione premerem, aliquis propius
 introspeceret; qui etsi perspicacissima acie esset,
 mihi autem vel præclarissima lux appareret, ni-
 hil tamen lucis ipse animadvertere unquam po-
 tuit.

ANIMADVERSIOLXXIV.

Ex his an
 aliqua in
 rem medi-
 cam existat
 utiditas, in-
 quiratur.

Cæterum siue ea lux vera est, siue, ut mihi
 quidem videtur, non est; illud aliquando ve-
 nit in mentem inquirere, annon ex ejus observa-
 tione aliqua in rem medicam existere possit utili-
 tas. Sic autem cogitabam. Ut alia causa est
 ejus cæcitatis quæ fit ob nervi optici, aut reti-
 næ obstructionem, aut resolutionem, ut in Amau-
 rosi, alia ejus quæ fit ob crystallini humoris vi-
 tium, ut in Glaucomate, alia ejus quæ fit obvi-
 tium aquei humoris, ut in Suffusione, alia deni-
 que ejus quæ non modo ob aquei, aut crystallini
 humoris vitium, sed etiam ob resolutionem; ob-
 structionemve, aut alium quemcunque maximum
 morbum nervi optici, aut retinæ qui ad diutur-
 nam suffusionem, aut glaucoma, ut ex ana-
 tome etiam didicimus, accedere nonnunquam pot-
 est; ita aliud in alio cæcitatis genere & prædi-
 cere, & sperare, & facere necesse est. Sic ubi
 suffusio sola est, eam acu deprimendo, haud ita
 difficile est cæcitatem curare. Sic ubi glaucoma
 solum est, haud ab simili curandi ratione viden-
 di facultatem reddi posse, contendunt Expe-
 rientissimi illi Viri qui pro suffusione glaucoma
 accipi, & curari animadvertisse se, docent: a quo-
 rum placitis etsi id minime discrepare adnotavi
 quod Fabricius noster monuit, videlicet ab iis
 etiam qui sua tempestate suffusionis chirurgiam
 profitebantur, „ hanc operationem fieri non
 „ potuisse absque crystallini perforatione: - ab
 „ iis necessario crystallinum læsum fuisse; „ eo
 tamen adduci non possum, ut existimem, suffu-
 sionem, qualem vulgo describunt Medici, nun-
 quam contingere. Nam qua ratione post thoracis
 inflammationes, morbosas quasdam quasi telas
 pulmonum, aut pleuræ, aut pericardii superficiei
 accrevisse, per anatomen sæpe observavimus, ea-
 dem post oculorum inflammationem, aliosve affe-
 ctus telæ haud ab similes in ipsa aquei humoris
 sede relinqui possunt, iridis staminibus interdum,
 ut cordis lacertulis polyposæ concretiones, suis
 quasi petiolis adhærentes: & sane constat, Suffu-
 sionem in ejusmodi telæ, vel si mavis, pelliculæ
 modum conformatam Regiæ Scientiarum Acade-
 miæ Parisiensi a Cl. Littrio ostensam esse. Ubi
 autem (ut ad institutum sermonem redeamus) si-
 ve suffusio, siue glaucoma cum retinæ, aut nervi
 optici vel resolutione, vel obstructione, vel
 alio quocunque maximo vitio conjungitur idem
 ab illa eadem Chirurgia auxilium non mo-
 do querere, sed ne sperare quidem licet.
 Nam & suffusionis, & glaucomatis curationibus
 vel felicissime administratis, tunc restat tamen
 altera longe difficilior, atque adeo utpluri-
 mum insuperabilis causa cæcitatis, videlicet ner-
 vi optici, aut retinæ vitium. Igitur antequam
 Medicus quid speret in ejusmodi diuturnis cæci-
 tatis speciebus, multoque magis antequam earum
 curationem proponat, necesse est, ut quomodo
 se habeat retina, nervusque opticus, cognoscat.
 Quoniam autem id scire non potest, nisi expe-
 riatur, an ita hæc constituta sint, ut videndo in-
 servire possint, vel nequeant; hoc vero experiri
 ob interjectum nimis opacum siue glaucomatis,
 siue suffusionis corpus haud raro in ejusmodi casu
 Morgagni *Adversaria Anat. VI.*

Num Suffu-
 sio sit
 semper
 Glaucoma.
 De Chi-
 rurgicis
 Operat.

Histoire
 del'Acad.
 R. des Sc.
 A. 1707.

bus non potest; relinquitur ergo, ut tunc vel te-
 mere agat, vel ægros deferat, vel aliam ejus rei
 dignoscendæ viam ac rationem excogitet. In eo
 igitur rerum statu ad id quod diximus, explo-
 randum an utilitatem aliquam afferre possit pro-
 posita oculi pressio, & hanc consequens aut prom-
 ptus, aut nullus descriptæ lucis in ægro sensus,
 Medici viderint; me quidem ne hoc, quale id
 cunque est, reticerem, illud Hippocratis permo-
 vit: „ immerito autem ullus aliquis ipsorum
 „ reprehendatur propterea quod invenire non po-
 „ tuerunt; imo laudandi potius omnes, quod in-
 „ vestigare conati sunt. „

De ration.
 Vict. l. 1.

ANIMADVERSIOLXXV.

Illud quoque Rei Medicæ causa perpendendum
 est quod de fibris Nervi Optici medullaribus at-
 tigit Briggssius: „ Hæ sunt, inquit, spirituum se-
 „ mitæ; quibus ex parte interceptis, puncta nigri-
 „ cantia, secundum Insignis. Willisium nostrum,
 „ in Oculis oriuntur: si vero penitus obstruantur,
 „ gutta serena, seu totalis luminis eclipsis infer-
 „ tur. „ Locus autem Willisii, quem Briggssius spe-
 ctavit, hic, „ est: Quoties in affectibus ophthalmicis
 „ puncta nigricantia, aut assulæ concatenatæ ob o-
 „ culos versantur, verisimile est, hanc apparitionem
 „ propterea fieri, quoniam Nervi optici filamenta
 „ quædam obturantur, quæ cum lux haud uti re-
 „ liqua recte trajicere potest, tot quasi spatiola opa-
 „ ca in medio diaphano apparent. „ Hisce Willisii,
 & Briggssii verbis abuti plures Medicos, deprehen-
 di, qui ejusmodi puncta, assulas, aliaque spectra ob
 oculos versantia nunquam non a fibrillarum nervi
 optici, aut retinæ læsione deducunt. Haud sane me
 fugit, a Doctissimis Viris Chalesio, & Pitcarnio de-
 monstratum esse, opacorum corpusculorum aqueum
 oculi humorem inquinantium nullam pingi in reti-
 na imaginem, atque ideo nullum esse sensum posse;
 & quod consequitur, errare Medicos qui id igno-
 rantes, ea de quibus diximus, spectra inchoatæ in
 aqueo humore suffusionis indicia esse, non dubi-
 tant. Attamen, ut hos errare confiteor, ita eos quo-
 que falli, contendo, qui non dubitant, ab iisdem
 spectris semper retinæ, optice nervi læsionem si-
 gnificari. Ut enim illud omittam, corpora opaca
 postremas vitrei humoris cellulas inquinantia ab
 ægris non animadverti non posse: cumque eas ob
 causas, ob quas hujusmodi corpora in eas cellulas
 se se proripiunt, in aquei etiam humoris sedem non-
 nunquam possint irruere, hinc esse aliquando, ut
 quamvis explicatio illa vulgaris diagnoseos inchoa-
 tæ suffusionis a vero aliena sit, ipsa tamen dia-
 gnosis a vero non aberret; ut, inquam, hoc omit-
 tam; illud certe non est omittendum: si in eorum
 aqueo humore opaca corpora acervabuntur quorum
 retina magis, minusve quam par est, ab humore
 abest crystallino, quod quidem tum primæ confor-
 mationis, tum ætatis vitio haud raro contingere,
 notum est; item si quibus corpora opaca ab ipsa
 siue corneæ, siue pupillæ, siue crystallini periphe-
 ria introrsum protendentur: si aliis denique vel in
 ipso humore aqueo corpora inerunt non illa qui-
 dem opaca, sed pellucida, at ea figura, ut incur-
 rentes lucis radios certa ratione possint refringere;
 hos omnes sine ullo nervi optici, aut retinæ vitio
 siue puncta, siue alia spectra esse visuros. Quæ qui-
 dem cuncta qua ratione demonstrari, ostendive
 possint, iis assequi facile est, qui vel in Opticis
 Doctrinis, vel in Camera, ut vocant, Opticæ
 experimentis se se exercuerint: iidemque etiam in-
 telligent, quemadmodum in certis præterea vitiis
 siue humoris vitrei, siue crystallini, seu tunicæ
 corneæ, seu denique lacrymalis laticis hanc ipsam
 extrinsecus alluentis illa omnia vera sint. Cæ-
 terum ut de Animadversione hac nostra ii quoque
 judicium ferre possint qui non sunt in iis Doctrinis, &
 Experimentis versati; nonne in homines sæpe incidi-
 mus quorum oculis in album præsertim parietem, aut
 in cælum ipsum conversis subnigra interdum pun-
 cta, alias quasi divulsæ araneæ telæ, nonnunquam
 pellucidorum globulorum oblongæ series, atque
 alia

372.
 De variis
 causis pun-
 ctorum
 quorundam
 oculis ob-
 versantium
 distinguen-
 dis, & di-
 gnoscendis.
 Cerebr.
 Anatom.
 cap. 21.

Optic. l. 1.
 Prop. 30.
 Theor.
 Morbor.
 Oculi.

alia ejus generis spectra obverfari folent? An ipsis aliqua nervi optici filamenta obftructa effe, credemus? At fpectra illa non modo oculis immotis, moventur, fed affidue (ad palpebrarum præfertim motum, lacrymalem illum impurum laticem dimoventium) variantur, evanefcunt, redeunt; ut planum fit, incertis illis, vagisque imaginibus certam, perftantemque, qualis obftructio illa effe, omnino caufam effe non poffe. Quæ omnia cum ita fint; liquet, cum puncta, aliave fpectra cujufpiam oculis obverfantur, diligenter effe inquirendum, vagane illa, an immota, variæ, an constantia, pellucidane, an prorfus nigra, num ab lateribus, an in medio, num minus quæ diftita, aut proxima objecta funt, an omnia pariter recte videnti, num ullo denique, & quonam aut prævio, aut comitante affectu vexato, an immuni prorfus, & quæ funt alia hujus generis, appareant. Nimirum hac ratione prudens, folersque Medicus Doctiffimorum Hominum laudatis fententiis, ac demonstrationibus (quod plures facere, animadverti) non abutetur; fed interdum quidem retinam, atque opticum nervum culpabit, nonnunquam dubius cohibebit judicium, aliquando etiam longe alias, atque illas, Partes vitiatas effe, pronunciabit.

ANIMADVERSIO LXXVI.

Quod reliquum effe, cum Briggfius nulla alia Oculorum vafa, nifi arterias, venas, nervosque opticos, motorios, & patheticos enumeret; non modo hic admonere Lectorem poteris, Vir Cl., Lymphæ Ductus in bovina faltem retina ab Diligentiffimo Anatomico Valsalva effe obfervatos; fed iis nervis illos etiam furculos addere debebas qui a Pari quinto profecti, tunicam fcleroticam fubeunt, atque, ut a Viris Præftantiffimis Willifio, & Vieuffenio obfervatum effe, ad uveam ufque pertingunt. Quod fi de his rebus admonere Lectorem nolebas; at illud faltem monere poteris, te Briggfii Caput Sextum, quod effe De (Oculi) Glandulis, & vasis lymphaticis, totum omiffiffe, & cum hoc omnes præterea quas ipfe Ophthalmographiæ fuæ adjecit, Figuras; nam ut illud fciri decebat, ne forte Auctor aliquam fufceptæ tractationis partem prætermiffiffe crederetur; fic harum aliquæ infpici poffunt, ut nonnulla eorum quæ ab ipfo fcribuntur, multo facilius intelligantur. Neque enim quia tres copiofiffimas, & elegantiffimas addis Figurarum Tabulas, idcirco aut ea quæ ad Picardi Experimentum attinet, aut ea (qualifcunque effe) quæ, Oculum fecundum axem fectum repræfentat, ut diverfæ hujus, morum regiones compareant, aut aliæ quæ fubftitui his poffint, in iisdem Tabulis inveniuntur. Imo in iis Tabulis, earumque Explicationibus multa occurrunt in quibus tua poteft diligentia defiderari. Quorum ut partem aliquam indicemus, principio illud in ipfa Tabulæ Cl. Figura 1. notandum effe, litteram G Glandulæ, five, ut Auctor ipfe Bidlous fcripferat, Glandularum indicem cum Iconifmo in quo nulla ufquam apparet glandula, tum Corneæ tunicæ, quafi vero hæc effet glandula, appofitam effe. Nam quod littera H. Carunculæ, non autem veræ Glandulæ Lacrymalis infcribatur, ex fuperioribus Animadverfionibus intelligi poteft. Eadem Animadverfiones, quænam, & quam gravia errata in Figuram etiam 5. irreperferint, ex parte oftendunt; nam alia præterea tum in Carunculæ I. fede, tum in Cartilaginei Arcus F. F. latitudine, longitudine, figura, tum in aliis quoque admiſſa funt.

ANIMADVERSIO LXXVII.

Verum his nunc quidem omiffis, ad Figurarum 7. & 8. Explicationem veniamus, cujus non omnes certe errores ad Bidloum pertinent. Nam quod Musculus ex. gr. D. quem propter oppofitum Trochlearem, evidens effe, eundem effe, atque C. hoc effe Abducentem, pro Adducente, qui in neutra iftarum Figurarum apparet, oftendatur; in hoc qui-

dem etiam Bidlous lapfus effe. Pariter quæ ad E. litteram fcribuntur: „ Tunica Oculum inveftiens, „ ubi omnes (Recti) Musculi prædicti primam „ fuam originem habent eo loci in quo Nervus Opticus F. oculum ingreditur; „ lane ferme eadem Bidlous fcripferat. Hæc tamen ejus Explicatio in eo tantum peccat quod a vero aliena effe, non autem in eo quoque, ut fecum aperte pugnet; neque enim ipfe habet quæ iftic, paulo ante verba quæ modo produxi, quamvis iisdem repugnantia, conſcribuntur: „ Hi omnes musculi originem habent in fundo orbitæ oculi juxta nervum opticum, principio acuto, partim ex offibus, partim ab ejusdem nervi velamine. „ Quod autem de Musculo G, Obliquo videlicet Inferiore iftic traditur, „ fuperius Corneæ, ex Iridis regione, ut plurimum, inferi; „ hoc ipſum & Bidlous tradiderat, ac perperam quidem, ut proxima Cowperi Figura oftendit. At iftic præterea verba illa Bidloi omittuntur: „ hoc vero in fubjecto prædictos (Musculos) exterius obreptabat: „ quibus omiffis Lectores decipiantur, neceffe effe, credentes illum Musculum, ut pictum vident, femper, vel plerumque fuper Abducentem Musculum extrinſecus ire. Sed gravior multo ipſorum deceptio erit ad litteram L. quæ cum eo in loco infcripta fit, ut nihil poſſit, niſi partem aut primi, aut ſexti Musculi, hoc effe Attollentis, vel Obliqui Superioris indicare; primum nescire me, fateor, cur a Bidloo pro infertione quinti Musculi, feu Obliqui primi, hoc effe Inferioris, qui in ea Figura 7. nuſquam apparet, oftendenda indicata fit; tum multo magis nescio, vel cur eadem littera ita iftic explicetur: „ L. Quintus oculorum Musculus, feu Obliquorum primus, hic a latere Trochlearis & pone Attollentem depictus; „ hoc enim fieri nullo pacto poteſt; vel cur ipſius deſcriptio ſubjiciatur, quafi vero alius effet atque is qui paulo ante ad litteram G. deſcriptus fuerat. Sed cum de tuo iftis Explicationibus plura adderes, miror, cur de Obliqui alterius Trochlea nihil addideris, niſi quod in offe majoris oculi Anguli pertuſa fit. Video quidem, cur ad litt. K. Bidloi ſententiam omittas, „ Trochlea, re organum effe circularem musculum, docentis, cujus tendo naſi offis integumento affixus effe, & qui Musculus a Trochleari perforatur; „ fed cur ipſe non addas, quid fit, & quomodo, ac qua de cauſa factum fit, non video, præfertim cum Briggfius nihil aliud de eo tradiderit, niſi Obliquum Superiorem Musculum, „ Trochlea muniri ad ſtrabifmi periculum in infantili ætate præcavendum; quæ Chirurgis in fiſtula lachrymali curanda negotium aliquando faceſſit. „ Sed præcipuum quidem Trochleæ uſum longe alium effe, mox apparebit; de ejus autem natura, ſtructureque quid aliud iftic a Tironibus exiſtimetur, niſi fortaffe quod tua illa verba indicant, offis partem effe pertuſam; vel ſi Cowpero magis credant, „ exiguam effe Cartilaginem, mox docenti, eandemque offi affixam; „ effe tamen ſemiannularis inſtar anſulæ, quemadmodum ille, & Bartholinus videntur delineare, fortaffe credent. Eſt vero exigua quidem cartilago, fed in breviffimi canaliculi formam, ut pluries vidi, convoluta, atque orbitæ per membranas affixa, quanquam in Viro quodam nihil prorfus cartilaginis, fed canaliculum quaſi tendineum inveni. Memini etiam, tendinem Obliqui Superioris Musculi, non modo per trochleam trajectum, fed oblongæ etiam vaginæ incluſum vidiffe, ex ſubſtantia inter ligamentum, & membranam media conſtructæ, & circa tendinis infertionem late cum oculi bulbo connexæ. Verum hac de re, & de Rectorum Oculi Musculorum, ac præfertim Deprimentis infertione ad ufque Palpebras per Conjunctivam Membranam ex parte producta, quam noſtris cum Auditoribus aliquando vidimus, & ad palpebrarum motum oculi motui obſequentem, ex. gr. ad inferioris palpebræ; dum oculus deprimitur, ne illa viſui obſtet, deſcenſum juvandum pertinere credidimus, cum alias plures addiderimus obſervationes,

399.

Cerebr.
Anatom.
cap. 22.
Nevrogr.
l. 3. c. 3.

377

De Trochlea.

368

Anatom.
quart. re-
nov. l. 3.
Tabul. 9.
Fig. 1.

nes, tunc fortasse certius aliquid scribemus. Caterum cur de Trochlea, & Musculis Oculi plura in istis Explicationibus notaverimus, id causæ fuit, quod tu *Lectorem* ad has ipsas, & proximas Explicationes nominatim *remiseris*, ut in quibus, Musculi hi omnes plenius describerentur, quoad suas origines ac insertiones; imo, etiam quoad fibrarum suarum decursum.

ANIMADVERSIO LXXVIII.

Quæ eadem causa facit, ut Lectorum utilitati inservientes de proxima quoque Cowperi Explicatione plura adnotemus. Et primum quamvis ipsam Figuram Cowperi paulo esse longiorem quam par sit, recte animadverterit Cl. Heisterus; plurimum tamen utilis est, præsertim cum superioribus Bidloi Figuris comparata: quas cum dixeris *Oculorum Musculos in naturali situ exhibere*; miror cur hanc Cowperi dicas *Oculorum Musculos in situ suo prope naturali rursus proponere*. Haud equidem id mirarer, si ipse Cowperus dixisset; verum ipse, Exhibet, inquit, totum oculum, una cum origine, progressu, & insertione ejus musculorum, ex orbita extratum. Mitto reliqua, ut levioris momenti, in quibus productam a te versionem ab anglico illius autographo discrepare video; illud unum, quod gravius est, noto. Versio ista litteram C ita explicat: Portio inferioris externi Anguli Ossis Orbitæ, unde Musculus Obliquus inferior exoritur; quasi vero Cowperus ignorasset, oriri hunc Musculum; ut verbis paulo supra a te scriptis utar; in inferiori parte orbitæ, non procul ab angulo interno. Verum ipse ne *angulum* quidem in istius litteræ explicatione nominavit. Portio, inquit, inferioris, & oppositæ partis externi marginis ossis Orbitæ, unde Musculus Obliquus inferior exoritur. Nimirum hoc voluit, quod & in Figuræ delineatione potissimum spectavit, ut attenderemus, quemadmodum Musculus Obliquus Superior, ad trochleam usque extrorsum procurrens, per ipsam quæ in hunc præsertim finem condita est, ita reflectitur, ut introrsum, oculo se se inserturus procedat, sic & Obliquum Inferiorem ab ipso orbitæ externo margine orientem, ut se se oculo inserat, necessario introrsum pergere. Caterum observatio hæc Cowperi, ut vera, & præclara sit, nova tamen non est; quando Eustachius id ipsum, ut ego animadverti, luculenter delineavit. Illud Cowperi proprium est, ex hac observatione, & reliquis Obliquorum Musculorum conditionibus novos, eosque egregios ipsorum Usus eruisse, qui cum ad eorum Historiam absolvendam necessarii sint, & in eodem in quo ista Figura proponitur, libro exponantur; permirum est, te illam quæ eorum præsertim Usuum causa picta est, describentem, ipsos omisisse. Sed qui eam paulo attentius consideraverit, facile intelliget, Obliquos Musculos, ut contrario ferme ac Recti, progressu insertum se eunt, ita his ferme esse antagonistas, ideoque non modo prohibere, nequando oculus nimis introrsum ab Rectis trahatur, verum etiam magnam, quotiescunque oculum extrorsum trahi expedit, utilitatem præbere. Atque; ut nunc hos, aliosque usus seponamus; ex eadem Figura etiam intelliget, neque id quod in superiorum Figurarum Explicatione positum est: Musculum Obliquum Inferiorem *eundem fere cum Trochleari terminum assequi*, neque id quod in proximæ 9. Explicatione ponitur, verum esse: Oculi Musculorum, omnium tendinem in modum membranæ, quæ anteriorem videlicet ipsius oculi partem obducit, expandi. Porro; ut de nonnullis ex reliquis etiam tum Explicationibus, tum Figuris perpauca notemus; quod in 11. Explicatione de Adnata Membrana dicitur, *e posteriore oculi globi parte detracta*; id neque fieri potest, cum ea membrana in anteriore tantum illius globi parte inveniatur, neque Bidloum idem prorsus voluisse, comperio. Quod autem in 14. & 15. Ex-

Morgagni *Adversaria Anat. VI.*

plicationibus scribitur: Retinam *ad inferiorem CrySTALLINI humoris marginem extendi*; hæc certe neque eo usque, neque magis deorsum, quam aut sursum, aut ad latera, extenditur. Denique ab 19. ad usque 24. Figuræ prope omnes humanæ magnitudinis modum excedunt.

ANIMADVERSIO LXXIX.

Ad meam denique Figuram venio, quæ etsi, alieno jam prorsus loco, in extremum Tabulæ angulum rejecta, atque adeo contorta est, ut propter adjectam Animadversionem potius, quam alia de causa exhibita esse videatur; ea tamen quæ nullus alius ex tot Iconismis sive in his tribus, sive in cæteris omnibus Theatri Tabulis occurrentibus planissime ostendit, ut si illam unam omisisses, nec qua Tarfi magnitudine sint, & figura (quantum hæc in eorum altero a tuo Scalptore vitiata est) nec quo glandularum aggeries in tarsis iisdem consistat, numero, ordine, & dimensionum, figuræque modo disponantur tui scire Lectores potuissent. Alia mitto quæ qualia sint, ex appositæ Animadversionis examine intelligi poterit; quantum haud satis scio, an non illæ etiam de quibus modo dicebam, glandulæ ab Animadversionis Auctore perstringantur. Nam, omisissis, inquit, præcipue levis illis, striisque per palpebram utramque interius protensis, quas Author aggeries vocat, minutissimarum glandularum sebacearum secundum descriptionem suam - §. 12., quasque ideo oculorum Galaxias dicerem; siquidem & striæ illæ cælorum albicantes, ut minutissimorum astrorum aggeries perhibentur. Quod ad me attinet, propositæ descriptionis non pœnitet, ex quo præsertim apud Virum Gravissimum Boerhaavium hæc legi: Ne autem collisu assiduonictantes palpebræ exorientur, in limbo utriusque, glandulæ granulosa, subflava, humorem quasi ex adipe & cera mistis conficientes, hoc ipso margines inungentes, adsunt. Sed si ipsum pœnitet eorum quæ, istiusmodi palpebrarum glandulas probans, in alia Animadversione scripsit, atque ideo in ista, non mihi modo, aut Cl. Valsalvæ, aliisque Anatomicis, verum sibi etiam ipsi adversatur; si id tantum novi affert, ut eas lineas oculorum Galaxias nuncupet eadem nimirum ratione qua alibi sanguifera vasa *eclypticam sanguinis* appellavit; quæ ipse omittit, & nos omittamus; *ostio* autem *notabilia*, quæ in nostra delineatione *advertenda obsignare*, ut ipse ait, *tenetur*, attendamus. Quod antequam facimus, illud est etiam atque etiam animadvertendum, ad eas potissimum res monstrandas quas ipse omittere se, dicit, nos eam Figuram proposuisse: quod & illarum magis perspicua delineatio, & Figuræ titulus satis indicant, per quam, demonstrari, diximus, Palpebras - a posteriore, sive interiore parte aspectas, Glandulasque earundem. Hæc primum, atque adeo potissimum; Cætera quæ addidimus, Caruncula præterea, punctaque lacrymalia, meatusque quibus hæc ad nasum pertingunt; ne Iconismorum numerum tunc augeremus, quasi ejusdem Figuræ appendices, ea ratione qua in ejusmodi Figura licuit, & qua instituto tunc suscepto, ut alibi diximus, dumtaxat satisfaceret, adjecta sunt. Hæc vero potissimum arguenda sibi sumit Auctor Animadversionis, minime attendens, in una ejusmodi Figura necessario extra suam sedem amota eadem pingi debuisset tum aliis de causis, tum quia si Caruncula ex gr. retrorsum revoluta non fuisset, quæ a nobis in anteriore hujus facie descripta erant, ostendi certe non potuissent. Quicumque igitur hæc omnia, ut par est, attenderit, & Palpebris e sua sede depositis, atque ita ut a nobis pictum est, collocatis, Carunculam retrorsum conversam in eodem positu servare voluerit, tum ea quæ delineavimus, omnino vera, tum *ostio* ista quæ nobis obijciuntur, nullius ponderis esse, comperiet. Nam, Primum est, quod puncta lacrymalia ad latera majoris anguli locari immediate non debent, ut sit in

P 4

, Au-

Præfat.
Compen.
Anatom.

De Muscu-
lorum Ocu-
li Obliquorum
ren-
dentia, &
usibus.

Tab.add.
Theatro
XVII.
Fig. 4. 5.

Myot. c. 8.

377.

378

379

Institut.
Med. nu.
511.

75.

„ Auctoris figura; siquidem ab eo versus oculi
 „ medietatem adhuc notabiliter distant. „ At
 caruncula in eum quem diximus, positum retra-
 cta, ea pars interioris palpebrarum membranæ quæ
 inter illum ipsarum angulum, & basim caruncu-
 læ intercedit, ita disponitur, ut cum ea membra-
 næ pars, atque adeo extremus angulus præ eo lo-
 co, in quo puncta lacrymalia insculpta sunt, hu-
 milius subsidant, spatium angulum inter, atque ea
 puncta interjectum, ut ex obliquo visum, live ut
 Pictores nostri loquuntur, *in iscorcio*, brevius
 apparere necesse sit, cum interim eadem illa mem-
 branæ pars tota e regione conspiciatur. Et sane ei
 parti Figuræ nostræ Scalptor, non tuus quidem,
 sed meus ejusmodi tractus, atque adumbrationem
 addidit, ut nemo, præsertim qui de Figuris de-
 lineandis unquam cogitaverit, majorem omnino
 quam quæ picta est, longitudinem ibi non possit
 intelligere. Atenim, fortasse dices, in Iconismis
 Anatomicis *natura* potius, quam *pictura* legibus
 esse inserviendum. Id ego quoque confiteor;
 sed hoc tamen addo, nec semper id licere, nec
 semper esse necessarium. Nam & Auctor Ani-
 madversionis illud est fassus, cum Partes nonnul-
 las ab ipso in Figura quadam pictas, „ nonnisi
 „ compendiose (italice *in iscorcio*) videri posse, „
 scripsit, & quod ego sic ostendi, neminem trahe-
 re in errorem poterat, cum in obvio quocunque
 homine quantum illud spatium esset, videre
 omnibus, sine anatome, eadem ratione liceret qua
 puncta lacrymalia perspicenda esse, monueram.
 Eodemque modo cum inspicere in naturali sua
 sede lacrymalem carunculam, docuissim, huius-
 quaquam necessarium credidi idipsum peculiari
 Figura ostendere: & propterea carunculam, ut
 mihi opus alioqui erat, in eum quem dixi,
 locum, positumque retractam exhibui.
 Quo facto cum ea pars membranæ de qua ante
 dictum est, inter carunculæ basim, & angulum
 videndam se præbeat; illam Auctor Animadver-
 sionis, seu punctorum lacrymalium, vel potius
 Meatum in quos hæc producuntur, alienum
 omnino a vero *coalitum* reprehendit; *Secundum*,
 inquit, *quod eorum coalitus, ut in figura descri-*
bitur, ante carunculæ situationem alienus a vero
omnimode est: quod quidem iudicium in ejus Fi-
 guras quibus vel Levatores illos Vesicæ Muscu-
 los, atque alia ejusdemmodi, vel; ne hinc lon-
 gius abeamus; Majoris Ductus Lacrymalis pelvi-
 forme, ac pene horizontale orificium ostendit,
 longe æquius quam in nostram hanc, cadens,
 nunquam, ut opinor, tulisset, si antequam ad
 hanc reprehendendam accederet, palpebras, & ca-
 runculam eodem positu quo nos delineavimus,
 statutas, ut par erat, inspexisset. Jam vero
Tertium quod in eadem Figura notat, videamus.
 Est autem, „ quod caruncula non jacet ultra de-
 „ sinentiam anguli, multo minus longe ab hoc
 „ angulo, ut in figura depingitur, dum inte-
 „ gram revera in angulo sedem obtinet suam. „
 Nempe eadem oberrat chorda; estque ex iis quæ
 ad superiora reposta sunt, longe manifestum,
 hic etiam quod in retrorsum convertenda carun-
 cula de industria fecimus, id tanquam per insci-
 tiam admissum, reprehendi.

ANIMADVERSIO LXXX.

Hic dicet fortasse aliquis: si quod data opera
 fecisti, id a te fieri, monuisses; neque il-
 le reprehendere, neque item Vir alter Cl. scri-
 bere potuisset: tuam istam Figuram „ propter
 „ minus concinnam carunculæ lacrymalis inter-
 „ positionem non satis accuratam sibi esse visam; „
 cum liberum, imo exoptatum omnibus Anato-
 micis & sit, & semper fuerit, Partes extra suam
 sedem depositas, in eo potissimum situ delineare
 qui ad res plures una Figura ostendendas com-
 modior esset, dummodo extra naturalem sedem

(ne quis forte deciperetur) illas dispositas esse,
 admoneret. Ego vero si quis hæc dicat, & æquum
 hominem esse, fatebor, & pro ejus æquitate sen-
 tentiam inter me, atque illos ferre, liben-
 ter patiar, ubi Explicatione quam meo Iconismo
 subjeci, ad litteram f. perfecta, ea verba legerit:
 „ Porro oblongum illud tuberculum, quod inter
 „ Meatum utrumque proponitur, Caruncula La-
 „ crymalis dicta est, *retrorsum, atque extrorsum*
 „ *revoluta*, iis tuberculis minimis instrata, un-
 „ de tenuissimi, brevesque prominent pili, de
 „ quibus n. 12. & 22. „ Num potui clarius id
 quod monendum erat, monere? num plenius
 insuper causas indicare, cur sic retrorsum con-
 versam carunculam pinxerim? videlicet ut ea tu-
 bercula, iique pili apparerent quos nihilominus
 tuus Scalptor, qui & carunculæ ipsius a me pi-
 ctam figuram vitiavit, fere omisit, & Animad-
 versionis Auctor cum toto isto meæ Explicationis
 monito adhuc ignorat. Imo ob hanc ipsam igno-
 rationem *Quartum* notat, „ quod in hac figura
 „ saccum illum lacrymalem non observat, qui cæ-
 „ terum ex ductuum a punctis lachrymalibus emer-
 „ gentium coalitu revera producitur; „ nam si
 illam Explicationis meæ partem legisset, facile
 animadvertisset, a caruncula ita ut sæpius dixi-
 mus, revoluta, operiri in Figura nostra magnam
 partem ejus loci in quo ipse saccum esse, perpe-
 ram credidit. Sed de vera sacci exiguitate,
 ejusque propterea longitudine tum ab ipso æquo
 majori delineata, tum a nobis inter carunculam,
 & Majoris Ductus initium non prorsus omitta,
 in XXXIX. Animadversione dictum est. Pariter
 ex eadem, & proxima, & XLIII. Animadver-
 sione satis constat, quid de iis tribus quæ dein-
 cept notat, habendum sit. „ Quintum, inquit,
 „ quod productio canalis Longitudinalis ex sacco
 „ versus nasum propagati sit per angulum non
 „ solum rectum, sed & ad acutum vergentem,
 „ tantum abest, ut per simplicem canalis curvi-
 „ tatem exhiberi debeat, ut a figura exhibetur.
 „ Sextum, quod canalis hujusmodi lachrymalis
 „ longitudinalis per lineam perpendicularem non
 „ ducitur, qualis in figura describitur; sed incli-
 „ natur ab anteriori versus posterius capitis, usque
 „ ad ejus insertionem in lacunas nasi. Septimum,
 „ quod canalis hujusmodi longitudinalis, cilin-
 „ driacus non est, uti & in figura comparet; sed
 „ in sui progressu, instar Uretherum, variis ca-
 „ vitatis diametris comprehenditur. „ Scilicet ex
 memoratis Animadversionibus clarius intelligi,
 & facilius colligi potest, quam ut hic ite-
 rare necesse sit, ex parte ipsum in hisce rebus
 falli; ut earum aliæ ita ut contendit, delinean-
 dæ non fuerint: ex parte has res ejusmodi esse,
 ut vel quia extra suam sedem depositæ, vel
 quia non e transverso, & a latere, sed e regio-
 ne, & a tergo inspectæ in Figura nostra propo-
 nuntur, nemini omnium suaderi jam possit, vel
 necessarium fuisse, vel licuisse in ipsa ostendere
 quæ vel nolimus, meritoque negleximus, vel in
 eo positu nullo prorsus modo apparere queunt.
Octavum autem quod notat, videlicet „ quod
 „ ejusmodi (Ductus) insertio in foveas nasales
 „ angustior non est ultra habitam per totum ejus
 „ tractum amplitudinem, quod notabiliter per
 „ figuram offertur; imo per majorem longe ca-
 „ vitatis expansionem celebratur; „ ex iisdem,
 aliisque Animadversionibus liquet, num meum,
 an ipsius potius non levem errorem manifestet:
 quem ut omnes qui Anatomicen consulunt, facile
 deprehendent, ita iidem agnoscent, nisi meum
 istum Iconismum addidisses, Figuras illas quas
accuratissimas vocas, tuos Lectores decepturas
 fuisse. *Nonum* addit, oblitus, ut videri potest,
 se *octo* proposuisse: quæ res etsi ea reducit ad
 memoriam quæ Tullius de Curione scribit qui
 non modo in causis agendis *tria cum proposuisset*,
aut quartum addebat, aut tertium querebat, - sed
etiam in scriptis (id quod jure, magis admiratur
 Brutus) *obliviscebatur quid paulo ante posuisset*;
 tamen

Theatr.
 Tom. I.
 431

Advers.I.
 num. 22.

tamen iis missis, quid demum Noster sive oblitus, sive consulto addiderit, videamus: „Puncta, inquit, lachrymalia, quæ in figuræ explicatione peculiari prominentiæ insculpta promittuntur, ut de facto sunt, interea in ichone infra dictas eminentias delineari. „Nimirum hic quoque hallucinatur; neque enim intelligit (quod tamen si insculptos prope illa puncta, in nostro præsertim archetypo, certos quosdam tractus attendisset, facillime intelligere debuisset) album eum locum in quo ipsa puncta ostendimus; assurgere, ac prominere: & quod magis mirandum est; cum illa, inquit, a nobis *infra dictas eminentias* delineari; aperte significat, se pro illis eminentiis, atque adeo punctorum eorum sedibus duos illos exiguos angulos accipere qui haud procul in isto palpebrarum positu in ipsarum limbi non interna, sed externa ora quodammodo apparent; quo in loco ea puncta esse non posse, inde arguere saltem debebat, quod si ibi insculpta a me essent, in eadem cum ciliis, non vero in eadem cum glandularum tarsorum orificiis linea fuissent: quod quam absolum esset, ac naturali eorum punctorum sive sedi, sive officio repugnans, tum obvii cujusque oculi, tum Figuræ etiam Cl. Ruyschii quam in CIII. Tabula n. 22. exhibes, vel una inspectio commonstrare satis potest.

Denique ut ipse suam istam Animadversionem his verbis concludit: „Sed hæc omnia evidentius demonstrantur per nuperrime evulgatam Dissertationem Epistolicam, cui titulus, *Ductus Lacrymales Novi*; „ita nos, & multo quidem potiori jure, hanc nostram sic concludemus: Sed quæ hic attigimus, evidentius demonstrantur per nunc evulgatas superiores Animadversiones, ex quibus non modo quid de iisdem rebus, sed quid insuper de tota illa Dissertatione, & de iis Novis Ductibus sit habendum, satis superque cognoscitur.

ANIMADVERSIOLXXXI.

372 **N**unc ut intelligere omnes possint, quam cum ratione actum sit, cujus omnibus Iconismis sine ulla prorsus, ut vel de novissimo ostendi, causa Animadversiones appositæ sunt, ecce Tabulam proximam CII. nullas alias Figuras complectentem, nisi aut de quarum Explicationibus plurimi, ut supra indicatum est, vehementer dubitant, aut de quibus tu ipse alibi dixisti: *si modo credere fas est*: sine ulla prorsus adjecta Animadversione exhibes. Verum in præsentia nullam in has cadere Animadversionem, ponamus, atque in ea tantum re Lectorum utilitati consulamus, ut quam caute, ob magnam tuorum, opinor, Amanuensium incuriam, hac uti debeant Tabula, sive ejus potius Explicationibus, non ignorent. Cum enim in his multa passim aliter scripta atque ab earum Auctoribus inveniam; etsi video, plures ejusmodi mutationes majoris perspicuitatis causa esse factas; tamen neque id, Lectore non admonito, faciendum fuerat, & constat, haud paucis in locis non verba modo, sed res quoque, & sententias esse mutatas. In Figuræ enim 6. in qua etiam Scalptor; ut alia nunc præteream; *Vas illud Sympatheticum* omisit; in ejus igitur Figuræ Explicatione cum Auctor (quantum ex Lipsiensibus, ex quibus te ista hausisse, profitearis, Actis Eruditorum cognosco) ita scripisset: C. *Ductus novus e reti proveniens, supraque D. D. D. nervum opticum flexus*; tu sic describis: „C. Ductus novus e reti proveniens. DDD. „Nervus Opticus flexus: „& deinde cum ille sic: *a. Divisio ejus in duos ductus*: tu ita: „a. „Divisio hujusce Ductus in duos ramos; „quæ quidem mutatio nullius, ut primum videtur momenti, paulo post Lectores turbat ad litteram H. ubi cum ex mutatione scribi debuisset „Ramus „alter; „cum Auctore scribitur *Ductus alter*, quasi vero non de illo altero ramo, sed de novo quopiam Ductu ageretur. Pariter in Figuræ 7.

Explicatione cum Auctor Ductus oculorum abducentes scribat C. *Rete venosum in situ naturali, una cum aliis D. D. D. vasis venosis efformare*; quis hoc ultimum apud te intelligat, ista ipsa verba sic rescribentem: „C. Rete venosum ab „iis (Ductibus abducentibus) efformatum, in „situ. DDD. Vasa alia venosa. „Ad hæc, Explicationis Figuræ 8. titulum omittis, ex quo licet intelligere, Figuram istam, non in vitulino, ut duæ priores, sed in canino capite res exhibere: omittis pariter explicationem litteræ d. *vas Nuckianum* designantis: postremo scribis: „OO. Duo Ductus oculorum Abducentes. Q. „Eorum in unum vas coalitio. R. Sinus Venosus ex Vasis venosis SSS. efformatus, in quem „Ductus oculorum Aquosi incidunt; „quali vero omnes Aquosi Ductus de quibus in Explicatione dictum est, ut Adducentes etiam illi b, in eum Sinum inciderent; cum Auctor de Abducentibus OO. dumtaxat, & diserte quidem, hoc docuerit; sic enim ille istam ipsam Explicationis partem scripserat: OO. *Duo ductus oculorum abducentes, qui in Q coaliti, in R sinum venosum, ex SSS. vasis venosis efformatum, incidunt*.

ANIMADVERSIOLXXXII.

Sed satis jam exemplorum adduximus, ut Lectores, quam caute istis uti oporteat Explicationibus, intelligant. Quod si istas ulla ratione immutare decebat; ibi præsertim optassem, ut plura de tuo adderes, ubi Figura 10. dicitur *Humorem vitreum, in cellulas divisum*, vel ut tu rescribis, „in varias quasi cellulas divisum, „ostendere. Hujus enim humoris substantiam nihil esse aliud nisi humorem quendam aqueum, tenuissimis, creberrimisque membranulis, fere ut intra uvarum acinos fieri videmus, interseptum, jam diu ex illius consistentiæ modo, & ex aqua magis, magisque, dum magis, magisque discerpitur, prodeunte conjicimus quidem, ac secundum hanc conjecturam humoris vitrei cellulas & agnoscere, & appellitare consuevimus. Cæterum quod primum affirmavit Riolanus: tunicam Hyaloidem „per substantiam humoris vitrei diffundi, cujus „interjectu concretus apparet, nec fluidus red- „ditur, nisi frequenti sectione solutis filamentis, tum in aquam fluentem liquefit: „& quod magis deinde asseveravit Scriptor alter: humoris vitrei „substantiam integre resultare ex „multis capsulis diaphanis continentibus humorem, rem maxime pellucidum: „& quod denique iste Auctor delineatione confirmat „humorem vitreum in cellulas divisum „ostendens; hæc, inquam, qua via & ratione plane perspicui, & anatomice demonstrari possint, neminem qui doceat, legi, etsi quosdam legisse memini qui ex iis quæ per pressionem, coctionemque in vitreo humore observantur; majus propositæ conjecturæ pondus addant. Interea dum qui istius demonstrationis modum indicent, expectamus, super Tabula etiam proxima CIII. unum, vel alterum monebimus. De *Ciliaribus Nervis* qui in 9. aliisque Figuris exhibentur, dicunturque „luculenter in „conspectum venire, postquam Arteriolæ Tunicae Choroideæ materia ceracea rubicunda sunt „repletæ; „permirum est addi: „hoc enim „neglecto, ut plurimum tantam habent convenientiam cum dictis Arteriis, ut in defunctis, in quibus raro oppletæ, facile ab aliis „sint neglecti. „Certe ego non modo memini, in eo quem primum ferme adhuc puer dissectui, oculo nervos istos luculenter vidisse, & mea manu delineasse, ut de quibus nihil ante legissem, vel audivissem; verum etiam paulo post ex Actis Eruditorum cognovisse a Moulino in quadrupedibus, & avibus *ligamentorum* nomine jam descriptos, & delineatos. Denique lectis Solertissimi Viri Pauli Manfredii Observationibus, comperi, ab hoc Romæ octo annis ante Moulinum in ipso humano oculo nomine *Filamentorum*, quæ *veluti nervea*

380.

De Vitrei humoris substantia, & structura.

Anthropogr. l. 4. c. 4.

382

A. 1684. M. Dec.

A. 1702.
M. Febr.

nervea esse, dicit, pictos, descriptosque esse: quos, atque alios Anatomicos qui de his scripserunt, cum Viri Eruditissimi Actorum eorundem Scriptores in alio etiam Volumine diserte memoraverint, atque adeo cum tu quoque, Vir Ornatissime, in Bibliotheca Anatomica eas Manfredii Observationes exhibueris; mirari satis non possum, cur ista nunc verba sine ulla hæsitatio-
ne edas: eosdem nervos; quos præterea Willisium quoque, & Vieussenium indicavisse, ex superiore LXXVI. Animadversione colligitur; eosdem, inquam, *facile ab aliis fuisse neglectos*. Quod reliquum est, in Figura 22. ejusque Explicatione quid desiderem, ex mea Palpebrarum Figura, & iis quæ de lacrymali caruncula sæpius dixi, intelligi potest.

383.

ANIMADVERSIO LXXXIII.

Quo plura in superioribus Capitibus notata sunt, eo pauciora cogor in reliquis notare.

Itaque etsi in adjectis quinto Capiti quatuor Tabulas errata plurima irreplere; nonnulla dumtaxat indicabo, si prius tamen ad Cl. Valsalvæ *Tractatum* unam, vel alteram earum rerum adscripsero quas ante hos tredecim annos in Academia Bononiensi, cum de eodem verba facerem, animadverti. Et primum Venarum Occipitalium descriptione, & delineatione non Historiam modo Anatomicam instaurari, atque augeri, verum Medicam etiam Facultatem juvari, atque illustrari, non dubito. Ut enim ex Venæ hinc in occipite chirurgicis instrumentis expositæ sunt, inde vero intra cranium cum laterali utroque Sinu communicant; ita opportunitatem præbent, ut ipsas incidendo, atque ideo sanguinem quem in Sinus convectorum essent, avertendo, reliqui sanguinis, per eosdem Sinus fluentis, copiam quidem nonnihil minuere, motum vero augere pro re nata immediate possimus. Quæ duo ut in multis Cerebri Affectionibus sunt admodum necessaria; ita illud per admotas cucurbitulas, & crebras, altasque incisiones eo tertius præstatur, quod earum venarum truncos & profunde semper locatos, & nonnumquam, ut eorum per cranium meatus, in plures, atque ideo minores divisos invenimus. Et his quidem rebus ita per anatomen illustratis, cum proclive nobis fuit isto ipso præsidii genere magnam opem ferre laboranti olim contumaci quadam, ac perditissimi *soporosa* affectione M. Antonio Cicognino Medicorum qui eo tempore per Æmiliam omnem florebat, ætate, auctoritate, rerum usu facile principi, & Præstantissimi Viri Jacobi Cicognini, qui nunc in Taurinensi Aula Consiliarii, & Medici partes summa fide, eruditione, ac doctrina tuetur, Parenti; tum multo facilius erit omnibus intelligere, qua ratione Zacutus Lusitanus, desperatam apoplexiam cucurbitula bis in occipite *profunde* scarificata curare, potuerit.

ANIMADVERSIO LXXXIV.

Porro quod Experientissimus Valsalva asserit, se nullam ferme vidisse in Apoplecticis Affectionibus alterius medietatis Corporis resolutionem, neminem, cujus causam, secto Cadavere, in opposita Cerebri parte non invenerit; id mihi etiam in iis quas Bononiæ, & Venetiis habui, ejusmodi cadaverum dissectionibus semper, constanterque perspectum est. Sed quoniam accidit, ut istiusmodi resolutio an sit, atque utro in latere sit, perspicere aliquando non possit, vel quod ægros in morbi initio, aut certo alio tempore quo hemiplectici apparuerint, non viderimus, vel quod jam mortuos, & ab nemine observatos inveniamus; animadverti, qua ratione aut Medicus, aut Anatomicus illud suspicari, & conjicere tamen possit, videlicet si hoc saltem, an in latere, & utrum in latere in ipso cadendi actu Apoplecticus procubuerit, vel ja-

cens repertus sit, diligenter attendat. Id enim latere fuisse potissimum resolutum, verisimile est, ideoque in opposita cerebri parte præcipuum vitium esse inveniendum: quod & de Virgine illa Epileptica censuissem, quam, ut Willisius tradidit, quovis paroxysmo in terram allisam, ob-
servabant domestici semper in idem latere præcipitari. Cæpi autem animo non mediocrem voluptatem, cum meam istam suspicionem, ejusque rationem aliquot post annis confirmatam vidi observatione luculenta quam Vir Summus, & cum de tota Re Medica, tum de me ipso, si quis alius, egregie meritis Joannes M. Lancisius doctissime, ut solet, exposuit in tertia Librorum suorum de Subitaneis Mortibus editione. In Auriga enim qui, repente de sella immoti cur-
rus dextrorsum ceciderat, tum dexterum cerebri hemisphærium citra sensibilem defectum, finistrum vero cum vasorum plenitudine, festumque, subobscurum refertum colore deprehensum esse, docuit, tum censuit, causam ruinæ, adeo præcipitis dextrorsum, in homine isto, subitam extitisse cruoris moram in sinistro cerebri hemisphærio, ubi vasa turgida inventa sunt. Debilitata enim dextra corporis medietate, in quam communi, firmiorque Anatomicorum opinione distribui creduntur nervi, qui a sinistro cortice profisciscuntur, minimo negotio deficere eo in latere æquilibras trunci, & versus illud casus totius corporis contingere potuit. Hæc Vir Eximius. Cæterum ea quæ diximus omnia de illis resolutionibus accipienda sunt, quarum causa, ut Cl. ipse Valsalva monet, sensibilis est, & in organica læsione consistit. Sæpe enim accidit, ut vel nihil, vel ferme nihil quod morbosum sit, vel feri dumtaxat copiam intra cranium inveniamus, quod quidem serum non esse morbi causam, sed hanc potius consequi, verisimile est; quanquam aliquando vel quod acre sit, vel quod repente effundatur, ipsa esse causa possit; nam si contra, eo paulatim destillet in iis præsertim quorum inter cranium, & cerebrum plus spatii intercedat, non parem afferre noxam premendo, ex eo potissimum conjeci quod in grandævæ mulieris cranio etsi os frontis, & processus uterque petrosus, albidioris, atque adeo novæ ossæ substantiæ accessione, & quasi effusione multum, atque inæqualiter introrsum protuberabant, ac cerebrum comprimebant; quoniam tamen ea compressio paulatim facta, & aucta fuerat, nullo quidem illa cerebri vitio de quo nunquam conquesta erat, sed mucronis cordis ruptura, & immani sanguinis intra pericardium incredibilem in modum distentum profusione, veluti cum Cl. Santorino, aliisque Amicis Venetis Doctissimis observavimus, repente obiit. Sed in Hemiplecticis sive nihil, sive serum dumtaxat in utraque parte cerebri inveniatur; ex eo tamen quod in sensibili, & organica eorum cerebri læsione observamus, tunc quoque licet profecto arguere qua in parte cerebri vitium lateat, præsertim cum propositum a Solertissimo Auctore Experimentum satis ostendat, quam facile maxima, quamvis insensibilis, noxa ipsi cerebro afferri queat. Nervi enim Cordis ad jugulum Canis filo arcte contracti, & illico soluti, adeo in structura insensibili labefactantur, ut Canis intra aliquot dies, eodem modo, ac si Nervi illi amputati essent, inde moriatur; licet iidem rursus inspecti, in se nullum sensibilis læsionis vestigium ostendant. Quod quidem Experimentum cum olim considerarem, inde etiam intelligi posse, vidi, quam facile universalis resolutio ex universali videlicet Duræ Meningis convulsione, & quam facile item particularis induci possit ex consimili nimirum, sed particulari causa, ut puta ex nervis, membraneisve filamentis quæ distincta unum aliquem nervum arcte circumprimant; qua potissimum ratione eas resolutiones explicandas esse puto quæ convulsivos, quos vocant, Affectus consequuntur, easque nominatim quæ post gravissimi-

De Morb.
Convuls.
cap. 3.

l. 1. c. 11.
n. 6. 7. 8.

407
De varia
a sero in-
tra cra-
nium
effuso no-
xa.

De Reso-
lutionum
quarun-
dam cau-
sa.

387
402
A cogni-
tione Ve-
narum Oc-
cipitalium
in rem
medicam
utilitas.

De Me-
dic. Prin-
cip. Hist.
l. 1. Hist.
33.

406.
De He-
miplexiæ
causa, &
diagnosi.

vissimos intestini Coli cruciatus interdum contingunt. Sed de his quidem hactenus.

ANIMADVERSIOLXXXV.

Quod reliquum est; ut consilium satis laudari non potest tuum, quod ad Auris Anatomiam, in qua notum est, quantum, & quanto cum Lectorum detrimento Verheyenius peccaverit, exponendam, perspicuo isto, elaboratoque Cl. Valsalvæ *Tractatu* usus sis; ita in eo tua diligentia ab iisdem Lectoribus requiretur, quibus neque omnia quæ Valsalva, neque ita ut Valsalva, exhibuisti. Primum namque ex decem illius Tabulis omisisti duas. V. videlicet, ac IX. quarum prima ad conspiciendum, quomodo se Pharynx ab anteriore parte habeat, & Uvulæ continuetur (quod recte in tuo Theatro ostenditur nusquam) & quæ præterea Auctor vel de illius primo, ultimoque orificio, vel de hujus secundi Musculorum Paris sine, & tertii origine proponit, necessaria est; altera autem Tabula ut magis ad Aurem pertinet (nam quomodo & superior eodem pertineat, satis ab Auctore ostensum est) ita est magis necessaria cum quia complures simul observationes ante oculos statuit, quibus ea illustrentur, ac confirmentur quæ ille de Canali Semicircularium proportionibus animadvertit, tum vero quia *lineæ* vocabulo quid in toto passim Opere sit accipiendum, præfixo modulo ostendit. Quem quidem modulum Diligentissimus Auctor in Præfatione pollicitus erat. Verum hanc tu, & quidquid præterea Monitorum ante Figurarum Explicationem ipse congesserat, omisisti. In quibus tamen Monitis; ut de cæteris fileam; hoc erat quod Lectorem minime decebat ignorare: curatum esse ab Auctore, ut in quibus Tabulis una tantummodo Auris, aut aliqua unius Auris Pars exhibetur; ea Auris perpetuo dextera sit, & illæ Partes semper ad eandem dextram Aurem pertineant. Denique etsi quæ ejus Tractatum, Figurasque diligenter inspicient, esse plura intelligent quæ in Verneyi, Anatomici alioqui Exercitissimi, Iconismis ab eodem non probentur; levius tamen ferrem quod hos ipsos Valsalvæ Figuris interjecisses, nisi multa Partium vocabula quæ alia Verneyo, atque illi sunt, in Verneyi Explicationibus sine ulla admonitione, atque ideo non sine magna Lectorum perturbatione retinuissem. Sed quando hoc tibi consilium fuit, ut Anatomici utriusque permixtis Figuris, & Explicationibus uteretur; illud saltem optandum erat, ne ex Operarum negligentia major perturbatio Lectorum existeret. Cujus quidem rei; ut pauca ex plurimis, quemadmodum promissimus, exempla afferamus; illa certe non sunt omittenda quæ etsi fortasse prius a Cl. Verneyi Operis, quam a tuis admitta sunt; tamen a te & in Bibliotheca Anatomica, & istic agnoscenda erant, atque emendanda. In Explicatione enim Figuræ 11. Tabulæ CV. non est opus inspicere Figuram 22. ut intelligatur, Fenestram E, *Ovalem* non esse, sed rotundam, quando ex eo quod in eadem Explicatione ad litteram C. prædictum est, per Stapedis (in situ videlicet ostensi) basim *Fenestram Ovalem esse obturatam*, necessario sequitur, istam alteram quæ aperta monstratur, Fenestram *Ovalem* non esse. Pariter cum in Figuræ 21. Explicatione traditur, FF. *Canalem esse ad Apophysim Mastoidem ducentem*; minime necesse est Figuras 11. & 22. consulere, ut dignoscatur, eum Canalem omnino oppositum esse, hoc est *ab Aure ad Palatum tendentem*; nam si, ut in ista ipsa Explicatione continuo subjicitur, HHH. *ejusdem Apophysis (Mastoidis) sinuositates sunt*, consequitur necessario, Canalem ad hunc ducentem esse G. cujus litteræ explicatio omittitur; Meatum autem FF. oppositum omnino esse.

ANIMADVERSIOLXXXVI.

Atque utinam Typographi tantum, non vero etiam Scalptores peccavissent: qui in ista quidem ipsa Tabula CV. quam sæpe, & graviter vel in foliis Officulis, eorumque Musculis erraverint, vide. In Figura enim 18. Mallei manubrium quod ad centrum membranæ tympani finiri oporteret, ad peripheriam ferme producit; Os autem Orbitale dictum cum illic, tum in subjectis plerisque Figuris multa quam Cl. earum Auctor, amplius exhibent. In Figura 19. pro ejusdem Mallei Processu Minimo, Majoris ipsius Processus partem, ut in 30. pro eodem Osse Orbitali Stapedis Caput demonstrant. In 20. abnormem prorsus, ac monstrosam Incudis figuram exhibent: quam etiam in 24. & 25. admodum vitiant. In 23. Musculi Processus Majoris Mallei tendinem quantum amplificaverint, nemo credet, nisi qui aut cum vero, aut cum Solertissimi Valsalvæ archetypo comparaverit. Multa alia quæ in una ista Tabula sunt, errata consulo præterimus; nam si quæ vel in eadem, vel in tres alias Tabulas, earumque Explicationes vitia irrepsere, ea notare omnia vellemus; finis profecto nunquam fieret. Attamen Lectorum, imo Auctorum ipsorum causa quædam alia non sunt omittenda. Qui enim in Explicatione Figuræ 29. ejusdem Tabulæ CV. hæc legerint: Cæterum qui Officulorum omnium naturalem magnitudinem videre cupit; is Figuras 25. 26. & 27. Tabulæ 107. adeat; qui, inquam, hæc, aut illa alia in Figuræ 8. Tabulæ CVII. Explicatione legerint: in modo memorata Figura 27. Semicirculares Canales ad naturalem magnitudinem esse expressos; cum in illa ipsa Figura 27. neque hos Canales, neque ea Officula ostendi viderint, ne ab Auctore earum Explicationum deceptos se credant, certiores fieri, æquum est, Cl. Valsalvam neutra in Explicatione ulla sigillatim Figuras, sed *Tabulam* suam X. nominasse, incujus videlicet duabus prioribus Figuris; non vero in 3. quæ nimirum illa est 27., id sane præstat quod utroque in loco promittitur. Pariter si quis legerit in Explicatione Figuræ 2. Tab. CVII. *Capitatem duorum sequentium Sinuum* (hoc est Sella Equinæ adjacentium) *simili figura delineatam* promitti, ac Sinus Lateralis, idest non undequaque equaliter curva, sed qua parte Cerebrum respicit, compressa, & quasi complanata; idemque illam non ita compressam, sed undequaque equaliter curvam in respondente Iconismo deprehenderit; eum admoneri, par est, non Scalptores Cl. Valsalvæ, sed tuos in ea parte peccavisse.

ANIMADVERSIOLXXXVII.

Atque ut paucis multa complectar; si quis denique aut in proxima Figuræ 3. Explicatione hæreat, ut hæreat quidem necesse est ob ea quæ ad 2. d. e. sunt vel confusa, vel omissa; aut in Figura 5. Mallei, & Incudis delineationem jure arguat, aut in Figuris 6. 8. 10. veram Canalis Majoris Semicircularis ad Orificium Proprium figuram, aut rursus in 10. Canalis Minimi Angustius Orificium requirat, vel in 11. & 13. ex lineis indicantibus haud omnia satis intelligat, vel in 14. ad litt. d. non quinque, ut Explicatio docet, sed innumeros Sirculos videat; in his omnibus, atque adeo aliis quæ prætereo, Cl. Valsalvæ librum consulat; nihil esse eorum ab hoc admissum, intelliget. Sed ne forte credar hujus tantum gratia cui plurimum alioqui debeo, me laborare; si quis item est qui in Præstantissimi Verneyi Iconismis aut 18. Annulum D. osseum, aut 20. Canales, & Foramen G. aut 21. & 22. Annuli *sulcum* non discernat; is ex 24. cujus Operæ reprehendendæ sint, conjiciat. Cum enim idem Iconismus, ut cæteri, in Bibliotheca Anatomica exhibeatur; ibi quidem Portio-

Tab. 70.
F. 11. 17.

416.

418

418.

419

424.

423.

425.

426
Tab. 73.
F. 7.

nis Duræ Nervi Auditorii superior Ramus D. est cum reliquis ejusdem Portionis Ramis, ut par est, conjunctus ad A; istic autem disjunctus: & ibi vicissim a Crasso Ramo BB. Ramus E. Quinti Paris est recte disjunctus; istic vero cum eodem conjunctus. Verum; ut omnia omittantur; quis credat, in ea saltem Auris Figura quæ & omnium utilissima est, & quæ Præcl. Valsalvæ longissimo, & incredibili labore est accuratissime perfecta, in ea, inquam, Auris Figura describenda majorem aliquanto diligentiam non esse adhibitam? Attamen vel in ipsa quæ istic 25. est, Musculus deest c, & in Vestibuli fornice 4. pro duobus tantummodo ex iis Foraminibus quæ Explicatio indicat, tria exhibentur, extremæque non modo Incudis, verum etiam Mallei parti suum, si Diis placet, Orbiculare Ossiculum adjectum est.

A N I M A D V E R S I O LXXXVIII.

JAm vero ut in VI. etiam Capite, quod de Naso est, perpauca notemus; illud quidem est verum, in superioribus Libris, & Capitibus multa habita esse quæ ad ipsum pertineant; num vero tot, eaque ratione habita sint, ut Lectoribus inde liceat plenam absolutamque certarum quas istic enumeras, hujus Organi Partium descriptionem repetere; vel ex iis quæ ad singula ea loca attigimus, satis esse perspicuum potest. Accedit quod si eorum Capitem ad quæ istic remittis, quædam inspiciantur, ea quoque diserte admonent quænam istic desiderentur. Exempli enim causa, „ Dis-
sertatio de Ductibus Lacrymalibus, Capite de
„ Oculi Exterioribus inserta, „ dum hæc habet:
„ in regione utriusque cavitatis (narium) seu
„ dexteræ, & sinistræ elevari, & trajici quatuor
„ protuberantias majores, aliasque lateraliter mi-
„ nores, „ has autem minores ibi omitti, ut ad
illud institutum non pertinentes; Lectores certe monet, easdem in hoc demum Capite inter nasi interiora esse describendas; tu autem, quasi nullæ, aut Anatomicis ignotæ essent, ne memoras quidem. Sunt tamen alia quædam in ea Disserta-
„ tione descripta, velut glandulæ (nasalis) mem-
„ branæ, aggerrimæ, & speciales, papillis odoris
„ intertextæ: „ quibus quidem „ papillis nume-
„ rosioribus nerveis obsita esse dicitur illa mem-
„ brana ad nasi sublimiores regiones, quam sit ad
„ imas ejusdem cavitatis partes: „ quæ tu omnia
in tuam istam descriptionem transfers, confirmasque, illam membranam „ papillis nerveis, con-
„ fertissimisque glandulis esse dotatam. „ Haud
„ equidem nego istas glandulas, istasque papillas;
neque ignoro, quot, & qui Anatomici easdem proposuerint, atque etiam ostenderint; illud tantum miror, eadem ratione a multis, atque adeo a vobis describi, qua prorsus, ultroque conspicuas glandulas, papillasque alias, ex. gr. quæ linguæ superficiem occupant, describeretis; quando ex plurimis inspectionibus exploratum compertumque habeo, neutras in narium membrana passim ita obvias, & manifestas occurrere, ut plerique ex vestra descriptione existimabunt. Contra autem, plurimum, ut par est, laudo Eximium Virum Fredericum Ruyschium, qui dum glandulas easdem monstrat, diserte admonet, ipsas „ in homi-
„ ne vivo, ut & jam jam denato, visum fugere,
„ in illo autem objecto luculenter conspici arte
„ sua. „ Neque tamen hæc quæ dico, ita accipi, velim, quasi negarem, narium membranam, ex obliquo præsertim aspectam, perexiguas, confertissimisque quasi tuberculis interdum obsitam apparere, aut foraminula excretoria ostendere ad posticos præsertim nasi fines, itemque prope, & supra pilos quibus narium aditus instructi sunt; imo addo, peculiare quædam, ut ego judico, glandulosas, & plerunque admodum insignes congeries certis ejusdem membranæ locis inhærere, quæ ab nemine adhuc, quod sciam, observatæ sunt. In octo enim cadaveribus continenter dissectis ad

utrumque Septi latus, loco inter summam, infimamque cavearum nasi regionem ferme intermedio, sed multo anticis, quam posticis nasi limitibus propiore, membrana secundum earum cavearum tum altitudinem, tum longitudinem binis sectionibus incisa, peculiarem, & valde notabilem hujus crassitudinem ibidem inveni, basi narium parallelam, ea secundum nasi altitudinem latitudine circumscriptam, ut auricularis digiti latitudinem, interdum & multo majorem, prope æquaret; longitudine admodum ampliore; sed quo magis ad extrema, & posterius præsertim, accedebat, eo magis contractam, & extenuatam. Vidi autem, crassitudinem hanc deberi densæ compactæque substantiæ ex albo rubescenti, quam ego glandulosam esse, judicavi. Sed utcumque hoc est; illud certe peculiare, & ferme horizontale corpus utrinque Septo narium appositum erat. Et vii quidem pluries in certis quibusdam aliis narium locis, & nominatim ad imam *Turbinatorum* Ossium oram peculiare, ex ejusdemmodi substantia, tunicæ narium crassitudines; sed in eo in quo descripsi, loco tum potissimum, tum in iis omnibus de quibus dictum est, cadaveribus vidi.

A N I M A D V E R S I O LXXXIX.

Porro in tua ista Nasi descriptione neque unde Vasa sanguifera ad ipsum veniant, aut quo redeant, neque ullos alios præter eos qui a Primo Pari exeunt, Nervos indicari, video, cum tamen illud in hæmorrhagiis scire deceat, Nervos autem a Pari quinto huc pertinentes sive in sternutatione explicanda plerique, sive in Olfactus facultate exponenda nonnulli potissimum attendant: quorum opinioni; de qua hic non judico; illud favet quod nonnulla brutorum genera cum primo quod Olfactorium dicimus, careant Nervorum Pari, olfaciendi tamen organo, & facultate non careant. Et si vero recte admodum ad Nares pertinere, do-
„ ces, „ etiam Ductus e cavitatibus Frontalibus,
„ Sphænoïdibus & Maxillaribus in nasi cavum pro-
„ ductos, „ sive, ut infra ais, „ canales e ca-
„ vitatibus frontalibus, ethmoidæis, ac maxilla-
„ ribus productos; „ mirari tamen subit non il-
lud tantum cur altero in loco ethmoidæas, in altero autem sphænoïdæas prætermittas; sed hoc etiam quod vias per quas istæ omnes cavæ cum naso communicant, ceu *Ductus*, & *Canales* proponas; quando constat, plerasque omnes per foramina communicare. Quod tamen Lectores non addiscent ex ea quam subjicis, Verheyenii descriptione, multoque etiam minus quibus in locis singula sint ea Foramina disposita; sunt autem ita disposita, ut sive caput servemus erectum, sive antrorsum, sive retrorsum, sive in alterutrum latus inclinemus, denique in quocunque capitis situ, ex aliqua semper earum cavearum ad humectandas nares effluere humorem, necesse sit: quod Cl. quoque Boerhaavius videtur indicare. Nec inde addiscent id quod Diligentissimus Gagliardus monuit, Frontales caveas „ non inter utrumque
„ (offis) Parietem, seu Antiquorum Laminam,
„ & per consequens in Meditullio, ut usque ad
„ huc quamplurimi opinati sunt, sed inter lamel-
„ las Parietis cerebrum respicientis, vel (quod
„ rarius) externi Tabulati sitas esse; „ cum Verheyenius eas describat *inter duplicaturam ejusdem Offis*, hoc est, ut alibi explicat, *inter utramque tabulam Offis frontis*: quo in loco id quoque addit quod his temporibus multo minus ferendum est: *corpus quoddam molliusculum ac medullosum* in iisdem caveis contineri. Neque item scient, Sphænoïdæas haud raro geminas non esse, sed unam, atque adeo ipsas maximas omnium Maxillares, quamvis multo rarius, interdum tamen prorsus deesse. Hæc autem ideo notare volui, quia cum de his Caveis, sive Sinibus Pituïtariis „ je-
„ junas esse admodum, ajas, Anatomicorum de-
„ scriptiones, solumque Cl. Philippum Verheyen
„ se

De Sinibus Pituïtariis.

428.

362
De Glandulis, & Papillis Membranae Nasi.Thes.
Anat. VI.

Nova quædam ejus Corpora Glandulosa.

Inst. Med.
n. 497.
Theatr.
Tom. I.
73l. r. tr. 5.
cap. 4.

429

se nobis offerre qui in hoc argumento non me-
,, diocrem adhibuerit diligentiam; ,, monendos
de iis esse Lectores, censui, quæ in ipsius descri-
ptione desiderantur. Quibus illud quoque addi po-
test (ut nihil de iis dicamus, qui non latine
scripsere) non ita denique *jejunam* istorum Si-
num descriptionem Præstantissimum Vieussenium
olim dedisse, ut cum iis conjuncta quæ a nobis
de eorundem varietatibus addita fuerant eo tem-
pore quo Verheyenius nullos nisi Frontales, co-
gnosceri videbatur; isti esset quæ ab hoc postea
conscripta est, quod quidem ad anatomicam histo-
riam attinet, magnopere posthabenda.

ANIMADVERSIO XC.

Anim. 31.
De Steno-
nis Transi-
tu a navi-
bus in pa-
latum.

429.

I. I. tr. 4.
cap. 16.

Thef.
Anat. VI.

361

430.

Vide Ve-
rheyen.
Tab. 31.
c. 18.

Cæterum ubi Verheyenius allato isto de quo
supra aliquid monuimus, Stenonis loco in
quo Summus hic Anatomicus describens, a Na-
,, ribus in palatum qui patet, transitum brevem
,, admodum, nec canalis, sed foraminis nomine
,, dignandum; in homine ad vomeris latera pro-
,, xime indicat foramen rotundum, quod licet
,, superiori ambitu sit satis amplum, mox tamen
,, arctatur adeo, ut ne setæ quidem transitum in
,, palatum concedat; ,, ubi, inquam, Verheyenius
hisce allatis verbis subjicit: *Hæc ille: ego autem
inveni ordinarie exitum istius transitus in palato satis
manifestum*; Stenonis sententiam minime videtur
assecutus. Neque enim Steno de exsiccatis, pur-
gatisque capitibus in quibus hæc Verheyenius
quæsit, ut ejus, a te omissa, verba quibus ad
XXX. suam Tabulam remittit, satis ostendunt, sed
de recentibus, integrisque adhuc locutus est. In
his autem nasi membranam invenimus superius
illud utrumque foramen subeuntem, & se utrini-
que in tubulum conformantem, non ita profe-
cto ut omnes quas adhuc legi, descriptiones in-
dicant, brevem; est enim os trajiciendum eo in
loco crassum, neque ad perpendiculum, sed oblique
a posterioribus ad anteriora trajici solet, ut tota
hæc via tantum ferme longa sit, quantum au-
ricularis digiti apex est latus. Etsi autem uter-
que tubulus primum latior est, via tamen infima
ita denique contrahitur, ut qua descendens ab naso
humor per palati membranam transmittatur, non
nisi obscure admodum, incerteque ut plurimum
viderim. Augetque etiam, ut opinor, hanc diffi-
cultatem alia in aliis rerum dispositio; nam certe in
nonnullis tubulos vidi media emensa via in unum
confluentes; & diserte Solertissimus Ruyschius
,, monuit: ,, non semper geminam reperiri aper-
,, turam, in oris cavum hiantem, aliquando enim
,, singularem occurrere, in aliis quoque vix visibi-
,, les esse: ,, quod supra attendisse non videtur
Auctor Dissertationis de Ductibus Lacrymalibus
Novis, minime alioqui ut de re obvia, & perpe-
tua sine ulla hæsitazione scripturus: illos tubulos
,, ad partem anteriorem palati, prope primos an-
,, teriores dentes duobus osculis suis aperiri. ,,
Postremo quam Verheyenius, postquam de boum
morbo a vermibus in cavitate ossis frontis nidulan-
tibus verba fecit, suspicionem adjicit: Quis scit,
,, inquit, homines nunquam laborare vertigine
,, aut convulsione ex vermibus in hac illave ossium
,, cavitate detentis; ,, eam suspicionem satis con-
firmat historia admirandæ curationis in Agricola
quodam ab Nobilissimo Medico Cæsare Magato in-
stitutæ, quam quia idem qui nobis narravit, Vir
Cel. & hoc tanto Avunculo M. dignissimus An-
tonius Vallisnerius in altero, quem ea qua solet,
Observationum copia solerter, ac diligenter in-
struit, de *Extraordinariis Humani Corporis Vermi-
bus Tractatu* per se ipse est editurus, idcirco hic
satis fuerit indicasse. De Figuris autem quas
huic Capiti apposuisti, hoc unum dicam: si a
Verheyenio aut delineationem Nasi Cartilaginum,
quas non tantum numero, sed etiam magnitudine,
& figura multo aliter pinxit ac Cl. Ruyschius,
aut alias interioris Nasi lateribus quæ a te nus-
quam ostenduntur, demonstrandis aptas nequaquam

sumere volebas; at eas saltem sumi decuisse quæ
ad monstrandas Ethmoidæas, Sphenoidæas, & Ma-
xillares Caveas pertinent, præsertim cum tu has
nulla alia in Tabula exhibeas, ipse autem in sua
qua usus es, earum descriptione ad illas Figuras
interjectis litteris, quas tu omnes omisisti, Le-
ctores passim remiserit.

ANIMADVERSIO XCI.

IN proximo autem Capite quod de Lingua in-
scriptum est, hæc, Vir Cl. ex te quæro. Pri-
mum, cur sine ulla dubitatione statuas, nervos,
Linguae papillis, & quod consequitur, gustando
inservientes, a quinta; illius autem musculis,
seu movendo destinatos, ab octava, seu, ut aliis
placet, a nona nervorum cerebri conjugatione de-
rivari. Ne enim quidquam dicam de conjectura
Doctissimi Boerhaavii indicantis, ,, credibile es-
se, papillas, tam numerosas, oriri a nono pari
,, uni linguae dato, perque eam distributo; quinti
,, vero paris ramum ejus musculosis inservire mo-
,, tibus, ut & alibi facit; ,, quæ quidem conje-
ctura ex iis quæ in humanis Olfactus, Visus,
Auditusque Organis observantur, quadantenus
confirmari posset: certe Solertissimus Vieussenius
diserte docuit: esse ex noni Paris fibris, quæ
,, propaginum nervorum quinti Paris fibrillis qui-
,, busdam intersertæ, in papillulis supernam lin-
,, guæ partem occupantibus terminentur, & ex
,, his plane intelligi, quod nonæ, quemadmo-
,, dum & quintæ conjugationes nervi, qui linguae
,, textum percurrunt, non solum illius motui perfi-
,, ciendo, sed & gustui excitando inserviant. ,,
Deinde scire velim, quosnam Ductus innuas, cum
sub lingua canales describis utrinque duos. Ma-
xillarium enim internarum glandularum ductus,
ut prima descriptionis pars indicat, credere non
possum tum quia hi singuli in singulis sunt late-
ribus, non utrinque duo, tum quia postrema pars
descriptionis eisdem non convenit; Sublingualium
autem tubulos, ut hæc ipsa descriptionis pars vi-
detur indicare, sive solos, sive cum prioribus con-
junctos, eo minus crediderim, quo mihi magis
constat, eos quidem duobus plures solere utrin-
que inveniri: qua de re infra in loco dicemus,
quemadmodum & de Musculorum Pari Chondro-
glossio; nam de Myloglossio, Basiloglossio, Genio-
glossio, a te hic iterum descriptis, quid sentia-
mus, alibi diximus. Illud quoque minus intelli-
go, cum doceas: ,, Structuram linguae - totam
,, muscularem esse, ex innumeris musculorum se-
,, riebus; ,, minus, inquam, intelligo, qua ratio-
ne perpaucis versiculis interjectis, ,, Linguae to-
,, tam Structuram ex Membranis, Glandulis, Cor-
,, poribus quibusdam, seu Sacculis Vesicularibus,
,, Tractibus Musculosis, ac Adipe ipsis interjecta
,, confici, affirmes; quandoquidem non omnia
hæc inter Musculi partes recensuisti. Atque ut
Linguae Descriptione omissa, ad ejus Iconismos
qui in Tabula CIX. exhibentur, horumque Ex-
plicationes veniamus, mirum omnibus videbitur,
si in ea ipsa quam ex me affers, Explicatione sci-
scitabor quem locum intelligas, ubi ad litteram
b. hæc habes: ,, Altera ex ejus (Cartilaginis
,, Scutiformis) Prominentiis, de quibus vid. suo
,, loco; ,, nusquam enim memini de iis Promi-
nentiis in tuo Theatro verba fieri. Verum omnes
mirari desinent, ubi cognoverint, istam Explica-
tionem ita ex meis Adversariis I. descriptam esse,
ut tamen alia addita, alia dempta, alia quoque
mutata sint, velut istic. Ego enim scripseram de
quibus num. 8.: quem tu Adversariorum locum, no-
strasque alias descriptiones, quotquot ad Figuram,
& Explicationem istam pertinent, omnes; quod
& ad plerasque alias nostrarum feceras; omisisti.
Neque tamen ad earum ullam omisisti Animad-
versionem: quam quidem & huic apponis.

432.

Inst. Med.
n. 486.

Nevr.ogr.
l. 3. c. 6.

Adver. II.
Anim. 13.

432.

Tom. I.
15. & seq.

436

ANIMADVERSI O XCII.

Qua de Animadversione ultima, quemadmodum de superioribus cunctis feci, ut quid sentiam, pro veri studio, exponam; a Cl. ejus Auctore in me congestas neque omnes laudes agnosco, neque ulla reprehensiones, te ipso iudice, pertimesco. Laudat me *præcipue*, quod genuinam Coracohyoidæi Musculi originem *ab errantibus aliorum omnium descriptionibus vindicaverim*. At quomodo hanc ego laudem agnoscam qui diserte passus sim, Galenum, Vesalium, Valverdum, Fuchsium, Riolanum eandem quam ego, ejus musculi originem descripsisse. Satis certe mihi est, ex meis me observationibus didicisse, aliisque ostendisse, ea in re non plerorumque, sed pauciorum Anatomicorum doctrinam esse veriorum, hancque, ut minus impotenter homines deciperentur, perspicuo iconismo primum omnium illustravisse. Deinde me laudat ob, Appendicem glandulæ Thyroideæ castigatissime delineatam; quam certe, te, inquit, non solum in subjectis omnibus, dissectis semper extantem, sed & in eadem forma, ac ab accuratissimo Authore describitur, dispositam invenimus. Quo in loco etsi verum ab ipso dici, facile credo; non minus tamen credo, si in tot, atque ego, cadaveribus quævisset, in nonnullis non fuisse inventurum; nam & Bononiæ olim haud semel antequam eam Appendicem primus describerem, & hic pariter in duabus mulieribus diligenter confectis, nullam comperi. Eandemque ob causam accidisse, non dubito, ut *quatuor* in nostra ista Figura, speculiosiore quandam animadversionem exigere, existimaverit. Primum est Ligamentum Epiglottidis Medium, a nobis videlicet restitutum; quod ipse non probat, usque ad ejusdem epiglottidis summitatem productum exhiberi; dum illud, inquit, revera lata illa, depictaque expansione usque ad hanc summitatem non producit; quinimo excusationem quandam suam nobis subjicit, quam tamen fateor, me haud satis posse intelligere, si videlicet hoc asseveremus ideo factum, ut nempe inspicientium menti actio ligamenti hujusmodi insculpat. Nos vero hæc duo asseveramus. Alterum, non ita lata expansione, ut a Scalptore tuo, istud a nobis ligamentum depictum esse; idque omnes qui archetypum nostrum cum tua ista Tabula conferrent, continuo esse intellecturos. Alterum qua latitudine illud pinximus, eadem ad summam usque epiglottidem pertingens in pluribus cadaveribus plerisque ex nostris Auditoribus, & præterea aliquando etiam Doctissimo Professore Joanni Poleno ostendisse. Itaque etsi minime diffitemur, in plurimis cadaveribus, nisi, ut par est, explicetur, in multis quoque, etiam si explicetur, ea latitudine, atque altitudine non esse; quapropter in descriptione consulto, non ad summam usque epiglottidem (hoc enim semper verum non esset) sed *alte ad epiglottidis dorsum assurgere* diximus; non tamen censuimus, ob eas videlicet quas alias attigimus, causas, ex iis corporibus in quibus minus vel est, vel apparet, esse nobis delineandum: quod quidem neque censuit is quem in alia Animadversione *fidelissimum, ac solertissimum* appellat, Verheyenius, cum & satis magna, si proportionem spectes, latitudine, & ad summam epiglottidem assurgens depinxit. Si cum iusto igitur cadaverum numero Figuram nostram contulisset; haud certe sine ulla hæsitazione scripsisset: hoc ligamentum, revera lata illa, depictaque expansione usque ad epiglottidis summitatem non produci.

ANIMADVERSI O XCIII.

Multo autem minus, secundo loco, de eo Linguae Foramine a me primum invento, ac delineato, quod, si non in majore, certe in

dimidia parte eorum quæ secui, cadaverum conspicuum fuisse, docui; multo, inquam, minus de eo scripsisset: Hoc certe & in subjectis omnibus occurrit mihi; ejusdemque ideo uni, versatiliorem assidentiam supra Authoris sensum, stabilio. Quot enim, quæso, fuisse demum, putas, *subjecta ista omnia* in quibus id Foramen vidisse se, dicit? Sed fac tamen, non fuisse omnino perpauca. Quid tum postea? Hic vicissim ante hos duos annos contigit, ut de quinque cadaveribus, magno inspectante Auditorum numero in Nosocomio continenter sectis, ne unius quidem lingua Foramen ostenderet; idem quoque anno eodem contigit in tribus prioribus cadaveribus quibus in Theatro usi sumus; quo in loco etiam superiore anno cum duas linguas ostenderemus, in utraque Foramen defuit. Siquis igitur decem horum cadaverum inspectione contentus, in hunc vicissim modum scripsisset: Hoc certe foramen in subjectis nullis occurrit mihi; ejusdemque ideo assidentiam contra Authoris sensum nullam stabilio; utrum horum rectius fecisse, existimaremus? Aequi certe Judices neutrum omnino probare possent. Postquam enim ego cum universæ præfatus eram, me in *cadaverum longa serie* meas observationes habuisse; tum speciatim monueram, id Foramen si non in majore, certe in dimidia parte eorum quæ secui, cadaverum conspicuum fuisse; haud sane decebat, unumquemque propter aliquot inspectas linguas continuo ad ista live supra, live contra meum sensum stabilienda decurrere. Quid enim; si ego in multo etiam pluribus linguis alterutrum observaverim, & neutrum tamen statuerim propterea quia in totidem ferme linguis etiam contrarium deprehenderim? Et certe in commentariis nostris cum linguarum propter hoc Foramen inspectarum Observationes omnino habeamus quinquaginta; harum quidem sex & viginti, Foramen fuisse; quatuor autem & viginti, defuisse, testantur. Quamobrem nisi tu, Vir Cl., aut Animadversionis Auctor multo longiorem, & ab hac discrepantem Observationum seriem habeatis; haud sane video, cur aut ille id stabilire potuerit, aut tu supra in tua Linguae descriptione Lectores monere ut de eo Foramine Figuram nostram videant una cum additis super eadem Animadversionibus; in Caputem autem Indice etiam docere, hoc Foramen ut plurimum inveniri. Verum multo etiam magis ob ea miror quæ post allata Animadversionis verba continuo subjiciuntur: sed alia res est de parvo illo orificio excretorio, quod in ejus (Foraminis) medio a parte inferiore sat tuto describit. Datum mihi nunquam fuit nec illum, nec alios quoscunque hujus generis ductus per sectiones attentissimas assequi. Equidem non id miror, nunquam ipsum assequi potuisse, quod ego tot linguis dissectis, semel, non pluries, observavi; illud miror, sat tuto ab ipso tum in dubium revocari quod ego certissime vidi, tum hoc ita fieri, quasi ego ceu rem perpetuam, aut certe frequentissimam istud parvum orificium in Foraminis medio descripsissem, quod quidem primum non in Foramine, sed in eo Canali in quem pluries tantum, hoc est decies omnino, vel undecies ipsum produci Foramen vidi; deinde ut semel a me observatum descripsi. Quæ ut omnes ita esse, intelligant, quando tu censuras quidem Descriptionis nostræ apponis, ipsam vero Descriptionem haud apponis; ipsius particulam quæ huc pertinet, adscribam: Et quamvis non raro immixtus foramini stylus parum alte adigi possit, pluries tamen memini ad longum spatium oblique deorsum nullo negotio descendisse. Sic nuperrime per tractum bini transversi digiti ad basim usque ossis hyoidis eundem adagi; canalemque secundum ejus longitudinem penitus apertum minus cosa scatentem saliva comperi, qualem & ex parvo orificio expressi quod in medio canali a parte inferiore aperiatur. Quibus ex verbis illud quoque intelligi poterit, num verum sit: quod

436.

Advers. I.
num. 27.De Thyroidæ
Glandulæ
Appendice.Ibid. n. 17.
De Medio
Epiglottidis
Ligamento.

loc. cit.

261.
Tab. 22.
Fig. 10.Advers. I.
num. 8.
De Foramine
ad
Linguae
radicem.

432.

De Canali
eidem Foramini
continua-
to.

437

quod me semel vidisse scripsi, id ceu *ordinario deprehendendum asseruisse*, quemadmodum paucis interjectis verbis, ista sic narrat Animadversio : „ De facto receptaculum hujusmodi, liquidis co- „ piose salivalibus scatens ordinario deprehendi- „ tur; ut etiam bene asserit Author. „

ANIMADVERSIO XCIV.

De Canalis
ejusdem
Usu.

Quod tamen si asseruissem, non cum isto magis quem Animadversionis Auctor, quam cum illo quem ipse indicavi, Canalis usu conveniret. Usus autem quem ipse *statui*, hic est. „ Ex plurimis scatebris aliis delatorum usque ad „ hanc partem, ibique concidentium succorum „ mucilagineorum receptaculum merum esse, & „ reservatorium, ut per frequentes linguæ mo- „ tus, perque ejus musculorum in actione tumen- „ tium pressuras laterales a latibulo hoc suo ex- „ pressi, ac per hujus organi facies corrivati, „ præsto sint in hisce casibus hujusmodi latices „ eidem per vices emolliendo, & lubricando, „ motuumque ideo suorum agilitatem facilitati ser- „ vandæ. „ Quo in usu statuendo hæc omnia non videtur attendisse, primum in istis casibus ipsos linguæ, & proximarum quæ una cum lingua agitantur, partium *frequentes motus* illico satis humorum ad emolliendam, lubricandamque linguam ex circumpositis undequaque glandulis exprimere: deinde in nullis aliis; quod quidem ego sciam; præter hominem animantibus, neque adeo in iis quæ creberrime, vel manducando, vel ruminando, vel lambendo, aliove præterea ad usus linguam agitant, istud receptaculum inventum esse: novissime multo majorem hominum partem eodem carere; nam, ut ex paulo ante dictis colligitur, dimidia fere pars id Foramen non habent, & ex iis ipsis qui habent, ne dimidia quidem pars Canalem Foramini adjunctum obtinent, qui videlicet tantum succorum præsertim mucosorum, queat continere, quantum ad illos usus præstandos per linguæ *facies corrivari* prompte possit. Nos contra cum hæc omnia, atque alia præterea quæ consulto omittimus, attenderemus, minime ausi sumus alium Usum indicare, nisi quem verbis hifce paucissimis comprehendimus; *Hunc canalem, seu potius sinum, cum extat, pro magnæ partis earum glandularum* (quæ postremam linguæ superficiem occupant) *excretorio ductu agnoscimus*. Quid enim aliud majore veri similitudine conjicere poteramus de eo Canali qui cum adest, illis certe glandulis subjectus, interjectusque ex parte invenitur? Verum iste nodum, ut ajunt, in scirpo quærit, dum quia nonnullas, easque magis extantes earum glandularum proprio instructas excretorio foramine delineavi, ex me quærit; „ quomodo inde conciliem viam hanc glandula- „ rum harumce excretoriam cum prædicto amplo „ foramine, ad summitatem dorsi linguæ aperto, „ quod dixeram, me *pro magnæ partis earum glandularum excretorio ductu agnoscere*? „ Quid; si in tot, tamque manifestas, quot, qualesque in ejus Scriptis deprehendi, *contradictiones* incidissem? nulla enim certe, etiam me silente, facilius est inter se conciliare, quam nonnullas quidem earum glandularum vel tunc proprium excretorium foramen habere; magnam autem earum partem in eum Canalem suum humorem corrivare.

ANIMADVERSIO XCV.

Compen.
Anatom.
n. 219.
De Lingue
Glandulis.

Cæterum quid in mea Glandularum istarum delineatione quam Diligentissimus Anatomicus Heisterus quantum probet, satis indicat, cum Lectores suos ad illius inspectionem nominatim remittit; quid, inquam, Animadversionis Auctor in eadem reprehendat, ne, quæso, prætereamus; est enim id tertium de quatuor quæ in mea Figura *specialiorem quandam animadversionem exigere existimat*. „ Non vidimus, inquit, adhuc, „ quæ naturaliter lingua tam grandes, distinctos-

„ que notabiliter inter se se glandulosos acervos „ visui Anatomicorum exponeret; multo minus „ quæ corpora hujusmodi glandulosa, instar glandularum quarundam intestinalium, foramina ex- „ cretoria in medio sui insculpta objicerent. „ Ego sane ipsi facile credo, qui tot alia de quibus supra dictum est, non viderit, ne ista quidem unquam vidisse. Sed ipse vicissim credat, necesse est, si non mihi qui observavi, atque ostendi, at innumeris tum Amicis, tum Auditoribus qui pluries mecum ista omnia in linguis sanissimis conspexerint, imo Gravissimo Auctori Whartono qui in sua Glandularum Descriptione diserte hæc docuit; „ per totam linguæ radicem glandulosam „ fere innumerabiles protuberantias instar papillarum dispersas esse: quarum unaquælibet in medio sinulum foraminulo perforatum habet: & „ ex omnibus his foraminibus per linguæ radicem „ sic dispositis mucum exprimi. „ Nos autem; ut de multis nostris vetustioribus observationibus fileamus; primum in Æthiope qui dum optime valere videretur, repente mortuus procubuit, magnas, extantesque illas glandulas, & suo quamque foraminulo in medio pertusas Doctissimis Amicis Venetis monstravimus. In hoc autem Nosocomio tum Cel. Professore Poleno semel, tum frequentissimis Auditoribus præsentibus pluries, hoc est in quinque, vel sex linguis nonnullas interdum, alias fere omnes, aliquando etiam omnes illas glandulas (quod quidem nuper Primariis quoque, ac Cel. Professoribus Antonio Vallisnerio, & Joanni Gratiano, cum Tabula nostra conferentes, ostendimus) omnes, inquam, illas glandulas iisdem prorsus quibus a nobis pictæ sunt, tum foraminibus, tum magnitudine spectabiles, atque adeo interdum magis etiam extantes, distinctasque comperimus, eaque omnia in eorum quidem cadaveribus quibus nihil ea in parte subesse morbo- si, erat omnibus manifestum. Qualia cum duo quoque essent cadavera quibus annis duobus superioribus publice in Theatro sum usus, in utriusque tamen lingua plures glandulas quicunque voluit, præclare vidit instar lenticularium quæ in intestinis occurrunt, excretorium osculum in medio obtinentes: quæ res hic jam amplius nulli ex Anatomes Studiosis non sæpius perspecta cum usque adeo incredibilis Animadversionis Auctori esse videatur; quid, quæso, ipsi visum esset, si præterea addidissem, non illud tantum excretorium foramen in medio earum glandularum esse a me inspectum, sed parvam insuper aliquando caveam (quam id esse opinor quod *sinulum* vocabat Whartonus) in mediis intus singulis glandulis latentem, ad quam illud osculum perducebat; ut luculenter præcæteris in ea ipsa Virgine observavi in qua primum Cervicis Uteri Valvulas animadverti. Quid? si non hoc tantum, sed illud etiam adjicerem, hoc ipso anno in Viro, ut ea Virgo, ex inflatis cranio ictibus mortuo, ideoque lingua, siquis alius, sanissima, non jam a me, sed a meis ipsis Auditoribus glandulas easdem a me delineatis majores, & cum multo majori tum osculo, tum continuata cavea inventas, hac aperta alia in fundo multo quidem minora, sed crebra tamen, & manifesta foraminula exhibuisse; tum vero quid diceret, cum de pictis a me ut sæpe inveniuntur, istis glandulis hoc judicium adscribere non dubitaverit: „ Sentio itaque notabiles hæc, distinctasque exquientias, si quæ dentur, morbosas esse. „ Quanto aliter sentit Cl. Auctor, idemque Solertissimus quem pluries in meis Adversariis laudavi, Anatomicus, qui in litteris Idibus Novembris superiore anno ad me datis, ultro hæc scripsit: *Neque te nescire volui, me magnitudinem glandularum linguæ aliquoties, & nuperrime adhuc in sanissimo subjecto talem reperisse, qualem eam in Adversariis tuis delineasti*. Et ne quispiam harum rerum imperitus fortasse credat, in hoc mihi Doctissimum Professore gratificari voluisse; inspicia- tur, quæso, ea Figura Summi Anatomici Eustachii

Adenogr.
cap. 22.

chii quæ apud te 19. est in Tab. XVIII. platumque erit iis omnibus qui magnitudinis proportionem spectabunt, an istas glandulas æque magnas, & magis etiam *exquisite*, quam ego, *distinctas* delineaverit.

ANIMADVERSIO XCVI.

Adver. V.
Anim. 38.
39. 40. 41.

T Andem ad quartam Censuram venit. „ Tandem, inquit, quoad oscula excretoria, „ per tractum internum tracheæ & bronchiorum, „ inter optime expositos longiores lacertos hiantia: Ego siquidem nec per microscopium attingi „ posse animadvertens; licet revera probabiliter „ adesse plerique ex Anatomicis judicaverint, facile nimis signata stabiliam: Quod & sequentes „ animadversiones proportionis super scatebras eorum glandulas ab Authore in alia sua figura „ delineatas; melius, ut existimo, evincunt. „ Mihi vero qui *sequentes* illas *animadversiones* in superioribus Adversariis expendens, totam quoque hanc Censuram excussi, satisque adeo ostendi, num ego in iis osculis *signandis*, an ipse potius in pernegandis *nimis* revera *facilis* fuerit; nunc illud unum reliquum est, ut quando satis ejus omnes Animadversiones repuli, a tuarum etiam Operarum negligentia meam istam ultimam Figuram, ejusque Explicationem defendam. Nam ut aliis de quibus supra dictum est, omissis, ab istis ipsis excretoriis osculis incipiam, ne unum quidem eorum scalpere; ut Lectores neque Animadversionem, neque Explicationis eam partem queant intelligere in qua ad litt. F. indicari dicitur „ Trachea, & nonnulla Bronchiorum pars, secundum „ eorum longitudinem aperta, ut conspici possint „ interni eorundem longiores Lacerti, atque inter hos hiantia Excretoria Oscula Glandularum „ Membranæ Bronchia investientis; „ sic enim Typographi tui non attendentes, me non in *Bronchiis* tantum, sed & in *Trachea* Arteria ista oscula ostendisse, eaque ad Glandulas pertinere docuisse, non *Membranæ Bronchia investientis*, sed inter extimam, & musculosam Membranam in ipso cartilagineum Tracheæ Arteriæ, & Bronchiorum interstitio dispositas, mea hæc verba temere mutaverunt: *excretoria oscula earum glandularum quæ in Tabula II. Fig. 1. (tibi Tabula LXXXVIII. Fig. 16.) ad lit. O. O. O. delineantur.* Idem quoque in explicatione litteræ l. hæc omnino prætermisere: *Cætera autem quæ in lingua hac exhibui, cum nihil ad hæc Adversaria spectent, hic propterea non explicantur. Quod & de partibus nonnullis subjectæ scapulæ, aliisque similibus, si qua forte & in ulterioribus occurrent Tabulis prædictum volo.* Quibus quidem verbis, in primæ nostræ Tabulæ Explicatione positus, æqui omnes Lectores admoneri poterant, siquid forte ex illo genere minus diligenter explicatum in nostris Tabulis deprehenderetur, id consulto in aliud tempus rejectum esse: quod quidem nescio cur Auctor Animadversionum attenderit nunquam, sed quasi omnibus nostris Explicationibus summa esset manus imposita, quæcunque libuit, reprehenderit; veluti cum paulo ante, delineatas a nobis linguæ glandulas ceu morbosas (& id quidem perperam) arguebat; qua unquam ratione scire poterat, nos ipsas fortasse de industria morbosas, ad earum videlicet structuram illustrandam, delineavisse, idque in aliis Scriptis in quibus non de earum expansione generatim, ut in I. Adversariis, sed de singularum fabrica, naturaque speciatim loqueremur, esse explicaturos? Cæterum, tuas ut ad Operas redeam, ex iis quæ eo tempore non explicavi, negligenter admodum Linguæ Papillas describere; neque enim ego aut fungiformes ita grandes & extantes, aut his passim circumjectas villosas ita paucas & exiguas, aut denique singulares & perpauca illas quas annularis sulcus ambit, simplices omnes, sed eorum nonnullas in una fovea geminas delineaveram; sic enim pluries, imo aliquando etiam ternas conspexi. Alia præ-

terea, ab iis qui istam Figuram cum archetypo nostro conferent, animadvertenda, omitto, ut de aliis istius Tabulæ Figuris pauca subjiciam.

ANIMADVERSIO XCVII.

ET primum quarta quæ ex Verheyenio deprompta est, cujusnam animantis linguam representet, scire pervelim. Humana enim lingua neque istis eo in loco Glandulis, neque istis Corporibus Unguiformibus tantis præsertim in ea delineationis parvitate instructa est. Itaque hunc, & nonnullos etiam alios istius Tabulæ Iconismos humanæ linguæ structuram exhibere, non crediderim. Quod autem ex eodem petitam Auctore Figuram 6. „ in paucis differre, inquis, a figura superiori ex Peritissimo Cowper exscripta; „ vereor, ut omnes qui summam illius superioris Figuræ simplicitatem, ac veritatem agnoscant, id facile concedant. Sed quoniam ex Musculis sex quos Verheyenius in sua addit, de quatuor quidem alias ostendimus quid habendum esse, censeamus; nunc tantum de duobus reliquis Chondroglossi D. quos & *Corniculo-Linguales* vocat, dicemus. Postquam hos ille primum descriperat, ac delineaverat, Exercitatissimus Anatomicus Val-salva recte monuit, *non semper; sed quandoque tantum inveniri.* Deinde ipse Verheyenius in altera Anatomies editione idem confirmavit, descriptioni suæ hæc addens: *sed illud (Par Corniculo-linguale) non reperio in omnibus.* Eodemque pertinere, vix dubito quæ istius ipsius Figuræ Explicationi in eadem editione adjecit. Cum enim in priore scripsisset, se „ prout in figurarum protypo se se obtulere, sex describere musculos „ rum (linguæ) paria; „ hæc quidem verba in altera etiam editione retinuit, sed in Figuræ Explicatione ad litteram D. *Musculi corniculo-linguales*, hæc addidit, *quos in aliis non reperi.* Quæ cum ita sint, et si hanc ejus Explicationis particulam in tuo Theatro sic mutatam invenio: D. *Musculi Corniculo-Linguales (seu Ceratio-glossi) hætenus non descripti;* non id tamen pertinaciter contendam, Auctoris non verba tantum, sed etiam sententiam esse mutatam; verum illud dumtaxat mirabor, te neque istic, neque supra, cum hos quoque inter cæteros Linguæ Musculos describeres, ullum verbum addidisse ex quo intelligerent Lectores, ipsos tamen perpetuos non esse. Minime autem dubito, quin si Explicationes Figurarum 12. & 14. cum Bidloi ex quo easdem proponis, autographo rursus conferas, tu ipse facile intelligas, neque istud „ Tegmen retis in „ star, Involucro mox explicato superimpositum „ esse; cum Auctor ipse, Malpighii anatomem secutus, diserte scribat: „ Avulsis hisce „ tegminibus prodire retis instar stratum quoddam „ tegmen, „ ideoque aperte indicet, istud tegmen reticulare ostenso Involucro subjectum esse: neque Figuram 14. „ ejusdem Tegminis structuram, „ qualis in Oris ambitu, & præcipue in Palato „ invenitur, proponere; „ cum Bidlous, imo & ista ipsa Figura, quæ ipsi 8. est, satis doceant, quæ in eadem monstrantur, ea esse quæ sub reticulari illo velamine operiuntur. Quæ cum Incomparabilis Anatomici, eorumque Inventoris Malpighii verbis, allata ejus Epistola, in hoc Capite egregie descripseris; optandum sane erat, ne adjectas ab eodem illi ipsi Epistolæ Figuras ommitteres quibus illa, hoc est Papillas, nervosque in ipsas productos, fideliter pinxit. Sed & quinque illarum quas dumtaxat non omisisti, quænam ad quam linguæ partem attineat, non satis Lectores intelligunt, prima illa Figura omissa in qua Auctor linguam in totidem partes, singulas singulis iis Figuris respondentes, distribuerat; ut illud fileam, in plerisque earum, & potissimum in 17. non omnes quæ in archetypo, fibras, earumque complicationes pari diligentia descriptas esse.

437.

395
1. 1. tr. 4.
cap. 19.

432.

438
Anatom.
hum. corp.
Tab. 13.

Ibid.

ANIMADVERSI O XCVIII.

439 **I**N postremo hujus libri, atque adeo totius tui Operis Capite Labra, & Glandulas Salivales describis. Sed illorum Ligamenta frustra perquiras, quamquam altera earum Figurarum quas ex Verheyenio sumptas in proxima Tabula apposueris, admonere te poterat, ut ipsorum quoque descriptionem ex eodem saltem Auctore peteres. Is autem ex Adversariis nostris facile sumpserat, ut intelligere omnes poterunt qui non illam modo nostra cum descriptione, verum etiam utramque ejus Anatomes, imo illius quoque Figuræ editionem inter se conferent. Illud quidem ultro, ac nemine adhuc monente, confiteor quod cum eam descriptionem proposui, ignorabam, & a Cl. Ruyschio, cujus ad id tempus nullus, nisi primus, Thesaurus Anatomicus Bononiam fuerat importatus, & a Bidloo, sed non suo loco, atque ideo meos facile oculos præterlapso, superioris Labri Ligamentum memoratum antea fuisse; veruntamen qui inferioris quoque Ligamentum, quod etsi, velut innui, altero minus est, labro tamen tracto, satis plerunque prodere se solet, eo tempore indicavisset, comperire adhuc potui neminem. Sed si in tua Labrorum historia ambo hæc Ligamenta desunt; contra in tua Salivalium Glandularum descriptione illæ ambæ redundant, quas ais, ad Canthum Oculi minorem ex observatione Clariss. Nuckii, repetiri. Earum namque majorem, ut totam, quam recte addis, Solertissimi Auctoris Sialographiam versemus, non nisi in canibus inventam, observatamque deprehendimus. Minoris autem si ut Figuras affers, ita descriptionem, quam in alio Opusculo proposuit, addidisses; Lectores Nuckium ipsum diserte fatentem invenissent, se, in subjecto Humano eadem detegere nondum potuisse; quod quidem postea, ut in alia etiam Animadversione dixi, neminem legi qui se fecisset, profiteretur.

ANIMADVERSI O XCIX.

De Gland. Tract. Tab. 27. Fig. 2. **S**Ed neque 3. quam ex Stenone profers, Figura (jam enim super adjecta huic Capiti postrema Tabula pauca addam) sed nec ista, inquam, Figura ad humanam pertinet anatomiam, ut non modo partes ejus omnes, verum Auctor etiam ipse testatur, cum ista glandularum buccarum vasa setarum capacia haud in homine, sed in brutis describere se, monet. Quod autem eodem in loco adnotat, eas glandulas, ut in homine egregie labiorum stipantes ambitum, totidem uvas referunt, - sic in brutis totum, buccarum replere planum; id si Verheyenius observasset, non eam Figuram proposuisset in qua glandulosi acini vel æque magni, confertique in toto fere buccarum spatio, ac circum labra, conspiciuntur. In qua Verheyenii Figura illa etiam Tironum causa notabimus, alterum quod Parotidem glandulam in medio qua ipsius Ductus radices prodeunt, deficientem, & quasi interruptam repræsentat, id tantum a vero abesse, ut contra haud raro observaverim, ejusdem glandulæ lacinia & quasi appendice magnam Ductus partem, imo aliquando totum fere ab origine ad usque insertionem Ductum obtegi; alterum quod Ductum sic tensum pingit, nisi forte immisso specillo sit tribuendum, id rebus ita, ut ostendit, præparatis, non modo a me conspectum non esse, verum tantam potius laxitatem esse observatam, ut sic prospectum esse, crediderim, ne ab alterna subjecti muscoli Masseteris inter manducandum turgentia Ductus aliquid detrimenti capiat, ut facile caperet, si brevior, atque ideo valde tensus foret. Sed hæc levia sunt præ iis quæ in Verheyenii Ductus ejusdem descriptione Morgagni Adversaria Anat. VI.

animadvertimus. Hunc enim, inquit, ex diversis glandulæ partibus emergentem, inde versus anteriora inter musculum buccinatorem, & Buccarum glandulas oblique deorsum tendentem, in illam oris partem quæ dentibus molaribus superponitur, prope labrum inferius desinere, osculo amplo ac patente; ita ut etiam per tubulum mediocris magnitudinis inflari queat. Verum enimvero is Ductus oblique antrorsum descendens, per Masseteris primum, inde per Buccinatoris Musculi exteriorem faciem sub ipsis communibus integumentis; non vero inter musculum buccinatorem, & Buccarum glandulas pergit: quæ res a Chirurgis magnopere attendenda est; tum Buccinatorem eo in loco perforat, ut contra intermedios superiores dentes molares, non vero prope labrum inferius, ipsius orificium invenire consueverim; idque sæpius Ductu arctius, nunquam autem in homine quidem de quo loquimur, ita amplum ac patens, ut etiam per tubulum mediocris magnitudinis inflari Ductus posset.

ANIMADVERSI O C.

SEd in Ductu quoque Maxillaris Glandulæ describendo lapsus est Verheyenius, non in eo dumtaxat quod ab Solertissimo Heistero notatum est, sed in eo etiam quod illius, inquit, ramus, musculis, observante Warthono, accedit ramus ex quadam glandula vicina minori; id enim Whartonius in bove, non in homine, observavit. Contra vero cum idem Verheyenius in Vascularum Glandularum Sublingualium descriptione, Stenonis, cujus nomen reticet, iis verbis utitur: sibi invicem parallela, a lingua versus gingivas recedunt, ubi ad digiti fere a dentibus distantiam vix conspicuis, nisi premantur, ostiis per tunicam hiant; etsi Steno neque cum hæc scripsit, neque alio in Opusculo, cum iterum de iisdem Vascularibus verba fecit, brutorum anatomem indicans, usquam hominem diserte memoravit; imo Iconismum qui ad bruta manifeste pertinet, adjecit; nemo tamen credat, Verheyenium quæ humanæ fabricæ repugnent, proposuisse. Quod eo magis monendum censeo, quo plures video qui Sublingualium hominis Glandularum Vascula vel juxta Maxillarium Ductuum ostia, vel, quod Cowperus ipse tradit, per hæc eadem exonerari, doceant. Namque ut id interdum, aut ex aliqua saltem parte observari, non negem; illud tamen certissime scio, me non modo frustra Maxillarium Ductus aliquando aperuisse, si forte aliquod ejusmodi Vasculum in ipsos influens comperirem; sed multoties complura utrinque Vascula inter se parallela conspexisse, & Amicis præsertim Venetis ostendisse quæ ab exterioribus Sublingualium Glandularum lateribus, non antrorsum, sed in transversum recta gingivas versus tendebant, & non magno a Glandulis intervallo peculiari quodque osculo hiabant, per quod sæpius tenuiores setas eo majori voluptate immisi, quod apud Stenonem legeram, hæc, valsa ne quidem in boum genere setam facile recipere. Quæ cum Nuckius neque describat, neque delineet, per eum poteras quem modo memorabam, Iconismum Stenonis exhibere, quando & alter quem ex eodem sumpseris, velut diximus, est ex brutis descriptus, & Tonfillæ Figura quam cum Nuckio affers, ex vitulo petita est. De cujus Glandulæ in ipso homine varietatibus sane digna proposuit Cl. Heisterus quæ a te isto in Capite, atque adeo ista in Tabula describerentur. Idem quoque de naturali utriusque Tonfillæ situ, & loco in diducto hominis ore luculenter demonstrando ferme unus post Fabricium nostrum ab Aquapendente sollicitus fuit. Verum ne ab istis ipsis quas exhibuisti, Figuris longius divager, sed finem tandem scribendi faciam; duo adhuc, non plura, notabo. Alterum est, in

1. 1. tr. 4. cap. 13.

Ibid. c. 20.

Comp. Anatom. Præfat. Adenogr. cap. 21. loc. cit. Observ. de Gland. Oris.

De Gland. Tract.

De Sublingualium Glandularum Ductibus. Anatom. Append.

Tract. cit.

Ephem. N. C. Cent. IV. Obs. 190. De Locutione.

451. Figuræ 8. Explicatione *Glandulam Maxillarem*
 451. *Warthonianam cum suo Salivali ductu* D. E. pro
Glandula & Ductu Stenoniano F. G. indicari, &
 vicissim: quem errorem semel, atque iterum haud
 Explicat. animadversum a te miror, primum in Bibliotheca
 Tab. 106. tua Anatomica, deinde istic. Alterum est, cum &
 Fig. 6. istic, & in illa Bibliotheca eadem Nuckii Figu-
 441. ræ iisdem verbis proponantur quibus utrobique,
 442. memoratarum modo Glandularum, & Ductuum,
 451. Glandulæ item Sublingualis, Glandularum deni-
 451. que Salivalium quæ in canum Orbita sunt, ha-
 rumque Ductuum *naturalis magnitudo* promitti-
 tur; easdem tamen Figuras majoribus admodum
 in Theatro, quam in Bibliotheca dimensionibus

exhiberi; ut alterutro in loco in plerisque ea-
 rum Lectorem falli, necesse sit. Hæc habui,
 Vir Cl. quæ ad tuum Anatomicum Theatrum
 animadverterem: in quibus si quid subinde veri,
 si quid unde Facultatis nostræ Studiosi juvari
 queant, identidem agnoveris; pro tuo candore,
 & veri studio, ac pro ista egregia quam præ te
 fers, eorum commodis inserviendi voluntate, spe-
 ro, fore ut eandem mihi gratiam habeas, quam
 ego certe, si in editis contra me Animadversioni-
 bus tantundem agnovissem, & tibi, & earum
 Cl. Auctori easdem ob causas æternum eram ha-
 biturus.

Adversariorum Anatomicorum VI. Finis.



F I G U R A R U M E X P L I C A T I O. T A B U L A I.

FIGURA I. ad Animadversionem I. pertinens, Posteriolem partem Cerebri, Dura Meninge obducti, & in hac tres majores Sinus apertos monstrat, ut quæ in illa Animadversione de Sinu Longitudinalis sine, & Lateralis Sinistri initio scripta sunt, oculis subjiciantur.



- A. Hemisphærium Cerebri sinistrum ex obliqua visum.
- B. Cerebelli Pars sinistra ad eundem modum conspecta.
- C. Cerebelli Pars dextera.
- D. Processus Posterior Durae Meningis (de quo in II. Animadv.) utramque Cerebelli Partem a tergo dirimens: qui cum medium adamussim locum teneat, quantum ab hoc deflectat finis Longitudinalis Sinus, ostendit. Porro de Partibus hætenus in hac Figura explicatis, ut & de proximis Sinibus, tantum delineatum est, quantum proposito huic nostro satis fuit.
- E. Sinus Longitudinalis.
- f. Hujus finis, & Lateralis Sinus Dexter initium.
- g. Sinus Lateralis Sinistri initium, hoc in Capite triplex.
- H. Sinus Lateralis Dexter, hic quidem de industria explicatus, distractusque; sed erat tamen revera Sinistro amplior.
- I. Sinus Lateralis Sinister.

FIGURA II. ad II. pertinens Animadversionem, Offis Occipitis partem a Torculari ad magnum ejusdem offis Foramen ostendit, Dura Meninge opertam, in qua Sinus aliquot, & præsertim Posteriores illi qui in ea describuntur Animadversione, aperti spectantur.

- A. Sectio Offis Occipitis, atque adeo ejus offei Processus de quo in memorata Animadversione.
- B. Magnum Foramen Offis Occipitis.
- C. Torcular.
- d. Finis Longitudinalis Sinus, cujus quidquid erat reliquum, ablatum est.
- E. Pars Sinus Lateralis Dexter.
- F. Pars Sinistri.
- g. Finis Sinus Quarti.
- h. Finis Sinus Posterioris Dexter.
- I. Sinus Posterior Dexter.
- K. Sinus Posterior Sinister.

T A B U L A II.

FIGURA I. ad Animadversiones pertinens XXXIII. & XLVI.

Sinistrum Juvenci Oculum ostendit cum Membrana niſtante, & Glandula, ac Caruncula Lacrymalibus; ut errores qui ex utriusque harum confusione, quasi una atque eadem res essent, a multis adhuc in Anatome retinentur, penitus convellantur.

- a. Limbus Palpebræ superioris.
- b. Limbus Palpebræ inferioris.
- c. Corneæ pars.
- d. Membrana niſtans, reliquam Corneæ partem hic obducens; illam enim ex angulo interno tantum protraximus, quantum proposito nostro satis erat.
- e. Ejusdem membrana, semilunaris, & niger limbus. Illud autem album triangulum quod inter

l. Hujus finis.

m. Processus Posterior Durae Matris, binas Cerebelli Partes dirimens: qui minus clare hic apparet, quia superior, magisque extans ipsius pars a diducto Sinu Posteriore Dextero obducitur. In hoc enim Iconismo delineando illud potissimum spectavi, ut quam descripseram Sinuum Posteriorum figuram oculis subjicerem: cui rei illud quo usus sum, caput, ob alterius eorum Sinuum amplitudinem singularem, maxime fuit idoneum. Istam igitur præsertim figuram Majorum Sinuum figuræ simillimam attendi hic velim; nam pleraque alia, quo plerunque modo se habeant, melius ex ipsis Animadversionibus cognoscetur.

FIGURA III. ad Animadversionem XI. spectans, Repræsentat alterum, ut sic loquamur, hemisphærium Cerebelli, duobus vel tribus in locis, ubi Circuli in quos ejus superficies distribuitur, altius descendunt, diductum, ut alia circulorum segmenta, in quæ priorum illorum circulorum facies assurgunt, in conspectum veniant.

- A. Sectionis qua hoc Cerebelli hemisphærium ab altero divisum est, portio.
- B. C. Duorum Circulorum altius descendentium facies, secundum naturam se mutuo contingentes, hic autem expansæ, ut ea Circulorum in quæ ipsæ distribuuntur, segmenta, & ex his alia inter se conferta, alia ab una earum facierum in alteram producta appareant.
- D. Alterius Circuli facies, in qua Circulorum segmenta magis quam nostri Artifices expresserunt, tum elegantia, tum inter se parallela conspiciuntur.

FIGURA IV. ad XXV. & XXVI. Animadversionem pertinens,

Ostendit Sellæ Equinæ Parietem posteriorem ab anteriore parte inspectum, una cum evulsa Glandula Pituitaria, & quidem ex majoribus.

- a. Paries posterior Sellæ, ad medium concavus.
- b. Glandula Pituitaria cum sua Appendice ex Sellâ extracta, atque inversa, sive oblique retrorsum super ostensi Parietis summam partem revoluta, ut sic facilius intelligatur, Appendicem intra ejusdem Parietis concavum a. collocatam antea fuisse.
- c. Glandula Pituitariæ Appendix.

e, & d porrigitur, extrema pars est, hic quâdantenus ob elevationem suam apparens, cartilaginis intra ipsam membranam condita, quæ quidem cartilago vertice ad istum semilunarem limbum, basi autem ad Glandulam usque pertinet Lacrymalem.

f. f. Duo tenuja specilla inter Corneam, & Membranam niſtantem interjecta, & singula in singulos Glandula Lacrymalis Excretorios Ductus suo denique altero tenuiore extremo inserta, ut intelligatur, ejus Glandula Ductus in niſtantis Membranae interna facie hiare. Eam autem faciem, & duo ipsorum Ductuum oscula hic non ostendimus, propterea quia in Iconismis Stenonis videri possunt.

G. Lacrymalis Glandula (de qua modo ad litt. e., & f. f. dicebamus) inter latus internum globi oculi-

oculi, & orbitam naturaliter locata, atque abscondita; hic autem deorsum, atque antrorsum, ut appareret, protracta. Est autem hæc Glandula Boum, & aliarum plurimum brutarum Animalium propria.

H. Lacrymalis Caruncula, pilis ornata, iisdem Animalibus, atque homini communis, ad internum Palpebrarum angulum in propatulo a natura posita. Hoc autem tuberculum, sive hæc Caruncula glandula non est; tantum abest, ut cum Glandula G. confundi debeat.

FIGURA II. ad easdem pertinens, itemque ad XLIV. aliasque Animadversiones, Sinistrum hominis oculum exhibet, ut cum priore bovino conferri, & quænam ex iis quæ in eodem ostensa sunt, utrique sint, aut non sint communia, uno fere aspectu intelligi possit.

- a. Angulus Palpebrarum internus, & in eo Caruncula Lacrymalis, cujus pili qua ratione conspici debeant, in XLVII. Animadversione ostensum est. Hoc igitur tuberculum; non autem glandula; homini quoque datum est.
- b. Membrana Semilunaris rubella, ex parte, videlicet, ut & ipsa Caruncula, & Palpebrarum limbi, quantum naturalis hic Palpebrarum ipsarum positus permittit, ostensa. Quæ membrana etsi neque usu, neque magnitudine; sede tamen nictanti Brutorum Membranae respondet.
- c. Limbi Palpebræ superioris pars illa in qua prominentia est, in cujus prominentiæ extremo ejusdem Palpebræ punctum lacrymale insculptum est.

FIGURA III. spectans ad Animadversiones XXXI. XLI. XLII. XLIII. LI. LIII. LIV. LV. LXI. LXII. LXXXVIII. LXXXIX. XC.

Humani Capitis, a basi cranii ad primos dentes molares fere ad perpendiculum dissecti, anteriorem sectionem ostendit.

- A. A. Pars Ossis Frontis anteriorem Cranii basim efficiens.
- B. B. Sinus Frontales, in hoc cadavere amplissimi, utrinque aperti.
- c. Ejusdem Ossis Processus, Spinæ instar per medium ejus internæ faciei assurgens.
- d. Foramen insculptum in interstitio inter eum Processum, & Cristam Galli interjecto: quod foramen etsi circulare erat in hoc cadavere, tamen cum hic ex obliquo inspiciatur, ellipticum videtur.
- e. Processus Ossis Ethmoidis Crista Galli vocitatus.
- f. f. Sinus Ethmoidæi.
- G. G. Orbitæ, ex quibus oculi dempti sunt.
- H. H. Sinus Maxillares.
- i. i. Septum Nasi.
- k. Ejusdem Septi crassitudo major, in hoc, & nonnullis aliis cadaveribus in eo in quo delineavimus, loco a nobis observata. Non est autem hæc crassitudo, de qua in LXXXVIII. Animadver-

versione verba fecimus. Illa enim fere statim supra hunc locum in membrana Septi latera investiente occurrit; sed quoniam sectione aliquanto anteriore opus fuisset ut satis ipsa intelligi posset, idcirco innuere hic potius quam minus apte & perspicue delineare eandem voluimus.

- l. l. Nasi dextera, & sinistra cavea, & in singulis singula setæ, Foraminum Stenonis in quæ sunt infixæ, loca indicantes potius quantum in hac delineatione licuit, quam plane ostendentes.
- m. Locus in palati antica regione, quem versus ab iis Stenonis Foraminibus via est.
- n. n. Orificia Ductus utriusque Lacrymalis Majoris non in summo vertice, sed in ipso exteriori ejus recessus Nasi pariete occurrentia qui inter Maxillarem Sinum, & Inferius Os Turbinatum, figura præsertim extrinsecus conica, utrinque asurgit: quæ Orificia ipsa qua erant naturaliter in hoc cadavere non solum figura, & positione, verum etiam sede, & magnitudine quam diligentissime exprimenda curavimus. Etsi enim sæpe his aliquanto majora, nonnunquam etiam valde magna vidimus; quoniam tamen in Theatri Tabula extra ordinem V. Fig. 2. & 3. tanta amplitudine picta sunt, quanta nunquam adhuc videre potuimus, idcirco nobis contra, minima quidem, sed tamen quanta & in hoc cadavere, & in aliis nonnullis ostendimus pingenda esse, existimavimus, ut facilius Rei Anatomicae Studiosis fidem faceremus, quamvis non hac qua pinximus, magnitudine, at ea certe quæ huic parvitati quam illi amplitudini propius accedat, multo frequentius inveniri.
- o. o. Ossa Turbinata Inferiora.
- p. p. Ossa Turbinata Superiora.
- q. q. Ossa Turbinata (sic enim facilioris doctrinæ causa juvare credimus appellitari) Suprema, seu majoris Minima.

Quod superest; quicumque hanc Figuram nostram inspicient, monendi sunt, minime a nobis ignorari, in aliis capitibus Septum Narium in alterutrum latus curvatum, Ossa Turbinata cum majora, tum non ita æqualia, Caveas ipsas Narium, humiliores, aut ampliores; ne de Pituitariis Sinibus quidquam dicamus; haud raro inveniri. Nos tamen subjectum in quo fere omnia elegantius disposita occurrerent, de industria selegimus, ut ipsa hujus sectionis non modo perspicua, sed concinna etiam atque eleganti figura (quanquam nonnihil huic Operarum incuria detraxit) exemplum præberemus quæ possent internarum Partium Nasi, ipsisque adjunctorum Sinuum, & Ductuum structura, positus, communicatio, aliaque ejuscemodi, clare, neque ineleganter sub aspectum poni, si videlicet aliarum consimilium anteriorum, & posteriorum Capitis Sectionum Figuræ ex ordine describerentur.

ADVERSARIORUM FINIS.

